

# С.Р.Фатак

## МАТЕРИЯ МЕДИКА

## ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВ

### ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Мы старались соблюдать принципы, заложенные автором в основу книги.

Структура симптома несколько изменилась, и это определяется особенностями русского и английского языков. Нам хотелось сделать так, чтобы чтение книги не требовало лишних усилий для "расшифровки" симптомов, иногда это сопровождалось небольшим увеличением объема текста (при переводе "телеграфного" стиля оригинала в более или менее литературный). В книге Фатака симптомы "накладываются друг на друга" как бусы, или "вставлены" друг в друга как матрёшки. Но в отличие от деревянной матрёшки, у Фатака матрёшки, спрятанные внутри, часто оказываются равновеликими: порой, как в головоломке, приходилось определять, какая связь существует между частями симптома, и разгадать эту головоломку иногда было весьма непросто.

Сохранилось применение точки с запятой во многих симптомах. Часто вместо точки с запятой употреблялось двоеточие, а симптомы второго уровня, модальности и прочее следовали после точки с запятой, или двоеточия, или (если симптом был небольшим) со знаками, принятыми в русской пунктуации. Если симптом был большим, развёрнутым, то при перечислении ставилась точка с запятой или запятая, в зависимости от количества перечисленных деталей, симптомов второго уровня и модальностей. Изредка очень громоздкий симптом делился на две части, при этом мы стремились не исказить смысл всего симптома. Модальности, как правило, отделялись точкой с запятой.

Таким образом, при переводе симптомов, применялись следующие знаки препинания и конструкции:

1) точка с запятой:

отделяет "заглавный симптом", или симптом первого уровня, от симптомов второго уровня и модальностей;

отделяет симптомы друг от друга, если они достаточно развёрнутые (в противном случае применялась запятая);

2) двоеточие иногда выполняет ту же функцию, что и точка с запятой — оно ставится после симптома первого уровня; применяется, как правило, при перечислении;

3) короткий симптом, не включающий перечисление, переводился как предложение, которое строилось в соответствии с принятыми в русском языке нормами (главные, второстепенные члены предложения и т. д.);

4) иногда, для того, чтобы подчеркнуть то место, где заканчивается симптом первого уровня и начинается симптом второго уровня, использовалась конструкция "в том числе" (можно было бы выбросить ее при чтении без ущерба для текста, когда симптомы первого и второго уровня имеют одинаковый ранг; но, собственно необходимость в ней возникла из-за довольно часто встречающегося различия в степени выраженности, значимости отдельных частей симптома: первая часть симптома может "существовать" без второй — вот смысл применения этой конструкции).

Кроме того, мы не старались изменить лексику, терминологию, принятую у автора: адаптировать, приблизить её к лексике 90-х годов. Терминология узнаваема, но мы позволили себе кое-где в скобках дать её перевод (толкование) с латинского или греческого языка. В нескольких случаях смысл высказывания остался для нас не вполне ясен: в подобном случае мы давали буквальный перевод, "подстрочник". Следует отметить, что оригинал книги содержал значительное количество опечаток.

Будем признательны за замечания, которые, несомненно, возникнут у сторонников гомеопатического метода при чтении нашего перевода.

Благодарю Е.Ю.Филина, моего наставника и неизменного руководителя, за терпение и внимание, а М.А.Лазарева, моего брата — за его преданность и поддержку: они были необходимы мне в процессе работы над книгой.

Н.А.Лазарева

### ПРЕДИСЛОВИЕ

#### *Почему появилась эта книга*

Студенты, изучающие гомеопатию и знакомые с разными руководствами по гомеопатическому лекарствоведению, написанными разными авторами, должны были заметить, что некоторые симптомы конкретного лекарства, описанные в одном руководстве, не указаны в другом. Доктор Богер (Boger) выбрал наиболее важные симптомы из разных Materia Medica и включил их в свой "Свод ключевых симптомов" (Synoptic Key). Но, описывая симптомы, он порой употреблял такие слова, скрытый смысл которых можно понять, только если уметь читать между строк. Более того, доктор Богер опустил многие важные симптомы, упоминавшиеся другими авторами.

Я приведу пример, чтобы проиллюстрировать сказанное. Доктор Берике даёт симптом "Задержка мочи после хирургической операции" при описании средства Клаустикум, а Богер не приводит этот симптом. И наоборот, Богер в описании препарата Карбо анималис указывает симптом "Вздутие живота после операции", который не упоминается другими авторами. Доктор Кент не включил вышеназванные симптомы в свой Реперторий. Оба симптома однажды предоставили мне возможность благополучно разрешить создавшуюся неловкую ситуацию.

Доктор Богер в препарате Меркуриус коррозивус приводит очень странный симптом "Дышит как сквозь металлическую трубу", который больше не встречается ни у одного автора. К тому же Богер ставит этот симптом во главе генеральной рубрики: "Труба металлическая — Меркуриус коррозивус". Значение очевидно. Если пациент приходит и рассказывает врачу, что во время стула или мочеиспускания, или даже во время разговора, у него возникает ощущение, что все эти действия он выполняет как будто через трубу, Меркуриус коррозивус может оказаться полезен. У меня был случай, когда я назначил это средство пациенту, который "говорил, как будто через трубу".

При правильном понимании, Репертория и Materia Medica доктора Богера бывает достаточно для рассмотрения большинства случаев. Но мы не обладаем ни его интеллектом, ни его проницательностью.

Составляя свою Materia Medica, я включил в нее все симптомы, которые давал доктор Богер. Я пытался упростить многие его неоднозначные слова, объясняя их смысл. Кроме того, я собрал много полезных клинических и прочих симптомов из других руководств по гомеопатическому лекарствоведению, которые не упоминал доктор Богер, и включил их в свою книгу.

Моя Materia Medica построена по обычной схеме. Под рубрикой "Общее" дано краткое описание (портрет) лекарства наряду с указанием областей, на которые он действует, сообщается о том, как он действует, какие болезни склонен излечивать, а также какие причинные связи ему свойственны. Затем следуют общие модальности средства, а после этого — местные симптомы и их собственные модальности.

Я полагаю, что доктор Богер собирался составить краткий Реперторий, расположив симптомы скорее в алфавитном порядке, чем по областям тела. Подобным же образом желательно было бы составить краткий лекарственный справочник (Materia Medica), в котором были бы приведены все относящиеся к данному средству признаки. Богер собрал ключевые симптомы в своём "Своде ключевых симптомов" для составления этих книг. С моим скромным умом и ограниченными познаниями в гомеопатии я попытался осуществить его намерения. Насколько моя попытка оказалась успешной, покажет только время.

### *Благодарность*

Моя благодарность обращена к моему другу доктору Х. Мерчант (miss Homai Merchant) за то, что она совершенно безропотно дважды перепечатала мою рукопись. Я благодарен также моему сыну, доктору Д.С.Фатаку (D.S.Phatak) за то, что он несколько раз уточнил результаты испытаний — от первого до последнего — и помог напечатать книгу в Издательском Бюро Mouj. Достойны благодарности господин Датай (Datay), осуществивший набор, и господин М.Р.Сейн (M.R.Sane), который с лёгкостью сверстал эту книгу.

Советую читателям заглянуть в "Советы для начинающих" и "Указатель хирургических средств".

Наконец, я очень благодарен Богу за то, что Он, несмотря на моё большое сердце и преклонный возраст, пощадил меня и дал увидеть книгу завершённой. Я сделал всё, что мог. Пусть способные молодые гомеопаты продолжат эту работу.

С.Р.Фатак

Июль 1977 года.

## СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Materia Medica и Реперторий — это два столпа, на которые опирается успешная гомеопатическая практика. Они дополняют друг друга. Каждый в отдельности — это только часть целого, поэтому неполон.

Изучение Materia Medica требует продолжительных усилий. Не существует короткого или легкого пути к успеху.

Лекарства должны стать Вашими друзьями. Вы можете узнать друга по тому, как он звонит или стучит в дверь, как её открывает, как поднимается по лестнице и т. д. Подобным образом Вы должны уметь узнавать лекарство, даже когда видна лишь его часть.

Характерные признаки лекарства можно найти в разделе Общее, Модальности (то есть, Хуже — Лучше) и Психика. Тщательное изучение этих разделов поможет Вам подобрать лекарство для Вашего пациента.

Чтобы добиться этого, следует во время чтения Materia Medica находить каждую рубрику в Реперторий. В результате сравнения лекарства с другими препаратами из той же рубрики у Вас в голове запечатлеется относительное значение каждого средства. Кажется, что это скучно, утомительно. Но в итоге в вашем мозгу возникнет непоколебимое и ясное представление о препарате, его портрете.

**СИМПТОМЫ.** Наиболее трудная вещь в гомеопатии — это интерпретация симптомов. Когда пациент рассказывает о себе своими словами, Вы должны суметь записать эту информацию в терминах, близких к названию рубрик Репертория. Если Вы хорошо изучили Materia Medica, Вам в голову автоматически придёт несколько лекарств. Уточните их по Реперторию. Более важными являются причина болезни и модальности. Особенный симптом, который не объясняется существующей патологией, точнее указывает на подходящее лекарство.

Когда чашка наполнена наполовину, она одновременно наполовину пуста. Оценивая симптомы, попытайтесь взглянуть на один и тот же предмет с разных точек зрения.

Кроме того, читая Materia Medica, старайтесь запомнить особенные свойства препарата. "Мягкие выделения" у Пульсатиллы; "не может избавиться от вредных веществ" у Цинкум металикум, "большое разнообразие симптомов" у Меркурия и т. д. Как уже говорилось, это опознавательные знаки лекарств.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.** Применение точки с запятой в книге имеет особый смысл. Например, у препарата Калькарея карбоника в разделе Психика вы найдёте: "Страх, боится; болезни, бедности, несчастья, безумия; что за ним наблюдают". Это означает: "Страх, боится (1) болезни, (2) бедности, (3) несчастья, (4) безумия и боится, что за ним наблюдают". У препарата Фосфор в разделе Общее: "Болезненные последствия гнева, страха, горя; беспокойства; промокания под дождем; стирки белья; употребления табака; и т. д. симптомы должны быть интерпретированы сходным образом. Это удобно для получения нужной комбинации слов.

Для градации симптомов применяется три разновидности шрифта. Это позволяет разграничить степень важности различных симптомов. Но у конкретного пациента симптом, имеющий низкую оценку в книге, может оказаться самым важным. Поэтому Вы не должны чрезмерно увлекаться градацией симптомов.

**НАКОНЕЦ,** следует уважать мнение авторитетных гомеопатов. Но если Ваш опыт противоречит их утверждениям, оставайтесь непоколебимы перед их авторитетом. В конечном счете, Ваш опыт — лучший авторитет в том, что касается Вас.

**С.Р.Фатак**

## ЗАМЕЧАНИЯ ИНДИЙСКОГО ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга должна была выйти в конце 1963 года. Просим извинения за задержку.

В обозначенное время не было написано ни строчки. Автор работал над книгой с неохотой. Понадобилось более трёх лет, чтобы полить остова книги. Пересмотр, исправление и дополнение продолжались. В 1970 году книга была подготовлена к печати.

От автора был получен также "Полный гомеопатический реперторий". Но хранение книг в Бомбее — настоящая проблема. Поэтому нам пришлось вести переговоры с другими сторонами, чтобы осуществить издание этой книги.

Переговоры велись с двумя или более разными компаниями. Они затянулись и, в конце концов, провалились.

Мы решили опубликовать её и отправили в печать в августе 1974 года. И вот, спустя три долгих года, мы представляем её вниманию любителей гомеопатии.

Кроме нас самих винить в задержке некого. Это вовсе не попытка оправдаться — это изложение основных фактов.

Мы издали две книги по гомеопатии, написанные доктором С.Р.Фатаком. Уверены, что с помощью этих книг будет объяснено большинство случаев из Вашей ежедневной практики. Желаем Вам пользоваться ими терпеливо, с умом и прилежанием. Чем больше Вы будете ими пользоваться, тем полезнее они будут казаться Вам.

**Издатели.**

## ABIES CANADENSIS

**Общее.** Поражает *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ И НЕРВЫ*. В желудке Абиес канадензис вызывает катар, из-за которого у пациента усиливается чувство голода и возникает желание грубой пищи, например, солений, маринадов, редиса, репы и т.д. Из-за нервной слабости пациент все время хочет лежать, чувствует дурноту. У женщин это средство показано при смещении матки, которое является следствием недостаточного питания (усвоения пищи) и слабости. Своеобразные ощущения: правое легкое и печень кажутся твердыми и маленькими; матка кажется мягкой. Лежит с поджатыми ногами.

**Психика.** Легко раздражается или тихий и беззаботный.

**Голова.** Кажется, что она легкая или как будто в ней что-то плавает. Плывёт.

**Желудок.** Волчий аппетит. Склонность съедать гораздо больше, чем может переварить. Вздутие живота и желудка, сопровождающееся сердцебиением.

**Женские половые органы.** Ощущение болезненности в матке уменьшается от давления. Матка как будто мягкая, слабая.

**Лихорадка.** Холодная дрожь, как будто вместо крови — ледяная вода. Кожа. Влажная и липкая.

## ABIES NIGRA

**Общее.** Это средство полезно при многих болезнях, сопровождающихся желудочными симптомами. Абиес нигра вызывает диспепсию, сопровождающуюся функциональными сердечными расстройствами, особенно у пожилых людей. Это средство полезно также при несварении желудка у пациентов, которые злоупотребляют чаем, а также курят или жуют табак. Главным симптомом при расстройстве пищеварения является ощущение, как будто в кардиальном отделе желудка лежит сваренное вкрутую яйцо. Пациенты описывают его таким образом: как будто плотный комок под ложечкой или в легком, хочется его откашлять.

**Хуже.** После еды.

**Психика.** Очень подавлен, не способен думать или учиться.

**Желудок.** Полное отсутствие аппетита утром, но очень голоден в полдень, ночью. Боль в желудке, всегда появляющаяся после еды.

**Грудная клетка.** Затрудненное дыхание; хуже, когда ложится. Сердце работает с трудом и медленно, может быть тахикардия или брадикардия.

## ABROTANUM

**Общее.** Это растение — Артемизия абротанум — поражает нервы, вызывая онемение, слабость, дрожание и парез. Абротанум — средство для лечения дистрофии (маразма) у детей в случаях, когда страдает усвоение пищи. Несмотря на хороший аппетит, дети худеют, особенно нижние конечности. Это средство вызывает *истинный метастаз заболевания*. Ревматизм, возникающий после подавления поноса. Когда подагра отступает, возникают другие проблемы. Это средство характеризуется *склонностью к экссудации*. Образование выпота в полости плевры, суставов и т.д. может быть проявлением процесса метастазирования заболевания, но может и не являться таковым. Абротанум вызывает также чередование болезней: одно болезненное состояние проходит, другое — возникает; например, геморрой чередуется с ревматизмом. Это средство подходит новорожденным или маленьким детям, особенно мальчикам, страдающим водянкой яичка, носовыми кровотечениями. Оно устраняет слабость, сохраняющуюся после гриппа. У новорожденных из пупка сочится кровь, он мокнет. Рвота большим количеством зловонной жидкости. Последствия хирургической операции на грудной клетке.

**Хуже.** От холодного воздуха; от сырого холода. После подавления выделений, особенно поноса. Ночью. В туман.

**Лучше.** От жидкого стула. От движения.

**Психика.** Сильная тревога и депрессия. Несговорчивый, своенравный и раздражительный (ребенок при дистрофии). Мышление затруднено; непонятливый. Бесчеловечный; желание совершить какое-нибудь злодейство, жестокость.

**Голова.** Не может поднять голову - не держит головку — из-за слабости шеи. Кажется, что мозг устал — после разговора или умственных усилий. Вены на лбу расширены.

**Глаза.** Синие круги вокруг глаз. Ввалившиеся глаза.

**Нос.** Кровотечения из носа у мальчиков.

**Лицо.** Сухое, холодное, в морщинах, как у старика — при дистрофии (маразме). Угри при исхудании. Ангиома на лице. Бледное лицо с ввалившимися глазами.

**Желудок.** Несмотря на хороший аппетит, истощение прогрессирует. Пища выходит непереваренной. Страстное желание хлеба, сваренного в молоке. Режущие, грызущие, жгучие боли в желудке, ночью при гастралгии. Ощущение, что желудок плавает в воде, сопровождается чувством холода.

**Живот.** Ощущение твердых комков в разных отделах живота. Живот вздут. Туберкулезный перитонит. Ощущение слабости в кишечнике, как будто он опустился, провалился. Геморрой с выпячиванием узлов, жжением от прикосновения. Частые позывы на стул, но выделяется лишь немного крови.

**Мужские половые органы.** Водянка яичка (гидроцеле) у детей.

**Женские половые органы.** Пронзающая боль в левом яичнике. Менструации подавлены.

**Дыхательные органы.** Сухой кашель, возникающий вслед за поносом. После плеврита сохраняется давящее ощущение на больной стороне, оно препятствует свободному дыханию.

**Спина.** Внезапная тупая боль, ломота в спине; хуже ночью; лучше от движения. Боль в крестце, связанная с геморроем. Слабость в спине при боли в яичнике.

**Конечности.** Боль в плечах, руках, запястьях и голеностопных суставах. Сильное исхудание голеней. Пальцы рук и ног холодные, покалывание и онемение в них. Не может двигать конечностями, из-за ревматизма. Контрактуры (сгибание) конечностей, возникающее из-за спазмов, судорог или после колики.

**Кожа.** Висит, дряблая. Кожа приобретает багровый оттенок после подавления высыпаний. Ознобление, обморожение кожи с зудом.

**Последующие.** *Acon.* и *Bry.* при плеврите.

**Диф. диагноз.** *Agar.*, *Chin.*, *Led.*, *Nux-v.*

### ABSINTHIUM

Общее. Это средство вызывает конвульсии, которым предшествует дрожание. Пациент прикусывает язык, у него идет пена изо рта, на лице появляются гримасы. Дрожание — яркий признак: отмечается дрожание языка, сердца (трепетание). Внезапно возникают тяжелое головокружение; эпилептиформные припадки, бред, сопровождающийся галлюцинациями и потерей сознания. Приступы быстро следуют друг за другом. Это полезное средство при нервозности, возбуждении и бессоннице у детей. Хорея. Опиостотонус.

Психика. Головокружение со склонностью падать назад. Забывает, что случилось недавно, а также перед судорогами и после них. Ни с кем не хочет иметь дела. Теряет человеческий облик, звереет при безумии. Клептомания.

**Уши.** Выделения из ушей; в том числе после головной боли.

Лицо. Спазмическое подергивание мышц лица. Глупый вид.

**Моча.** Очень насыщенная моча, имеет темно-желтый цвет. Сердце. Шумная работа сердца, удары слышны со спины.

Женские половые органы. Климакс преждевременный.

**Диф. диагноз.** *Art-v.*, *Cic*, *Cina*, *Hydr-ac.*

### ACETICUM ACIDUM

Общее. Ведущими симптомами этого средства являются: тяжелая анемия, сопровождающаяся восковой бледностью; сильное исхудание; выраженная слабость; частые обмороки; затруднение дыхания; сердечная слабость; обильное мочеиспускание, рвота; а также потливость. Это вещество является антидотом по отношению ко всем ингаляционным анестетикам. При судорогах пациент вскакивает с постели, как безумный, и ползает по полу. Это средство для лечения генерализованного отека, анасарки, для заболеваний, сопровождающихся отеками. Кровотечение: из носа, желудка, прямой кишки, легких, из язв и т.д. Ребенок хочет, чтобы его носили на руках. Невусы (родинки); бородавки, мозоли.

Психика. Пациент глубоко опечален своей болезнью, огорчается из-за своих детей. Беспокоится о своем бизнесе. Женщина не узнает своих собственных детей. Забывает недавние события.

**Голова.** Болит от злоупотребления наркотиками, табаком. Ребенок не позволяет прикоснуться к своей голове. **Лицо.** Левая щека красная при лихорадке. Бледное, восковое, исхудавшее. **Нос.** Кровотечение, особенно из-за падения или удара.

**Горло.** Жажда у детей, но проглотить жидкость трудно, даже один глоток (дифтерия).

**Желудок.** При лихорадке жажды нет. Сильная жажда при водянке, отеках. Жесткая жгучая боль в желудке и грудной клетке, после которой кожа становится холодной и появляется холодный пот на лбу. Рвота после любой пищи. Язва, рак желудка. Скирр привратника. От холодного питья становится хуже; от овощей, кроме картофеля, — хуже. От хлеба с маслом — хуже.

**Живот.** Сильное вздутие живота, тимпанит. Асцит. Кровотечения из кишечника. Хронический понос у истощенных детей. **Мочевыделительная система.** Выделяет большое количество бледной мочи.

Диабет, сопровождающийся сильной жаждой и слабостью.

**Женские половые органы.** Метроррагия, сопровождающаяся сильной жаждой; в том числе после родов. Угрожающий абсцесс молочной железы. Молоко жидкое, синеватое, кислое; грудной ребенок слабеет, теряет вес, истощается (возникает дистрофия).

**Дыхательные органы.** Кашель возникает, когда пациент делает вдох. Учащенное и затрудненное дыхание. Клокотание мокроты в груди.

**Спина.** Боль (при миелите) облегчается, только когда пациент лежит на животе; она сопровождается обильным мочеиспусканием.

**Конечности.** Отечное опухание стоп и голеней, при поносе. **Кожа.** Пониженная чувствительность всего тела. Кожа сухая, горит.

**Лихорадка.** Гектическая лихорадка: сопровождающаяся проливными ночными потами; пот обильный и холодный.

**Диф. диагноз.** Следует за *Chin*, после кровотечений.

## ACONITUM

**Общее.** Быстрота действия Аконита определяет его симптоматику. Его симптомы характеризуются *остротой, интенсивностью и болезненностью*. Они возникают *внезапно*, сохраняются недолго, как при сильной буре, которая быстро проходит. На психику оказывают влияние такие эмоциональные факторы, как *ИСПУГ; ШОК* (потрясение), неприятности, разочарование. *Нервное возбуждение*; пациент остается в эмоциональном и нервном напряжении. Невралгические боли очень интенсивны.

У пациента настолько **СИЛЬНЫЙ СТРАХ**, что он впадает в *неистовство, кричит*, стонет, грызет кулак, кусает ногти, хочет умереть. Страх после испуга сохраняется. Страх сопровождает самые пустяковые заболевания. Сильно страдает *сердце и артериальная система*, что приводит к *конгестии* головы (полнокровию ее сосудов, которое часто сопровождается апоплексией, то есть инсультом) и органов грудной клетки. Это средство для лечения острого воспаления и конгестии. *Кровотечения ярко-красной кровью. Боли колющие, рвущие.* Возникают отчетливые ощущения *жжения, онемения, пощипывания*, покалывания или ползания мурашек по телу. *Части тела кажутся увеличенными или деформированными.* Ощущение болезненности снаружи, на поверхности и тяжести — внутри тела. Внезапный упадок сил — *коллапс. Обострены все чувства.* Части тела остаются болезненными при прикосновении или *немеют после болей. Конвульсии.* Обморочное состояние. Ребенок держится ручками за больное место.

Заболевания возникают после воздействия сухого холода, в холодную сухую погоду, в особенности, болезни дыхательных путей. Желудочно-кишечные расстройства возникают при очень жаркой погоде. Это средство подходит очень крепким, цветущим людям. Жалобы, возникающие после хирургического шока или травмы, или после подавления пототделения. Это средство устраняет отдаленные последствия испуга. Пациент вскрикивает и хватается за свои половые органы. Крепитация.

**Хуже.** От очень сильных эмоций, ОТ ИСПУГА, ШОКА; от Неприятностей. Простуживается в **ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ**, в сухую холодную погоду, если остыл, будучи вспотевшим. От давления, прикосновения. Ночью. В постели, во второй половине дня. Лежа на боку. От шума. От света. При прорезывании зубов. Во время менструации. Если спит на солнце. От музыки. От курения табака. Когда делает вдох.

**Лучше.** На открытом воздухе. Отдохнуть. От теплого пота.

**Психика.** Сильная **ТРЕВОГА; СМЕРТЕЛЬНЫЙ СТРАХ** и **ДВИГАТЕЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО** сопровождают любое недомогание, каким бы незначительным оно ни было. *Страхи:* боится смерти; толпы; перейти улицу; будущего; прикосновения прохожих, коснуться кого-то на улице. *Нетерпеливый;* выходит из себя; *неистовый, в том числе из-за сильной боли. ОТ СТРАХА кричит*, стонет, *кусает кулак*, грызет ногти; хочет умереть. Боится выйти из дому. Одолевают *предчувствия*, предсказывает время своей смерти. Пациент **ОХВАЧЕН УЖАСОМ**. От музыки становится печальным. Ясновидение. Кажется, что только что сделанное — это сон. Бред. Настроение приступообразно меняется: смеется, поет, а затем печален, чего-то боится. *Тревожен, возбужден, нервничает, как в лихорадке.* Пациент воображает, что какая-то часть тела деформирована, уродливая. Ему кажется, что мысли возникают в желудке, что он «думает желудком».

**Голова.** Тяжелая, горячая, разрывается. *Жжение;* ощущение волнообразных движений в голове. Как будто голова повязана чем-то горячим или мозг кипит. Ощущение, что лоб или глаза жестоко сдавлены или их распирает, как будто они лопнут. Головная боль сопровождается повышенным выделением мочи. Головокружение усиливается при вставании или при любом другом движении головы или тела. Ощущение, как будто дергали за волосы или что волосы встали дыбом. Треск в голове. Пульсация во лбу. Пациент бьется головой.

**Глаза.** Кажется, что глаза сухие и горячие, как будто в них песок. Веки опухшие, плотные и красные. Стреляющая боль в глазных яблоках. Пациент не выносит отраженный от снега солнечный свет. Конъюнктивит от попадания частиц золы или других инородных тел. Глаза блестящие, застывшие, затуманенные. Отвращение к свету или желание света.

**Уши.** Очень чувствительны к шуму. Музыка невыносима. Ощущение, как от капли воды, попавшей в ухо.

**Нос.** Нос немеет при носовом кровотечении. Обостренное обоняние. Боль в корне носа. В носу сухо и он заложен; или выделения из носа жидкие, скудные, горячие, водянистые.

**Лицо.** *ТРЕВОЖНОЕ* выражение лица; оно становится то бледным, то красным попеременно. *Горячие, красные щеки.* Красное лицо становится смертельно бледным при вставании, либо у пациента при вставании появляется головокружение. Одна щека красная, горячая, а другая — бледная и холодная. Невралгия сопровождается двигательным беспокойством, ощущением пощипывания и онемением. Губы черные, сухие, шелушатся. Чувство тяжести во всем лице.

**Рот.** Зубная боль в здоровых зубах. Биение (пульсация) в зубах и в голове. Скрежетание зубами. Десны горячие и воспаленные. Язык кажется словно опухшим. Все, кроме воды, кажется горьким, а вода имеет гнилой вкус. Дрожание языка и временное заикание. Онемение полости рта и языка; сухой, жгучий жар во рту. Пощипывание при кашле и глотании. Жевательные движения нижней челюстью.

**Горло.** Красное, сухое, горячее; кажется, что оно сжато, пациент задыхается, когда глотает. Миндалины опухшие и сухие.

**Желудок.** Рвота сопровождается страхом, жаром, обильным потоотделением и повышенным выделением мочи. *ИНТЕНСИВНАЯ ЖГУЧАЯ ЖАЖДА.* Страстное желание пива, кислого, горьких напитков. Жажда усиливается после очень холодных — со льдом — напитков. Голоден. От молока — хуже. Рвотные массы выбрасываются с силой, фонтаном. Жесткая рвота желчью или кровью. Давление в желудке сопровождается одышкой. От вина, как правило, лучше. Тошнота и потоотделение перед жидким стулом и после него.

**Живот.** Чувствителен к прикосновению. Колика: боль не облегчается ни при каком положении тела. Живот горячий, вздутый. Желтуха: у новорожденных; от испуга. Ущемленная грыжа. *Стул: в виде чистой крови;* слизистый, зеленый, как трава или белый; хуже, когда дни жаркие, а ночи холодные. Дизентерия. Водянистый понос у детей в жаркие дни: они плачут, беспокоятся и теряют сон. Зуд и колющая боль в заднем проходе; ощущение, как будто теплая жидкость вытекает из ануса.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная, красная, горячая, мочеиспускание болезненное. Задержка мочи или подавление мочеиспускания: у новорожденных; после воздействия холода, при этом ребенок трогает половые органы. Мучительная дизурия. Цистит. Уретральная лихорадка (после катетеризации).

**Мужские половые органы.** Орхит; кажется, что яички опухли и плотные.

**Женские половые органы.** Подавление менструаций после испуга или воздействия холода, у полнокровных пациенток. Послеродовые схватки сопровождаются страхом и двигательным беспокойством. При появлении менструации — яростная мания. Активное маточное кровотечение. Оофоро-рит из-за внезапного прекращения менструальных выделений. Жар, сухость во влагалище и чувствительность его. Лактационный мастит («молочная лихорадка») сопровождается бредом. Много молока в груди.

**Дыхательные органы.** *Хриплый, сухой, крупозный, болезненный кашель* или отрывистый, лающий, звучный или свистящий кашель; усиливается при каждом вдохе, ночью, во время питья; пациент хватается за горло. Кашель уменьшается, когда пациент ложится на спину. Задыхается во время сна; сидит выпрямившись. Ларингит. *Круп сопровождается лихорадкой.* Сильнейший застой крови (конгестия) в грудной клетке. Пневмония. Ощущение стеснения в груди при быстром движении или при подъеме по лестнице; при болезни сердца. При покашливании отхаркивается кровь. *Легкие кажутся горячими.* Колотье в груди. Плеврит. Пощипывание в груди после кашля.

**Сердце.** Кажется опухшим, увеличенным при кардите. Сердцебиение сопровождается тревогой, обмороком и пощипыванием в пальцах рук, болью вдоль левой руки. Сердечные боли распространяются в левое плечо, усиливаются, когда пациент сидит прямо. Тахикардия. Пульс частый, скачущий, сотрясающий, напряженный и большой, полный, либо нитевидный, крайне лабильный. Повышенное артериальное давление.

**Шея и спина.** Боль в спине мешает сделать глубокий вдох. Боль между плечами и в крестце, как от ушиба.

**Конечности.** Руки свисают без сил. Онемение левой руки, покалывание, пощипывание в пальцах. Кончики пальцев красные. Горячие кисти и холодные стопы. Красный блестящий отек в области суставов. Кожа на ладонях в области возвышения мизинца (гипотенар) красная. Нет сил в ногах (в голени), чувство усталости в них во время отдыха, в покое. Как будто капли воды тонкой струйкой стекают вдоль бедер. Подергивание левой руки. *Ладони горячие.*

**Кожа.** *СУХАЯ, ГОРЯЧАЯ* или как будто облили ледяной водой. Милиарная сыпь. Зуд уменьшается от приема стимулирующих веществ.

**Сон.** Кошмары. Тревожные сновидения. Бессонница с двигательным беспокойством, метаниями; она возникает из-за страха, испуга или тревоги. Бессонница у стариков.

**Лихорадка.** *ОЗНОБ* волнами проходит по телу. Озноб или чувство холода чередуется с жаром. *ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА:* сухой жгучий жар ощущается в области век, носа, рта, горла, легких и ладоней, пациент должен раскрыться. *Пот* проливной, хочет раскрыться. Потоотделение на непокрытых или на больных частях тела.

**Дополнительно.** *Coff., Sulph.*

**Диф. диагноз.** *Bell., Cham., Coff.*

## АСТЕА СПИКАТА

**Общее.** Это растение действует на суставы, особенно мелкие. Хотя Актея более всего поражает запястье, страдают также и другие суставы, например, голеностопный сустав и суставы пальцев рук. Актея вызывает рвущие и щиплющие, покалывающие боли. Суставы опухшие; боли усиливаются от прикосновения и движения. Малейшее утомление приводит к опуханию суставов. Актея вызывает паралитическую слабость пораженной части тела. Чаще всего симптомы появляются после испуга или от утомления. Одышка после воздействия холода. Пожилой возраст. Повышенная чувствительность к холоду. Слабость.

Хуже. При перемене погоды, от незначительного напряжения, от холода; ночью; от прикосновения.

**Глаза.** Предметы кажутся синими.

Уши. Дергающая боль, когда чихает или сморкается.

**Дополнительно.** *Caul., Coloc, Sabin., Stict., Viol-o.*

## ADONIS VERNALIS

**Общее.** Действует преимущественно на сердце: когда оно поражается при заболевании ревматизмом, гриппом или нефритом, если миокард находится в состоянии жирового перерождения. Адонис нормализует пульс, увеличивает силу сокращений миокарда, при этом повышает секрецию мочи. Это ценное средство при сердечных отеках, гидротораксе; асците и анасарке. Боли перемещаются с места на место. Аритмия. Адонис верnalis не имеет кумулятивного действия. Компенсаторная гипертрофия сердца при стенозе клапанов и митральной недостаточности.

Хуже. От холода. Лежа.

**Лучше.** От напряжения.

**Голова.** Головокружение усиливается, когда пациент встает, быстро поворачивает голову или когда ложится; при сердцебиении. Тупая боль из затылка распространяется через виски в глаза. Кожа головы кажется туго натянутой, тесной.

**Рот.** Язык болезненный, кажется ошпаренным. Жажда нет.

**Желудок.** Ощущение слабости в области эпигастрия при головокружении, уменьшается на улице.

**Живот.** Ощущение большой тяжести, груза; кажется, что кишечник порвется; хуже, когда пациент сгибается.

**Мочевыделительная система.** Императивный позыв на мочеиспускание. Альбуминурия; моча скудная, маслянистая пленка на поверхности мочи.

**Дыхательные органы.** Часто возникает желание сделать глубокий вдох. Одышка усиливается от прикосновения к спине. Сухой, щекоцущий кашель сердечного происхождения.

**Сердце.** Слабое, жирное. Аритмия. Загрудинная боль, сильное сердцебиение и одышка. Пульс частый, неправильный (аритмичный).

**Спина.** Скованность в шее и в позвоночнике; тупая боль с ощущением

усталости. **Кожа.** Пузырьки (везикулы) на коже.

**Сон.** Бессонница с блужданием мыслей, или со страшными сновидениями.

**Диф. диагноз.** *Вы/o, Conv., Crat., Dig., Stroph-h.*

**Доза.** Тинктура, по 5—10 капель.

## AESCULUS HIPPOCASTANUM

**Общее.** Эскулюс обладает выраженным действием на вены нижнего отдела кишечника и тазовых органов, вызывая переполнение кровью геморроидального сплетения. Вены портальной системы также переполнены кровью, что вызывает ощущение болезненности и переполнения в области печени и в животе в целом. Многие симптомы, характерные для средства Эскулюс, зависят от поражения печени или *рефлекторно связаны с геморроем*. Эскулюс вызывает общий венозный застой: части тела становятся багровыми и одутловатыми, расширенные вены — багровыми. Все процессы замедляются — пищеварение, деятельность сердца, кишечника. В дополнение к чувству переполнения внутренних органов возникает ощущение *ЖАРА, СУХОСТИ, СКОВАННОСТИ* и *ШЕРОХОВАТОСТИ* в горле, носу, заднем проходе и т.д. Наблюдается характерная боль в спине, мешающая пациенту работать. Боли колющие или летучие (в любом месте); горячие, как молния.

**Хуже.** Утром, когда пациент проснется. От любого движения. Лежа, при наклоне; после стула; от мочеиспускания. От холодного воздуха, от стирки. Зимой. Стоя.

**Лучше.** От прохладного воздуха; на открытом прохладном воздухе; от обмывания прохладной водой. От кровотечения (геморроидального); стоя на коленях. От продолжительной физической нагрузки, напряжения. Летом.

**Психика.** Мрачный и *раздражительный*; не способен сосредоточиться (невнимателен). При пробуждении — спутанное сознание; замешательство, особенно у детей.

**Голова.** Головная боль, как от ушиба, из затылочной области распространяется в лобную, сопровождается приливами жара к затылку, шее и плечам.

**Глаза.** Кажутся тяжелыми, тусклыми, горячими и болезненными, это сопровождается слезотечением. Кровеносные сосуды расширены.

**Нос.** Чувствителен к вдыхаемому холодному воздуху: он вызывает жжение, саднение и жидкие выделения из носа, а также чихание. Заложенность носа, связанная с болезнью печени. Конгестивный катар (застойного происхождения).

**Рот.** Ощущение, что полость рта и язык ошпарены. Язык покрыт толстым налетом. Слюнотечение. Не может правильно выговорить слово — язык не слушается. Сладкий, горький, металлический привкус во рту. Зубы, как будто смазаны маслом.

**Горло.** Фолликулярный фарингит, связанный с конгестией печени. Чувство шероховатости, сухости; при глотании колет и жжет, как огнем. Невралгические боли в зеве. Откашливает тягучую сладковатую слизь.

**Желудок.** Давление, как от камня, сопровождается грызущей, ноющей болью — примерно через 3 часа после приема пищи. Изжога и отрыжка пищей после еды. Желание вызвать рвоту при постоянном дискомфорте и жжении в желудке.

**Живот.** Пульсация глубоко в животе: внизу живота (в гипогастрии) и в тазу. Чувствительность области печени к прикосновению и ощущение переполнения в ней. Желтуха.

**Прямая кишка.** Стул сухой, твердый; разного цвета. Прямая кишка кажется наполненной мелкими щепками. Геморрой с резкими стреляющими болями вверх по спине; кровоточащий, внутренний; багровый, болезненный, наружный; хуже стоя и при ходьбе. Запор: стул твердый, сухой, узловатый, белый. Боли в прямой кишке сохраняются после стула долго. Как будто насекомое выползает из заднего прохода. Во время стула отходит вначале твердый и черный кал, затем — белый и мягкий. Жжение в анусе, с ознобом, распространяющимся вверх и вниз по спине. Болезненные сокращения: как будто ножом пилят вверх-вниз. Геморрой усиливается во время климакса.

**Мочевыделительная система.** Учащенное выделение небольшого количества мочи: моча мутная, темная, горячая.

**Мужские половые органы.** Выделение сока простаты (простаторея) каждый раз во время стула и мочеиспускания.

**Женские половые органы.** Постоянное биение (пульсация) позади симфиза. Бели сопровождаются слабостью в пояснице — «спина отказывает» — поперек крестцово-подвздошного сочленения, а также тупой болью в коленях. Бели: темные, желтые, клейкие, едкие; хуже после менструации.

**Грудная клетка.** Кажется сжатой, ощущение жара внутри. Кашель, связанный с нарушением работы печени. Боль в области сердца у лиц, страдающих геморроем. Слышимое сердцебиение, когда пульсация достигает конечностей.

**Спина.** Тупая боль в пояснице, вызывающая слабость, с ощущением, что поясница не держит. Поясница «отказывает». Боль, как будто спина сломается; вынужден вставать в несколько приемов; хуже при ходьбе и при наклоне. Боль с ощущением разбитости, как будто крестец и тазовые (подвздошные) кости ушиблены.

**Конечности.** Тупая боль, ломота и болезненность в конечностях. Паралитическая тяжесть в руках, позвоночнике, стопах. Руки и стопы опухают, краснеют после стирки. Позвоночник кажется слабым.

**Сон.** Склонность потягиваться и зевать.

**Дополнительно.** Carb-v., Lack., Mug-ac.

**Диф. диагноз.** Aloe, Coll., Puls.

## АЕТНУСА СЫНАРИУМ

**Общее.** Это средство оказывает влияние на *МОЗГ и нервную систему*, что бывает обусловлено нарушением деятельности *желудочно-кишечного тракта*. Один из ключевых признаков, характеризующих действие Этузы, — это *интенсивность, бурное проявление* симптомов: жестокая рвота, сильные судороги, жестокие боли, яростный бред. С другой стороны, отмечается *глубокая протрация* и ступор (оцепенение), отсутствие реакции, даже речи. Ум и тело слабеют. Этуза особенно полезна детям при прорезывании зубов и летних недомоганиях, когда ребенок мучается, плачет, а лицо выражает беспокойство и недовольство.

По мере прогрессирования болезни пациент все более замыкается, и *все больше плачет*. При эпилептиформных судорогах большие пальцы зажаты в кулаке, лицо краснеет, глаза повернуты вниз, зрачки расширены и неподвижны, изо рта выделяется пена. Пациент не может стоять, подняться в постели и сесть или держать голову прямо. Нервное истощение или упадок сил от чрезмерной работы. Старческое слабоумие. Пронзающие боли. Ощущение, что части тела стиснуты, зажаты (как будто стянуты винтом). Дети, у которых нет сил держать головку, не страдающие какой-то особенной болезнью. Иногда они не могут даже стоять или не выносят малейшего груза на своих ручках и ножках.

**Хуже.** С 3 до 4 ч утра и вечером. От тепла; в жаркую погоду. ОТ МОЛОКА. При прорезывании зубов. От частой еды. От переутомления.

**Лучше.** На открытом воздухе, при ходьбе на улице. От разговора (беседы).



**Психика.** Не способен думать или фиксировать внимание после чрезмерных занятий, учебы. Бред: видит кошек, собак, крыс и т.д. Идиотизм (глупость), чередуется с яростью, неистовством. Хочет вскочить с постели или выпрыгнуть в окно. Страх экзамена из-за чувства, что просто не способен его сдать. Дети, страдающие идиотией. Неуклюжий, неловкий.

**Голова.** Мучительные боли в затылке, распространяющиеся вдоль задней поверхности шеи и вдоль позвоночника; уменьшаются, если лечь, либо от давления. Симптомы со стороны головы уменьшаются после испускания кишечных газов и после стула. Ощущение, что тянут за волосы. Головокружение сопровождается сонливостью, сердцебиением, слабостью. Пациент не может поднять голову. Голова горячая после головокружения. Сжимающая головная боль с головокружением; усиливается при ходьбе и взгляде вверх. Головокружение и сонливость, дремота.

**Глаза.** Хроническая фотофобия (светобоязнь). Глаза навекате и блещут. Глаза повернуты вниз. Роговица запавшая. Предметы кажутся крупнее или удвоенными. Опухание мейбомиевых желез. Пациент вращает глазами при засыпании.

**Уши.** Как будто что-то горячее струится из ушей. Ощущение, что уши заложены; лучше, если вставить палец в наружный слуховой проход и как бы раздвинуть его.

**Нос.** Герпетическая сыпь на кончике носа. Частое безрезультатное желание чихнуть. Крылья носа втянуты.

**Лицо.** Осунувшееся; бледное, одутловатое, в пятнах, красное. *Выраженная носогубная складка.* Синеватая бледность вокруг губ. Вид, как у мертвеца. Подбородок и углы рта кажутся холодными.

**Рот.** Язык кажется слишком длинным. Афты во рту. Речь медленная, затрудненная. Пациент не говорит. Во рту привкус: горечи; лука; сыра; сладковатый привкус — утром.

**Желудок.** Ест маленькими кусочками, перекусывает. *Непереносимость молока.* Как только проглотит молоко, внезапно возникает жестокая рвота молоком или *КРУПНЫМИ СГУСТКАМИ* свернувшегося молока. Голоден после рвоты. *ХРОМАЕТ, ДВИГАЕТСЯ С ТРУДОМ И ВПАДАЕТ В ГЛУБОКИЙ СОН ПОСЛЕ РВОТЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ТОШНОТА.* Регургитация пищи спустя много времени после еды. Рвота белой, как молоко, пенистой массой; либо желтой жидкостью. Кажется, что желудок перевернулся. Пищеварение страдает из-за нервного истощения. Срыгивание, позывы на рвоту.

**Живот.** Живот опухший, синевато-черный; у пациента ощущение, что живот холодный, но он холодный и на ощупь (то есть и субъективно, и объективно); при этом голени холодные, в кишечнике ощущается тупая боль; лучше от теплых аппликаций. Колика с последующей рвотой, головокружением и слабостью. Ощущение, как будто в области пупка лопаются пузырьки, булькает.

**Стул.** Желтый, зеленый, слизистый — при поносе. Непереваренная пища в стуле. Стойкий запор с ощущением, что кишечник совершенно бездействует. Холера у пожилых людей.

**Мочевыделительная система.** Режущая боль в мочевом пузыре сопровождается частыми позывами на мочеиспускание.

**Мужские половые органы.** Правое яичко втянуто — при боли в почке.

**Женские половые органы.** Менструальная кровь водянистая. Набухание молочных желез сопровождается пронзающей болью. Прищипки (папулы) на наружных половых органах; зуд при согревании.

**Дыхательные органы.** Одышка, дыхание прерывается икотой. Из-за страданий пациент перестает разговаривать. Ощущение, что грудная клетка судорожно сжимается. Кашель вызывает боль в голове. Колотье в грудной клетке слева.

**Сердце.** Бешеное сердцебиение с головокружением, головной болью и двигательным беспокойством. Пульс частый, твердый, малый, аритмичный.

**Шея и спина.** Нет сил стоять, держать голову прямо. Поясница как будто в тисках. Опухание желез в области шеи: они напоминают нитку бус, четки. У пациента такое чувство, что боль в спине может уменьшиться, если выпрямиться и прогнуться в пояснице.

**Конечности.** Пальцы рук согнуты, большие пальцы на руках согнуты или зажаты в кулак. Ощущение, что руки стали значительно короче. Онемение кистей и стоп. Тяжесть, слабость в пальцах рук, контрактуры пальцев. Экскориация кожи (ссадины, потертости) на бедрах при ходьбе.

**Кожа.** Лимфатические железы опухшие, как нитки бус, четки. Кожа холодная и покрыта *прохладным липким потом*. Высыпания с зудом, в том числе в области суставов; лучше от горячего, от жара. Экхимозы (кровоподтеки). Анасарка. Все тело может быть синим, черным.

**Лихорадка.** Сильный жар без жажды. Должен укрыться при потоотделении. Потеет при малейшем физическом напряжении.

**Сон.** Прерывается сильным вздрагиванием и/или появлением холодного пота. Дремлет после рвоты или стула. Вращает глазами или возникают слабые судороги при засыпании.

**Дополнительно.** *Calc.*

**Диф. диагноз.** *Ant-c, Cic.*

## AGARICUS MUSCARIUS

**Общее.** Этот ядовитый гриб действует на *ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ*. Действуя на мозг, он вызывает, главным образом, головокружение и бред. Воздействие на спинной мозг, нервы и мозжечок приводит к появлению *БЕСПОРЯДОЧНЫХ, УГЛОВАТЫХ, НЕТОЧНЫХ и НЕСОРАЗМЕРНЫХ ДВИЖЕНИЙ*: пациент протягивает руку слишком далеко, пошатывается или слишком высоко поднимает ноги при ходьбе, *роняет вещи* и т.д. Симптомы развиваются медленно.

У пациента *МНОГО РАЗНООБРАЗНЫХ* симптомов. Очень характерны *ДРОЖАНИЕ, ПОДЕРГИВАНИЯ И РЕЗКИЕ СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦ* или *фибриллярные спазмы*, возникающие там и сям, но особенно в мышцах *ВЕК* и языка. Симптомы локализуются по диагонали, например: в правой руке и левой ноге. Содрогание тела. Нервозность и двигательное беспокойство. Хорей уменьшается во время сна. Ощущение, как будто тело пронизывают холодные или горячие иглы, как будто холодная капля или холодный груз лежит где-нибудь на теле. Болезненные подергивания, после чего в этом месте возникает скованность, оно становится холодным. При эпилепсии, конвульсиях физическая сила возрастает, человек может поднять тяжелый груз. Подергивание мышц прекращается во время сна. Судороги после полового акта; после подавления лактации; после того, как отругали; или после наказания. Молодые, нервные, истеричные замужние женщины, падающие в обморок после коитуса. Дети начинают ходить и говорить поздно из-за поражения головного мозга. Зевота перед возникновением симптомов.

**Хуже.** От *ХОЛОДНОГО воздуха*. От *МОРОЗНОГО воздуха*. Перед грозой. От *нервного истощения*. От *коитуса*. От пьянства, неводержанности. От *алкоголя*. От *давления на позвоночник*. От *прикосновения*. Утром. Во время менструации. От солнца. От испуга.

**Лучше.** От спокойного движения.

**Психика.** Поет, говорит бессвязно, быстро меняет тему разговора, на вопросы не отвечает. *Болтливость*. Не расположен ни к какому труду, особенно к умственному. Бесстрашие. Сочиняет стихи. Веселый. Обнимает и целует руки. Эгоистичный. Безразличный. Оупение, пациент пошатывается из-за головокружения, как будто пьян. Мрачный, своевольный, упрямый; медленно учится ходить и говорить. Неуклюжий, неловкий. Никого не узнает; бросает вещи. Давление на позвоночник вызывает произвольный смех. Не может сделать что-нибудь новое, не может выполнять свою обычную работу или делает все наоборот.

**Голова.** Головокружение, в том числе от солнечного света. Тупая головная боль; должен *двигать головой туда-сюда*. Головная боль уменьшается после стула или выделения мочи; головная боль сопровождается кровотечением из носа или густыми слизистыми выделениями. Боль, как от гвоздя в правой половине головы. Голова постоянно находится в движении. Голова втянута в плечи.

**Глаза.** Читать трудно, потому что кажется, что буквы двигаются, плывут. Двойное зрение (диплопия), колебательные движения глазных яблок. Скопление секрета в углах глаз. Мушки (точки) перед глазами; в том числе коричневого цвета. *Подергивание век*. Сужение глазной щели. Нистагм; косоглазие (страбизм). Веки толстые, сухие, горячие.

**Уши.** Зуд в ушах; уши красные; жгучая боль в ушах, как будто они обморожены. Подергивание мышц вокруг ушей. *Шум в ушах*.

**Нос.** Частое чихание без насморка. Выделение прозрачной жидкости без признаков воспаления (без ринита). Чихание после кашля. Зуд снаружи и внутри носа. Вонючие темные кровянистые выделения. Носовое кровотечение; в том числе у старых людей. Покраснение носа. Заложенность носа при наклоне.

**Лицо.** Ощущение скованности в мышцах лица; подергивание их. Зуд и жжение в лице. Боль в щеках, как будто от занозы. Невралгия с ощущением, как будто холодные иглы вонзаются в нервы. Grimасы. Идиотское выражение. Лицо синее и одутловатое.

**Рот.** Углы рта опущены; в том числе из-за паралича; слюна вытекает изо рта. Герпес на губах. Привкус во рту: сладкий, горький. Афты на нёбе. Язык сухой, дрожит; онемение языка с одной стороны при головокружении. Неразборчивая, отрывистая речь. Зловонное дыхание. Пена у рта. Опухание и кровоточивость десен, с болью.

**Горло.** Ощущение сжатия. Без кашля выделяются маленькие твердые комочки слизи. Сухость в горле, трудно глотать. Ощущение царапанья при каждой попытке запеть.

**Желудок.** Всегда хочется пить — жажда. Отрыжка: воздухом, с привкусом яблок или тухлых яиц. Отрыжки чередуются с икотой. *Ощущение комка в эпигастрии*. Нарушение работы желудка сопровождаются резкой болью в области печени. Рвота горечью сопровождается полным упадком сил; рвота сопровождается колотьем в прямой кишке и паховых областях.

**Живот.** Урчание и брожение в кишечнике. Обильные газы без запаха. Понос с выделением большого количества зловонных газов с чесночным запахом. Понос у детей: стул с зеленой, как трава, желчью. Кишечные газы горячие. Ощущение, что живот «крутит», скручивает. Колотье в области селезенки, в том числе у бегунов.

**Мочевыделительная система.** Моча обильная, бесцветная, прозрачная, лимонного цвета. Из уретры выделяется вязкая, клейкая слизь. Учащенное мочеиспускание. Моча холодная. Моча вытекает медленно или по каплям: пациент вынужден тужиться, чтобы помочиться.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание повышено. После полового акта возникает выраженная слабость, обильный пот, жжение и зуд кожи; напряжение и давление под ребрами. Сперма горячая. Сильное сердцебиение во время коитуса; подавленность после него (у представителей обоих полов). Преждевременная эякуляция. Яички болезненно втянуты. Застарелый гнойный уретрит. Жалобы после сексуальных излишеств.

**Женские половые органы.** Боль с давлением на низ, особенно после климакса. Сексуальное возбуждение. Менструации слишком обильные. Зуд и жжение сосков, они красные; в том числе во время беременности. Жалобы возникают после родов и полового акта. Метастаз заболевания после подавления лактации: в головной мозг, органы брюшной полости и т. д. Бели темные, кровянистые, едкие (приводят к образованию ссадин) — пациентка не может ходить. Зуд сопровождается сексуальным возбуждением.

**Дыхательные органы.** Отдельные приступы кашля, потом чихание. Кашель как будто возникает в позвоночнике. Легко отхаркиваются хлопья или комочки слизи. Затрудненное дыхание, стеснение в груди. Грудная клетка кажется слишком узкой.

**Сердце.** Сильное сердцебиение во время коитуса. Сердцебиение: неритмичные, сильные сокращения сердца; сопровождаются покраснением лица; уменьшаются от табака. Давление или жгучее покалывание из сердца распространяется в левую лопатку. Стенокардия проявляется только сильной болью. Удары в области сердца: от внезапного шума, отрыжки или кашля.

**Спина.** Отдельные позвонки чувствительны к жару. Боль, как от усталости. Болезненная слабость в спине и ее болезненность. *Позвоночник чувствителен* к прикосновению и давлению; на всем протяжении. Стреляющие боли, жжение вдоль позвоночника. Позвоночник кажется коротким. Боль в поясничной области и в крестце, что-то вроде растяжения мышц; распространяется в заднюю часть шеи; усиливается при наклоне. Прострел (люмбаго): хуже на открытом воздухе; хуже сидя. Подергивание мышц шеи. Ощущение ползания мурашек вдоль позвоночника. Мышцы спины кажутся напряженными, как будто они могут порваться при сгибании. Ощущение, как будто холодный воздух распространяется вдоль спины; похож на дуновение, на ауру.

**Конечности.** Беспокойство в руках. Жжение, зуд обеих кистей, как будто они обморожены. Дрожание кистей. Правая кисть нетвердая при письме; рука кажется парализованной от продолжительного письма. Неуверенная походка. Зуд стоп и пальцев на ногах, как будто они обморожены. Судороги в подошвах и в стопах. Боль в большеберцовой кости. Жесткая боль в бедре возникает, когда пациент садится нога на ногу. Паралич нижних конечностей сочетается с незначительными спазмами в руках. Онемение голеней, когда сидит положив ногу на ногу. Ягодицы холодные. Боль в верхней части бедер (в области крыльев подвздошных костей); хуже лежа. Пальцы спастически разжимаются, когда пациент держит предмет. Голени кажутся тяжелыми. У пациентки возникает ощущение, что конечности не принадлежат ей.

**Кожа.** *ЖЖЕНИЕ, ЗУД; покраснение и опухание. Кожа КАК БУДТО ОБМОРОЖЕНА.* Обморожение, ознобление. Зуд при расчесывании меняет место. Кожа болит при охлаждении. Ангио-невротический отек. Милиарные высыпания с невыносимым зудом и жжением. Зуд кожи в области больного органа. От легкого удара возникает кровоподтек (экхимоз).

**Сон.** *Зевота:* частая; возникает перед появлением болей или спазмов; в том числе как сопутствующий симптом. Зевота с последующим произвольным смехом. При засыпании вздрагивает, возникает подергивание мышц, пациент часто просыпается.

**Лихорадка.** Легко замерзает, легко потеет; потоотделение то с одной, то с другой стороны. Ночные поты.

**Дополнительно.** *Calc.*

**Диф. диагноз.** *Phys. Tub.*

## AGNUS CASTUS

**Общее.** Основной эффект Агнус кастус связан с его влиянием на *ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ* представителей обоего пола. Кроме того, имеются характерные симптомы. *В ПСИХИЧЕСКОЙ СФЕРЕ.* Авраамово дерево понижает сексуальную энергию, что сопровождается депрессией и утратой нервной энергии. Отмечается сильная грусть с навязчивой идеей о приближающейся смерти. Это средство оказывает влияние на людей обоего пола, но в большей степени — на мужчин. *ИМПОТЕНЦИЯ* и *ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ*, вследствие сексуальных излишеств. Повторное заболевание гонореей в анамнезе. Пациент презирует себя из-за сексуального оскорбления, насилия. Нервная слабость у неженатых людей. Выдающе еся средство для лечения растяжения связок и перенапряжения. Гложущее, грызущее ощущение и зуд повсюду, особенно в глазах. Тахикардия от табака у молодых мужчин-невротиков. *Пресыщенный повеса, распутник.* В прежние времена как мужчины, так и женщины использовали растение для подавления сексуального желания.

**Хуже.** От *СЕКСУАЛЬНЫХ ИЗЛИШЕСТВ.* Растяжение связок при поднятии большой тяжести.

**Психика.** Рассеянность. Печаль, доходящая до отчаяния; сопровождается чувством, что пациент скоро умрет. Смятение: находится «в растрепанных чувствах». Не может вспомнить. Не хватает смелости. Женщина говорит, что скоро умрет, и бесполезно что-либо делать. Иллюзии запахов — селетки, мускуса. *ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ.*

**Голова.** Головная боль, как будто пациент находился в помещении со спертым, прокуренным воздухом; лучше, когда смотрит в одну точку.

**Глаза.** Зрачки расширены. Грызущая боль, жжение в глазах.

**Нос.** Иллюзия запаха: селедки, мускуса. Сильная тупая боль в спинке носа; уменьшается от давления.

**Лицо.** Едкий зуд щек. Ощущение ползающих мурашек на щеках. Боль рвущая, раздражающая ниже альвеол в нижней челюсти справа.

**Рот.** Язвы во рту и на деснах. Зубы болят от прикосновения теплой пищи или питья.

**Желудок.** Тошнота с ощущением, что кишечник придавлен книзу, хочется поддержать кишечник руками. Может есть только самую простую пищу. Отрыжки с запахом мочи.

**Живот.** В животе урчит во время сна. Селезенка увеличенная и болезненная. Кишечные газы имеют запах мочи, которая давно пропитала одежду (разложилась). Глубокие трещины заднего прохода. Ощущение, как будто под кожей возле ануса — язва; возникает только при ходьбе. Кишечник как будто опускается, падает вниз, приходится поддерживать его руками.

**Мочевыделительная система.** Выделяет повышенное количество мочи, часто.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание почти утрачено. Яички: холодные, опухшие, твердые, половой член маленький, вялый. Сперматорея, в том числе с импотенцией. Когда тужится, теряет простатическую жидкость (простаторея). Желтые выделения из уретры.

**Женские половые органы.** Прозрачные бели незаметно выделяются из крайне расслабленных половых органов. Отвращение к половому акту. Бели оставляют желтые пятна на белье. Агалактия, сопровождающаяся грустью. Подавление менструаций; в том числе сопровождающееся болями в животе. Истерическое сердцебиение в сочетании с носовым кровотечением. Бесплодие при подавлении менструаций и отсутствии сексуального желания. Сексуальное возбуждение отсутствует из-за чрезмерной мастурбации.

**Диф. диагноз.** *OInd., Ph-ac.*

## AGRAPHIS NUTANS

**Общее.** Это средство вызывает расслабление во всем теле. Пациент склонен простуживаться от пребывания на холодном ветру. Аденоиды и увеличенные миндалины. Глухота глоточного происхождения. Слизистый понос после подавления простуды. Мутизм (задержка речи, немота), не связанный с глухотой.

## AILANTHUS GLANDULOSA

**Общее.** Действует на *КРОВЬ*: вызывает изменения в ней и способствует возникновению состояний, подобных тяжелым септическим лихорадкам. Это септические варианты болезней, сопровождающихся сыпями, геморрагический диатез. Аилантус поражает *ГОРЛО*, вызывая состояние, похожее на дифтерию, фолликулярный тонзиллит. Стрептококковая инфекция. Кожа *ЦИАНОТИЧНАЯ* или с багровым оттенком. Быстро возникает упадок сил, *прострация*. Характерны для Аилантуса: *ЦИАНОЗ*, *СТУПОР* (оцепенение), *отвратительный запах* и *ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССА*. Выделения жидкие и едкие. Сепсис. Часто наблюдается ежегодный рецидив сыпи. Это средство подходит нервным, чувствительным людям. Полный, цветущий пациент с желчным темпераментом.

**Хуже.** От подавления симптомов. Когда встает, поднимается или садится в постели. При виде пищи. От движения, при ходьбе.

**Лучше.** От горячего питья. Лежа на правом боку.

**Психика.** Ступор, оцепенение или стоическое безразличие, сопровождающееся вздохами. Тупость: пациент должен прочитать текст несколько раз; обдумывает его снова и снова. Все прошлое пациента забыто. Постоянный бред с бормотанием; бред с бессонницей и двигательным беспокойством. Яростный бред с блестящими глазами.

**Голова.** Тупая боль в лобной области, сопровождающаяся головокружением, лицо красное, горячее; пациент не может подняться и сесть в постели. Обморочное состояние при вставании; или головокружение, которое усиливается лежа.

**Глаза.** Красные, налитые кровью глаза (конгестия); испуганный взгляд, если пациента разбудить. Зрачки расширены. Светобоязнь (фотофобия).

**Уши.** Боль в ухе при глотании. Околоушные железы чувствительны к прикосновению и увеличены.

**Нос.** Обильные жидкие кровянистые, ихорозные (гнилостные) выделения из носа. Нос сухой. Зуд и неприятное ощущение в области носа.

**Лицо.** Цвета красного дерева; *темное* и опухшее. В крапинку, пятнистое лицо; разновидность угрей. Губы опухшие и потрескавшиеся.

**Рот.** Грязно-серый налет на губах и на зубах при лихорадке. Язык: сухой и коричневый; как будто пергаментный и покрыт трещинами.

**Горло.** В зеве сухость, зловоние. Горло *темное* и опухшее. Миндалины *усеяны множеством глубоких язв* (больше слева), стекают кашицеобразные выделения. Сильное опухание горла внутри и снаружи. Лакунар-ный тонзиллит. Раздражение и зуд задней стенки глотки. Дифтерия.

**Желудок.** Внезапная жестокая рвота возникает, когда пациент садится в постели. Необычное чувство пустоты в желудке.

**Живот.** Понос, дизентерия, сопровождающиеся выраженной слабостью. Стул жидкий, водянистый, зловонный, выделяется произвольно вместе с мочой. Ленточные глисты. Чувство неуверенности: опасается, что не контролирует сфинктеры и т.д.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная; подавление мочеиспускания; моча выделяется неосознанно.

**Женские половые органы.** Злокачественная послеродовая инфекция.

**Дыхательные органы.** Дыхание учащенное, неритмичное (неравномерное). Сухой отрывистый кашель. Ощущение, что легкие болезненные и утомленные.

**Сердце.** Пульс частый, малый, слабый.

**Спина и шея.** Шея чувствительная и очень сильно распухшая.

**Кожа.** *Высыпания в виде темных, разбросанных по телу бляшек;* появляются постепенно; при надавливании исчезают, но затем вновь медленно появляются. Кожа пестрая, в крапинку. Крупные волдыри, наполненные темной сывороткой. *Злокачественная скарлатина.* Петехии. Ощущение ползающих по всему телу насекомых.

**Сон.** Дремота, сонливость, беспокойный сон.

**Лихорадка.** Адинамическая лихорадка в сочетании со слабым сердцем. Холодный пот.

**Диф. диагноз.** *Arum-t., Bapt., Lac-c.*

## ALETRIS FARINOSA

**Общее.** Он поражает женские половые органы. Это средство для анемичных, утомленных, ослабленных женщин, которые всегда чувствуют себя усталыми. Они страдают выпадением органов, белями, заболеванием прямой кишки. Многие симптомы возникают вследствие патологии матки. *Части тела кажутся тяжелыми.* Это средство подходит анемичным девушкам и беременным женщинам. Слабые, истощавшие люди. Крово течения.

**Хуже.** От потери жидкостей организма.

**Лучше.** От выделения кишечных газов. Изогнувшись назад.

**Психика.** Ощущение замешательства, спутанность сознания. Не может сосредоточиться.

**Голова.** Ощущение тяжести в затылке: как будто груз тянет голову назад. Головокружение, сопровождающееся обмороком, сонливостью, рвотой или поносом.

**Уши.** Как будто уши соединяет проход.

**Рот.** Много пенистой слюны.

**Желудок.** Отсутствие аппетита; отвращение к еде. Малейшее количество пищи вызывает дискомфорт, недомогание. Упорная рвота беременных. Нервная диспепсия. Тошнота уменьшается от кофе, после обеда; сопровождается давлением в лобной области.

**Живот.** Колика, локализующаяся в нижних отделах живота, уменьшается от выделения кишечных газов; скудного жидкого стула; боль уменьшается от сгибания тела назад. Ужасная боль во время стула, как будто она выталкивает стул. Стул объемистый, твердый, выделяется с трудом. Запор, как будто из-за атонии прямой кишки.

**Мочевыделительная система.** Произвольное мочеиспускание при быстрой ходьбе или чихании.

**Женские половые органы.** Ранние и обильные менструации, сопровождающиеся схваткообразными болями. Меноррагия: обильное кровотечение, кровь черного цвета, со сгустками. Матка кажется тяжелой. Бели тягучие, белого цвета — вследствие слабости и анемии. Привычный выкидыш. Мышечные боли во время беременности. Менструации обильные, после них, между менструациями, возникают водянистые обильные бели.

**Дыхательные органы.** Кашель перед менструацией.

**Шея и спина.** Ощущение, что спина переломится сразу выше талии. Боль в спине с тянущим книзу ощущением в области крестца; сопровождается бесцветными, тягучими белями.

**Конечности.** Нога (правая) кажется парализованной ниже колена; немеет, не выносит никакой тяжести.

**Диф. диагноз.** *Chin., Helon., Tril-p.*

## ALFALFA

Это растение оказывает благоприятное воздействие на усвоение питательных веществ и считается тонизирующим средством. Повышается аппетит, улучшается пищеварение, возвращается психическая и физическая сила, это сопровождается прибавкой веса. Альфа- — полезное средство при неврастении, меланхолии, нервозности и бессоннице. Это средство способствует отложению жира, помогает набрать вес. Оно повышает качество и количество молока у кормящих матерей. В клинике оно оказывает благоприятное влияние

на течение сахарного диабета, применяется при фосфатурии. Кроме того, Альфа уменьшает раздражение мочевого пузыря при гипертрофии простаты. Его следует давать по 5—10 капель несколько раз в день.

## ALLIUM CERA

(Красный лук)

**Общее.** Поражает слизистые оболочки *НОСА, ГЛАЗ, гортани* и кишечника, вызывая повышение секреции. Сильное жжение и колотье: в глазах, в носу, во рту, в горле, в мочевом пузыре, на коже. Выделения из носа едкие; из глаз — мягкие, не раздражающие. *Неврологические* боли стреляющие, как от натянутой тонкой нити; возникают после травмы нерва или после ампутации, а также после других хирургических операций. Хронический посттравматический неврит. Симптомы перемещаются слева направо. Насморк у певцов. Неврома. Старческая гангрена. Ощущение пылающего жара в разных частях тела.

**Хуже.** В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ. От промокания ног. От пения. В сырую погоду. Весной. Вечером. От употребления испорченной рыбы; от огурцов; от салатов.

Лучше. На прохладном свежем воздухе, на улице. От купания. От движения.

**Психика.** Боится, что боль станет невыносимой. Меланхолия.

**Голова.** Тупая боль во лбу, распространяющаяся в глаза и лицо; уменьшается после жидких выделений из носа или после менструации; возобновляется, когда выделения прекращаются. Ощущение электрических ударов, проходящих через голову. Онемение костей черепа.

**Глаза.** Сильное жжение, саднящая, жгучая боль. Слезотечение: слезы обильные мягкие (не раздражающие); сильнее при кашле; хочется

потереть глаза. Близкие предметы кажутся удаленными, когда пациент зевает.

**Уши.** Тупая боль, распространяющаяся в горло.

**Нос.** ЧАСТОЕ ЖЕСТОКОЕ ЧИХАНИЕ. НАСМОРК С ЖИДКИМИ ЕДКИМИ ВЫДЕЛЕНИЯМИ; со жжением и жгучей, саднящей болью в носу. Капает из носа. Пациент чувствителен к запахам цветов и к запаху кожицы персиков. Едкие выделения из носа во время пения.

**Лицо.** Паралич левой половины лица, а также левых конечностей.

**Горло.** Саднение в горле. Боль распространяется в ухо. Секрет капает с нёбного язычка. Ощущение комка в горле, или как будто проглотил большой кусок.

**Желудок.** Страстное желание сырого лука, от которого плохо не становится. Боль в области привратника. Потоотделение с покалыванием в лысине в области темени; усиливается после каждого приема пищи. Волчий аппетит с жаждой. Тошнота. Отрыжки.

**Живот.** Урчание и выделение зловонных газов. Колики при метеоризме; хуже сидя, от движения. Ощущение пылающего жара в прямой кишке.

**Мужские половые органы.** Боль в мочевом пузыре и предстательной железе после коитуса.

**Женские половые органы.** Тромбофлебит, или белый флебит (phlegmasia alba dolens); в том числе после щипцовых родов.

**Мочевыделительная система.** Обильное мочевыделение; в том числе с насморком. Болезненное, затрудненное мочеиспускание (странгурия) после промокания ног. Выделение мочи по каплям, слабой струей у старых людей.

**Дыхательные органы.** Охриплость, непрерывный отрывистый, щекощущий кашель; хуже при вдыхании холодного воздуха; кашель сопровождается ощущением, как будто гортань расколота и разодрана; пациент хватается за нее. Кашель настолько мучительный, что пациент хочет его сдержать. Боль в гортани при разговоре. Бронхит у стариков.

**Конечности.** Суставы кажутся слабыми, ненадежными. Стирает кожу обувью до появления язв, особенно на пятках. Конечности, особенно руки, кажутся болезненными и усталыми. Болезненность стоп после продолжительной ходьбы.

**Кожа.** Красные, вздувающиеся полосы на коже; паронихия; в том числе у родильниц.

**Сон.** Зевота: возникает во время глубокого сна или сопровождает головную боль с сонливостью, а также при спазме в желудке.

**Дополнительно.** *Phos., Puls., Ther.*

**Диф. диагноз.** *Euphr., Gels., Kali-i.*

## ALLIUM SATIVUM

**Общее.** Чеснок действует на слизистую оболочку кишечника, усиливая его перистальтику. Препарат Аллиум сативум подходит толстым людям, ни в чем себе не отказывающим и страдающим от несварения желудка и катаральных заболеваний. Пациенты, потребляющие гораздо больше пищи, особенно мяса, чем питья. Пищеварение расстраивается при малейшей погрешности в диете.

Это средство обладает способностью расширять сосуды. Действует лучше на мясоедов, чем на чистых вегетарианцев. Ребенок сонливый, безжизненный, крайне бледный; кишечник вялый; не ходит, ноги не успевают в росте за остальными частями тела.

Хуже. При перемене температуры. Вечером и ночью. При ходьбе. От давления. Из-за питья плохой воды. От обжорства.

**Лучше.** Сидя согнувшись.

**Психика.** Страх: что никогда не поправится, что не перенесет никакое лекарство; что его отравят. Хочет многое, но ничто не доставляет удовольствия.

**Голова.** Головокружение во время чтения. Головная боль перед менструацией, прекращается во время нее, возобновляется после менструации. Перхоть.

**Лицо.** Пятна на лице. Губы сухие.

**Рот.** Выделяется много сладковатой слюны: после приема пищи и ночью. Ощущение волоса на языке или в горле. Язык бледный, сосочки красные.

**Желудок.** Прожорливый — волчий аппетит. Желание сливочного масла. Недомогания после питья плохой воды. Малейшая погрешность в диете нарушает работу желудка. Ощущение, будто что-то холодное и/или горячее поднимается вверх по пищеводу.

**Женские половые органы.** Менструации обильные. Болезненность наружных половых органов (вульвы) и бедер. Молочные железы набухшие и чувствительные к прикосновению во время менструации. Набухание молочной железы после отнятия ребенка от груди.

**Дыхательные органы.** Кашель утром с выделением большого количества мокроты, которая отхаркивается с трудом. Кашель возникает, когда пациент курит. Бронхоэктазы с отхаркиванием зловонной мокроты.

**Конечности.** Боль в области крыльев подвздошных костей (в верхней части бедра); боль в поясничной и подвздошной мышцах; хуже, когда сидит нога на ногу.

**Дополнительно.** Ars.

## ALOE

**Общее.** Это средство поражает *ВЕНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ*, вызывая застой крови (конгестию) и *расслабление В ПРЯМОЙ КИШКЕ, в печени* и органах малого таза. Алоэ восстанавливает физиологическое равновесие, когда симптомы болезни и симптомы гомеопатического препарата в значительной степени перемешаны.

Периодическая головная боль, которая чередуется с прострелом, *люмбаго*. Это средство для лечения дурных последствий малоподвижного образа жизни или флегматичного характера. Оно подходит усталым, пожилым людям, старым любителям пива. *Ощущение переполнения. ОЩУЩЕНИЕ ТЯЖЕСТИ, СЛОВНО ТЯНЕТ КНИЗУ, как будто давит груз.* Ощущение давления на низ. Студенистые выделения из задних отделов носа, студенистый стул и т. д. *Чувство неуверенности* (опасается, что не контролирует сфинктеры, не удержит стул). Общая слабость и усталость. Жар: наружный и внутренний. Дети очень эмоциональны, болтают и смеются.

**Хуже.** ОТ ЖАРЫ, в жаркую влажную погоду; летом. Рано утром. После дизентерии. От зевоты или жевания. Если тяжело ступает. Вечером. После еды и питья.

**Лучше.** На прохладном свежем воздухе (на улице). От холодных аппликаций. От выделения кишечных газов. Когда глаза закрыты. От питья чая или приема стимулирующих веществ.

**Психика.** Недоволен собой и сердится на себя. Не расположен к умственному труду. Ненавидит людей; отталкивает всех от себя. В дурном настроении, хуже в облачную погоду, когда пасмурно, или при запоре. Пациентка считает, что умрет через неделю. Жизнь в тягость. Дрожит от звуков музыки, а также от других звуков, шума. Пациенту кажется, что люди ступают тяжело или быстро.

**Голова.** Тупая боль выше лба с ощущением тяжести в глазах, пациент должен прикрыть (не полностью) глаза. Головокружение с чувством неуверенности, неустойчивости. Симптомы со стороны головы чередуются с абдоминальными или поясничными симптомами; лучше закрыть глаза. Сильное давление в области темени. Звенит в голове, как будто дрожит тонкое стекло; звон распространяется в уши.

**Глаза.** Боль в глубине орбиты (глазницы). Мерцание перед глазами. Частично закрывает глаза из-за боли во лбу.

**Уши.** Треск в ушах при жевании.

**Нос.** Кончик носа холодный. Кровотечение из носа после пробуждения, в постели.

**Лицо.** Губы очень красные, сухие, потрескавшиеся; кровоточат. Боль в\* лице возникает, когда пациент зевает или жуёт.

**Рот.** Привкус во рту горький или кислый. Язык и полость рта сухие.

**Горло.** Откашливает плотные комки желеобразной слизи. Чувство саднения и опухания в горле.

**Желудок.** Желание сочных продуктов, фруктов, особенно яблок, соленой пищи. Когда пациент оступается, возникает боль под ложечкой. Отвращение к мясу. Отрыжки, сопровождающиеся ощущением, что желудок сдавлен. После стула возникает чувство голода.

**Живот.** Ощущение полноты, тяжести, жара в животе, вздутия. Боль из области пупка распространяется в прямую кишку. Ощущение пробки между симфизом и копчиком, сопровождающееся позывом на стул. Чувство тяжести внизу живота, в прямой кишке; ощущение давления на низ, как будто тянет книзу. Выпадение прямой кишки. *Урчание, бульканье в кишечнике; императивный позыв на стул, ОЩУЩЕНИЕ НЕУВЕРЕННОСТИ*, опасение, что не сможет удержать стул, *затем быстро происходит извержение водянистого стула*. Не уверен, что произойдет: выделение кишечных газов или стула.

Понос: с болью в прямой кишке после стула; с выделением полупереваренной пищи (как при энтерите). *АНУС СЛАБЫЙ*, из него подтекает слизь.

Стул выделяется вместе с газами или во время мочеиспускания. Стул: мягкий, комковатый; водянистый, желеобразный; кровянистый. Твердый стул выделяется произвольно; возникает позыв на стул, но выделяются только кишечные газы.

Геморрой: узлы как гроздь винограда, выпадают; лучше от обмывания холодной водой. Жжение или колющая боль в заднем проходе и в прямой кишке из-за геморроя; они не дают спать. Стул и газы горячие. Жжение в прямой кишке. Пульсация в прямой кишке после еды. Ребенок ходит по дому, роняя маленькие, твердые, круглые, похожие на мрамор комочки кала.

Понос: после устриц; в жаркое время года, а также у любителей пива. Выделяется много слизи, возникает боль в прямой кишке после стула. Комковатый, водянистый стул.

**Мочевыделительная система.** Недержание мочи у старых людей. Увеличение простаты. Каждый раз при мочеиспускании возникает ощущение, что одновременно произойдет выделение жидкого стула. Моча горячая.

**Мужские половые органы.** Сексуальная возбудимость: после еды; после пробуждения (у детей). Поллюции во время дневного сна.

**Женские половые органы.** Тяжелая, переполненная кровью матка (кон-гестия), со схваткообразными болями, которые ощущаются в паховых областях и в верхней части бедер (в области крыльев таза); боли усиливаются, когда пациентка стоит и во время менструации. Кровотечение во время климакса. Менструации слишком ранние и продолжаются слишком долго. Бели в виде кровянистой слизи, им предшествует колика. Дизентерия после родов.

**Дыхательные органы.** Зимний кашель, сопровождающийся зудом. Затруднение дыхания сопровождается колющей болью, распространяющейся из печени в грудную клетку. Кашель возникает, когда пациентке хочется сесть, когда она стоит или поднимается со стула; со слезами.

**Шея и спина.** Прострел (люмбаго), чередующийся с головной болью и геморроем. Боль в крестце усиливается сидя; уменьшается, когда пациент прохаживается, ходит туда-сюда.

**Конечности.** Тянущая боль в суставах. Слабость во всех конечностях («отказывают»). Когда пациент идет по мостовой, возникает боль в подошвах.

**Сон.** Сновидения о том, что испачкался.

**Лихорадка.** Ощущение *внутреннего жара*.

**Дополнительно.** *Sulph.*

**Диф. диагност.** *Lil-t., PODO., Sep., Sulph.*

## ALUMEN

**Общее.** Это средство вызывает паралитическую слабость всех мышц во всех частях тела. Склонность к уплотнению желез и других тканей очень выражена. Уплотнение (затверждение) языка, прямой кишки, матки и т.д.; язвы с плотным основанием. Алюмен подходит пожилым людям, страдающим катаром бронхов. Ощущение сухости и сжатия. Самый худший вид запора, как, например, при раке матки и прямой кишки. Кровотечения, в том числе после укуса пиявки; с крупными сгустками. Чувствительность к холоду; от воздуха кожа становится шершавой, появляются трещины. Средство полезно после хирургических операций на глазах и зубах. Желтые, мягкие (не раздражающие) выделения. Ощущение сжатия, как будто от нити или повязки вокруг конечности, при параличе. Расслабление мышц.

**Хуже.** Во время сна; когда лежит на правом боку; от холода. От плохих известий.

**Психика.** Нервная дрожь от плохих известий. Сомневается в людях, не доверяет им. Страх постели (лектофобия).

**Голова.** Жгучая боль, как будто груз давит на темя; уменьшается от давления холодной руки. Головокружение, сопровождающееся слабостью под ложечкой; уменьшается при открывании глаз; уменьшается, когда пациент переворачивается на правый бок. Головная боль уменьшается от питья холодной воды.

**Глаза.** Пропалс радужки после операции по поводу катаракты. Правый глаз косит к носу.

**Уши.** Во сне слышит каждый звук. Гнойные выделения из уха.

**Горло.** Миндалины увеличены и уплотнены вследствие частых простуд. Нёбный язычок удлинён, расслаблен. Царапает в горле при кашле. Спазмы пищевода, трудно проглотить жидкость. Полная афония.



**Живот.** Очень тяжелый запор; позывы отсутствуют в течение нескольких дней. Выделяются твердые, похожие на мрамор массы, но сохраняется ощущение, что прямая кишка полная. После стула в прямой кишке долго сохраняется боль и жжение (сиднение). Кровавая рвота у сильно пьющих. Из прямой кишки выделяются крупные сгустки.

**Женские половые органы.** Уплотнение (индурация) шейки матки, а также молочных желез. Хронические желтые выделения из влагалища. Менструальные выделения водянистые. Во время менструации кисти слабые: роняет вещи.

**Дыхательные органы.** Обильная тягучая мокрота отхаркивается в первой половине дня (до полудня) — у старых людей. Катар органов грудной клетки; грудь слабая; кровохарканье; слизь отхаркивается с трудом.

**Сердце.** Сердцебиение: хуже, когда пациентка лежит на правом боку; когда думает о своей болезни.

**Кожа.** Экзема на спинке полового члена и на мошонке. Облысение.

## ALUMINA

**Общее.** Алюминий поражает *ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ*, вызывая *нарушение координации и параличи*. Парестезии. В психической сфере отмечается расстройство восприятия реальности и мышления. Алюмина подходит старым людям с недостатком жизненного тепла или преждевременно состарившимся и ослабленным. Алюмина показана при *СУХОСТИ* кожи и слизистых оболочек — глаз, горла, прямой кишки и т.д.; либо при *раздражительности и расслабленности*. Обильный секрет слизистых оболочек. Выделения жидкие, едкие, скудные. Склонность к возникновению уплотнений. Деятельность органов замедляется, реакция становится отсроченной, например, булавочный укол пациент чувствует с опозданием, впечатления осознаются медленно.

Пациент худой, бездеятельный, стремится лечь, но от этого чувство усталости усиливается. Алюмина полезна нежным детям, выросшим на искусственном детском питании. В разных частях тела ощущается пульсация; боли распространяются вверх. Самочувствие пациента на некоторое время улучшается, потом без видимой причины ухудшается. Хроническое течение процесса. Истощение: после разговора, после менструации. Дегенеративные изменения спинного мозга. Пациент не может ходить с закрытыми глазами. Непроизвольные движения отдельных частей тела. Высохшие и сморщенные девушки в пубертатном возрасте. Последствия разочарований. Ощущение сжатия. Дрожание, судорожные движения, спазмы, сопровождающиеся смехом и плачем, или тем и другим попеременно.

**Хуже.** В *ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ*; в теплой постели. От искусственной пищи, картофеля, крахмала, соли. *От разговора. В сухую погоду. Рано утром при пробуждении.* Сидя. После менструации. Периодически, в том числе через день. От коитуса. От курения табака. После поднятия тяжести. От напряжения, от усилий. В новолуние и в полнолуние.

**Лучше.** Вечером. На открытом воздухе. От умеренной нагрузки и при средних температурах. При влажной погоде, от умывания холодной водой.

**Психика.** Иллюзии: что сам пациент увеличен, крупнее, чем на самом деле; что *онемел; гладкий (ровный)*; что тяжелый. *Торопливый, но делает все медленно*, так как делает ошибки, когда говорит и пишет. Депрессивные состояния. Робкий. Страх: пугается своих собственных импульсов; *при виде ножа, крови*; боится потерять рассудок. Когда пациент что-то говорит или смотрит на что-то, у него возникает чувство, что это кто-то другой сказал или увидел; или как будто он помещен в другого человека и только тогда способен видеть. Время течет слишком медленно. Всегда причитает, стонет, беспокоится, мучается. Память плохая; разное настроение. Депрессия при пробуждении. Раздражительный, капризный. Все видит в мрачном свете. Чередование состояний, изменчивость настроения. У пациента возникает ощущение, что он может упасть вперед: он этого очень боится. Вещи кажутся нереальными. Пациент смеется и разговаривает между приступами спазмов. Насмехается надо всем. Ворчит. Думает о самоубийстве при виде ножа или крови.

**Голова.** Головокружение усиливается при разговоре; когда закрывает или открывает глаза; перед завтраком. Во время головокружения перед глазами возникают белые звездочки, если внезапно глаза оказываются не в фокусе: приходится подождать, пока зрение восстановится; лучше потерять глаза. Жестокое колотье в мозгу, сопровождающееся тошнотой. Головная боль с ощущением, что дергали за волосы. Выпадение волос; зуд кожи головы, ее онемение. Головная боль уменьшается, когда спокойно лежит в постели. Сухие волосы.

**Глаза.** Белые звездочки перед глазами при головокружении. Веки слабые, опускаются, утолщены, сухие; жжение и жгучая, саднящая боль в них. Двухстороннее косоглазие; усиливается при прорезывании зубов. Предметы кажутся желтыми. Глаза воспалены, жжение в глазах; они склеиваются ночью, в дневное время отмечается слезотечение. Глаза кажутся холодными.

**Уши.** Жар и покраснение одного уха. Кажется, что евстахиева труба закупорена. Треск или жужжание в ушах, возникающие при жевании или глотании.

**Нос.** Ноздри болезненные и красные. Кончик носа в трещинах. Корочки с выделением густой желтой слизи.

**Лицо.** *Выглядит старым*; темное, морщинистое. Ощущение яичного белка или паутины на лице. Кровяные нарывы и папулы. Непроизвольные спастические подергивания нижней челюсти. Ощущение напряжения в височно-нижнечелюстных суставах, возникающее, когда пациент жует или открывает рот.

**Рот.** Затхлый, скверный запах изо рта. Зубы кажутся длинными; боль из зубов распространяется в другие места — вдоль гортани, вдоль шеи, в плечи. Ощущение сухости во рту при повышенном выделении слюны. Пощипывание, зуд на языке.

**Горло.** Сухое, кажется наполненным щепками или *сжатым*; пища не проходит. Горло болит после употребления в пищу лука. Склонность постоянно прочищать горло. Нёбный язычок свисает. Глотание болезненное; хуже, когда глотает твердую пищу; лучше — при «пустом» глотании, от теплого питья. Ощущение сужения, сжатия, начиная с глотки и заканчивая желудком; как будто пища не может пройти вниз; за один прием может проглотить лишь маленький кусочек. Боли в горле у ораторов (у проповедников и т.д.). Пациент чувствует, как пища проходит по пищеводу.

**Желудок.** Страстное желание необычных вещей: сырых продуктов, мела, угля, сухой пищи, чистого белого тряпья, кофейной гущи или спитого чая, фруктов, овощей, сухого риса, и других несъедобных вещей. Сжатие пищевода. Боль, сохраняющаяся в течение трех часов после приема пищи. Дети с большим животом. Отвращение к картошке, мясу, от которого бывает плохо.

**Живот.** Симптомы локализуются с левой стороны. Давление в обеих паховых областях, направленное в сторону половых органов. Боль распространяется из прямой кишки в область голеностопного сустава. Вялая прямая кишка: даже мягкий стул удаляется с трудом, твердый стул вызывает сильные рези. Стул в виде мелких шариков; твердый узловатый или содержит яркие сгустки крови. Опорожнению кишечника предшествует болезненный позыв, возникающий задолго до стула; затем приходится тужиться. Запор у грудных детей, у старых людей и у женщин, ведущих сидячий образ жизни. Стул возможен только стоя.

**Мочевыделительная система.** Мышцы мочевого пузыря вялые (парез), пациент *должен тужиться, чтобы помочиться*. Боли в почке усиливаются от танцев. Учащенные позывы у старых людей; моча вытекает медленно. Пациент боится, что помочится в постель. Задержка мочи и выделение мочи по каплям, слабой струей. Жгучая, саднящая боль при мочеиспускании. Ощущение слабости в мочевом пузыре и в половых органах.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание повышено. Сладострастный зуд или щекотание в области половых органов. Поллюции возникают, когда тужится во время стула, после чего возобновляются старые (прежние) симптомы. Боль в промежности возникает во время коитуса и продолжается до тех пор, пока сохраняется эрекция. Приапизм ночью.

**Женские половые органы.** Менструации слишком ранние, короткие, скудные, менструальные выделения бледные, после менструации наступает сильное истощение. На восстановление сил у женщины уходит весь период между менструациями. Бели едкие, обильные, стекают по ногам до самых стоп; сильнее в дневное время, перед менструацией; уменьшаются от обмывания холодной водой. Невыносимая боль с ощущением давления на низ. Щекотание и зуд в области половых органов; в том числе, сопровождающееся сильным желанием сексуальной близости. Зуд сосков, жжение, воспаленный вид (при беременности).

**Дыхательные органы.** Кашель: постоянный, сухой, отрывистый; он прерывает дыхание, сопровождается чиханием; усиливается после пробуждения утром; связан с удлинением нёбного язычка; возникает из-за приправ или раздражающей пищи, от разговора или пения. Внезапная потеря голоса; в том числе при простуде. Ощущение сжатия в грудной клетке; усиливается, когда пациент сидит согнувшись или наклоняется. Болезненность грудной клетки: при разговоре; при поднятии тяжести.

**Сердце.** Сердцебиение и ощущение ударов в сердце. Просыпается с 4 до 5 ч утра с ощущением тревоги в области сердца; лучше после того, как встанет с постели.

**Шея и спина.** Боль в спине, как будто раскаленный железный прут пронзает (воткнут в) нижний отдел позвоночника. Жестокое колотье в спине. Кажется, что спина перевязана веревкой.

**Конечности.** Боль в руках (от кисти до плеча) и пальцах, как будто они пронзены раскаленным железом. Руки кажутся тяжелыми, как будто парализованными; короткими; немеют. Тяжелые нижние конечности. Пошатывается при ходьбе. Голени немеют, особенно когда пациент сидит нога на ногу. Ощущение онемения в пятках, когда на них ступает. *Семяющая, торопливая походка*. Локомоторная атаксия. Ногти хрупкие или толстые. Грызущее ощущение под ногтями. Способен ходить только с открытыми глазами или в дневное время. Шатается, если глаза закрыты. Подошвы болезненные, когда ступает на ногу; как будто они слишком мягкие, а также при ходьбе; возникают судороги, когда пациент сидит, положив ногу на ногу. Кости кажутся сжатыми, сдавленными.

**Кожа.** Невыносимый зуд возникает, когда пациент согревается в постели. Сухая, шершавая, потрескавшаяся кожа. Зуд, жжение над местом, где ощущается боль. Вынужден расчесывать кожу до крови. Экзема. Малейшее повреждение кожи вызывает жгучую боль, саднение и приводит к воспалению. Кожные симптомы усиливаются зимой, в новолуние и полнолуние.

**Сон.** Тревожный, беспокойный, с запутанными сновидениями — о ворах, призраках (привидениях), о тонущих лодках.

**Лихорадка.** Зябкость уменьшается на открытом воздухе. Жар с зудом.

**Дополнительно.** *Bry.*

**Диф. диагноз.** *Bry., Plb.*

## ALUMINA SILICATA

**Общее.** Это средство воздействует на спинной мозг. Сжатие, сужение — вот характерный общий симптом. Сжатие отверстий тела. Тупая боль, ломота и жжение в позвоночнике. Ощущение ползания мурашек, онемение и боль во всех конечностях. Эпилептиформные судороги. Холодное тело, мерзнет при болях.

**Хуже.** От холодного воздуха; после еды; стоя.

**Лучше.** От тепла; когда голодает (постится); во время отдыха в постели.

## AMBRA GRISEA

**Общее.** Амбра поражает *НЕРВЫ*, вызывая нервозность, мышечные подергивания и резкие сокращения. Гомеопатическое средство Амбра подходит истеричным людям, худым, костлявым женщинам; пациентам, ослабленным вследствие преклонного возраста или чрезмерного труда; старым людям с нарушением функций всех органов.

Пациенты *изношены и, тем не менее, крайне впечатлительны*. Потрясение, шок вследствие неудачи в бизнесе или в случае, когда умирают один за другим члены семьи. Слабость верхней половины тела, сопровождающаяся дрожанием нижней половины. Из-за незначительных причин или от необычных впечатлений возникает нарушение дыхания, появляются сердечные симптомы, начинается менструация и т.д.

Симптомы заболевания локализуются с одной стороны. *Симптомы внезапно меняют локализацию*. Ощущение холода, онемения возникает на небольших участках или в отдельных частях тела — в пальцах, руках и т.д. — и сопровождается подергиванием. Зуд, дрожание и радостное возбуждение, волнение крови. Ощущение общей пульсации. Онемение и оцепенение всего тела, особенно утром. Все тело холодное, при этом отмечаются подергивания. Последствия потрясения, несчастья в семье, забот о бизнесе. Потеря близких родственников. Фантазии. Молодые современные светские девушки.

**Хуже.** *От музыки. В присутствии других людей.* От смущения. **От** возбуждения, беспокойства, забот; при мысли о симптоме, о болезни. От поднятия чрезмерной тяжести. От любых необычных впечатлений. Утром. От тепла. От теплого молока.

**Лучше.** От медленного движения на открытом воздухе. Лежа на большей части тела. От холодного питья.

**Психика.** Нарушение памяти; пациент медленно соображает. *Мечтательный*. Идеи, мысли проносятся в голове или возникают навязчивые неприятные фантазии. В воображении видит дьявольские лица, картины. Меланхолия: сидит и плачет целыми днями. Неловкий, неуклюжий. Болтает обо всем, с легкостью обо всем судит, современная светская девушка. Боится, избегает людей. Желание быть одному. Не может понять то, что читает. Печален. *Застенчив*; легко краснеет. Пациент волнуется, если присутствует при разговоре других людей или сам участвует в разговоре. Время идет медленно. Отвращение к смеху. Перескакивает с одной темы на другую, никогда не дожидаясь ответа на первый вопрос. Музыка вызывает плач и дрожание.

**Голова.** *Головокружение*: старческое; сопровождающееся ощущением слабости в голове и в желудке. Рвущая боль в верхней части мозга. Кажется, что мозг не закреплен, болтается и падает на тот бок, на котором лежит пациент. Выпадение волос. Ощущение *спутанности* сознания, как будто помутилось в голове — в области затылка, а также ощущение растяжения в нем. Головная боль усиливается, когда пациент сморкается.

**Глаза.** Колющие боли в веках, как будто должен появиться ячмень. Веки тяжелые, не может открыть глаза, хотя и не спит. Пятна плавают перед глазами после шитья.

**Уши.** Тугоухость, сопровождающаяся ощущением холода в животе. Одно ухо не слышит, в другом — рев и свист.

**Нос.** Кровотечение при умывании лица утром. Носовое кровотечение, в том числе во время менструации. При хроническом насморке заложенность носа возникает преимущественно ночью, пациент вынужден дышать ртом.

**Лицо.** Подергивание мышц лица. Спазмы в губах; губы горячие. Левая щека красная. Приливы крови к лицу; лицо желтого цвета. Смущенный вид. Тризм (сжатие челюстей) у новорожденных.

**Рот.** Обильное кровотечение из десен; зловонное дыхание. Киста подъязычной железы (ранула). Кислый привкус во рту; хуже после питья молока. Слюнотечение при кашле.

**Горло.** Ощущение, как будто пробка в горле, трудно глотать. Болезненность, саднение в горле после пребывания на воздухе; хуже от движения языком.

**Желудок.** После еды возникает кашель и приступ зевоты, а также ощущение, что пища не спустилась в желудок. Отрыжки в сочетании с жестоким судорожным кашлем. Изжога после питья молока. Вздутие желудка после полуночи. Отсутствие жажды.

**Живот.** Метеоризм, не может допустить, чтобы кто-то присутствовал в помещении, когда он мочится или опорожняет кишечник; сильнее во время беременности. Ощущение холода в животе. Запор во время беременности, а также после родов. Тупая боль на небольшом участке в области печени; уменьшается от давления. Сильное кровотечение во время стула. Потоотделение на животе и бедрах. Частые безрезультатные позывы на стул.

**Мочевыделительная система.** Боль в мочевом пузыре и в прямой кишке одновременно. *Не может помочиться в присутствии других людей.* Ощущение в уретре, как будто вытекло несколько капель мочи. Моча мутная, даже при мочеиспускании, в ней образуется коричневый осадок. Выделяет жидкости больше, чем выпивает. Кислая моча при коклюше. Жжение, саднящая боль, зуд в области наружных половых органов (вульвы) во время мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Сексуальное возбуждение и зуд половых органов. Половые органы снаружи немеют, внутри — горят. Эрекции без сексуального возбуждения. Импотенция.

**Женские половые органы.** Зуд промежности, сопровождающийся болезненностью и опуханием. Зуд половых губ. Кровь выделяется между менструациями по малейшему поводу: после твердого стула, если пациентка походит чуть дольше и т.д. Бели представляют собой синеватую слизь; они обильные; сильнее ночью. Повышенное сексуальное желание. Когда женщина ложится, маточные симптомы усиливаются. Менструации слишком ранние и слишком обильные.

**Дыхательные органы.** Астматическое дыхание, в том числе у старых людей; хуже от коитуса. Гулкий, спастический, лающий кашель, возникающий глубоко в грудной клетке; после него возникает отрыжка. Синеватая или белая мокрота. Кашель: усиливается от музыки; возникает в присутствии множества людей; от разговора, чтения вслух, поднятия тяжести. Пациент задыхается от кашля. Кашель с исхуданием.

**Сердце.** Сердцебиение сопровождается ощущением давления в груди, как будто там застрял комок; или как будто грудная клетка закупорена. При сердцебиении лицо бледное. Ощущение тревоги в области сердца.

**Конечности.** Судороги в кистях и пальцах рук; усиливаются, когда пациент хватается за что-нибудь. Левая голень становится совершенно синей во время менструации. Подергивание конечностей во время сна, при этом тело холодное. Судороги в мышцах голени и в икрах. Конечности легко немеют. Ногти на руках хрупкие. Роняет то, что несет. Кисть (левая) холодная при головной боли. Болезненность и саднение между бедрами.

**Сон.** Не может спать из-за беспокойства, вынужден встать. Ложится в постель усталым, сон пропадает, как только коснется подушки.

**Кожа.** Зуд и болезненность кожи, особенно в области половых органов.

**Лихорадка.** Частые приливы жара — через короткие промежутки времени. Потоотделение от малейшего напряжения, особенно на животе и бедрах.

**Диф. диагноз.** *Bar-c, Ign.*

## AMBROSIA

**Общее.** Это средство для лечения сенной лихорадки (поллиноза), слезотечения и невыносимого зуда век. Носовое кровотечение. Ощущение заложенности в носу и голове.

**Диф. диагноз.** *Ars-i, Sabad.*

## AMMONIUM BROMATUM

**Общее.** Аммоний броматум показан при катаре глотки и гортани. Внезапный, перехватывающий дыхание, удушливый кашель. Ощущение удушья перед приступом эпилепсии. Ощущение беспокойства, раздражения в области ногтей на руках; лучше, когда пациент кусает их.

## AMMONIUM CARBONICUM

**Общее.** Это вещество воздействует на *СЕРДЦЕ; кровообращение и кровь*. Сердце слабеет, возникает коллапс. Поскольку кровообращение становится вялым и кровь недостаточно насыщена кислородом, возникает *ЦИАНОЗ* и *СЛАБОСТЬ* и сонливость. *Снижается запас жизненных сил, реакция становится недостаточной.*

Аммоний карбоникум подходит тучным пациентам со слабым сердцем, со свистящим дыханием и ощущением удушья; полным женщинам, которые всегда чувствуют усталость и утомление, ведут сидячий образ жизни, легко простывают и страдают от поноса, напоминающего холеру, перед менструацией.

Пациент *очень чувствителен к холодному воздуху*. Он испытывает сильное отвращение к воде, не выносит ее прикосновения. Пациент нечистоплотен. Ощущение тяжести во всех органах. Характерны боли, как от ушиба, и ощущение болезненности. Отмечается ощущение жгучего саднения внутри. Выделения *горячие, едкие*, клейкие. *Кровотечения темной жидкой кровью*. Злокачественные опухоли. Прострация (упадок сил душевных и физических) по пустякам. Состояния, вызванные дефицитом витамина С. Пожилой возраст — старики. Пациент ложится из-за слабости или болезненности во всем теле. Отравление угарным газом.

**Хуже.** ОТ ХОЛОДА: В ОБЛАЧНУЮ ПОГОДУ (В ПАСМУРНЫЕ ДНИ): ОТ СЫРОГО ХОЛОДА. От сырого холодного открытого воздуха. При засыпании; в том числе в 3—4 ч утра. Во время менструации. От движения. От жевания, при стискивании зубов. Согнувшись вперед, наклонясь. В новолуние.

**Лучше.** От давления; от еды, лежа на животе. В сухую погоду. Лежа на правом боку.

**Психика.** Деятельный, но быстро истощается. Забывчивый, в плохом настроении, мрачный — в ветреную, штормовую погоду. Невнимательный, небрежный и непокорный. Подавленность в сочетании со слабым интеллектом. Рассеян, пусто в голове, отсутствие мыслей. Потеря памяти; хуже от неприятностей. Пациент волнуется, когда говорит или когда говорят другие. Отвращение к работе. Раздражается, беспокоится, мучается, как будто было совершено преступление. Хочется плакать. Склонен делать ошибки, когда говорит, пишет и считает.

**Голова.** Когда пациент откусывает что-нибудь, то есть сжимает зубы, возникает ощущение ударов, которые проходят через голову, глаза, уши и нос. Жесточая головная боль: ощущение переполнения, распирающего лоб, как будто он лопається. Кажется, что мозг болтается, не закреплен внутри головы.

**Глаза.** Жжение и сухость в глазах. Длительная нагрузка на глаза вызывает астенопию; перед глазами появляются желтые пятна, когда пациент смотрит на белые предметы. Поток слез. После шитья перед глазами плавают большие черные пятна. Боль в глазах уменьшается после дневного сна.

**Уши.** Тугоухость. Зуд над ушами, распространяющийся на все тело. Околоушные и шейные железы опухшие, твердые.

Нос. Заложенность носа ночью, при продолжительном насморке; пациент вынужден дышать ртом. Сопение (насморк) у детей. Носовое кровотечение: при мытье рук или умывании лица, после еды, или при пробуждении. Постоянно хочется чихнуть. Обильные водянистые выделения из носа. Катар, начинающийся с носа. Нарыв (фурункул) на кончике носа. Неспособность высморкаться, у детей.

**Лицо.** Нарывы (фурункулы), пустулы во время менструации. Углы рта болезненные, с трещинами и жжением. Трещины и жжение на губе. Плотный отек на щеке.

**Рот.** Чувствительные, кровоточащие десны. Стискивание зубов вызывает ощущение удара, проходящего сквозь голову, глаза, уши и нос. Сухость во рту и в горле. Шатающиеся или тупые, сточившиеся зубы. Пузырьки на языке. Жжение, мешающее есть и говорить. Зубы ноют во время менструации. Опухание на внутренней стороне щеки.

**Горло.** Увеличенные миндалины и шейные железы (лимфатические узлы). Гангренозные язвы на миндалинах. Дифтерия: нос заложен, пленки распространяются на верхнюю губу.

**Желудок.** Боль под ложечкой: сопровождается изжогой, тошнотой, кислой отрыжкой и зябкостью. Диспепсия с метеоризмом. Аппетит хороший, но быстро наступает насыщение.

**Живот.** Кровоточащий геморрой; ухудшение во время менструации. Выделение крови из прямой кишки до и после стула. Выпячивание геморроидальных узлов; хуже после стула или когда нет стула; лучше лежа, ходить не может. Темный едкий стул при поносе. Колики сопровождаются болью между лопатками. Запор: стул твердый, сухой.

**Мочевыделительная система.** Учащенные позывы. Моча: белая, кровянистая, содержит песок, обильная, мутная и зловонная. Непроизвольное мочеиспускание под утро.

**Мужские половые органы.** Стойкие эрекции без сексуального желания или неистовое желание без эрекции. Поллюции частые, после коитуса.

**Женские половые органы.** Холероподобные симптомы сопровождают менструацию. Менструации слишком частые, обильные, ранние, со сгустками, с выделением черной крови, сопровождающиеся спастической болью и твердым стулом, который выделяется с трудом, с ощущением утомления, особенно в бедрах, с зевотой и зябкостью. Менструальное кровотечение обильнее ночью, впоследствии возникает одышка или слабость. Обильные бели — густые, едкие, водянистые. Раздражение клитора.

**Дыхательные органы.** Нарастающее затруднение дыхания заставляет пациента проснуться; лучше на прохладном воздухе. Сильное стеснение дыхания; хуже от любого усилия, когда входит в теплое помещение. Эмфизема. Клокотание мокроты в груди, но отхаркивается малое ее количество. Охриплость. Отек легких. Кашель после гриппа. Застойное полнокровие легких. Отхаркивает чистую кровь — после кашля.

**Сердце.** СЛАБОЕ. Просыпается с одышкой и сердцебиением. Сердцебиение, слышимое на расстоянии, сопровождающееся страхом, холодным потом и слезотечением, невозможностью говорить и дрожанием рук. Стенокардия. Из-за слабости сердца возникает застой крови.

**Конечности.** Те части тела, на которых пациент лежит, немеют. Судороги в икроножных мышцах и подошвах. Пальцы на руках и кисти в целом опухают, когда руки свободно свисают. Склонность потягиваться. Пана рий. Рвущая боль, уменьшается в тепле постели. Правая стопа немеет. Киста сухожильного влагалища (ганглион). Тупые боли, ломота в костях уменьшаются при перемене погоды. Правая рука тяжелая и слабая.

**Кожа.** Красная или пятнистая кожа. Рожистое воспаление, в том числе у стариков. Злокачественная скарлатина.

**Сон.** Сонливость в дневное время. Пациент просыпается от удушья. Чем раньше ложится спать, тем лучше спит.

**Лихорадка.** *Ощущение холода.* Жгучий жар с жаждой.

**Диф. диагноз.** *Ant-t., Carb-v., Clon., Lack., Mur-ac.*

## **AMMONIUM MURIATICUM**

**Общее.** Хлористый аммоний поражает *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ*: он усиливает секрецию, но способствует задержке выделений, особенно в органах *ГРУДНОЙ КЛЕТКИ* и в *желчных протоках*. Он вызывает *нарушение кровообращения*: кажется, что кровь все время течет в суматохе, отчего возникает *ощущение волнения крови, жжение и локальная пульсация (биение)*. Многие симптомы сопровождаются кашлем или выделением *БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА слизи, ПОХОЖЕЙ НА ЯИЧНЫЙ БЕЛОК*, а также сопровождаются патологией печени. Ощущение напряжения и *стягивания, как будто мыширг и сухожилия слишком короткие*, возникающее в паховых областях, в подколенных сухожилиях, в области поясницы и т.д. Хлористый аммоний вызывает изъязвление и боли — язвенную или с ощущением, что ткань нагнаивается, нарывает. Невралгические боли в культе ампутированной конечности. Кровотечения. Ощущение кипения.

Это средство подходит полным, отечным, вялым пациентам с тонкими конечностями, которые всегда чувствуют себя усталыми и больными. Последствия горя.

**Хуже.** Утром — усиливаются симптомы со стороны головы и органов грудной клетки. После полудня — брюшные симптомы; вечером — кожные симптомы, лихорадка и симптомы со стороны конечностей. В связи с хроническим растяжением связок. Хуже, когда ходит выпрямившись (держится прямо). Периодически. Ночью — с 2 до 4 ч утра.

**Лучше.** На открытом воздухе. От быстрого движения; когда ходит согнувшись (сгорбившись).

**Психика.** Хочется плакать, но не может. Непроизвольно возникает отвращение к определенным людям. Меланхолия и дурные предчувствия; как будто от переживания внутреннего горя. Паралич мозга.

**Голова.** Тяжесть во лбу; давящая боль по направлению к корню носа, сопровождающаяся ощущением, что мозг разорван, растерзан. Выпадение волос сопровождается зудом и перхотью.

**Глаза.** При ярком свете возникает дымка перед глазами. Летают пятна перед глазами; желтые пятна. Начинающаяся катаракта, капсулярная катаракта.

**Нос.** Обильные едкие, горячие, водянистые выделения из носа при насморке; в том числе, если зажать одну ноздрю. Пациент не чувствует запахи. Ощущение закупорки, заложенности; желание высморкаться, прочистить нос. Ощущение, как будто верхние носовые ходы закупорены шершавым предметом. Болезненность носа при прикосновении. Чихание: будит пациентку ночью; сопровождается стреляющей болью в задней части шеи, которая распространяется в плечи. Насморк у детей сопровождается синеватыми выделениями.

**Лицо.** Бледное. Губы горят, как от огня. Губы сухие, сморщенные, потрескавшиеся, должен их увлажнять, облизывая языком. Жгучие высыпания; лучше от холодных аппликаций.

**Рот.** Много слизи. Жгучие волдыри на кончике языка.

**Горло.** *Много слизи.* Биение, пульсация в горле, опухание миндалин. Горло опухает внутри и снаружи, это сопровождается выделением клейкой слизи. Сужение (стриктура) пищевода.

**Желудок.** Желание лимонада. Тошнота сопровождается горькой отрыжкой; усиливается от еды; сопровождается дрожью, содроганием. Грызущая, жгучая, колющая боль в желудке, распространяющаяся в правую подмышечную область и руку (от плеча до локтя). Рак желудка. Ощущение пустоты в желудке, но нет желания что-нибудь съесть. Понос и рвота во время менструации.

**Живот.** Колотье в селезенке во время еды, сопровождающееся затруднением дыхания. Кашель при поражении печени. Избыточное отложение жира в области живота. Скучный, твердый, крошащийся стул, разного цвета и консистенции. Выделение крови из заднего прохода или понос во время менструации. Геморрой после подавления белей. Жжение в прямой кишке во время стула и в течение нескольких часов после него. Ощущение напряжения, как при растяжении связок, в паховых областях; вынужден ходить согнувшись. Ощущение опухания и болезненности в паховых областях.

**Мочевыделительная система.** Обильное и учащенное мочеиспускание. При позыве вытекает лишь несколько капель, полное, без затруднения опорожнение мочевого пузыря происходит только во время следующего стула. Выделение большого количества мочи с запахом аммиака.

**Женские половые органы.** Менструации слишком ранние, сопровождаются болью в животе и пояснице; менструальное кровотечение обильнее ночью. Выпадение матки. Бели, похожие на яичный белок, сопровождаются болью возле пупка; ухудшение после каждого мочеиспускания.

**Дыхательные органы.** Охриплость и жжение в гортани. Кашель возникает при обильном выделении слюны или при поражении печени. Пациент не может дышать из-за кашля. В *грудной клетке* — шум, клототание вязкой слизи. Пульсация, участки жжения в груди. Кашель усиливается, когда пациент лежит на спине или на правом боку.

**Шея и спина.** Опухшие шейные железы. Болезненное растяжение мышцы, или ощущение ледяного холода между лопатками, которое не уменьшается от тепла. Прострел (люмбаго). Боль в копчике, как от ушиба, возникает, когда пациент сидит. Отложение жира, как будто припухлость на затылке, распространяется от уха до уха.

**Конечности.** Ощущение напряжения, как при растяжении связок, в паховых областях, вынужден ходить согнувшись. Сокращение (контрактуры) сухожилий, ограничивающих подколенную ямку. Ишиас (слева): хуже — сидя, лучше — лежа. Язвенная боль в кончиках пальцев рук. Боль в пятке или язва на пятке. Боль в стопах во время менструации. Стреляющая боль в лопатках, усиливается при дыхании. Крупные ягодицы. Подколенные сухожилия кажутся слишком короткими, возникает боль при ходьбе.

**Сон.** Эротические сновидения. Тревожные, страшные сны. Внезапно просыпается, вскакивает.

**Кожа.** Кровоточащие высыпания. Шелушение кожи между пальцами рук и на запястьях. Зуд кожи в разных местах, особенно вечером.

**Лихорадка.** Ощущает озноб столько раз, сколько просыпается. Ощущение жара: уменьшается на открытом воздухе; чередуется с ознобом. Зябкость вечером, после того, как ляжет в постель. Обильный ночной пот. Пациент потеет при каждом движении.

**Диф. диагноз.** Calc, Caust., Seneg.

## AMYLUM NITRICUM

**Общее.** Амилий нитрикум воздействует на сосудо-двигательные нервы, вызывая расширение всех артериол и капилляров. Поэтому возникают приливы крови к лицу, жар и *пульсация в голове*. *Приливы жара, в том числе с последующим возникновением проливного пота* (на одной стороне тела), — это яркий симптом для назначения препарата Амилий нитрикум. Расширение сосудов головного мозга. Экзофтальмический зоб, возникший как следствие пережитого горя. Бессознательное состояние, сопровождающееся неспособностью глотать. *Пульсация (биение)*, особенно в голове. Пациент слабый, истощенный, с нетвердой походкой: кажется, что он вот-вот упадет; тенденция при ходьбе отклоняться в одну сторону («заносит»). Не может сидеть неподвижно.

**Хуже.** ВО ВРЕМЯ КЛИМАКСА. ОТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН. От переживаний, эмоций. От жары. В закрытом помещении.

**Лучше.** На открытом воздухе, от физических упражнений на улице. От холодной воды.

**Психика.** Тревога, как будто что-то может случиться; необходим свежий воздух.

**Голова.** Прилив крови к голове; лицо огненно-красное. При мигрени лицо бледное.

**Лицо.** Лицо легко краснеет или на нем появляется румянец от малейшего волнения, переживания. Жевательные движения нижней челюсти. Пациент чмокает губами, как будто что-то пробует на вкус.

**Горло.** Перехватывает дыхание; воротник кажется слишком тесным.

**Желудок.** Икота и зевота с потягиванием.

**Женские половые органы.** Кровотечения, сопровождающиеся приливом крови к лицу. Невралгия во время менструации. Климактерические приливы, в том числе с головной болью, тревогой и сердцебиением. Конвульсии сразу после родов.

**Грудная клетка.** Боль и ощущение сжатия в области сердца. Трепетание сердца от малейшего волнения. Сильное, шумное сердцебиение. Стенокардия, сопровождающаяся сильной тревогой. Полный, мягкий пульс. Тупая боль распространяется назад вдоль левого ложного (плавающего) ребра.

**Сон.** Пациент неоднократно зевает в коматозном состоянии. Зевает много и глубоко. Практически постоянно потягивается — почти невозможно удовлетворить потребность потянуться. Потягивается и зевает, при этом икает.

**Лихорадка.** Ненормальное потоотделение после гриппа.

**Диф. диагноз.** Glon., Lach.

## ANACARDIUM

**Общее.** Пациенты, которым показан Анакардиум, — неврастеники. Страдает ПСИХИКА, а также нервы, мышцы и суставы. НЕ ХВАТАЕТ СИЛЫ — умственной и физической. *Снижена чувствительность*: ослаблены зрение, слух, тактильная чувствительность и т.д. *Ощущение пробки* в разных местах; или *ОЩУЩЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ* ТУПЫМ предметом, которое возобновляется время от времени. Ощущение повязки или обруча. Прерывистость симптомов. Страх экзаменов у студентов. *Дрожание*: от малейшего напряжения; сильнее в коленях и в руках. Параличи. Хочет все время лежать или сидеть. Еда временно облегчает все симптомы. Нервное истощение от учебных перегрузок. Парез мышц, подвластный воле пациента. Ранение сухожилий. Контрактуры суставов. Пожилой возраст, старики. Злонравные дети. Истеричные, нервные женщины. Заболевания спинного мозга. Ощущение тяжести и полноты во всем теле после игры на фортепиано.

**Хуже.** ОТ УМСТВЕННОГО (НЕРВНОГО) НАПРЯЖЕНИЯ. От переживаний, эмоций. От гнева. От испуга, беспокойства, забот. От унижения, обиды. Когда тяжело ступает. От движения. От сквозняков, открытого воздуха; в том числе от холодного. Спустя много времени после еды. От растирания; чесания. От разговора. Утром. С вечера до полуночи. Из-за подавления высыпаний. От сильных запахов.

**Лучше.** От еды. Лежа на боку. От растирания. От жара; от горячей ванны. На солнце.

**Психика.** Навязчивые идеи; пациент считает, что находится во власти двух людей, или что им управляют две воли. Иллюзия двойственности, удвоения, что кто-то находится за спиной пациентки и т.д. Что ее муж — это не ее муж, а ее ребенок — вовсе не ее ребенок. Все нереально, все кажется сном. Пациент ожидает неприятности отовсюду. Бессмысленные речи. Громко кричит; как будто хочет кого-то позвать. Религиозная мания. **ПЛОХАЯ ПАМЯТЬ.** Пациентка внезапно забывает имена тех, кто рядом с ней, тех, кого встретила. Отвращение к работе. Недостаток уверенности в себе. Желание проклинать и ругаться. Страх паралича. Отчаяние: не верит в выздоровление. **Противоречивые импульсы:** пациент смеется над серьезными вещами, остается серьезен, когда происходит что-то смешное. Трусливый. Нерешительный. Нет гармонии внутри пациента: не в ладу с собой. Меланхолия. *Дурной нрав. Богохульник.* Видит все с плохой стороны. Рассеянный; как будто во сне. Слышит голоса: тех, кто находится от него далеко или голоса умерших. Склонность к самоубийству: может застрелиться. Видит в зеркале лица всех людей, за исключением своего. Жестокосердие, жестокость. Сомневается, колеблется; часто ничего не делает. Необщительный. Невротик. Подозрительный. Очень легко обижается. Старческое слабоумие. Отказывается от еды из страха, что его отравят.

**Голова.** Головокружение усиливается при ходьбе; возникает при наклоне, когда пациент поднимается после наклона; при этом предметы кажутся сильно удаленными. Давящая боль, как от пробки: в висках, затылке, во лбу и в темени; уменьшается от приема пищи; при засыпании; усиливается от кашля, глубокого дыхания. Зуд и мелкие нарывы (фурункулы) на коже головы. Головные боли желудочного и нервного происхождения. Головная боль от сильных запахов.

**Глаза.** Давящая боль, как будто от пробки, на верхней стенке орбиты. Нити и черные пятна перед глазами. Предметы кажутся сильно удаленными. Зрение неясное. Близорукость.

**Уши.** Тугоухость. Давящая боль, как от пробки. Воображает, что слышит шепот.

**Нос.** Обоняние извращено, снижено или обострено. Иллюзии запахов. Частое чихание, после которого возникает насморк и слезотечение. Жестокий насморк в сочетании с сердцебиением, особенно у стариков.

**Лицо.** Бледное. *Болезненный вид.* Синие круги вокруг глаз. Экзема лица и шеи. Невыразительное лицо; дикое, ребяческое выражение лица.

**Рот.** Скверный запах изо рта и неприятный привкус во рту. Болезненные пузырьки во рту. Язык кажется опухшим и одеревенелым: пациент не может говорить и шевелить языком, во рту много слюны. Не чувствует вкус пищи.

**Желудок.** Ощущение пустоты в желудке. Слабое пищеварение. Дыхание перехватывает, когда ест или пьет. Боль в желудке уменьшается от еды, но снова усиливается через 2—3 часа. Торопливо пьет и глотает пищу. От рвоты лучше. Отсутствие аппетита чередуется с жестоким чувством голода.

**Живот.** Боль, как будто тупая пробка вдавлена в кишечник. Живот твердый. Колика при метеоризме сопровождается урчанием в животе, щиплющей и сжимающей болью. Прямая кишка кажется заткнутой пробкой и бессильной; пациент не может избавиться даже от мягкого стула. Безрезультатный позыв. Зуд ануса; мокнутие в области заднего прохода (выделения из прямой кишки).

**Мочевыделительная система.** Часто выделяется прозрачная водянистая моча; в том числе с осадком, мутная; с осадком цвета глины. Ощущение жжения в головке полового члена во время и после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Сладострастный зуд мошонки, вызывающий сексуальное желание. Поллюции без сновидений. Выделение сока простаты (простаторея) во время стула. Наслаждения не испытывает.

**Женские половые органы.** Бели, сопровождающиеся зудом и раздражением половых органов. Частые, но скудные менструации; сопровождаются спастической болью в животе. Тошнота при беременности уменьшается от еды.

**Дыхательные органы.** Дыхание прерывается, когда пациент кашляет и глотает. Кашель, возникающий от разговора, после еды, при рвоте пищей, с болью в затылке; у детей, после приступа гнева (раздражительности). Кашляет, потом зевает и засыпает. Истерическая астма, приступ заканчивается потоком слез.

**Сердце.** Двойной укол в области сердца, распространяющийся в поясничную область. Сердцебиение, в том числе сопровождающееся насморком, у стариков.

**Шея и спина.** Ощущение тупого давления, или как будто тяжелый груз лежит на плечах. Скованность в задней части шеи и в шее вообще; ниже, вдоль спины, а также боль, усиливающиеся от движения.

**Конечности.** Невралгия большого пальца на руке. Колени кажутся парализованными или перевязанными. Сухие кисти. Судороги в икрах, усиливаются при ходьбе или при вставании со стула. Боль в голеностопном суставе, как при растяжении связок; хуже, когда делает шаг, ступает на ногу. Ощущение болезненных тяжелых



ударов в области средней трети плеча, (слева). Судороги: от пальцев ног — вдоль плюсны (по верхней поверхности стопы); от пятки — до икроножной мышцы. Бородавки на ладонях и кистях. Писчий спазм.

**Сон.** Периоды бессонницы, длящиеся по несколько ночей. Тревожные сновидения.

**Кожа.** Кожа нечувствительная; зуд усиливается от расчесывания. Дерматит. Невротическая экзема. Желтые пузыри. Бородавки на ладонях и кистях.

Крапивница. Анакардиум способствует изгнанию заноз.

**Лихорадка.** Легко зябнет, лучше на солнце. Липкий пот на ладонях, особенно на левой. Жар длится с 16 ч и до вечера, проходит после ужина.

**Диф. диагноз.** *Ign., LYC, Plat., Rhus-t.*

## ANTHRACINUM

**Общее.** Этот нозод — очень ценное средство при злокачественном или септическом воспалении соединительной ткани или клетчатки. Он вызывает появление нарывов (фурункулов) или сходных высыпаний; кроме того, карбункулов, злокачественных язв, абсцессов, бубонов — то есть гнояников. Кровотечения: кровь густая, черная, как деготь — из любого отверстия тела. Железы опухшие; клетчатка отекая, плотная. Отмечается ужасное жжение и выраженная прострация. *Черные и синие* волдыри. Гангрена, распадающиеся раны. Болезненные последствия вдыхания отвратительного запаха. *Абсцесс носовой перегородки.* Флегмонозная ангина, острый паратонзиллит (перитонзиллярный абсцесс). Последовательное возникновение фурункулов. Твердая, как камень, припухлость в области нижней челюсти справа, а также в области подчелюстной железы.

**Диф. диагноз.** *Ars., Tarent-c.*

## ANTIMONIUM CRUDUM

**Общее.** Выбор этого средства бывает обусловлен симптомами, возникающими в психической сфере и в области пищеварения. Как следует из второй части названия, пациент типа Антимониум крудум «сырой» и психически, и физически. Этот пациент — *обжора*, ненасытный человек: он съедает больше, чем может переварить его желудок, или ест все, без разбора. Поэтому *психические и кожные симптомы* обусловлены **РАССТРОЙСТВОМ ПИЩЕВАРЕНИЯ**. Это приводит к *эффекту комков* (узлов): стул водянистый, содержит комки кала; бели водянистые с примесью комочков; комки (узлы) появляются на коже; ногти становятся толстыми, кривыми, узловатыми.

Отмечается склонность к возникновению *трещин*: в углах глаз, возле ноздрей, в углах рта. На ментальном уровне — с точки зрения психики — пациент либо сентиментален, особенно при лунном свете, в сумерки; при поносе, перед менструацией; либо своенравен, несговорчив и раздражителен. Это средство характеризует странное *отсутствие боли* там, где ее следовало бы ожидать, например, при пролежнях.

Антимониум крудум подходит младенцам и маленьким детям; а также людям молодого и почтенного возраста, у которых имеется *склонность к полноте*. Когда комплекс симптомов появляется вновь, происходит либо изменение локализации симптомов, либо их перемещение с одной стороны тела на другую. Рецидив возникает каждые пять, семь или двенадцать недель. Когда отступают симптомы подагры, заболевает же лудок. Обнаруживаются, кроме того, следующие симптомы со стороны нервной системы: двигательное беспокойство, подергивание мышц, склонность вздрагивать от малейшего шума.

Последствия разочарования в любви и подавления высыпаний. Хронические болезни, возникновение которых связано с подавлением высыпаний или язвенного процесса. Анасарка. Исхудание (маразм). Болезненные последствия купания или падения в воду. Ревматоидный артрит. Пациент всегда *сонливый и усталый*.

**Хуже.** ОТ КУПАНИЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ. От сырого холода. ОТ ПОПАДАНИЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ на голову. От кислого. От сладкого. От лунного света. При вставании. При ходьбе вверх по лестнице. От прикосновения. ОТ ЛЕТНЕГО ЖАРА; от жара солнца. От лучистого тепла. ОТ ПЕРЕЕДАНИЯ. От ночных оргий, после пьянки. От укуса. От свинины.

**Лучше.** На открытом воздухе; в покое; от влажного тепла. Лежа.

**Психика.** Сильная тревога за свою судьбу; способен застрелиться (склонность к подобному способу самоубийства). Пациент *беспокойный, своенравный, несговорчивый и раздражительный*. Громко плачет, если на него смотрят или прикасаются к нему, или умывают его — особенно выражено у детей. Взрослые угрюмые, не желают ни с кем разговаривать. Отвращение к жизни, к еде, к купанию и т.д. *Экстаз, восторг и возвышенная любовь. Мечтательный и сентиментальный*. Сердится из-за малейшего внимания к нему. Томится от любви. Так занят своими делами, что забывает сходить в туалет (помочиться, опорожнить кишечник); кушает, только когда позовут. Повышенная возбудимость. Истеричные, нервные девушки и женщины, которых завораживает мягкий свет, исходящий от витражей. Говорит в рифму или стихами; молчаливый, неразговорчивый.

**Голова.** Голова болит после купания в холодной воде или из-за расстройства желудка; хуже от сладостей или кислого вина, фруктов, жирного, от ходьбы вверх по лестнице. Склонность к простуде, насморку. Тяжесть во лбу,

сопровождаясь головокружением, тошнотой и кровотечением из носа. Зуд головы, сопровождающийся выпадением волос. Головная боль после прекращения насморка.

**Глаза.** Саднение, трещины и мокнутие в углах глаз. Пустулы по краям век, хронический блефарит. Веки красные и воспаленные. Когда смотрит на открытый огонь, возникает кашель. Хроническое воспаление глаз у детей. Светобоязнь (фотофобия).

**Уши.** Звон в ушах и глухота. Мокнувшие высыпания вокруг ушей. Выделения из ушей (оторея). Глухота, как будто на ухе повязка или лежит листок.

**Нос.** *Ноздри покрыты чешуйками*, трещинами и болезненные. Кровотечение из носа после головной боли. Экзема ноздрей. Когда вдыхаемый воздух попадает в нос, возникает ощущение холода.

**Лицо.** Болезненное, желтоватое, изможденное или печальное. Папулы, пустулы и нарывы (фурункулы) на лице. Желтые, покрытые корочками высыпания на щеках и подбородке. Трещины в углах рта. Мелкие, болезненные, медового цвета зернистые высыпания на подбородке.

**Рот.** *ЯЗЫК ПОКРЫТ ТОЛСТЫМ БЕЛЫМ НАЛЕТОМ, КАК БУДТО ИЗВЕСТЬЮ.* Боль в полых, имеющих дупло зубах, она распространяется в голову; усиливается от прикосновения языка; уменьшается при ходьбе на открытом воздухе. Пациент скрежещет зубами, когда спит сидя. Язвенный (афтозный) стоматит. Зубная боль перед менструацией. Папулы (прыжки) вокруг рта. Афты. Кровоточивость десен. Горький привкус во рту. Слюнотечение: слюна соленого вкуса.

**Горло.** Из задних отделов носа выделяется много густой, желтоватой слизи. Грубый голос из-за чрезмерной голосовой нагрузки. Охриплость после купания в холодной воде. Ощущение, что в горле застряло инородное тело, все время хочется сделать глотательное движение и проглотить его.

**Желудок.** Отсутствие аппетита и отвращение к пище. Жажда нет. Желание кислого, маринада. Отрыжка со вкусом съеденной пищи; после еды остается привкус пищи во рту или возникает постоянное срыгивание. Легко возникает *РАССТРОЙСТВО ПИЩЕВАРЕНИЯ*. Рвота усиливается от еды или питья; не сопровождается тошнотой и не приносит облегчения. Желудок болезненный при пальпации (давлении). Метастаз подагры в желудок и кишечник. Сладковатая отрыжка. Вздутие живота после еды. У грудного ребенка после кормления возникает рвота сгустками свернувшегося молока, впоследствии он отказывается от груди (*Aeth.* — наоборот). Аппетит после тяжелой болезни не восстанавливается. Рвота ужасная, сопровождается конвульсиями, ничто не в силах это прекратить. Сильно хочется есть, но нет сил (у маленьких детей). От свинины становится плохо. Кажется, что желудок всегда перегружен.

**Живот.** Понос, чередующийся с запором, особенно у старых людей. Стул кашицеобразный или *водянистый*, вперемешку с комками. Слизистый геморрой сопровождается покалыванием и жжением, постоянным выделением из заднего прохода слизи, которая оставляет на белье желтые пятна. Катаральный проктит. *Ощущение полноты, переполнения в животе.* Кровотечение при твердом стуле, при геморрое. Стул состоит только из слизи. Понос: летом, после кормления грудью.

**Мочевыделительная система.** Рези в уретре во время мочеиспускания. Мочеиспускание частое, обильное, сопровождается жжением и болью в спине. Непроизвольное мочеиспускание при кашле. Отвратительный запах у мочи.

**Мужские половые органы.** Атрофия полового члена и яичек. В области мошонки при наличии высыпаний ощущается жжение («щиплет») и зуд. Сексуальное возбуждение с ощущением неловкости, дискомфорта во всем теле.

**Женские половые органы.** Менструации: отсутствуют (подавлены) после купания в холодной воде; сопровождаются чувствительностью яичников, давлением в области матки, как будто что-то должно выйти из нее во время менструации. Нимфомания из-за прекращения менструаций. Бели водянистые, содержат комки. Тошнота, рвота и понос во время беременности. Болезненные яичники у девушек, томящихся от любви.

**Дыхательные органы.** Кашель усиливается при входе в теплое помещение; сопровождается жжением в груди. Первый приступ кашля всегда самый тяжелый, последующие приступы становятся все слабее и слабее. Кашель усиливается, когда пациент смотрит на огонь (в камин и т.д.). Боль в груди, сопровождающаяся жаром. Пациент недостаточно владеет голосом, голос грубый, низкий, неприятный; лучше от нагрузки — когда говорит. Афония от перегревания. Зуд в грудной клетке. В большом количестве отхаркивается слизь, это истощает пациента.

**Шея и спина.** Когда встает, возникает жестокая боль в пояснице; лучше при ходьбе. Зуд шеи и спины. Тяжесть в копчике.

**Конечности.** Артрит: боли в суставах пальцев на руках. Утолщенные, грубые или расщепленные, растрескавшиеся ногти; ногти медленно растут; неправильной формы; под ногтями отмечается гиперкератоз. Бородавки с ороговением на руках и подошвах. Болезненное воспаление сухожилий в области локтей, сопровождающееся сильным покраснением и сгибанием руки. Блестящая кожа на локтях. Стопы очень чувствительные; подошвы очень чувствительные при ходьбе. Мозоли на подошвах. Кожа на подошвах сухая, сморщенная из-за потливости стоп. Когда пациент пишет, в кистях ощущается слабость, они трясутся; затем

выделяются зловонные кишечные газы. Подергивание мышц. Резкие сокращения мышц на руках. Уродливые, деформированные стопы. Разрастания под ногтями.

**Кожа.** Экзема при нарушении деятельности желудка. Склонность к появлению высыпаний вроде папул, везикул (пузырьков) и пустул. Крапивница: пузырьки белого цвета; с красным венчиком и ужасающим зудом. Высыпания, как при кори. Бородавки с ороговением. Сухая гангрена. Когда пациент согревается в постели, возникает зуд. Мозоли возникают от малейшего давления.

**Сон.** Сонливость и усталость. Сонные, дремлющие старики. Глубокий неосвежающий сон.

**Лихорадка.** Сильный жар от небольшой физической нагрузки (упражнений), особенно на солнце. Жар и жажда после потоотделения. Расстройство желудка во время апиреksии (когда нет повышения температуры тела) при перемежающейся лихорадке.

**Диф. диагноз.** *Sulph.*

**Дополнительно.** *Squil.*

## ANTIMONIUM TARTARICUM

**Общее.** Существует определенное сходство симптомов *Ant-c.* и Антимониум тартарикум, особенно в психической сфере и в пищеварении.

Антимониум тартарикум поражает *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ*, в особенности *бронхов и легких*, вызывая *БОЛЬШОЕ СКОПЛЕНИЕ СЛИЗИ*. При этом выслушиваются грубые *влажные хрипы*; *дыхание* затруднено, а *сердце работает с повышенной нагрузкой*, *кровь недостаточно насыщается кислородом*. Все это приводит к цианозу, снижению запаса жизненных сил. У пациента *НАРАСТАЕТ СЛАБОСТЬ*, он *ПОТЕЕТ*, *СТАНОВИТСЯ СОННЫМ*, *РАССЛАБЛЕННЫМ*, *ВЯЛЫМ*, возникает *АРЕАКТИВНОСТЬ*.

Это средство подходит старым людям и детям; пациентам, страдающим подагрой, и пьяницам, имеющим болезни желудка. Дрожание всего тела, выраженная проstration — упадок сил — и обморочное состояние. Ощущение груза или тяжести во многих частях тела: в голове, в затылке, в копчике, в конечностях. Судорожное подергивание. Пациент беспокоится, хнычет и плачет перед приступом заболевания. Хроническое дрожание головы и кистей, как при дрожательном параличе. Дрожание (как от холода), контрактуры и боль в мышцах. Отеки синовиальных оболочек.

Если не появляются высыпания, возникают судороги. Ребенок постоянно требует, чтобы его носили вертикально на руках, не желает, чтобы к нему прикасались или смотрели на него. Заболевание начинается с поражения пищеварительных органов. Болезненные последствия гнева и неприятностей. Упадок сил умственных и физических. При кормлении грудной младенец выпускает сосок изо рта и плачет так, как будто задыхается. У детей возникают конвульсии, если им уделяют повышенное внимание, навязываются. Последствия вакцинации, если *Thuj.* не действует, а *Sil.* не показана. Ощущение холода в кровеносных сосудах. Бильгарциоз (шистозоматоз). Пациент льнет к человеку, который его сопровождает.

**Хуже.** *ОТ ТЕПЛА:* в теплом помещении, от теплого укутывания, в теплую погоду. *От гнева.* Лежа. Утром. От перегревания. От холода; от сырого холода. После того, как сядет на стул; когда усадят; когда встает со стула. От движения. От кислого. От молока.

**Лучше.** Если *отхаркивается мокрота*. Когда сидит прямо. От движения. От рвоты. От отрыжки. Лежа на правом боку.

**Психика.** Боится оставаться один. Плохое настроение. Уныние. Пугается любого пустяка. Бред с бормотанием. Тупость при пробуждении. *Апатия* либо раздражительность; пациент хочет, чтобы его оставили в покое. Капризничает; хнычет и стонет. Отчаяние: не верит в свое выздоровление. Льнет к своему спутнику, к тем, кто его сопровождает. Сознание угасает, когда пациент закрывает глаза. Меланхолия: жалуется на свои многочисленные страдания.

**Голова.** Ощущение, как будто повязка на лбу. Голова горячая и покрыта потом. Дрожание головы при кашле. Головокружение сопровождается отупением и спутанностью сознания; чередуется с сонливостью. Ощущение комка во лбу. Головокружение при поднимании головы с подушки.

Во время приступа головокружения появляются искры перед глазами. Симптомы со стороны головы уменьшаются на открытом воздухе, от умывания холодной водой и движения. Голова запрокинута.

**Глаза.** Мутные, слезящиеся глаза. Скопление слизи по краям век (при пневмонии). Один глаз закрыт. Пустулы на конъюнктиве. Мерцание; искры перед глазами. Застывший, неподвижный взгляд.

**Нос.** Заостренный. Ноздри расширены, *черные*. Крылья носа раздуваются.

**Лицо.** Болезненное, осунувшееся. *Бледное, синеватое или подергивается* при кашле. Покрыто холодным потом. Непрекращающееся дрожание подбородка и нижней челюсти. Верхняя губа подтянута (кверху). Тревога, отчаяние на лице. Пустулы, оставляющие уродливые красно-синие шрамы.

**Рот.** Слюнотечение, в том числе при беременности. Язык: толстый, белый, как тесто; очень красный или с красными полосами; сухой посредине; сосочки видны сквозь белый налет. Рот остается открытым после зевания. Вкус во рту горький, пресный. Язык вялый, сухой. Отпечатки зубов по краям языка.

**Горло.** При одышке в горле много слизи. Глотать больно или невозможно.

**Желудок.** Страстное желание яблок, фруктов и *кислого* (от которого становится плохо). *ТОШНОТА*: возникает волнами, «накатывает»; сопровождается слабостью и холодным потом. *Отвращение к еде*; тревога или страх, вслед за которыми возникает головная боль, сопровождающаяся зевотой, слезотечением и рвотой. *Сильная рвота* (фонтаном), после которой наступает изнеможение и *сон*. Жестокие позывы на рвоту. Ощущение, как будто желудок опустился, провалился. Рвота сопровождается большими усилиями. Жажда холодной воды: пьет понемногу, но часто. Отрыжка с запахом тухлых яиц. Рвота уменьшается, когда пациент лежит на правом боку. Отвращение к молоку, к любой еде. Отсутствие жажды.

**Живот.** Кажется наполненным камнями. Жестокая колика сопровождается сонливостью, дремотой. *Понос* при болезнях, сопровождающихся кожными сыпями. Стул: содержит слизь, цвета зеленой травы. В паховых областях ощущается боль перед менструацией, как будто холод ползет. Сердцебиение во время стула.

**Мочевыделительная система.** Жжение в уретре во время и после мочеиспускания. Последняя капля — кровавистая, сопровождается болью в мочевом пузыре.

**Мужские половые органы.** Боль в яичках после подавления (обычного лечения) гонореи. Орхит. Бородавки на головке полового члена.

**Женские половые органы.** Бели напоминают разбавленную водой кровь; усиливаются, когда женщина сидит. Эclamптические судороги; уменьшаются после рождения ребенка.

**Дыхательные органы.** *Неравномерное дыхание; брюшное дыхание; ОДЫШКА С УДУШЬЕМ*, возникающая перед кашлем или чередующаяся с ним. Кажется, что листик закрывает трахею. *КАШЕЛЬ ГРУБЫЙ, ВЛАЖНЫЙ, С КЛОКОТАНЬЕМ МОКРОТЫ (ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ)*. *КАЖЕТСЯ, ЧТО ГРУДНАЯ КЛЕТКА НАПОЛНЕНА МОКРОТОЙ, ОДНАКО ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ МОКРОТЫ ОТХАРКИВАЕТСЯ*. После кашля возникает рвота или пациент засыпает; хуже от гнева. Пациент вынужден подняться и сесть в постели, чтобы стало легче дышать или чтобы откашляться. Кашляет и зевает по очереди. Густая мокрота.

**Асфиксия новорожденных:** ребенок не дышит и бледен при рождении. Паралич легких с отеком легких. Кашель и одышка уменьшаются, когда пациент лежит на правом боку, от отрыжки; усиливаются — от теплого питья. Капиллярный бронхит; плевропневмония. Эмфизема. Ощущение, как будто в груди бархат. При кашле ребенок изгибается назад.

**Сердце.** Сильная предсердечная тоска, сопровождающаяся рвотой слизью и желчью. Сердцебиение с неприятным ощущением жара. Угнетение сердечной деятельности — паралич сердца (сердечная недостаточность). Слабый частый пульс. Ощущение холода в кровеносных сосудах. Сердцебиение при жидком стуле.

**Шея и спина.** *Жестокая боль в пояснично-крестцовой области*, малейшая попытка пошевелиться вызывает позыв на рвоту и холодный, липкий пот; хуже от поднятия тяжести. Ощущение, что к концу копчика подвешен тяжелый груз, который постоянно тянет книзу. Кажется, что позвонки трутся друг о друга.

**Конечности.** Дрожание кистей. Кончики пальцев холодные, как лед, или омертвели, онемели, сухие и твердые. Беспокойные руки. Стопы немеют, когда сидит. *Отек голеней; коленного сустава (левого)*. Напряжение в подколенных сухожилиях при ходьбе. Синовит. Опухание суставов. Пациент внезапно скидывает конечности во сне, когда стул жидкий.

**Кожа.** Пустулезные высыпания, оставляющие синевато-красные отметины. Кожа густо усыпана, как будто оспинами. Сикоз области бороды и усов [воспаление волосяных фолликулов с образованием пустул — Н.Л.]. Оспа. Импетиго. Задержка появления высыпаний или их исчезновение. Высыпания синего цвета.

**Сон.** *СИЛЬНАЯ СОНЛИВОСТЬ* возникает при всех болезненных состояниях или от тепла. *Зевота* сопровождает многие болезни. Пациент ощущает удары при засыпании. Громко плачет во сне: глаза неподвижны, тело дрожит. Спит на спине, подложив левую руку под голову.

**Лихорадка.** *ОБИЛЬНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ, ЛИПКИЙ ПОТ*. Тело холодное, дрожит, пациент мерзнет. Ощущение жжения. Жар, исходящий из сердца. Ощущение ползучего холода, перед менструацией.

**Дополнительно.** *Var-c, Ip., Op.*

**Диф. диагноз.** *Aesc, Am-c, Ip., Lob., Op.*

## APIS MELLIFICA

Общее. Хорошо известно, что бывает, когда ужалит пчела: возникает *жжение, жгучая, саднящая, жалящая, колющая, как иглами*, пронзающая боль, а также сильнейший отек. Это ведущие симптомы для назначения препарата Апис. Он действует *НА КЛЕТЧАТКУ*, особенно в области глаз, лица, горла, яичников, вызывая отек кожи и слизистых оболочек. Это средство вызывает воспаление *СЕРОЗНЫХ ОБОЛОЧЕК* сердца, мозга, плевры и т.д. с образованием выпота.

Любая часть тела опухает, становится *ОДУТЛОВАТОЙ*; возникает отек, в области которого кожа *блестящая, розово-красная*. Характерно жжение, как от горячих иголок. Отмечается выраженная слабость, как будто человек занимался тяжелым трудом; пациент вынужден лечь.

*Симптомы возникают быстро. Боли внезапные, заставляют кричать. ВНЕЗАПНЫЙ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ КРИК, ВИЗГ. КРИК при гидроцефалии и менингите. Характерна чрезвычайная чувствительность к прикосновению и общая БОЛЕЗНЕННОСТЬ с ощущением разбитости, как от ушиба; в том числе мозга, ЖИВОТА, яичников, мочевого пузыря. Ощущение сжатия. Ощущение скованности, а также, как будто что-то оторвалось внутри тела. Сильное двигательное беспокойство и суетливость. Дрожание, резкие сокращения мышц и их подергивание. Одна половина тела подергивается, другая вялая, слабая или парализована.*

Невралгия губ, языка, десен. Выраженная прострация, вплоть до обморока. Инфекции. Последствия: горя; испуга; гнева (ярости); ревности; плохих новостей; психического шока; подавления высыпаний. *Правая сторона* поражается сильнее. Симптомы перемещаются справа налево. Онемение. Тромбоз. Лимфангит. Воспаление почек, мочевого пузыря. Отек: век, губ — красный, мясистый, сочный. *ЖЖЕНИЕ* с зудом. Паралич после дифтерии и других тяжелых болезней.

**Хуже.** ОТ ЖАРА: в жарком помещении; в жаркую погоду; от жара открытого огня; от горячих напитков, горячей ванны, от тепла постели. От прикосновения, даже волоса. От давления. После сна. Когда ложится. От подавления высыпаний. В 16 ч.

**Лучше.** ОТ ПРОХЛАДНОГО ВОЗДУХА; от прохладной ванны; если раскроется в постели, обнажится. Если откашлять немного мокроты. От движения. Когда сидит прямо.

**Психика.** Ревность, говорит непристойности. Волнуется из-за пустяков, суетится; ему трудно угодить. Неуклюжий, неловкий — роняет вещи и смеется: либо потому что нервничает, либо по рассеянности. Подозрителен до глупости. Ребяческое, глупое поведение у женщин после родов. Раздражительный, возбудимый. Бесплодная деятельность. Легкомысленный и веселый.

Ребенок постоянно хнычет. Сильная плаксивость, не может не плакать, без всякой причины плачет день и ночь. Маниакальное сексуальное возбуждение у женщин чередуется со ступором (оцепенением). *Безразличие:* пациент говорит, что его ничто не беспокоит. Когда пытается читать или писать, не может сосредоточиться (истеричные девушки в период полового созревания).

Не выносит, когда остается один. Кажется, ничто не приносит ему удовлетворения; все не так, все не на своем месте. Предчувствие смерти. Совершает ненужные поступки — осложняет себе жизнь. Страх: боится, что его отравят.

**Голова.** Ощущение, что мозг очень устал. Головокружение сопровождается чиханием; усиливается лежа или когда пациент закрывает глаза. Внезапная кинжальная боль в голове, или боль, как от удара; сильнее в затылке, иногда возникает *РЕЗКИЙ ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ КРИК*. Головная боль с ощущением онемения, усталости; уменьшается от давления. Поток слез при головной боли. При гидроцефалии *КАТАЕТ ГОЛОВУ ПО ПОДУШКЕ* из стороны в сторону; *зарывается головой* — затылком — в подушку при менингите. Роднички запавшие. Боль в *корнях волос*. Пот на голове затхлый. Не может держать голову при менингите. Голова кажется опухшей. Волосы выпадают; гнездное облысение.

**Глаза.** *Отечные глаза;* веки или конъюнктивы красные, либо отечные, как мешочки с водой, *красные*, с хемозом (воспалительным отеком конъюнктивы). Слезы горячие. Глаза блестящие. Жгучая, жалящая, стреляющая боль в глазах. Стафилома роговицы. Отеки под глазами, как мешочки. Светобоязнь (фотофобия), однако невыносимо прикрыть глаза чем-нибудь. Слепота уменьшается после стула. Косоглазие. Близорукость (миопия). Отек или краснота вокруг глаз. Не может пристально смотреть на какой-то предмет; кроме того, не может читать при электрическом свете. Помутнение роговицы. Ячмени: Апис предупреждает возникновение рецидивов. Язва роговицы с перфорацией.

**Уши.** Наружное ухо красное, воспаленное. При каждом крике подносит руку к задней части уха. Отит при скарлатине.

**Нос.** Опухший, красный и отечный. Нос и его кончик холодные. Нарывы в ноздре, лучше от холода. Насморк с ощущением опухания, отека в носу.

**Лицо.** Выражение лица счастливое; ужас на лице; безучастное. Лицо красное, горячее, опухшее и отечное при пронзающих болях; или *восковая бледность* лица и отечность. Губы синеватые, отечные, в частности, верхняя. Ригидность жевательных мышц — челюсти скованы; язык словно одревеневший. Паралич правой стороны лица, правый глаз закрыт. Желание умыться холодной водой. Ощущение ползания мурашек и покалывание, как иголками, на лице.

**Рот.** *Язык:* красный или с пузырьками на кончике; опухший, с ощущением саднения; как будто обожжен; как будто деревянный; болезненный; с трудом двигается. Пациент *скрежещет зубами*. Рот глянцевого, как будто отполирован. Язык высунут, свисает; или его невозможно высунуть. Внезапно непроизвольно стискивает зубы.

Горло. Зернистое, как будто глянцевое или прозрачное; лучше от холода; горло опухшее снаружи и внутри. Горло багровое. Миндалины опухшие, огненно-красные, в горле во время глотания ощущается жалящая боль; лучше от холодного питья. Ангина. Дифтерия с рано возникающим упадком сил; грязного вида пленки, отек небного язычка. Горло болезненное, при глотании возникает боль; хуже, когда глотает твердую пищу, кислую или горячую.

**Желудок.** При отеках *ЖАЖДЫ НЕТ*. Страстное желание: кислого, молока — от него становится лучше. Ребенок сосет днем, отказывается от еды ночью. Тошнота. *Рвота*. Болезненность под ложечкой при прикосновении. Пациент не ест и не пьет — в течение недель. Отрыжки: со вкусом съеденной пищи; усиливающиеся от питья воды; от текущей воды.

**Живот.** Когда пациент тужится во время стула, живот кажется таким *напряженным*, как будто лопнет. Болезненный живот; при давлении (пальпации), при чихании возникает ощущение, что он ушиблен. Отеки (водянка). Перитонит. Понос: стул водянистый желтый, или оранжево-желтый, или похожий на томатный соус. Стул без запаха или зловонный, непроизвольный; хуже от движения. Задний проход болезненный, опухший; обильное кровотечение из ануса; он открыт (зияет); выпадение заднего прохода. Ощущение электрических разрядов в прямой кишке перед тем, как возникнет позыв на стул. Жжение, боль и чувствительность в эпигастрии. Боли из-под ребер распространяются вверх. Жжение или болезненность под ребрами.

**Мочевыделительная система.** Жжение при мочеиспускании. Дизурия с жалящими болями. Моча: скудная, зловонная, насыщенного цвета; последние капли вызывают жжение и саднение; моча, как молоко, при гидроцефалии. Альбуминурия. Моча очень обильная: пациент выделяет жидкости больше, чем выпивает. Осадок в виде кофейной гущи. Недержание мочи (энурез); хуже ночью, при кашле. Может помочиться только вместе со стулом. Нефрит. Цистит. Задержка мочи у новорожденных. При заболевании простаты отмечается затрудненное, учащенное или медленное мочеиспускание; пациент должен тужиться, чтобы помочиться.

**Мужские половые органы.** Отек (водянка) мошонки. Водянка яичка (гидроцеле) при многокамерных кистах. Болезни предстательной железы.

**Женские половые органы.** Аменорея в пубертатном возрасте. При подавлении менструации в области яичников возникает ощущение онемения или конгестия. Кисты яичников. Отек половых губ. Жжение, жалящие боли в области яичников или матки. Дисменорея сопровождается скудными выделениями в виде вязкой крови или болями в яичниках. Меноррагия в связи с выкидышем. Бели обильные, едкие, зеленые. Жалящие, жгучие боли в молочной железе. Опухоли или изъязвленный рак молочной железы. Выкидыш в первые месяцы беременности. Отеки при беременности в поздние сроки, сопровождающиеся экламптическими судорогами. Мания у женщин из-за сексуальных излишеств или при подавлении менструаций. Боли в яичниках усиливаются во время полового акта. Менструации продолжаются один день или появляются с интервалом в один день. Изъязвление пупка у новорожденных.

**Сердце.** Удары сердца сотрясают все тело. Колотье распространяется из верхушки сердца назад. Сердцебиение вследствие скудной секреции мочи. Пульс твердый, малый, перемежающийся, а также частый, слабый. Недостаточность митрального клапана. Органическое поражение сердца.

**Дыхательные органы.** *Дышит тяжело, задыхается; кажется, что каждый следующий вдох может быть последним.* Гипоксия. Отек гортани. Жгучие, жалящие боли по всей передней стенке груди. Гидроторакс после плеврита. Ощущение разбитости: как будто по грудной клетке били или она ушиблена. При каждом кашлевом толчке возникает ощущение болезненного

удара в голове и в груди. Астма при крапивнице; лучше после отхаркивания небольшого количества мокроты. Гортань втянута. Охриплость. Мокрота сладковатая.

**Шея и спина.** Скованность в задней части шеи. Ревматическая боль в спине. Ощущение жгучего давления в копчике; усиливается, когда пациент садится. Спина усталая, как будто ушиблена. Сосудистый зоб.

**Конечности.** Онемение кистей и кончиков пальцев рук. Ладони горячие. Отек кистей. Паронихий в начальной стадии, сопровождающийся жжением, жалящими, пульсирующими болями. Конечности неподвижные, тяжелые, онемевшие. В стопах — онемение и скованность. Голени и стопы, как будто восковые, бледные, опухшие, отечные. Дрожание кистей и стоп. Кажется, что ногти болтаются, отстают от пальцев. Гемиплегия вследствие тяжелого нервного потрясения, шока. Пошатывается, когда глаза закрыты.

**Кожа.** Розово-красная, чувствительная, болезненная. Кожа шершавая от сыпи; либо возникают пятна, похожие на следы ужаления. Крапивница с крупными пузырями. Кожа сухая; а также горячая, сухость сменяется проливным потом. Отечное опухание кожи. Рожистое воспаление. Скарлатина. Карбункул.

**Сон.** *СИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАСНУТЬ, ПОСПАТЬ*, но не может уснуть из-за нервозности, двигательного беспокойства. Сонливость, дремота при лихорадке. *КРИЧИТ* во сне и внезапно просыпается. Во время сна сбрасывает с себя одеяло ногами. Видит сны, полные забот и тяжелого труда.

**Лихорадка.** Озноб: в том числе от ожидания, предчувствия; сопровождается одышкой, крапивницей, желанием раскрыться, обнажиться; чередуется с жаром. *ЖГУЧИЙ ЖАР*, но при движении возникает чувство холода, зябкость. При лихорадке *нет жажды*. В одной части тела ощущается жар, в другой — холод. Проливной пот на отдельных частях тела. Пот часто проступает и подсыхает. Жажда при ознобе.

**Дополнительно.** *Arn., Ars., Hell., Merc-cy., Nat-m., Puls.*

**Диф. диагноз.** *Ars., Canth., Graph., Iod., Lyc, Puls., Stram., Sulph., Urt-u.*

## **APOCINUM CANNABINUM**

**Общее.** Это средство действует на *МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ*: оно способствует выделению мочи и ликвидирует отеки. Угнетение сердечной деятельности. *Расстройство пищеварения.* Апоцинум полезен для лечения генерализованных отеков при наличии органического заболевания или без него. Опухание всего тела, сопровождающееся скудным выделением мочи и пота. Пациенту кажется: если бы только он мог потеть, то поправился бы. Отеки часто сопровождаются нарушением пищеварения: тошнотой, рвотой и сильной жаждой; эти симптомы могут сопровождаться сонливостью и затруднением дыхания. При острой водянке мозга (гидроцефалии) ребенок лежит в оцепенении (в ступоре), у него отмечаются автоматические движения одной руки и ноги. Левосторонний паралич; один глаз неподвижен, другой вращается. Выраженная слабость.

Отеки, возникающие после кровотечения; после приема хинина. Маточное кровотечение. Скудные выделения. Хуже. *ОТ ХОЛОДА*, в холодную погоду; *от холодного питья*. Когда раскрывается, обнажается. Лежа. После сна. Лучше. От тепла.

**Психика.** Подавлен, нервничает, в замешательстве. Не может думать. Пациент теряет сознание (возникает обморок), когда поднимает голову с подушки.

**Голова.** Тупая боль. Гидроцефалия, сопровождающаяся потерей зрения; выступающим вперед лбом.

**Глаза.** Горячие и красные; ощущение, как будто песок в глазах. Один глаз неподвижен, другой вращается.

**Нос.** Утром заполнен густой желтой слизью; насморк у младенцев (сопят носом). Легко простывает.

**Лицо.** Опухшее, одутловатое; хуже, когда пациент лежит; отек проходит, когда поднимается, садится в постели. Во время поноса лицо бледное, покрыто холодным потом. Сухие губы, сухость во рту.

**Желудок.** Тошнота в сочетании с сонливостью. Жажда, но от воды становится плохо, рвота возникает сразу после питья или еды (при водянке). *Ощущение пустоты под ложечкой, как будто все опустилось вниз* (провалилось, замерло и т.п.), в том числе после обильного мочеиспускания — при сахарном диабете. Уремическая рвота.

**Живот.** Асцит. Понос при водянке: стул желтый, безболезненный; выделяется с шумом, сплошным потоком. Ощущение, что анус раскрыт и стул свободно вытекает.

**Мочевыделительная система.** Задержка мочи при параличе нижних конечностей. Моча обильная или скудная. Ночное недержание мочи в пожилом возрасте (ночной энурез).

**Мужские половые органы.** Отечность полового члена и мошонки. Увеличение предстательной железы.

**Женские половые органы.** Аменорея у юных девушек, сопровождающаяся отеком живота и ног. Маточное кровотечение во время климакса: кровь в виде крупных сгустков, иногда — жидкая. Опухоль яичника. Кашель во время беременности.

**Дыхательные органы.** Дыхание: одышка, дыхание недостаточное, затрудненное. Чувство стеснения в груди. Отрывистый сухой кашель; вздохи. Гидроторакс.

Сердце. Пульс медленный, трепещущий, аритмичный или перемежающийся. Недостаточность митрального и трехстворчатого клапана.

**Кожа.** Шершавая, сухая. Не потеет.

**Сон.** Сонливость. Сильное двигательное беспокойство, спит мало.

**Диф. диагноз.** *Chin-ar.*, *Nux-v.*

## **ARALIA RACEMOSA**

**Общее.** Аралия действует на дыхательные органы. Она применяется для лечения астматического состояния, сопровождающегося кашлем; ухудшение наступает, когда пациент ложится. Пациент слабый, вялый и истощенный. Заболевания желчевыводящих путей. Выделения едкие.

**Хуже.** После кратковременного сна. От сквозняков. В 23 ч (кашель).

**Лучше.** Лежа, когда голова лежит на высокой подушке. Когда пациент поднимается, садится в постели.

**Психика.** Страх болезни легких; пациент никак не может от него избавиться.

**Нос.** Чихание: хуже от малейшего сквозняка; сопровождается обильными, водянистыми, разъедающими кожу выделениями из носа. Сенная лихорадка (поллиноз), сопровождающаяся частым чиханием.

**Рот.** Афты. Ощущение, как будто в горле — инородное тело. Тошнота ощущается в горле.

**Живот.** Боль из области печени распространяется в правую лопатку.

Дыхательные органы. Одышка или жестокий кашель, возникающие после первого сна; уменьшаются после отхаркивания небольшого количества мокроты. Саднение, чувство жжения за грудиной. Свистящее дыхание. Солёная мокрота; ощущение тепла во рту.

**Дополнительно.** *Lob.*

## **ARANEA DIADEMA**

**Общее.** Лекарство из этого паучьего яда подходит пациентам, страдающим малярийной интоксикацией. Холод пробирает до костей, пациент никак не может согреться. Отмечается ненормально повышенная

чувствительность к сырости и холоду. Не может жить вблизи пресноводных водоемов, рек, озер и т.д. или во влажных прохладных местах. Яд этого паука поражает нервы, вызывая невралгию; эта боль жестокая, внезапная, появляется в один и тот же час ежедневно, через день, каждую неделю, каждый месяц или через другие правильные промежутки времени.

Ощущение, как будто часть тела **УЖАСНО. ДО ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ** или *онемела*; ощущение более выражено при пробуждении или пациент просыпается с подобным чувством. Аранеа — это средство против кровотечений. Оно также показано при поражении костей, при периостите. Колотые раны. Многие симптомы возникают с правой стороны. Боли напоминают удары электрическим током. Сильное желание лечь. Ощущение, что по всему телу ползают муравьи.

**Хуже.** Ухудшение имеет **ЧЕТКУЮ ПЕРИОДИЧНОСТЬ. От холода. ОТ СЫРОСТИ. От купания в холодной воде.** Во время дождя, в дождливую погоду.

**Лучше.** От курения табака. На открытом воздухе. От давления. Летом.

**Психика.** Нервный. Подавлен; желает смерти.

**Голова.** Головная боль уменьшается от курения, когда пациент выходит на открытый воздух. Головокружение, сопровождающееся мерцанием перед глазами.

**Глаза.** Жар и искры, яркий блеск перед глазами; в том числе перед головной болью.

**Лицо.** Невралгия тройничного нерва. Щеки как будто опухли при зубной боли.

**Рот.** Жестокая боль во всех верхних зубах сразу: возникает, когда пациент уединяется, отдыхает. Горький вкус во рту; лучше от курения.

**Желудок.** Эпигастрий болезнен при давлении (при пальпации). После того, как пациент немного поест, возникают спазмы.

**Живот.** Селезенка увеличена. Колика, возникающая в один и тот же час. Боль уменьшается от растирания.

**Женские половые органы.** Менструации слишком ранние; слишком обильные. Невралгия в поясничной области и брюшной полости, в том числе сопровождающаяся рвотой и зевотой; во время менструации.

**Дыхательные органы.** Кровохарканье, кровь яркая. Боль при межреберной невралгии распространяется в позвоночник.

**Конечности.** Боли в костях. Боль в пяточной кости уменьшается от продолжительного движения. Онемение областей, иннервируемых локтевым нервом. Руки и голени немеют. Кости холодные, как будто сделаны из льда. Язва на пятке. Конечности кажутся тяжелыми.

**Сон.** Беспокойный сон, пациент просыпается с ощущением, что кисти и предплечья опухшие и тяжелые.

**Лихорадка.** Зябкость при болях в длинных костях, сопровождается ощущением, что в животе камень. Потоотделения нет.

**Дополнительно.** *Cedr.*

## ARGENTUM METALLICUM

**Общее.** Серебро поражает *НЕРВЫ*, вызывает судороги и спазмы. Оно действует на суставы и все их составляющие: кости, мышечки, *хрящи* и связки. Секрет слизистых оболочек при этом *ГУСТОЙ, серого цвета, или вязкий*; или как вареный крахмал. Этот секрет *ПРОПИТЫВАЕТ, УПЛОТНЯЕТ* ткани, особенно хрящи, в том числе хрящи век. Кроме того, серьезно поражается *ГОРТАНЬ*.

Болезнь подкрадывается незаметно, развивается медленно, неотступно прогрессируя, вмешиваясь в глубинные процессы. Боли постепенно усиливаются, становятся жестокими, затем внезапно прекращаются; усиливаются от прикосновения. Боли сопровождаются полиурией.

Безболезненное подергивание мышц или ощущение ударов, похожих на электрические разряды. *Потеря контроля над своей ПСИХИКОЙ и телом.* Судороги в мышцах; кажется, что *в конечностях нет силы*. При эпилепсии после приступа возникает буйный бред, пациент беспокоится, подпрыгивает, бьет тех, кто рядом. Боль в суставах (артралгия). Кости болят, чувствительные. Это средство подходит высоким, худым, раздражительным людям. Экзостозы на черепе. Болезненные последствия онанизма и солнечного удара. *Болезненное саднение.* Пациент ложится из-за чувства усталости и слабости. Исхудание. Кариес.

**Хуже.** *От напряжения голоса.* От разговора, пения. *От нервного напряжения.* В полдень. От сырого холода. С 15 до 18 часов. От прикосновения, давления. От езды в экипаже. Лежа на спине. Сидя. При наклоне. Когда входит в теплое помещение. От солнца.

**Лучше.** От движения. От кофе. Укутавшись.

**Психика.** *Неврастения. Забывчивость.* Торопливый, лживый. Разговорчивый или не расположен говорить в обществе; часто меняет тему разговора. Тревога, сочетающаяся с двигательным беспокойством, заставляет пациента переходить с места на место. Время идет медленно. Не допускает никакого сочувствия к друзьям. Совершает всякого рода странные, причудливые и необъяснимые поступки. Тревожится за свое здоровье.



**Голова.** Головокружение: вращательное (системное); усиливается при взгляде на текущую воду или при входе в теплое помещение. Ощущение ползания мурашек и пустоты в голове. Кожа головы очень чувствительна к прикосновению.

**Глаза.** Зуд век и углов глаз. Обильные гнойные выделения. Сужение (стриктура) слезного протока. Веки и хрящи век становятся толстыми.

**Уши.** Зуд мочек. При этом расчесывает ухо до крови.

**Нос.** Жестокий насморк с жидкими выделениями из носа, сопровождающийся частым чиханием и доводящий до изнеможения. Носовое кровотечение, сопровождающееся щекотанием в носу; хуже, когда сморкается.

**Лицо.** Бледное, желтоватое болезненное лицо в сочетании со слабостью. Красное лицо. Внезапный жар и сердцебиение.

**Горло.** Пациент чувствует саднение в горле и болезненность во время выдоха, или когда глотает, или при кашле. Легко отхаркивается вязкая, желеобразная серая слизь; в том числе утром. Ощущение напряжения в горле; усиливается при зевании. Покашливает. Онемение зева.

**Желудок.** Жжение в желудке, поднимающееся в грудную клетку. Тревога и давление под ложечкой. Аппетит повышен или пациент испытывает отвращение к любой пище. Икота от курения. Снится, что тошнит.

**Живот.** Громкое урчание в животе, когда голоден. Болезненная чувствительность живота, хуже при езде в экипаже. Рвота во время стула.

**Мочевыделительная система.** Обильное и частое мочеиспускание. Диабет: Аргентум металликум показан, если имеется опухание лодыжек. Моча как сыворотка, со сладким запахом. Хронический уретрит.

**Мужские половые органы.** Боль, как будто яичко (правое) раздавлено. При ходьбе боль усиливается от прикосновения одежды. Поллюции без сексуального возбуждения, а также без эрекции. Желтовато-зеленые выделения.

**Женские половые органы.** Боль в левом яичнике. Яичники кажутся слишком большими. Выпадение матки, сопровождающееся болью в левом яичнике и пояснице, распространяющейся вперед и вниз. Эрозированная, рыхлая шейка матки. Скирр матки. Климактерическое кровотечение. Бели зловонные, как кровянистая жидкость, вызывающие раздражение, появление ссадин. Кисты яичников, опухоли. Сердцебиение при беременности.

**Дыхательные органы.** Охриплость и афония, хуже от напряжения голоса. Полная потеря голоса у профессиональных певцов. Ощущение болезненности и саднения в гортани. Кашель усиливается от смеха. *Без усилия отхаркивается серая, студенистая или похожая на крахмал слизистая мокрота.* Ощущение, что возле яремной ямки имеется участок саднения. Выраженная слабость в грудной клетке (слева), колотье в груди, которое мешает дыханию, возникает при чтении вслух или при разговоре. Ощущение кипения, бурления возле последнего ребра; невралгические боли по краю нижнего ребра слева.

**Сердце.** Сердце останавливается, потом возникает ощущение трепетания, дрожания, затем — сильное биение; лучше во время вдоха. Сердцебиение с волнением сердца, лучше, когда лежит на левом боку. Сердцебиение во время беременности; уменьшается, если глубоко дышать. Пульс перемежающийся, крайне неритмичный при сердцебиении.

**Шея и спина.** Сильная боль в спине: вынужден ходить согнувшись. Чувство ледяного холода вблизи крестца.

**Конечности.** Кажется, что верхние конечности лишены сил. Голени слабые и дрожат; хуже, когда спускается по лестнице. Когда пациент идет вниз по лестнице, кажется, что икроножные мышцы слишком короткие. Опухание области голеностопных суставов (лодыжек) — при диабете. Контрактура пальцев на руке с частичным параличом предплечья. Писчий спазм. Чувство онемения или скованности в конечностях. Жжение в мозолях.

**Кожа.** Нервный зуд, ощущение ползания мурашек, щекотания в разных местах.

**Сон.** Ощущение, как от ударов электрическим током, при засыпании. В сновидениях пациента тошнит.

**Лихорадка.** Гектическая лихорадка с повышением температуры в полдень.

Потеет только живот и грудь.

**Диф. диагноз.** *Calc, Puls., Sel., Sep., Stann., Zinc.*

## ARGENTUM NITRICUM

**Общее.** Нитрат серебра воздействует на *ПСИХИКУ*, вызывая невротические расстройства. Действуя на *спинномозговые нервы*, он вызывает нарушение координации, пациент теряет равновесие и контроль над своим психическим и физическим состоянием.

Воспаление и изъязвление слизистых оболочек бывает причиной слизисто-гнойных выделений и *БОЛЕЙ, КАК ОТ ЗАНОЗЫ*. Это полезное средство для людей *высохших, сморщенных и преждевременно состарившихся*, у которых отмечается *дрожание* и слабость. Истерические...

вает съеденную пищу. Ощущение, что газы давят сверху, а пищевод спастически сжат. Дрожание и биение (пульсация) в желудке.

**Живот.** *МЕТЕОРИЗМ*, вызывающий вздутие живота и чувство *распирания, как будто живот лопнет*. Громкая, как взрыв, отрыжка, с выходом газов вверх и вниз. *Понос: от переживаний, эмоций; шумный, возникающий*

сразу после еды и питья, после сладкого. У пациента ощущение, что жидкости проходят прямо насквозь. Стул: содержит хлопья, пленки, слизь, он становится зеленым, как рубленый шпинат. Зуд ануса. Ощущение дрожи, пронизывающей кишки и поднимающейся вверх по спине. Понос: нервный, после сладостей; у детей после отнятия от груди. Запор: усиливается при любом недомогании; чередуется с поносом.

**Мочевыделительная система.** Сильная боль, распространяющаяся из почки в мочевой пузырь (нефралгия); она усиливается от прикосновения, движения, от глубокого вдоха. Недержание мочи днем и ночью (энурез). Императивный позыв на мочеиспускание, моча выходит не совсем легко и свободно. Рези в уретре, сопровождающиеся болезненной эрекцией. Раздвоенная струя мочи. Желтые кровянистые выделения при гонорее; в том числе на ранней стадии. Моча интенсивно окрашена, темно-красная; содержит белок. Задержка мочи.

**Мужские половые органы.** Импотенция: эрекция пропадает при попытке совершить половой акт. Коитус болезненный: уретра, как будто вытянута, или болезненная в области наружного отверстия. Язвы, как шанкры, на крайней плоти. Яички сильно втянуты.

**Женские половые органы.** Коитус болезненный, после него возникает кровотечение. Выпадение матки в сочетании с изъязвлением наружного зева или шейки матки. Метроррагия, сопровождающаяся нервной возбудимостью, возникает во время климакса; а также у молодых вдов и бездетных женщин. Яичники болезненные, боли распространяются в крестец и бедра. Менструации нерегулярные, наступают слишком рано, или с большой задержкой, или длятся только один день. Боль в желудке или ощущение спастического сжатия в грудной клетке перед менструацией. Менструации скудные, сопровождаются одышкой. Младенец погибает вскоре после родов. Обильные бели при эрозии шейки матки.

**Дыхательные органы.** Хронический ларингит у певцов, повышение голоса вызывает кашель, на верхних нотах возникает кашель. Саднение, болезненность в верхней части трахеи; усиливаются при кашле. Перехватывает дыхание в толпе, в помещении. Желание сделать глубокий вдох, от которого усиливается одышка. Одышка нервная или вследствие метеоризма; усиливается от боли в желудке. Кашель: усиливается от смеха, при наклоне, от курения, при подъеме по лестнице, перед менструацией. Ощущение, что грудная клетка стянута обручем. Как будто тяжелый камень лежит на середине грудины. У пациента *страстное желание свежего воздуха*. Потеря голоса (афония). Боль в грудной клетке при надевании ботинок. Астма: хуже летом, в холодную погоду или от простуды.

**Сердце.** Сердцебиение: сопровождается тошнотой; усиливается, когда пациент лежит на правом боку, во время езды в автомобиле; уменьшается, если прижать руку. Неприятное ощущение полноты, переполнения в области сердца; лучше на свежем воздухе. Пульс аритмичный, перемежающийся. Тревога, сопровождающаяся сердцебиением и пульсацией во всем теле.

**Шея и спина.** Боль в пояснице: усиливается при вставании со стула; уменьшается стоя или при ходьбе. Уплотнение шейных желез. Пульсация в позвоночнике или ощущение, что позвоночник слабый.

**Конечности.** Дрожание кистей, пациент не может писать. Онемение кончиков пальцев на руках; а также безымянного пальца и мизинца. Пальцы наполовину сжаты в кулак, невозможно их разогнуть. Вялость и усталость в предплечье и голених, сопровождающиеся дрожанием. Слабость, скованность или ощущение скручивания в икроножных мышцах. Паралич в сочетании с психическими и желудочно-кишечными симптомами. Пациент не может идти с закрытыми глазами. Пошатывается, когда ходит или стоит; сильнее, когда за ним никто не наблюдает. Ощущение, как будто груз подвешен к копчику. Судороги, похожие на хорею; ноги подтянуты, руки дергаются вверх и наружу. Невралгии периферических нервов. Отек голених. Ощущение, что голени сделаны из дерева или подбиты ватой. Паралеплегия после истощающих заболеваний.

**Кожа.** Коричневая, натянутая и жесткая. Язвы: воспаленные, красные, глубокие, с твердыми краями. Бородавчатые грануляции. Плотные сидящие корки.

**Сон.** Ужасные сны о змеях; испытывает сексуальное удовлетворение во сне.

**Лихорадка.** Мерзнет, если раскрывается, однако задыхается, душно, когда укрыт. Озноб при тошноте.

**Дополнительно.** Calc, Nat-m., Puls., Sep.

**Диф. диагноз.** Lyc, Puls.

## ARNICA MONTANA

**Общее.** Это средство преимущественно для лечения травм. Травма любого рода — психическая или физическая — и ее последствия, недавние или отдаленные, поддаются лечению этим средством.

Арника действует на *КРОВЬ*, вызывая гниение и септические состояния. *КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ* расслаблены — это приводит к образованию кровоподтеков (экхимозов), черно-синих пятен; сопровождается *СКЛОННОСТЬЮ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ КРОВОТЕЧЕНИЙ*, в том числе из носа и т.д. Арника воздействует на нервы, вызывая невралгии. *Мышцы всего тела ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К ПРИКОСНОВЕНИЮ, БОЛЯТ, КАК ОТ УШИБА*. Части тела болезненные, чувствительны к прикосновению после болей или после кровотечения. Это средство может предотвратить нагноение. Гнойные затеки. Арника обладает рассасывающим действием. Прогрессирующее

исхудание. Сильная прострация; чувство усталости. *ЗЛОВОННЫЕ* выделения, *скверный запах изо рта*, отвратительный привкус во рту, зловонные кишечные газы, стул и т.д. Боль с ощущением, что часть тела раздавлена, размята. *ПОСТЕЛЬ КАЖЕТСЯ ЖЕСТКОЙ* или неровной (вся в кочках). *Непроизвольный стул*. Абсцесс, который никак не созреет. Боли паралитические; внезапные, летучие, перемещающиеся из одного сустава в другой.

Арника лучше всего действует на полнокровных, темноволосых людей с ригидными мышцами, нервных, сангвинического темперамента. На явно ослабленных, анемичных пациентов с мягким телом Арника действует слабо. Сложные переломы. Подергивание в сухожилиях, мышцах. Остеомиелит.

Болезненные последствия испуга, финансового краха, гнева, раскаяния; чрезмерной нагрузки на любой орган; вагинит у женщин и импотенция у мужчин вследствие сексуальных излишеств. *Напряжение* любого рода. Чередование психических и маточных симптомов. Симптомы возникают из-за крайней спешки. Апоплексия (геморрагический инсульт). Тиф, септические лихорадки. Рецидивирующие фурункулы. Хирургические операции. Укусы насекомых. Занозы. Тромбоз.

**Хуже.** *ОТ ТРАВМЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ: падения, удара, ОТ УШИБОВ; шока; сотрясения; после родов; от перенапряжения; от растяжения связок. ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ*<sup>1</sup>. После сна. От движения. В пожилом возрасте, у стариков. От алкоголя. От сырого холода. От угарного газа. Лежа на левом боку.

**Лучше.** Лежа, в том числе с низко опущенной головой, вытянувшись.

**Психика.** *СТРАХ*: пациент боится, что его *ударят* или *прикоснутся* к нему; или приблизятся; страх болезни; внезапной смерти; ночью страх сопровождается неприятным ощущением в области сердца; страх открытого пространства; страх при пробуждении; страх толпы, общественных мест.

Пациент мрачный, раскисает. Что касается психики, то характерны полный упадок сил и апатия, но на физическом уровне отмечается *двигательное беспокойство*, пациент *говорит, что его ничто не беспокоит*. Когда к нему обращаются, отвечает медленно, с усилием. Чувствует себя здоровым в случае серьезной болезни.

Забывчивый пациент; прочитанное быстро вылетает у него из головы. После сильного гнева льет слезы и что-то выкрикивает. Бездна; безразличие. Жестокие приступы тоски — при стенокардии. Алкогольный делирий (белая горячка). Внезапный страх, который заставляет проснуться ночью, особенно после несчастного случая (аварии). Сильное желание царапать — стену, постель, голову и т.д. *Кома*. Бред с бормотанием. Ощущение, что он никчемный человек. Легко пугается, вздрагивает от пустяковой неожиданности. Сидит, как будто в раздумье.

**Голова.** Мозг кажется усталым; в нем ощущается жжение. Головокружение: хроническое; у стариков; сопровождается тошнотой, рвотой и поносом; предметы вращаются вокруг; хуже при ходьбе. Головокружение усиливается при ходьбе, когда пациент сидит прямо, когда закрывает глаза. Головная боль, как от гвоздя. Голова горячая, а тело холодное. Холодный участок на лбу, горячие участки — на темени. Менингит вследствие травмы головы. Запрокидывает голову назад при ходьбе.

**Глаза.** *Налиты кровью*. Кровоизлияние в сетчатку. Светобоязнь. Ощущение усталости и тяжести в глазах после осмотра достопримечательностей, после кино. Кажется, что высокие предметы наклоняются вперед и вот-вот упадут. Правый глаз выпячивается, кажется, что он больше левого.

**Уши.** Тугоухость; шум в ушах. Выделение крови из ушей. Боль, как от ушиба, в области наружного уха. Нарушение слуха из-за травмы головы. Чувствителен к пронзительным, визжащим звукам.

**Нос.** Кровотечение из носа, в том числе после каждого приступа кашля, после умывания лица. Жестокое чихание после поднятия тяжелого груза. Нос болезненный, холодный. Из задних отделов носа по каплям стекает секрет. Воспаление придаточной пазухи. Жжение в носу при тифе (тифоидной лихорадке).

**Лицо.** *Румяное, ярко-красное* лицо, прилив крови к лицу (конгестия), синевато-красное лицо; в том числе при апоплексии (кровоизлиянии в мозг), при лихорадке. Осунувшееся, бледное лицо. Губы горят, опухшие, потрескавшиеся. Нижняя губа дрожит во время еды. Нижняя челюсть отвисает при параличе. Болезненные угри. Щеки одутловатые; красные.

**Рот.** Зловонное дыхание. Сухость во рту сопровождается сильной жаждой. Привкус во рту, как от тухлых яиц — после хирургической операции (тампонады и т. д.). Ярко-красный, отечный зев. Язык сухой, почти черный. Глотать мешает что-то вроде тошноты, как будто пища не может спуститься вниз.

**Желудок.** *Отрыжки, в том числе с привкусом тухлых яиц; после кашля*. Отсутствие аппетита днем, и волчий голод перед полуночью. Тошнота. Рвота темно-красной свернувшейся кровью. Ощущение, как будто желудок наталкивается на позвоночник. Вонючие рвотные массы. Как будто комок, шишка на задней стенке желудка. Отвращение к молоку и мясу. Желание уксуса. Постоянно хочется чего-нибудь выпить, но чего — не знает, так как все напитки неприятны.

**Живот.** Спазмы распространяются из эпигастрия вниз, через кишечник, затем выделяется зловонный стул. Резкие боли, распространяющиеся с одной стороны живота в другую. Стул: кровавый, пенистый, гнойный, едкий; непроизвольный, в том числе во сне. Дизентерия в сочетании с расстройством мочеиспускания (дизурией) — все лето и осенью. Спазмы в прямой кишке возникают, когда пациент стоит. Кишечные газы с запахом тухлых

яиц. Пациент вынужден лечь каждый раз после стула. Выпадение заднего прохода: хуже после ходьбы всего в течение нескольких минут; лучше — помыться, обмыть все тело.

**Мочевыделительная система.** Режущая боль в почках. Задержка мочи в мочевом пузыре после переутомления, после родов. Моча непроизвольно подтекает, выделяется по каплям; при этом постоянно возникают позывы на мочеиспускание. Приходится долго ждать, пока потечет моча. Кажется, что мочевой пузырь полный, болезненный; от давления мочи в нем возникает боль.

**Мужские половые органы.** Импотенция вследствие сексуальных эксцессов или насилия. Фимоз из-за фрикций. Семяизвержение во время нежных прикосновений, ласк. Гематоцеле (кровоизлияние в оболочку яичка).

**Женские половые органы.** Послеродовые схватки усиливаются при кормлении ребенка грудью. Болезненность половых органов после родов. Ощущение, что положение плода поперечное. Не выносит движений плода: они вызывают тошноту и рвоту. Кровотечение после коитуса. Болезненность сосков. Дети задыхаются, когда сердятся. Мастит. Угроза выкидыша из-за падения и т.д. Слабость и прекращение родовой деятельности. Менструации ранние, менструальная кровь горячая, кровотечение обильное. Ощущение болезненности во всем теле при беременности. Опухоли молочной железы, возникшие после травмы. Пуэрперальная лихорадка (послеродовой сепсис, родильная горячка).

**Дыхательные органы.** Охриплость: хуже от напряжения, при простуде, от промокания. Пациент кашляет во сне, не просыпаясь. Кашель, вызываемый зевотой, плачем или причитаниями. Ребенок плачет перед пароксизмом кашля при коклюше. От кашля возникает кровоизлияние под конъюнктиву или носовое кровотечение. Кашель при болезни сердца. Одышка с кровохарканьем. Жестокий спастический кашель и герпетические высыпания на лице. Болезненность костей и хрящей грудной клетки; хуже от движения, дыхания или кашля. Тяжесть в нижних отделах грудной клетки. Колющие боли в груди, от которых перехватывает дыхание; лучше от давления. Охриплость от перенапряжения голоса.

**Сердце.** Удары сердца сотрясают все тело. Внезапная боль, как будто сердце сжато или по нему ударили: боль ощущается в левом локте (стенокардия). Перегрузка сердца из-за усиленного, стремительного бега. Сердечные отеки. Гипертрофия сердца. Ожирение сердца. Сердечные боли; перемещаются слева направо. Пульс слабый и аритмичный. Слабость миокарда. Страх внезапной смерти; сопровождается неприятным ощущением в сердце ночью. Сердцебиение после любого усилия.

**Шея и спина.** Мышцы шеи слабые, голова падает назад или в сторону. Болезненность спины. Шейные позвонки чувствительные.

**Конечности.** Конечности болят, как побитые. Боли в руках уменьшаются, если их свесить вниз. Отсутствие силы в кистях, когда сжимает их, захватывает предмет. Судороги в пальцах рук — писчий спазм. Расширение вен на кистях. В области таза пациент ощущает боль, как от ушиба; она не позволяет ему ходить выпрямившись. Гигрома коленной чашечки. Подагра. Ноги внезапно сгибаются в коленях, когда пациент стоит. Онемение стоп.

**Кожа.** Темная (смуглая), пятнистая. От любого незначительного повреждения возникают черные и синие пятна. *Очень болезненные угри или скопления мелких прыщиков (фурункулов). Симметричные высыпания.* Петехии. Рожистое воспаление. Пролечни. Покалывание и зуд, перемещающиеся из одного места в другое; после расчесывания зуд возникает в другом месте. Карбункул, в том числе на бедре.

**Сон.** *Коматозная сонливость, дремота:* пациент засыпает отвечая на вопрос. Сновидения о смерти, видит во сне изувеченные тела; сны тревожные и страшные, пациент просыпается в ужасе, потом не может уснуть. Сильное утомление способствует возникновению двигательного беспокойства и бессонницы.

**Лихорадка.** При ознобе одна щека горит и красная. Голова или только лицо горячие, тело холодное. Та часть тела, на которой пациент лежит, холодная. Жажда при ознобе. Пациент вынужден раскрыться, но тогда ему становится холодно, он мерзнет. Перемежающаяся, тифоидная (тиф), септическая, травматическая лихорадки.

**Дополнительно.** *Acon., Calc, Nats., Psor., Rhus-t., Sul-ac.*

**Диф. диагност.** *Bell-p., EchL, Hyper., Rhus-t.*

## ARSENICUM ALBUM

**Общее.** Мышьяк действует очень глубоко, поражая каждый орган и ткань. *ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ* пациента характеризуется крайней нервозностью, двигательным беспокойством и тревогой.

*СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ* продуцируют *ЕДКИЕ, ЖИДКИЕ И СКУДНЫЕ* выделения: насморк, слюна, пот и т.д. Характерно *НАРУШЕНИЕ СОСТАВА КРОВИ*, поэтому Арсеникум альбум показан при пернициозной анемии, тяжелых септических состояниях. Кровотечения: кровь черная, зловонная. *Быстро развивается слабость и происходит исхудание.* Создается впечатление, что имеющийся упадок сил не соответствует состоянию организма, болезни пациента.

*Боли, доводящие до безумия; ЖЖЕНИЕ, КАК ОТ ОГНЯ; как от горячих иголок* или проволоки, лучше от жара (от горячего). Боли ощущаются даже во время сна; они будят пациента. Боли вызывают *одышку* или зябкость.

Боли возникают по очереди то в голове, то в желудке или в туловище. Арсеникум альбум воздействует на нервы, приводя к возникновению трудно поддающихся лечению невралгии и полиневрита; лучше от горячего, от жара.

Частые обмороки. Дрожание, резкие сокращения мышц, судороги, хорея. *Внезапные и интенсивные симптомы; ВНЕЗАПНАЯ ВЫРАЖЕННАЯ СЛАБОСТЬ* вследствие незначительной (тривиальной) причины.

*ВЫРАЖЕННОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО*; оно отмечается даже в большой части тела; даже оцепенение (ступор) прерывается приступами двигательного беспокойства, при этом пациент встревожен и жалуется. Небольшой запас жизненных сил. Постепенно снижается масса тела.

*ГНИЛОСТНЫЙ ТРУПНЫЙ ЗАПАХ*. Исхудание. Паралич. Деструктивные процессы: карбункул, гангрена, рак; злокачественные процессы. Водянка: *ОТЕКИ бледные, напоминают мешочки; части тела имеют одутловатый вид*.

Увеличение селезенки при малярии, при кала-азаре. Ребенку становится лучше, когда его берут на руки и быстро ходят туда-сюда. Болезненные последствия употребления в пищу мороженого; фруктов, особенно водянистых, плохого питания; употребления табака, хинина; морских купаний и путешествий, восхождения на горы. А также последствия забот, горя, испуга, отравления птомаином (трупным ядом), расслаивающиеся раны. Это средство может применяться для профилактики желтой лихорадки. Острые и хронические ожоги. Эпилепсия; пациент внезапно теряет сознание, возникают конвульсии, двигательное беспокойство; затем наступает сонливость.

**Хуже.** *ПЕРИОДИЧЕСКИ; В ПОЛНОЧЬ; после полуночи; после 2 ч ночи; каждые 14 дней; ежегодно. ОТ ХОЛОДА; ОТ МОРОЖЕНОГО; ОТ ХОЛОДНОГО ПИТЬЯ; ОТ ХОЛОДНОЙ ПИЩИ; от холодного воздуха, от холода и сырости. ОТ ОВОЩЕЙ.* От водянистых фруктов. *ОТ АЛКОГОЛЯ, ОТ ПЬЯНСТВА.* При инфекционном заболевании. От испорченных продуктов: мяса, пищи. Если высыпания так и не появились или были подавлены. *От хинина.* Когда лежит на большой части тела. *ОТ НАПРЯЖЕНИЯ.* От жевания табака. На берегу моря.

**Лучше.** *ОТ ЮРЯЧЕГО; ОТ ГОРЯЧИХ (сухих) АППЛИКАЦИЙ; ОТ ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ; от горячих напитков.* От теплого укутывания. От движения. Когда прохаживается, ходит туда-сюда. *ЛЕЖА*, с приподнятой головой. Когда сидит выпрямившись. В обществе, компании. От потоотделения. На открытом воздухе.

**Психика.** Пациент *излишне чувствительный*. Тревожный. *Привередливый, разборчивый. Придирчивый. ТОСКА, МУКА; отчаяние: не верит в выздоровление. ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ. МУЧИТЕЛЬНЫЙ СТРАХ СМЕРТИ;* но устал от жизни; это сильнее ощущается ночью. Страх: смерти от голода; из-за финансового краха. *ЖЕСТОКОСТЬ;* самоистязание: пациентка рвет на себе волосы, кусает ногти, царапает, ранит свое собственное тело. *Мысли о самоубийстве; импульс совершить самоубийство, мания, одержимость этой идеей.*

*Двигательное беспокойство*, пациент постоянно переходит с места на место, хочет перебраться из одной постели в другую; дети капризничают, хотят, чтобы их носили на руках; ребенок хочет быть то с матерью, то с отцом, то с няней. Меланхолия. Мерещатся паразиты; пригоршнями сбрасывает с себя насекомых. *Подозрительный.* Боится остаться один, иначе может нанести себе увечье. Страх: боится, что убил кого-то. Скупой, злобный, эгоистичный. Не хватает храбрости. *Раздражительный, иногда чрезвычайно.* Чувствителен к беспорядку.

Алкогольный делирий (белая горячка). Старческое слабоумие. Навязчивые идеи, галлюцинации. Воображает, что в доме полно воров; прыгает и прячется. Торопливый. Видит призраков днем и ночью. Стонет, жалуется и плачет во время менструации. Желания пациентки превосходят ее потребности. Пациент не хочет встречаться со своими знакомыми, считает, что обидел их.

**Голова.** Конгестивная боль, уменьшается от холода. *Беспокойная голова*, постоянно находится в движении. Боль над левым глазом. Гемикрания (мигрень) с ощущением ледяного холода. Головокружение: сопровождается потерей сознания; возникает во время приступов кашля, у астматиков; перед приступом эпилепсии. Кожа головы очень чувствительная; пациент не может причесаться. Волосы рано седеют; выпадение волос. Перхоть. Хронические высыпания — гнойники. Болит по очереди то голова, то желудок, то еще какое-нибудь место на теле; хуже от разговора других людей. Ходит, запрокинув голову назад.

**Глаза.** Ввалившиеся или нависшие. Жжение в глазах, слезы едкие. Отек вокруг глаз. Сильная светобоязнь (фотофобия). Веки зернистые. Спазмы век. Все окрашено в зеленый цвет. Как будто смотрит сквозь белую дымку. Конъюнктивит: инъецированная; желтая. Золотушная (скрофулезная) офтальмия. Веки красные, с язвами. Выпадение ресниц. Веки отечные.

**Уши.** Жидкие, зловонные, выделения, вызывающие раздражение кожи (образуются ссадины). Рев в ушах при боли. Снижение слуха на человеческий голос.

**Нос.** *Жидкие, водянистые выделения, вызывающие раздражение кожи.* При жидких выделениях нос кажется заложенным. Простуда из носа спускается в грудную клетку. *Лихорадка (герпес),* в том числе в носу. *Чихание*, не приносящее облегчения. Пациент *не выносит ни вида, ни запаха пищи.* Сенная лихорадка (поллиноз). Узловатое опухание носа. Нос заострен. Угри на носу. Носовое кровотечение после приступа гнева или после рвоты. Одышка ощущается в носу. *Чихание, сопровождающееся щиплющими, водянистыми выделениями.*

**Лицо.** Лицо: *БЛЕДНОЕ; тревожное, осунувшееся, изможденное или перекошенное, «маска Гиппократы»,* покрыто холодным потом. Выглядит старым; в том числе у детей. Отечность лица. Жгучие, жгущие боли, как от раскаленных докрасна иголок. Губы черные, мертвенно-бледные (синева-серые). Высыпания на губах. Рак губы. Черные точки, угри на лице.

**Рот.** Язык: сухой, чистый и красный; *синева-ый*, белый. Кончик языка красный, с отпечатками зубов. Жгущая боль в языке. Для языка характерно ощущение жжения; дрожание; ощущение скованности, одеревенения; налет на языке белый, желтоватый; он может быть коричневаый, черный. Опухание в области корня языка.

Невралгическая боль в зубах; они кажутся удлинеными; лучше от горячего, хуже ночью. Опухшие, кровоточащие десны, до них больно дотронуться. Скрежетание зубов во время сна. Прикусывает стакан, когда пьет. Сухость во рту. Афты. Зловонный запах изо рта. В рот забрасывается жгущая жидкость — пациент как будто давится ей, проглатывает ее. Привкус: горький у воды; возникает после еды и питья; кислый, скверный, солоноватый, сладкий — утром. Кровянистая слюна. Речь быстрая, шепелявит.

**Горло.** Опухшее, отечное, как будто сжатое, горит, пациент не может глотать. Кажется, что все проглоченное застревает в пищеводе.

**Желудок.** *Не выносит вида, запаха пищи или мысли о ней. СИЛЬНАЯ, НЕУТОЛИМАЯ, ЖГУЧАЯ ЖАЖДА; пациент ПЬЕТ ПОНЕМНОГУ И ЧАСТО СТРАСТНО ЖЕЛАЕТ ЛЕДЯНОЙ ВОДЫ, ОТ КОТОРОЙ ВОЗНИКАЕТ ДИСКОМФОРТ В ЖЕЛУДКЕ И НЕМЕДЛЕННО ВОЗНИКАЕТ РВОТА ВЫПИТОЙ ВОДОЙ.*

Отсутствие аппетита; в том числе сопровождается жаждой; тошнотой. Тошнота, позывы на рвоту и рвота после еды и питья. Тревога, которая ощущается под ложечкой. Жгущая боль в желудке; лучше от сладкого молока. Изжога, пациент подавляет отрыжку (срыгивание) жгущей жидкости. *Рвота и понос.* Икота: возникает часто; а также перед тем, как должна начаться лихорадка; сопровождается отрыжками. Отвращение к сладкому, к сливочному маслу, к жирному; к мясу. Гастрит.

Пациент *ПЬЕТ ПОНЕМНОГУ И ЧАСТО*, ест редко, но много. Тошнота. Желание кислого, бренди (коньяка), кофе, молока. Гастралгия от малейшего количества пищи или питья. Рвота черной массой.

**Живот.** Уплотнение и увеличение селезенки и печени. Жестокие боли в животе, сопровождающиеся тоской, мучением. *Нигде не находит покоя*, катается по полу в отчаянии, считает, что его состояние безнадежно. Эпигастрий болезненный, чувствительный. Стул: как рисовый отвар, зловонный, маленький, произвольный, едкий, *жгущий*, черный, слизистый, жидкий — с полупереваренной пищей; хуже от холодного питья; стул сопровождается сильным изнеможением, прострацией. Язва выше пупка. Дизентерия, холера у детей. Задний проход красный и болезненный, *жжение* в анусе. Острое выпадение заднего прохода. Выпадение геморроидальных узлов сопровождается жжением; лучше от горячих аппликаций. Зуд и экзематозные высыпания в области заднего прохода. Перитонит. Асцит.

**Мочевыделительная система.** Моча: скудная, жгущая, выделяется произвольно. Ощущение слабости в животе после мочеиспускания. Атония мочевого пузыря у старых людей. Уремия. Альбуминурия. Диабет. Задержка мочи, как будто мочевой пузырь парализован после родов. Моча черная, как будто смешана с навозом. Дизурия.

**Мужские половые органы.** Отечная мошонка. Сперматорея во время поноса. Рожистое воспаление мошонки. Сифилитические язвы; в том числе с ощущением жжения, колющей болью.

**Женские половые органы.** Обильные, густые, желтоватые, едкие бели; усиливаются, когда пациентка стоит, когда отходят кишечные газы. Рак матки. Жжение в области яичника. Давящая, колющая боль в яичнике, распространяющаяся в бедро; а в бедре возникает ощущение слабости и онемение, которые усиливаются при движении и сгибании ноги. Менор-рагия с выделением черной крови. Жжение в молочной железе уменьшается от движения. Повышенное сексуальное желание во время менструации. Подавление (задержка) менструаций у слабых, усталых, измученных заботами женщин. Колотье в прямой кишке во время менструации. Дисменорея: лучше от жара, от горячего.

**Дыхательные органы.** *ОДЫШКА:* пациент не может лечь, он вынужден подняться и сесть в постели; одышка усиливается от запахов, от смеха, при подъеме по лестнице, когда пациент поворачивается в постели или когда исчезают высыпания; одышка уменьшается также от кофе или сладкой воды.

Свистящее, хриплое дыхание. Астма: ухудшение возникает при простуде, в середине лета. Кашель: то сухой, то с мокротой попеременно; сухой кашель ночью; уменьшается, когда пациент садится в постели; усиливается от питья. Мокрота скудная, пенная. Сильная одышка; она ощущается в носу; при этом лицо синюшное, покрыто холодным потом; пациент испытывает сильную тревогу.

Афония. Эмфизема. Отек легких. Ощущение жжения или холода в груди. Кашель провоцируется курением. Ощущение, как будто пары серы попали в гортань. Кашель сопровождается отхаркиванием кровянистой мокроты. Кровохарканье; в том числе сопровождающееся жжением повсюду или болью между лопатками; возникает у пьяниц; при подавлении менструаций. Гангрена легких. Пронзающая боль в верхней доле правого легкого. Желтоватые пятна на груди.

**Сердце.** Слабое сердце, дрожание сердца. Сердцебиение сопровождается тоской; усиливается лежа на спине, при подъеме по лестнице, из-за незначительных причин. Сердечные боли распространяются в шею и затылок, сопровождаются тревогой, затруднением дыхания, обмороками. Стенокардия. Более частый пульс утром. Гидроперикард. Сердцебиение с дрожанием и слабостью — после стула. Биение сердца громкое, слышно со стороны. Видимая пульсация.

**Шея и спина.** Скованность в спине, распространяющаяся от копчика к затылку. Ощущение, что холод ползет по спине. Как будто поток теплого воздуха поднимается вдоль позвоночника к затылку. Боль, как от ушиба, в пояснице. Слабость поясничной области.

**Конечности.** Подергиваются, дрожат, сильно вздрагивают во время сна. Тянувшая боль от локтя к подмышке. Усталость в конечностях. Дрожание кистей, конечностей вообще. Покалывание в пальцах рук. Пальцы рук невозможно выпрямить. Ногти: синие, либо цвет ногтей изменен. Язвы на кончиках пальцев рук, сопровождающиеся жгучей болью.

Стопы слабые, усталые и онемевшие, отекающие. Язвы на подошвах и на пальцах ног. Ощущение одеревенения в подошвах. Болезненность, чувствительность подушечек пальцев ног при ходьбе. Дискомфорт, неудобство в нижних конечностях, пациент вынужден постоянно двигать стопами или прохаживаться. Пальцы на ногах загнуты вниз. Периферический неврит. Судороги в икроножных мышцах. Опухание стоп. Конечности тяжелые. Беспокойные стопы. Ишиас; лучше при ходьбе и от горячих аппликаций. Паралегия с атрофией конечностей. Паралич с контрактурой конечностей.

**Кожа.** Сухая, шершавая, покрыта чешуйками, грязная, сморщенная. *Выглядит увядшей.* Экзема. Остроконечные высыпания. Сильное шелушение. Крапивница от употребления в пищу моллюсков. Язвы: хронические, сопровождаются жжением, режущей болью и кровянистыми выделениями. Гангрена. Фагедена (ползучая гангрена). Карбункулы. Псориаз. Кожа, как пергамент. Кожные симптомы чередуются с поражением внутренних органов. Пятна на коже: синие, черные, белые. Папулы, везикулы с сильным жжением.

**Сон.** Прерывистый, тревожный, *беспокойный.* При засыпании пациент ощущает толчки. Сновидения: о смерти, наполненные заботами, горем и страхом. Спит, положив руки выше головы. Зевота сопровождается вытягиванием конечностей. Сонная болезнь (летаргический энцефалит). Разговаривает во сне. Просыпается от болей.

**Лихорадка.** Ощущение *ХОЛОДА* снаружи и жгучего жара внутри тела. *Ощущение холода*, в том числе на отдельных участках тела. Пациент чувствителен к холоду, все же лучше на открытом воздухе. *Ознобы* нерегулярные, потрясающие; страстное желание горячего питья при ознобе; одышка при ознобе. Жар с ощущением, как будто в венах горячая вода; или как будто вены — это полосы огня. Высокая температура, гектическая лихорадка. Потоотделение сопровождается сильной жаждой, одышкой или изнеможением. Пот холодный. В кровеносных сосудах ощущаются волны ледяного холода или сильный, как кипятик, жар. Переменяющаяся лихорадка, желтая лихорадка.

**Дополнительно.** *Alls., Carb-v., Lack., Nats., Phos., PULS., Sulph., Thuj.*

**Диф. диагност.** *Sul-ac, Verat.*

## ARSENICUM IODATUM

**Общее.** Об этом средстве следует думать, когда *выделения, секрет СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК* неизменно *едкий, обильный*, густой, клейкий, желтый, как мед, при хронических заболеваниях; а в острых случаях — жидкий. Выделения вызывают *ЖЖЕНИЕ* в том месте, по которому они стекают.

Симптомы этого препарата очень сходны с симптомами ранней стадии туберкулеза, характеризующейся послеполуденным повышением температуры. При хроническом воспалении легких и бронхиального дерева мокрота бывает зеленовато-желтой, похожей на гной, наблюдается одышка, выраженный упадок сил, исхудание, периодическая (рецидивирующая) лихорадка и потливость, а также склонность к поносу. Арсеникум йодатум — это средство для лечения старческого сердца, миокардита, жирового перерождения сердца. Сердце ослаблено хроническим заболеванием легких. Ощущение *тяжести* возникает во многих частях тела. Опухоли в подмышечной области. Раздражительная слабость; бессилие.

**Хуже.** В сухую холодную *погоду*. В ветреную, туманную погоду. От напряжения. В помещении. От яблок. От курения табака.

**Лучше.** На открытом воздухе.

**Психика.** Не способен учиться: занятия вызывают головную боль.

**Голова.** Головокружение с ощущением дрожания, особенно у пожилых людей. Тупая головная боль с ощущением тяжести поперек лба или затылка. Учебные занятия вызывают головную боль. Боль выше корня носа: у пациентки возникает ощущение, что она станет слабоумной.

**Глаза.** Глазные яблоки кажутся тяжелыми.

**Уши.** Зловонные выделения из ушей. Утолщение барабанной перепонки. Глухота вследствие гипертрофии евстахиевой трубы.

**Нос.** Из носа капает жидкость *горячая, зеленая, едкая, из-за которой краснеет верхняя губа*. Покалывание в носу и постоянное желание чихнуть. Постоянное, не приносящее удовлетворения чихание. *Насморк* сопровождается одышкой. Катар задних отделов носа (ринофарингит). Сенная лихорадка (поллиноз). Грипп. Простуда сопровождается чувством голода.

**Лицо.** *Тупая, ноющая боль в скуловых костях*. Рак губы.

**Горло.** Жгучее саднение, миндалины опухшие. Хронический фолликулярный фарингит. Зоб.

**Желудок.** Сильная жажда: хочется холодной воды, но она сразу же извергается. Рвота возникает через 1 час после еды. Не дающая покоя тошнота.

**Живот.** Понос и дизентерия; стул обжигающий, белый, как стекло. Увеличение мезентериальных желез (лимфоузлов). Болезненная припухлость в правой паховой области, заметная при выпрямлении ноги.

**Женские половые органы.** Узел в молочной железе; хуже от прикосновения. Втянутый сосок. Атрофия молочных желез. Зловонные, кровянистые, желтые, раздражающие бели, сопровождающиеся опуханием половых губ.

**Дыхательные органы.** *Одышка; гипоксия, чувство нехватки воздуха*. Отрывистый, короткий кашель. *Мокрота желто-зеленая, зловонная*. Астма при туберкулезе легких. *Пневмония, которая никак не разрешится*. Жгучий жар в грудной клетке. Туберкулезный плеврит. *Охриплость*. Афония.

**Сердце.** Слабое, возбудимое сердце. Пульс частый, лабильный.

**Шея и спина.** Жгучий жар в поясничной области, как будто одежда горит.

**Конечности.** Боль в плечевой кости усиливается, когда пациент пишет. Одежда кажется холодной; это ощущение уменьшается при ходьбе.

**Кожа.** Сухая, грубая, темная (смуглая). Псориаз. Ихтиоз. Сильное шелушение кожи: отслаиваются крупные чешуйки, обнажая мокнущую поверхность. Угри твердые, как дробины. Венерический бубон. Экзема в области бороды, хуже от умывания.

**Лихорадка.** Рецидивирующая лихорадка с потоотделением. Проливные ночные поты, сопровождающиеся слабостью. Зябкий, не выносит холод.

**Дополнительно.** *Kali-i.*

**Диф. диагноз.** *Kali-bi.*

## ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM

**Общее.** Предполагается, что это средство оказывает благоприятное влияние при лейкодерме (витилиго). Характерно улучшение от пара или от горячей воды.

### ARTEMISIA VULGARIS

**Общее.** Это выдающееся средство для лечения судорожных состояний у маленьких детей и у девушек в период полового созревания. Пациент раздражителен и возбудим перед приступом эпилепсии. Эпилепсия без ауры; возникает после испуга или горя; после удара по голове; сочетается с нарушением менструального цикла. Обильный зловонный пот с чесночным запахом; поллюции сопровождают приступы эпилепсии или возникают после них. Снохождение (сомнамбулизм). Пациент встает ночью и работает, наутро ничего не помнит. Хорея, пациент не может глотать. С правой стороны — судороги, с левой — паралич. Цветной свет вызывает головокружение. *Petit mal*. Человек идет по улице, внезапно останавливается, смотрит в пространство, часто при этом что-то бормочет — всего несколько слов, — потом снова становится нормальным, впоследствии ничего не помнит. Склонность к воровству.

## ARUM TRIPHYLLUM

**Общее.** Это ядовитое растение обладает раздражающим действием. Оно вызывает повышенную нервную возбудимость и физическую раздражимость тела. Особенно сильно поражаются *слизистые оболочки полости рта, ГОРЛА и гортани*. **ВЫДЕЛЕНИЯ ЕДКИЕ**, вызывают **БОЛЕЗНЕННОСТЬ, САДНЕНИЕ И ЖЖЕНИЕ** в больных органах. Саднение сопровождается зудом. Дергающая, стреляющая боль. У детей пропадает аппетит; они не хотят играть, худеют; жалуются на *головные боли*.

**Хуже.** От перенапряжения голоса, от **РАЗГОВОРА**, пения. От холода, сырости, от холодного ветра. От жары. Лежа.

**Психика.** Необычайно своенравный и упрямый. *Нервный. ПОСТОЯННО КОВЫРЯЕТ В НОСУ, или сдирает кожу с губ, с пальцев, пока не возникнет болячка или не потечет кровь*; это особенно свойственно детям.

**Голова.** Зарывается головой в подушку. Ребенок прикладывает ручку к задней части головы и плачет при головной боли. Головная боль усиливается от теплой одежды и от горячего кофе.

**Глаза.** Дрожание верхнего века (слева). Тяжесть в глазах, они сонные.

**Нос.** *Едкие, жидкие выделения*. Нос заложен, пациент вынужден дышать ртом. Заложенность носа, сопровождается зловонными выделениями, чиханием; усиливается ночью.

**Лицо.** Губы сухие, опухшие, потрескавшиеся, в них ощущается жжение; углы рта болезненные.



**Рот.** Ощущение саднения на нёбе. Полость рта болезненная, воспаленная, с ощущением болезненного саднения. Афты. Слюна обильная, едкая. Язык в трещинах и кровоточит. Малиновый язык.

Горло. Саднение, боль, боль при кашле, *когда прочищает горло*, все же пациент *хватается за горло* и у него возникает желание почесать в горле. Опухание шейных желез спереди и сзади.

**Живот.** Понос. Стул, как кукурузная крупа. Жидкий стул вытекает из заднего прохода, вызывает саднение и жжение в области ануса.

**Мочевыделительная система.** Очень скудное выделение мочи. Уремия.

**Дыхательные органы.** Голос хриплый, скрипучий или срывается. Боли в горле, фарингит у ораторов, проповедников. Чувство саднения в груди. Сенная астма.

**Кожа.** Зуд пальцев рук и ног. После сыпи остаются блестящие красные пятна. Пемфигус (пузырчатка). Импетиго контагиозное.

**Дополнительно.** *Nit-ac.*

**Диф. диагноз.** *Ars., Merc-c.*

## ASA FOETIDA

**Общее.** Это средство охватывает истерические и ипохондрические симптомы. Несмотря на то, что пациент *полный, тучный и крепкий на вид, он недопустимо нервный и ЧРЕЗМЕРНО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ*.

В пищеварительном тракте ферула (Аза фетида) вызывает метеоризм и спазмы желудка и пищевода, сопровождающиеся обратной перистальтикой: все поднимается вверх, ничего не опускается вниз.

Аза фетида показана при поражении костей и надкостницы; она оказывает положительный эффект при кариесе костей (остеомиелите) и глубоких язвах. *Приступы тяжелой, бешеной пульсации*. Боли давящие, резкие, колющие, *распространяющиеся наружу*; сочетаются с онемением; боли меняют локализацию и уменьшаются от прикосновения. Тупые, ковыряющие боли в костях. Легко возникает рецидив. Синюш-ность. Зловонные, жидкие, едкие выделения.

Ощущение, словно вбит гвоздь или вставлена пробка. Подергивания и резкие сокращения мышц. Свищи (фистулы) с отвратительными гнойными выделениями. Во всех железах тела ощущается жар и пульсация. Боли дергающие и стреляющие. Неуклюжие дети. Ожирение. Симптомы локализуются с левой стороны. Волнообразные движения, подергивание мышц. Последствия подавления высыпаний и выделений. Невралгия культи после хирургической операции. Нервные расстройства после подавления кожной сыпи.

**Хуже.** *Ночью*. В помещении. В покое. От еды. От подавления симптомов. От применения ртути. От шума. *Сидя*. От теплого укутывания.

**Лучше.** От движения на открытом воздухе. От давления; от прикосновения. Почесать (кожу).

**Психика.** Непостоянный, не может настойчиво добиваться чего-либо. Сначала пациенту хочется одного, потом другого; он слоняется, ходит с места на место. Пациентка преувеличивает свои симптомы. Страстно желает сочувствия. Истерия после внезапного прекращения выделений. Падает в обморок от боли. Пациент падает в обморок при мысли, что принял лекарство. Слабость, обморок: возникает почти без причины; в закрытом помещении; от волнения или от беспокойства; после поллюции. Истерия, сопровождающаяся сильным дискомфортом в области горла или пищевода: пациент хватается за горло, сжимает его. Недоволен собой. Пациентка жалуется на свои болезни, неприятности. Изменчивое настроение; приступы веселья со взрывами смеха.

**Голова.** Боли в области затылка; лучше после стула.

**Глаза.** Пульсирующая боль в глазу и вокруг него; сильнее ночью. Глазничная невралгия: боль уменьшается от давления и в покое. Веки приклеиваются к глазным яблокам. Онемение вокруг глаз; изъязвление роговицы. Сифилитический ирит.

**Уши.** Зловонные гнойные выделения из уха в сочетании с тугоухостью. Боль в сосцевидном отростке с ощущением, что он выталкивается наружу.

**Нос.** Отвратительные выделения из носа. Озена. Кариес костей носа. Напряжение в области костей носа, сопровождающееся онемением.

**Лицо.** Одутловатое, багровое, как будто перегрелся. Маленькие бугорки на щеке. Опухание нижней губы. Онемение костей.

**Рот.** Сальный, прогорклый привкус во рту. Постоянные жевательные движения, изо рта при этом выделяется пенистая слюна; хорея.

**Горло.** *Каждый предмет прижимает к горлу*. Комок в горле: шар поднимается вверх по нему. Спазмы пищевода и желудка.

**Желудок.** *Отрыжка, как взрыв, с запахом чеснока и прогорклым вкусом*. Регургитация (срыгивание) жидкостей. Пульсация под ложечкой; ощущается рукой или ее можно даже видеть. Отвращение к любой пище.

**Живот.** *Метеоризм*; внезапная, продвигающаяся вверх, истерическая спастическая боль при метеоризме, сопровождающаяся пульсацией в животе. Кишечник кажется завязанным в узел, запутанным. Понос: стул

темный, водянистый, с отвратительным запахом. Из кишечника выделяется только слизь. Кишечные газы поднимаются вверх, совсем не идут вниз. Ощущение жара в селезенке в животе.

**Мочевыделительная система.** Моча коричневая и с едким запахом. Спазмы в мочевом пузыре во время и после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Колотье, как от иголки, в половом члене. Обморок после семяизвержения.

**Женские половые органы.** Молочные железы распухают от молока у небеременных женщин. Недостаток молока сочетается с повышенной чувствительностью. Ощущение давления на низ в области половых органов, особенно при езде в экипаже. Менструации слишком ранние, слишком скудные, продолжаются недолго. Бели: обильные, зеленоватые, жидкие; зловонные.

**Дыхательные органы.** Ощущение спастического сжатия в грудной клетке, как будто легкие не могут полностью расправиться. Астматические приступы по меньшей мере один раз в день; хуже от физического напряжения, от коитуса, после сытной еды. Спазм голосовой щели, чередующийся со спазмом (контрактурой) пальцев на руках и ногах.

**Сердце.** Сердцебиение, больше похожее на дрожание. Сердце кажется наполненным, расширенным. Рефлекторные сердечные симптомы нервного происхождения.

**Конечности.** Боль в большеберцовой кости, чувствительность к прикосновению; невыносимая боль; хуже ночью. Пациент не может работать из-за боли в спине. Холодный отек вокруг голеностопных суставов (лодыжек). Конвульсивное дрожание уменьшается, если держать конечность.

**Кожа.** Высыпания в виде пузырьков, наполненных воздухом. Синеватые язвы с очень чувствительными краями. Зуд уменьшается при расчесывании. Старые рубцы становятся багровыми и изъязвляются. Зловонный гной, образующий затеки.

**Дополнительно.** *Caust., PULS.*

**Диф. диагноз.** *Aur., Chin., Lach., Merc, Sumb., Valer.*

## ASARUM EUROPEUM

**Общее.** Азарум вызывает примечательное состояние *ПОВЫШЕННОЙ НЕРВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ: невыносим звук, вызываемый царапаньем по шелку или льну, шуршание бумаги*, более того, даже мысль о возможности провести кончиком пальца или ногтем по поверхности ткани вызывает неприятное содрогание всего тела. Характерно также возникновение *дрожи*, сопровождающейся ощущением холода, от любого волнения. Давление, напряжение и *ощущение сжатия* являются также ведущими симптомами; пациент считает, что все его тело или отдельные его части были сдавлены, сжаты.

Азарум подходит людям, занимающимся литературой или ведущим сидячий образ жизни, которые ёжатся от холода и всегда мерзнут. Секрет *СЛИЗИСТЫХ* оболочек похож на яичный белок. *Ощущение легкости, как будто парит, летает.* Пьяницы.

**Хуже.** *ОТ ШУМА - ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ, РЕЗКИХ ЗВУКОВ.* В холодную сухую погоду. От переживаний, эмоций. От позывов на рвоту (кроме симптомов со стороны головы).

**Лучше.** *От купания в холодной воде;* от умывания лица холодной водой.

При влажной, сырой погоде.

**Психика.** Постепенное исчезновение мыслей. Ощущение тупости в голове; лучше от позывов на рвоту. *Ощущение легкости, похожей на парение*, когда идет по улице, на открытом воздухе.

**Голова.** Сдавливающая головная боль. Напряжена вся кожа на голове; не выносит причесывания. **Глаза.** Слезятся и в них ощущается жжение. Астенопия. Пронзающая боль в глазу; в том числе после хирургической операции.

**Уши.** *Болезненно обостренный слух.* Ощущение заложенности ушей; в том числе при насморке. Ощущение, что кожа вытянулась в области наружного уха (правого).

**Нос.** Насморк с чиханием.

**Лицо.** Ощущение тепла в лице; лучше от умывания холодной водой.

**Рот.** При тошноте во рту скапливается холодная водянистая слюна. Когда курит, табак кажется горьким. Чистый язык. Отвратительный привкус во рту.

**Желудок.** Жестокие позывы на рвоту, от которых усиливаются все симптомы, кроме относящихся к голове. Жестокая рвота, сопровождающаяся поносом и такой же жестокой коликой. Желание алкоголя. Ужасное чувство в эпигастрии: когда просыпается утром; у пьяниц.

**Живот.** Нити желтой, без запаха слизи выделяются из кишечника. Непереваренная пища в стуле. Стул — после еды и питья. Желеобразная или в виде клочков слизь в стуле; слизистый колит.

**Женские половые органы.** Жестокая боль в пояснице при наступлении менструации: пациентка едва может дышать из-за нее; боль усиливается от движения. Бели вязкие, желтые. Угроза выкидыша из-за чрезмерной нервной чувствительности. Менструации слишком ранние и продолжительные, кровь черного цвета.

**Дыхательные органы.** Отрывистый нервный кашель. Астматическое дыхание; хуже от запахов и от холода. Как будто оба легких стянуты проволокой. Колотье в гортани, уменьшается от кашля.

**Конечности.** Ощущение легкости во всех конечностях. Ощущение бульканья в коленной чашечке. Слабость, пошатывается при ходьбе.

**Сон.** Частая зевота; сильная сонливость, дремота.

**Лихорадка.** Зябкость, отдельные части тела холодные, как лед. Ощущение холода не уменьшается от укутывания или в жарком помещении. Пот кислый, легко потеет.

**Дополнительно.** *Caust., Puls., Sil.*

**Диф. диагноз.** *Arg-n., Castm., Ther.*

## ASCLEPIAS TUBEROSA

**Общее.** Это растение усиливает *СЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ КОЖИ*, а также серозных и слизистых оболочек. Гомеопатическое средство Асклепиас показано в случае *обильного потоотделения при плевропневмонии, при поносе* или ревматических заболеваниях, то есть когда имеется повышенное выделение жидкости.

Характерны резкие, колющие, как от иголок, боли, усиливающиеся от движения. Крайняя слабость, пациенту кажется, что он не в состоянии ходить. Онемение всего тела. Грипп, сопровождающийся плевритом. Чувствительность к табаку. Пациент слабый и вялый, как будто долго болел. Не в состоянии работать из-за боли в кишечнике и частого стула.

**Хуже.** От движения. От глубокого дыхания. Лежа. От табака. При вставании. От кашля.

**Психика.** Слабая память.

**Голова.** Головная боль уменьшается от ножной ванны.

**Нос.** Клейкие желтые выделения из носа; насморк у детей (они сопят носом).

**Рот.** Плотный желтый налет на языке. Гнилостный привкус, привкус крови во рту.

**Живот.** *Стул пахнет тухлыми яйцами; или жжет, как огонь.* Катаральная дизентерия, сопровождающаяся ревматическими болями во всем теле. Стул сопровождается ощущением огненного потока, текущего через живот.

**Мужские половые органы.** Вялые половые органы.

**Дыхательные органы.** Сухой кашель, сопровождающийся сжатием горла. Боли в грудной клетке уменьшаются при сгибании тела вперед, усиливаются лежа, при дыхании. Одышка и слабость при ходьбе. Плевроди-ния. Выпот в полости перикарда. Плеврит. Боль ниже левого соска в сочетании с сердцебиением.

**Диф. диагноз.** *Ant-t.*

## ASTACUS FLUVIATILIS - см. CANCER FLUVIATILIS

## ASTERIAS RUBENS

**Общее.** Это средство показано при нарушении кровообращения, которое характеризуется *пульсацией* и полнокровием (конгестией) и возникает в голове, матке, грудной клетке и т.д. Оно показано также *при нервных болезнях*, включая невралгию, хорею, истерию и эпилепсию. Астериас бесспорно воздействует *на женские половые органы*. Приступу эпилепсии предшествуют подергивания во всем теле. Ощущение, что глаза, соски и т.д. тянет назад. Рак; в том числе рак молочной железы. Пациент вялой лимфатической конституции. Хорея: пациент неподвижен, только когда держит руки в карманах. Симптомы с левой стороны.

**Хуже.** От жара (от горячего). При менструации. От возражений, когда пациенту противоречат. В холодную сырую погоду. От кофе. Ночью.

**Психика.** Пациент легко возбуждается, начинает волноваться от любого переживания, особенно если ему возражают; в том числе это наблюдается при эпилепсии. Плачет от малейшего волнения. Галлюцинации: пациент слышит голоса; в том числе издалика; что он среди чужих людей. Чувство надвигающегося несчастья. Боится плохих новостей.

**Голова.** Приливы крови к голове, сопровождающиеся пульсацией (биением). Жар в голове, как будто она окружена горячим воздухом. Удары в мозг.

**Глаза.** Ощущение, что глаза оттянуты назад. Пациент моргает.

**Лицо.** Красное, румяное лицо. Прыщики (папулы) на боковой поверхности носа, на подбородке, вокруг рта. Угри.

**Живот.** Стойкий, тяжелый запор. Понос: водянистый коричневый стул извергается с силой в виде струи.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание повышено.

**Женские половые органы.** Постоянное неистовое сексуальное желание; оно не снижается после коитуса, сопровождается нервным возбуждением, склонностью плакать. Ощущение, как будто левая молочная железа втянута внутрь. Тупая, ноющая невралгическая боль в молочной железе. Узлы и затвердения в молочных

железах; соски втянуты; рак — даже на стадии изъязвления; острые, пронзающие боли; опухание подмышечных (лимфатических) желез: они твердые, в виде узелков. Влагиалище влажное, с ощущением легкости, комфорта. Резкое подергивание или ощущение дискомфорта в матке.

**Конечности.** Онемение кистей и пальцев рук — слева. Боль из молочной железы распространяется по внутренней поверхности руки в кончик мизинца. Походка неустойчивая, мышцы не повинуются воле пациента.

**Кожа.** Угри: точечные высыпания с черной верхушкой на небольшом красном основании. Псориаз. Опоясывающий лишай (*herpes zoster*).

**Диф. диагноз.** *Murx., Sep.*

## AURUM METALLICUM

**Общее.** Золото оказывает глубокое влияние *НА ПСИХИКУ*: вызывает острую депрессию, чувство безнадежности и приводит к утрате жизнелюбия.

*НАРУШАЕТСЯ КРОВООБРАЩЕНИЕ*; кажется, что вся кровь отхлынула от головы и устремилась к нижним конечностям. Вскипание крови, как будто кровь кипит во всех венах. *Летучее волнение крови. Венозное полнокровие (конгестия)*, более выраженное в области головы и груди. *Кариес (остеомиелит) костей*, особенно костей носа; нёба и сосцевидного отростка. В костях возникают ковыряющие и режущие боли. Боли блуждают, заставляя двигаться, наконец, возникают в сердце.

Затвердение, уплотнение органов и опухание желез. Экзостоз, остеомиелит. Артериосклероз; в том числе склероз коронарных артерий; склероз сосудов головного мозга; цирроз печени. Чрезвычайно жестокие проявления болезни. Меркуриальная, сифилитическая дискразия. Хронические заболевания. При ходьбе кажется, что сердце болтается. Ощущение, как будто воздух дует на какую-то часть тела.

Аурум подходит нервным, истеричным женщинам; девушкам в период полового созревания; хилым, чахлым мальчикам; старикам, *страдающим болезнью сердца*; людям подавленным, безжизненным, со слабой памятью; однако чувствительным к боли; боль доводит пациента до отчаяния.

Болезненные последствия горя, испуга, гнева, разочарования в любви, возражений, противоречий, скрытого недовольства. А также продолжительная тревога; необычайно высокая ответственность. Потеря имущества. Чувство безнадежности при болезни сердца; не теряет надежды пациент с заболеванием легких. Раковые язвы. Некроз, омертвление ткани. Отеки.

**Хуже.** *От эмоций, переживаний.* От вызывающих депрессию; выводящих из равновесия чувств. *От нервного напряжения. От холода*, в холодную погоду. *Ночью* — от захода солнца до его восхода. От ртути. От алкоголя. От применения йодида калия. В пасмурную, облачную погоду. Зимой.

**Лучше.** От прохладного воздуха; на открытом воздухе. *От купания в холодной воде.* Когда согревается. От музыки. При ходьбе. При лунном свете.

**Психика.** *Выраженная депрессия с чувством безнадежности; а также с отвращением к жизни.* Говорит о возможности самоубийства. *Суицидальная тоска, мучение.* Раздражается и впадает в неистовство от малейших возражений, или это состояние чередуется с веселостью. *Мрачная меланхолия*; в том числе чередующаяся с раздражительностью и угрюмостью. Чувство обреченности и совершенной бесполезности.

Плачет, молится и упрекает себя из-за болезни сердца. Болтливость. Быстро задает ряд вопросов, не дожидаясь ответа. Пугается при малейшем звуке. Слабая память. Раздосадован. Жестокая истерия; в том числе с безрассудными действиями; пациент мечется и т.д. Обвиняет, критикует себя, недоволен собой.

Изменчивое настроение. Пациентка делает все неправильно; считает, что пренебрегла чем-либо — друзьями, обязанностями. Не хочет разговаривать. Полон ненависти, вздорный. Будущее видит в мрачном свете. Ворчит, жалуется.

**Голова.** Жестокая головная боль, вызывает спутанность сознания. Головная боль у студентов, учащихся, которая сопровождается предсердечной тоской и приливами жара к голове. Голова горячая, как будто переполненная. Экзостоз с ковыряющей болью в нем. Гнойники (фурункулы) на коже головы. Под кожей на голове — шишки, бугры. Облысение вследствие заболевания сифилисом. Как будто воздух проплыл над мозгом.

**Глаза.** Светобоязнь. Гемиопия: не видит верхнюю часть предмета. В области глазниц пациент ощущает болезненность. Глаукома. Зрачки неправильной формы. Желтые, в форме полумесяца тельца плывут вверх и наискосок по полю зрения. Черные пятна, вспышки, искры перед глазами, все кажется синего цвета.

**Уши.** Кариес сосцевидного отростка. Упорные зловонные выделения из уха. Нейрогенная глухота, речь затруднена. Повышенная чувствительность к шуму, но лучше от музыки.

**Нос.** Изъязвленный, болезненный, опухший при кариесе костей. Выделения зловонные, гнойные, кровянистые. Кончик носа красный, шишковатый. Озена. Вздернутый нос.

**Лицо.** Красное (конгестия), синевато-красное лицо. Околоушные железы опухшие, болезненны при прикосновении. Боль в скуловых костях. Мелкая сыпь в области губ, на лице в целом, на лбу.

**Рот.** Отвратительный запах изо рта; в том числе у девушек в период полового созревания. Язык кожистый, жесткий. Привкус молока или сладковатый привкус, отвратительный вкус даже у воды. Бородавки на языке. Кариес зубов. Язвы на нёбе. Десны опухшие, темно-красные, кровоточат.

**Горло.** Колотье в горле при глотании. Кариес *твердого нёба*. Напитки вытекают через нос.

**Желудок.** Жжение в желудке и горячая отрыжка. Желание молока и кофе. Отсутствие аппетита у хилых, истощенных мальчиков. Жажда. Волчий аппетит.

**Живот.** Область печени горячая и болезненная. Гепатит. Желтуха, в том числе при беременности. Сочетание печеночных и сердечных симптомов. Асцит при болезни сердца. Запор уменьшается во время менструации. Стул комковатый, твердый, объемный. Бородавки вокруг заднего прохода. Ворчание и урчание в животе. Паховая грыжа у детей.

**Мочевыделительная система.** Моча мутная, как пахта. Болезненная, паралитическая задержка мочи.

**Мужские половые органы.** Боль в яичках и их опухание — орхит. Атрофия яичек у мальчиков. Водянка яичка, в том числе у детей. Хроническое затвердение яичек. Саркома яичка (саркоцеле). Эпидидимит.

**Женские половые органы.** Бесплодие вследствие сифилиса; а также депрессия у женщин, страдающих бесплодием. Увеличение, выпадение матки. Наружные половые органы (вульва) постоянно мокнут. Вагинизм. Родовые схватки доводят женщину до отчаяния. Неприятные ощущения в матке; хуже, когда тянется руками вверх. Затвердение и изъязвление матки из-за повторных аборт. Бели усиливаются при ходьбе. Аменорея при сильной депрессии, от сильной печали. Менструации задерживаются, скудные.

**Дыхательные органы.** Ощущение раздавливающей тяжести за грудиной; хуже при подъеме по лестнице. Одышка усиливается при смехе, ночью. Сухой, нервный, спастический кашель, присущий женщинам, беспокоит от захода солнца до его восхода. Пациент всегда делает глубокий вдох и не может набрать в грудь достаточно воздуха.

**Сердце.** Ощущение, что сердце остановилось, сразу же вслед за этим возникает тяжелый, двойной, удар. Чувство стеснения в области сердца. *Бешеное сердцебиение*; в том числе в пубертатном возрасте. Гипертрофия сердца. Стенокардия. Заболевания аорты. Видимая пульсация сонных и височных артерий. Пульс частый, слабый, аритмичный. Высокое артериальное давление. При ходьбе возникает ощущение, что сердце болтается. Из-за сердцебиения пациенту приходится остановиться. Ощущение ушиба, болезненности в сердце; сильнее после подавления потоотделения на стопах.

**Шея и спина.** Шейные железы опухшие; как четки. Ощущение, как будто нижний отдел позвоночника выпячивается назад. Болезненная скованность поясничных мышц, невозможно поднять бедро. Туберкулезный кифоз (болезнь Потта).

**Конечности.** Ночные боли в голени. Во время приступа сердцебиения левой рукой держится за область сердца. Слабые колени. Ощущение паралича в голени. Ногти синеют. Боль в обоих коленных суставах, как будто они туго перевязаны. Дрожание стоп. Подошвы горячие, как будто ушибленные, ночью. *Холодный зловонный пот на стопах*.

**Сон.** Беспокойный, сопровождается тревожными, страшными сновидениями. Пациент громко всхлипывает во сне. Сон прерывается возникшим сексуальным возбуждением.

**Кожа.** Липомы. Бородавки. Угри.

**Лихорадка.** Болезненная чувствительность к холоду; пациент дрожит в постели. Все тело холодное и влажное. Потливость в области половых органов.

**Диф. диагноз.** *Merc.*

## AURUM MURIATICUM

**Общее.** Это сикотическое средство, оно способствует возобновлению подавленных выделений. Характерны катары и заболевания желез. Возникают склеротические и экссудативные процессы в нервной системе. Аурум муриатикум — ценное средство для лечения маточного кровотечения во время климакса. Появляются бородавки на разных частях тела; в том числе на языке, на половых органах. Рак языка. Язык жесткий, как кожа. Желание общества; если остается один, думает только о своих болезнях и у него еще больше портится настроение. Гипертрофия всех пальцев на руках. Последствия разочарования, испуга, неприятностей.

**Хуже.** При подъеме по лестнице. От тепла.

**Лучше.** От холода; умывания холодной водой; в холодную погоду.

## AVENA SATIVA

**Общее.** Аvena сатива, или овес обыкновенный, улучшает питание головного мозга и нервной системы. Поэтому это средство полезно при нервном истощении, половом бессилии (импотенции); при слабости после истощающих заболеваний. Нервная дрожь у стариков, дрожательный паралич (болезнь Паркинсона), хорей и эпилепсия. Неспособность сосредоточиться на чем-нибудь одном, особенно вследствие мастурбации. Последствия употребления морфия (морфинизм, наркомания). Бессонница.

**Доза.** Следует давать по 10—30 капель настойки в горячей воде.

## BACILLINUM

**Общее.** Этот нозод готовят из мокроты туберкулезного больного. Бациллинум показан при хронических воспалительных заболеваниях легких (катарах), сопровождающихся бронхореей и одышкой. Склонность часто простывать. Туберкулезный менингит. Экзема век. Дерматомикозы — стригущий лишай, отрубевидный лишай. Шейные железы увеличенные и чувствительные. Этот препарат полезен в качестве промежуточного средства.

**Хуже.** Ночью и рано утром. От холодного воздуха.

**Дополнительно.** *Calc-p., Kali-c, Lach.*

## BADIAGA

**Общее.** [Бадяга — это русское название речной губки — Н.Л.]. Она вызывает появление болезненности кожи и мышц, которая усиливается при движении, а также от трения одежды. Железы опухшие. Парез общий. Бубоны; шанкры. Карцинома молочной железы. Сифилис у младенцев.

**Хуже.** От холода; холодного воздуха. В штормовую погоду, в бурю. От давления. От прикосновения.

**Лучше.** От жара, от горячего; в теплом помещении.

**Психика.** После приятных эмоций, переживаний возникает сердцебиение.

**Голова.** Как будто увеличена и переполнена. Боль во лбу и в висках, распространяющаяся в глазные яблоки. Кожа головы болезненная. Перхоть. Головная боль при воспалении глаз.

**Глаза.** Невралгическая боль в глазных яблоках, распространяющаяся в виски. Подергивание век (слева).

**Уши.** Слабые звуки значительно усиливаются.

**Нос.** Насморк, чихание, водянистые выделения сопровождаются астматическим дыханием и удушливым кашлем.

**Рот.** Горячо во рту. Сильная жажда. Дыхание горячее.

**Горло.** Миндалины воспаленные, опухшие; хуже при глотании твердой пищи.

**Желудок.** Пронзающая боль под ложечкой, распространяющаяся в позвонки и лопатку.

**Мужские половые органы.** Сифилис у младенцев. Шанкры. Бубоны.

**Женские половые органы.** Карцинома молочной железы. Метроррагия: кровотечение усиливается ночью, сопровождается ощущением увеличения головы.

**Дыхательные органы.** Кашель усиливается после полудня, уменьшается в теплом помещении; кашель провоцируется сладостями, конфетами и т.д.; при кашле *МОКРОТА вылетает изо рта* и ноздрей.

**Сердце.** Сердцебиение: дрожание сердца. Пациент чувствует, что удары сердца из груди доходят до шеи; сильнее, когда лежит на правом боку. Дискомфорт; болезненность; боль в области сердца, колотье то здесь, то там — повсюду.

**Кожа.** Болезненная при прикосновении. Веснушки. Трещины. Рубцы, шрамы приподнятые и отличающиеся цветом от окружающей кожи.

**Дополнительно.** *Iod., Merc, Sulph.*

## BAPTISIA TINCTORIA

**Общее.** Дикое американское индиго известно как средство для лечения тифа. Оно поражает *КРОВЬ*, вызывая септические состояния, септическую лихорадку и интоксикацию, как при малярии.

Ощущение *БОЛЕЗНЕННОСТИ, ТЯЖЕСТИ И ТУПЫЕ БОЛИ В МЫШЦАХ* выражены сильно. *БЫСТРО ВОЗНИКАЕТ ПРОСТРАЦИЯ*, общий упадок сил, *постель кажется слишком жесткой* из-за болезненности мышц, однако *пациент чувствует себя слишком слабым, чтобы пошевелиться. Слизистые оболочки становятся темными.* Выделения — стул, кровь при кровотечении и т.д. — темного цвета. Появляются темные пятна на теле. *ЗЛОВОННЫЙ* запах: от тела, изо рта, у выделений, стула, пота, мочи и т.д. *Коричневого цвета:* налет на зубах и во рту, стул, менструальные выделения.

Пролежни. Грипп. Хроническая токсемия кишечного происхождения у детей, сопровождающаяся вонючим стулом и отрыжками. Безжизненное тело, но беспокойный ум. Пациент не чувствует боль. Кажется, что части тела немеют или слишком большие, увеличены. Двигательное беспокойство, все время потирает руки, истерическое беспокойство. В низкой потенции Баптизия стимулирует иммунитет против тифа. Неблагоприятные последствия введения противотифозной сыворотки.

**Хуже.** От *влажного жара*. Во время тумана. В помещении. От давления. При пробуждении. От ходьбы. На открытом воздухе. От холодного ветра. Осенью. В жаркую погоду.

**Психика.** Ощущение *УДВОЕНИЯ*, двойственности. Пациент испытывает отвращение к умственным и физическим усилиям. Считает, что он разбит на части или двойной. *КАЖЕТСЯ, ЧТО ЧАСТИ ТЕЛА ОТДЕЛЕНЫ ДРУГ ОТ ДРУГА* или *разбросаны*. Пациент мечется в постели, пытаясь собрать куски тела. Не верит в выздоровление; убежден в неизбежности смерти. *Отупение и спутанность сознания.* Засыпает, отвечая на вопрос, или не заканчивает мысль, фразу. Бред с блужданием, бормотанием. Абсолютное безразличие. Пациент в замешательстве, сбит с толку. Воображает, что части его тела разговаривают друг с другом.

**Голова.** Кажется слишком большой, тяжелой, онемевшей. Ощущение, как от удара, или сильная боль в затылке. Головокружение, с ощущением слабости, особенно в нижних конечностях и коленях. Кажется, что темя отлетит от головы. Мозг кажется болезненным.

**Глаза.** Веки тяжелые. Кажется, что глаза опухли. Глаза полузакрываются.

**Уши.** Ранняя глухота при тифоподобных состояниях.

**Нос.** Боль в корне носа. Кровотечение из носа, кровь темная. Иллюзия запаха: кажется, что пахнет палеными перьями.

**Лицо.** *ТЕМНОЕ, ОТУПЕВШЕЕ, ОДУРМАНЕННОЕ*, глупое. Ригидность жевательных мышц. Потрескавшиеся, кровоточащие губы.

**Рот.** *Коричневая полоса* посередине языка. Язык кажется обожженным. Язык потрескавшийся, кровоточит; кажется толстым или покрыт густым налетом. Зловоние изо рта. Неразборчивая речь. Язвы во рту. Вкусовые ощущения притуплены; горький привкус во рту. *Темный, красный, распухший* рот. Нижняя челюсть отвисает. Слюна вязкая. Стоматит у грудных младенцев. Опухание миндалин и мягкого нёба.

**Горло.** *Темное, красное, распухшее.* Онемение горла внутри и чувствительность его снаружи. Пациент может глотать только жидкости, от малейшего количества твердой пищи он давится. Сжатие пищевода в месте его перехода в желудок. В горле — язвы с неровными краями. Спазмы пищевода.

**Желудок.** Ощущение пустоты в желудке, как будто он опустился, провалился. Легко возникает рвота. Боль в эпигастрии. Ощущение чего-то твердого в желудке. Внезапные приступы рвоты и поноса при лихорадке; лихорадка, сопровождающаяся желудочными расстройствами. Все симптомы усиливаются от пива.

**Живот.** Правая подвздошная область чувствительная. Болезненность области желчного пузыря при поносе. *Понос:* внезапный, страшно зловонный, с кашицеобразным стулом, безболезненный, стул темный, синевато-серый, как графит, или кровавистый. Дизентерия у стариков; сопровождается болью в конечностях, пояснице и холодом («коченеет от холода»). Безболезненная дизентерия; в том числе с лихорадкой. Кишечная токсемия у детей, сопровождающаяся зловонным стулом и отрыжками. Сужение прямой кишки из-за геморроя.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная, темно-красная, щелочной реакции; вонючая, светло-зеленая. Уремия.

**Мужские половые органы.** Орхит. Давящая боль в яичках, как будто они сжаты, стиснуты.

**Женские половые органы.** Угроза выкидыша из-за нервного потрясения, шока, депрессии, при септической лихорадке. Менструации: слишком ранние, слишком обильные. Лохии едкие, зловонные. Послеродовой сепсис (родильная горячка). Стоматит у кормящих матерей.

**Дыхательные органы.** Дыхание затруднено из-за слабости груди; хуже при пробуждении; лучше стоя. *Не хватает воздуха.* Бронхиальная астма. Легкие кажутся тесными и сжатыми. Пациент боится лечь спать из-за ощущения удушья и кошмарных снов.

**Сердце.** Пульс сначала учащенный, потом медленный и слабый.

**Шея и спина.** Шея усталая, пациент не может найти удобное положение. Боль в крестце, в области тазовых (подвздошных) костей и в голени. Спина болезненная, как будто ушиблена. Пролежни. Кажется, что лежит на доске. Симптомы распространяются из поясничной области.

**Конечности.** Скованность и боль — тупая, а также тянущая — в руках и голени.

**Сон.** *Пациент сонный, тупой и вялый;* в постели сползает вниз, к ножному концу кровати. Кошмары и страшные сны. Лежит, свернувшись калачиком, как собака, на одном боку.

**Кожа.** Синевато-серые пятна разбросаны по всему телу и конечностям.

**Лихорадка.** Гиперпирексия (очень высокая температура). Адинамические лихорадки, тиф; корабельная лихорадка (из-за плохих гигиенических условий). Пот приносит облегчение. Грипп, сопровождающийся желудочными симптомами.

**Диф. диагноз.** *Arn., Gels., Hyos., Lack., Mus-ac, OP., Rhus-t.*

## **BARYTA CARBONICA**

**Общее.** Это средство оказывает выраженное влияние на *РОСТ, РАЗВИТИЕ*. Оно особенно полезно детям и старым людям, которые начинают вести себя, как дети, впадают в детство. У детей отмечается задержка роста; они остаются *недоразвиты* (как карлики) умственно и физически; от них долго нет никакого толку; они поздно начинают брать на себя ответственность и выполнять свою работу.

*Тупой, апатичный;* или впадающий в маразм. Отмечается тенденция к увеличению желез и их уплотнению, особенно миндалин, шейных желез и простаты. Прострация; усталость; постоянное желание лечь, сесть или прислониться к чему-нибудь. Верхняя часть тела кажется скованной и онемевшей. Пациент слишком устал даже для того, чтобы поесть. Это средство показано *при раннем старении*, а также если у пожилых людей наступают дегенеративные изменения в сердце, головном мозгу и сосудистой системе. *Склонность простывать*, каждый раз миндалины увеличиваются. *Параличи.* Симптомы возникают в отдельных частях тела, например: паралич, онемение, жжение. Специфический симптом — *ощущение, как будто проталкивают через узкое место.*

*Сосудистого происхождения размягчение и расширение органов: аневризма сердца, разрыв сосуда и апоплексия (кровоизлияние в мозг, инсульт).*

Болезненные последствия подавления потоотделения на стопах. Кисты. Саркома, сопровождающаяся жжением. Липома. Исхудание у людей, которые хорошо питаются. Сонливость и усталость от малейшего напряжения.

**Хуже.** *В обществе, в компании.* Когда думает о болезненных симптомах. *От сырого холода.* От охлаждения головы и стоп. *Если лежит на больном месте,* на левом боку. От запахов. От солнечного тепла, от печного жара. Когда поднимает руки. От еды.

**Лучше.** От холодной пищи. От теплого укутывания. В одиночестве.

**Психика.** *МЕДЛЕННО СООБРАЖАЕТ, ГЛУПЫЙ; нелепый и отсталый.* Детское и бездумное поведение. Робкий. *Трусливый.* Тяжело вздыхает по любому пустяку. Хнычет. Нарастающая *умственная слабость.* *Затуманенный ум.* *Плохая память.* Пациентка забывает, что ей поручили или слово, которое она собралась произнести. *Нерешительный. Недоверчивый. Стесняется незнакомых людей.*

Считает, что его ноги обрезаны, и он ходит на коленях. Ребенок не хочет играть, а сидит в углу и ничего не делает. Дети не могут запоминать информацию и учиться. Пациент огорчается по пустякам. Считает, что над ним смеются и высмеивают его. Ребенок прячется за мебель и прикрывает ладонями лицо, подглядывая сквозь пальцы. Всегда делает ненужные вещи, усложняет себе жизнь. Отсутствие уверенности в себе. Болтливая мания; в том числе во время менструации у юных девушек. Идиотия.

**Голова.** Головокружение у старых людей; оно сопровождается тошнотой; усиливается при наклоне; а также при поднимании рук. Кажется, что мозг болтается; лучше на прохладном воздухе. Лысина на макушке. Жировики на коже волосистой части головы. Сильное давление на глаза. Сухие высыпания или мокнущие корки на коже головы. Колющая боль в голове, когда пациент стоит на солнце.

**Глаза.** Зрачки быстро расширяются и суживаются. Давление глубоко в глазах; уменьшается при взгляде вниз. Свет слепит глаза. Помутнение роговицы. Веки: зернистые; утолщены. Огненные искры, вспышки перед глазами в темноте.

**Уши.** Треск, хруст в ушах; усиливается при глотании, ходьбе. Железы вокруг уха болезненные и опухшие. Высыпания на мочках ушей. Тугоухость. При чихании звуки отдаются в ушах.

**Нос.** Сухость; хуже, когда сморкается. Насморк с опуханием верхней губы и носа (у детей с большим животом). Ощущение дыма в носу. Выделение густой, желтой слизи из носа; струпья, корки вокруг крыльев носа. Носовое кровотечение.

**Лицо.** Бледное, одутловатое лицо; ощущение, как будто на лице паутина. Верхняя губа опухшая. Губы отвисшие.

**Рот.** Язык слабый, парализован, плотный у стариков, пациент не может говорить. Болезненность в сочетании со жжением или пузырьки на кончике языка или под языком. Зубная боль усиливается перед менструацией. Чувство онемения во рту. Вся ротовая полость покрыта пузырьками: их особенно много на внутренней поверхности щеки. Слюна вытекает изо рта, когда пациент спит. Неприятный запах изо рта, который пациент не замечает. Частые и значительные кровотечения из десен.

**Горло.** *Миндалины воспаляются при каждой простуде,* или ухудшение наступает во время менструаций. *Хронический тонзиллит. Увеличенные миндалины.* Как только пища попадает в пищевод, в нем возникают спазмы, пациент давится и задыхается. Боль в горле; хуже при «пустом» глотательном движении. Может глотать только жидкости. Изжога, кислая отрыжка; в том числе внезапная. Подчелюстная железа опухшая. Сильное жжение в горле. Горло болит от перенапряжения голоса.

**Желудок.** Болезненный участок в желудке. Голоден, но отказывается от пищи. Отвращение к сладкому, к фруктам, особенно к сливам. Внезапное отвращение к пище во время еды. Диспепсия у юношей, занимающихся мастурбацией, или при возникновении поллюций. Боль возникает, когда голоден, постится, а также после еды. Слабое пищеварение у старых людей при подозрении на злокачественную опухоль; становится лучше от холодной пищи.

**Живот.** Твердый и напряженный, чувствительный, раздутый, тогда как тело очень худое. Понос сопровождается болью в пояснице. Когда пациент поворачивается в постели, возникает ощущение, что кишечник падает с одной стороны на другую. Стул твердый, комковатый. При мочеиспускании выпадают геморроидальные узлы. Ощущение ползания мурашек в прямой кишке. Мокнутие в области ануса. Привычная колика у детей, которые не прибавляют в весе и, хотя явно голодны, отказываются от пищи. Мезентериальные железы (лимфоузлы) твердые и увеличенные.

**Мочевыделительная система.** При позыве на мочеиспускание не может удержать мочу. Жжение в уретре при мочеиспускании. Учащенное мочеиспускание. Моча темно-коричневая, скудная.

**Мужские половые органы.** Половые органы вялые. Увеличенная предстательная железа. Уплотнение яичек. Импотенция. Преждевременная эякуляция. Эрекции во время езды. Пациент засыпает во время коитуса. Чувство онемения в половых органах. Болезненные узлы в грудных железах — у тучных старых мужчин.



**Женские половые органы.** Менструации скудные, продолжаются всего один день. Перед менструацией возникают боли в желудке и в пояснице. Ощущение онемения половых органов. Атрофия яичника и молочной железы. Аменорея. Бели непосредственно перед менструацией.

**Дыхательные органы.** Афония из-за паралича. Астма; в том числе у пожилых людей; хуже от сырого, теплого воздуха. В гортани ощущение, как будто туда попал дым. Кажется, что легкие наполнены дымом. Кашель усиливается в присутствии чужих людей; а также, когда пациент ест теплую пищу. Хронический бронхит. Сухой удушливый кашель у стариков; много слизи, но нет сил ее откашлять.

**Сердце.** Сердечные симптомы возникают после подавления потоотделения на стопах или после мастурбации. Кажется, что сердце ушиблено, болезненное. Сердцебиение и неприятное ощущение в области сердца, когда пациент лежит на левом боку. Сердцебиение чувствуется в голове. Аневризма сердца. Пульс медленный, малый. Высокое артериальное давление. Артериосклероз.

**Шея и спина.** Опухание лимфоузлов на задней поверхности шеи и на затылке. Хроническая кривошея. Слабый позвоночник. Пульсация в спине; в том числе после переживаний, от эмоций. Жировые опухоли на шее.

**Конечности.** Онемение пальцев. Конечности кажутся онемевшими. Дрожание стоп, а также кистей при письме. Ночью, во время сна в подошвах ощущается жар или разбитость, как от ушиба. Онемение конечностей от коленей до мошонки; лучше сидя. *Холодный, зловонный пот на стопах.* Боль в дельтовидной мышце, усиливается при поднимании рук. Боль в коленных суставах, когда стоит на коленях.

**Кожа.** Бородавки. Угри. Липома. Кисты. Саркома с ощущением жжения.

**Сон.** Разговаривает во сне (у стариков). Часто просыпается; чувствует жар. Подергивания во сне.

**Лихорадка.** Приливы жара, больше ночью. Потоотделение на отдельных частях тела: на одной кисти, на одной стопе, на одной стороне тела, на лице; пот вонючий, в том числе на стопах; потоотделение усиливается в присутствии чужих людей.

**Дополнительно.** *Ant-t., Dulc, Psor., Sil.*

**Диф. диагноз.** *Kali-p., Lyc, Med., Puls., Sep., Sil., Tub.*

## **ВАРЬТА ИОДАТА**

**Общее.** Это средство применяется в клинике при увеличении и уплотнении желез, особенно миндалин и молочных желез. *Лейкоцитоз.*

**Хуже.** При ходьбе.

**Лучше.** На холодном открытом воздухе — на улице.

## **ВАРЬТА МУРИАТИКА**

**Общее.** Подобно *Var.c.*, это средство бывает полезно при лечении стариков и детей, когда имеется умственная, психическая и физическая незрелость, «карликовость». Барита муриатика показана при дегенеративных изменениях сосудов и при гипертонии, для которой характерно высокое систолическое и сравнительно низкое диастолическое давление, и которая сопровождается поражением мозга и сердца. Это противосудорожное средство. Судорожные припадки возникают периодически, сопровождаются вздрагиванием и чрезвычайным беспокойством, метанием. Ощущение электрических ударов при судорогах.

Всевозможные проявления мании при повышении сексуального желания. Увеличение желез и их уплотнение — миндалины, поджелудочной железы. Рассеянный склероз с поражением головного и спинного мозга. Тело холодное, как лед, при параличе. В мышцах сила отсутствует, а чувствительность безупречная. Дети ходят с открытым ртом и говорят в нос. Выраженная слабость, пациент хочет лечь. Лейкоцитоз. Ребенок все время лежит на животе, чтобы не смотреть на свет. Глупое выражение лица. Тугоухость.

**Психика.** Идиотия. Сексуальная мания.

**Голова.** Головокружение вследствие ишемии мозга, а также шум в ушах. Тяжесть в голове (у стариков).

**Уши.** Шумы в ушах; в том числе, когда жует и глотает, когда чихает. Боль в ухе уменьшается, когда пациент пьет маленькими глотками холодную воду. Зловонные выделения из уха.

**Нос.** Чихает во сне; не просыпаясь.

**Горло.** Нёбный язычок удлинён. Миндалины увеличены. Горло кажется слишком широко раскрытым. Глотание затруднено. Спазм пищевода в кардиальном отделе: боли возникают сразу после еды, сопровождаются тенезмами в эпигастрии.

**Желудок.** Ощущение пустоты в эпигастрии. Ощущение жара, поднимающегося к голове.

**Живот.** Неприятная, мучительная пульсация в животе — аневризма аорты. Уплотнение поджелудочной железы.

**Мочевыделительная система.** Значительно повышено содержание мочевой кислоты.

**Женские половые органы.** Нимфомания. Опухоль или атрофия яичников. Бесплодие.

**Дыхательные органы.** Заболевания бронхов у пожилых людей при расширении сердца; мокрота отхаркивается легко.

**Конечности.** Спазмы в пальцах ног; лучше, если подтянуть конечности. Усталость в голених, как после продолжительной ходьбы, сопровождается скованностью в суставах.

## **BELLADONNA**

**Общее.** Белладонна действует на *нервные центры*, вызывая подергивания, судороги и боль. Ее влияние на *головной мозг* приводит к неистовому волнению и извращенной чувствительности, искажению восприятия. Циркуляция крови в сосудах, в капиллярах усилена, это вызывает конгестию, пульсацию и расширение артерий. Слизистые оболочки становятся сухими. Действие Белладонны *внезапное и яростное*.

ЖГУЧИЙ ЖАР, ЯРКАЯ КРАСНОТА и СУХОСТЬ тканей очень характерны. *ГОРЯЧИЕ* тело или часть тела, выделения и т.д. Покраснение в виде полос.

*СИЛЬНАЯ НЕВРАЛГИЧЕСКАЯ БОЛЬ*, которая появляется и исчезает внезапно. Характерными признаками являются *ОЩУЩЕНИЕ ПОЛНОТЫ, ПЕРЕПОЛНЕНИЯ; КОНГЕСГИЯ*, особенно головы, а также *ОПУХАНИЕ. БОЛИ ПУЛЬСИРУЮЩИЕ; РЕЗКИЕ; РЕЖУЩИЕ; СТРЕЛЯЮЩИЕ* или *рвущие*, словно когтями; боли настолько сильные, что доводят до безумия; они появляются и исчезают в виде повторяющихся приступов. *Выделения горячие и скудные*.

*СПАЗМЫ; ТОЛЧКИ; РЕЗКИЕ МЫШЕЧНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ПОДЕРГИВАНИЕ МЫШЦ. СЖАТИЕ* возникает либо в отдельных частях тела, например, в горле, влагалище и т.д., либо во всем теле.

*Чувствительность к СВЕТУ, ШУМУ; СОТРЯСЕНИЮ.* После эпилептических припадков возникает тошнота и рвота. Судороги начинаются в руке. За спазмами следует продолжительное бессознательное состояние. Тело бросает то вперед, то назад при хорее.

Белладонна действует профилактически при скарлатине. Экзофтальмический зоб при тяжелом тиреотоксикозе. Водобоязнь. Белладонна полезна при воздушной болезни. Наибольшее влияние Белладонна оказывает на умных, полнокровных людей, которые веселы и любят развлечения, когда здоровы, и неистовы, когда они больны. Следовательно, это большое детское средство. Болезненные последствия стрижки волос, намокания головы. А также употребления колбасы, пребывания на солнце, ходьбы на ветру или пребывания на сквозняке. Кровотечения: кровь горячая. Жар в теле; части тела горячие, опухшие и сухие. *Симптомы локализуются с правой стороны*.

**Хуже.** От солнечного тепла; от перегревания. После воздействия *СКВОЗНЯКА на голову*; после стрижки волос; от мытья головы. После того, как простудился. От света; шума; сотрясения тела. *ОТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОТООТДЕЛЕНИЯ. От прикосновения.* В обществе, компании. От давления. *От движения. Если свесить вниз больную часть тела.* После полудня. Лежа, если прилечь. Когда смотрит на блестящие предметы или текущую воду.

**Лучше.** От легкого покрывала. *Прогнувшись назад*, наполовину выпрямившись. Отдохнуть в постели. Стоя. Прислонить голову к чему-нибудь. Согнуть или повернуть пораженную часть тела, конечность.

**Психика.** Чувства обострены. *ДИКИЙ БРЕД. Пациент ужасно возбужден; шумит; вскрикивает.* Быстро говорит. *СИЛЬНОЕ ДВИГАТЕЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО.* Кусается, дерется; мания рвать вещи. Плует в лицо людям. Видит чудовищ, отвратительные, страшные лица. Боится воображаемых вещей. Желание убежать или спрятаться. Дети своенравны, упрямые, плачут при этом. Возбудимый, легко плачет. Вздорный, драчливый. Хочет танцевать, смеяться, петь, насвистывать. Вздрагивает в испуге, когда к нему приближаются. Постоянно жалуется. Страстно желает нюхать табак. Ангел, когда в порядке и здоров, дьявол — когда болеет. Сидит и ломает шпильки, булавки. Психические симптомы уменьшаются от легкой пищи. Пациент живет в своем собственном мире.

**Голова.** *ПУЛЬСИРУЮЩАЯ, СТУЧАЩАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬ*; сильнее в висках, хуже от движения; уменьшается, если распустить волосы; положить руку на голову; запрокинуть голову назад. Ощущение, как будто в мозгу плещется вода. Мозг поднимается и опускается, как волны. Ощущение холода в голове, в середине лба. Головокружение усиливается при наклоне и когда возвращается из наклона в исходное положение. Гидроцефалия: зарывается головой в подушки. Волосы сухие, расщепляются, выпадают. *Мотает головой, катает голову по подушке.* Рвет на себе волосы. Менингит. Солнечный удар. Боли спускаются вниз из головы. *Голова чувствительна к сквознякам и холоду*, а также к мытью волос.

**Глаза.** *ЗРАЧКИ РАСШИРЕНЫ.* Глаза *сверкающие, выпуклые, неподвижные* — пристальный взгляд. *Конъюнктивит красная.* Огненные, в красных тонах, яркие галлюцинации; даже если закрывает глаза. *Приступы слепоты*, после которых пациент видит всё в желтом свете. Видит красные вспышки в поле зрения. *СВЕТОБОЯЗНЬ.* Диплопия. Предмет троится перед глазами. Слепота при лунном свете. Ощущение, что глаза наполовину закрыты. Кажется, что веки болезненные, налиты кровью и опухшие. Экзофтальм. Слезы, как рассол (концентрированный раствор соли). Линии кажутся изогнутыми при чтении.

**Уши.** Из-за боли в ухе возникает бред; ребенок вскрикивает во сне. Средний отит. Аутофония — слышит собственный голос в ухе. Гематома. Шум в ушах.

**Нос.** Красный, опухший. Воображаемые запахи; невыносим запах табака. Кровотечение из носа, при этом лицо румяное.

**Лицо.** Пылает, *КРАСНОЕ; опухшее и горячее; либо поочередно — то бледнеет, то краснеет.* Одностороннее опухание лица. Спастическое искривление рта, сардоническая улыбка. Судорожные движения мышц лица. Лицевая невралгия, сопровождающаяся подергиванием мышц и приливом крови к лицу. Нижняя челюсть, как будто оттянута назад.

**Рот.** *СУХОЙ, ГОРЯЧИЙ.* Язык красный, горячий, опухший. Края языка красные. Малиновый язык. Красная полоса посередине языка, она расширяется у кончика языка. Пациент скрежещет зубами. Язык свисает изо рта (у детей). Передняя часть языка холодная и сухая. Зубная боль уменьшается, когда кусает, при стискивании зубов. Жевательные движения челюстей, как будто пациент что-то жует или сосет. Заикание. Сжатие челюстей (тризм). Горячее дыхание.

**Горло.** *СУХОЕ и ГОРЯЧЕЕ.* Миндалины увеличены. *Тонзиллит,* сильнее с правой стороны. При одышке возникает потребность делать глотательные движения. Горло кажется сжатым. Глотать трудно, пациент *пьет маленькими глотками.* Чтобы проглотить твердую пищу, должен ее запить. Когда глотает, наклоняет голову вперед и поднимает колени. Хватается за горло при эпилепсии.

**Желудок.** Желание лимонада или лимонов, от них пациенту лучше. Отвращение к мясу, кислому, кофе, молоку, пиву. Вырывает все, рвота сопровождается бледностью и слабостью. Сильное желание холодной воды. Боится пить. Спастическая икота, сопровождающаяся потоотделением и судорогами. Боль в желудке: распространяется в плечо и горло, усиливается от давления.

**Живот.** Вздутие живота, он горячий; хуже от прикосновения постельного белья. Режущая боль в эпигастрии; лучше прогнувшись назад. Поперечно-ободочная кишка растянута и выпячивается, как валик, при кишечной колике. Судорога и колика, как будто рукой сжали больное место. Острая боль в области печени: распространяется в плечо и шею; хуже, если пациент лежит на этом боку. Раздирающая, как когтями, боль возле пупка.

Давление на низ, как будто все внутренности вывалются через наружные половые органы. Острое выпадение ануса. Стул: зеленый, дизентерийный или содержит комки, напоминающие мел. Непроизвольный стул. Геморрой сопровождается болью в спине: как будто она ломается. Боль в области селезенки усиливается при чихании, кашле, от прикосновения.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание: после того как ляжет; или когда стоит; или ночью; днем, если дремлет, сонный. Задержка мочи; в том числе при параличе мочевого пузыря; после родов. Огненно-красная моча; частое и обильное мочеиспускание. *Гематурия без патологии органов мочевого выделения.* Ощущение, как будто в мочевом пузыре шевелится червь, желания помочиться при этом нет.

**Мужские половые органы.** Яички твердые, втянуты, воспалены. Потоотделение в области половых органов. Мягкая безболезненная опухоль на головке полового члена.

**Женские половые органы.** Менструации сопровождаются выделением ярко-красной крови со сгустками, слишком ранние, слишком обильные, менструальная кровь *горячая, выделяется сплошным потоком,* зловонная. Метрит. Ригидность шейки матки. Жестокое ощущение давления на низ, к половым органам, как будто все выпадет наружу; оно уменьшается, когда пациентка стоит или сидит прямо; хуже, когда ложится. Мастит: пульсирующая боль, покраснение, *красные полосы расходятся от сосков разные стороны.* Молочная железа тяжелая, твердая и красная. Лохии скудные, горячие, зловонные. Полезно при родах у немолодых женщин. Бели сопровождаются коликой. Схватки в родах появляются и проходят внезапно; или прекращаются совсем.

**Дыхательные органы.** Щекочущий, короткий, сухой кашель; сильнее ночью. Гортань очень болезненная; при кашле кажется, что в ней — инородное тело. Кашель усиливается из-за мелкой пыли в воздухе. Ребенок плачет перед кашлем. Кашель усиливается при зевоте. Высокий, писклявый голос. Лающий кашель или голос. Коклюш: перед приступом кашля возникает боль в желудке; приступ сопровождается кровохарканьем. Дыхание Чейна-Стокса. Пациент стонет при каждом вдохе. Дыхание затрудненное, короткое, учащенное. Астма при жаркой, влажной погоде.

**Сердце.** Биение в сонных и височных артериях. Пульс полный, твердый, напряженный. Бешеное сердцебиение сопровождается затрудненным, тяжелым дыханием. Ощущение кипения, бурления в области сердца.

**Шея и спина.** Скованность в шее и плече (правом). Опухание лимфоузлов на задней поверхности шеи. *Кажется, что спина сломана.* Прострел (люмбаго) сопровождается болью в области крыла подвздошной кости (в боку) и в бедрах.

**Конечности.** Резкие сокращения мышц или спазмы в конечностях. Суставы опухшие, красные, блестящие; краснота в виде расходящихся в разные стороны полос. Тяжесть и ощущение паралича в конечностях. *Конечности холодные.* Пациент произвольно прихрамывает. Послеродовой тромбоз, или белый болевой флебит (phlegmasia alba dolens). Дрожание конечностей. Слабость и нетвердая походка, идет спотыкаясь. Лежит или сидит, скрестив стопы, не может раздвинуть их.

**Кожа.** ЯРКАЯ, КРАСНАЯ, лоснящаяся. Сухая и горячая. Чередование бледности и покраснения кожи. Тяжелый дерматит. Скарлатина. Рожистое воспаление. Гнойники (фурункулы), рецидивирующие каждую весну.

**Сон.** Сонливость, но уснуть не может. Стонет и беспокойно мечется во сне. РЕЗКИЕ СОКРАЩЕНИЯ МЫШЦ ВО ВРЕМЯ СНА. Видит страшные сны: о ссорах, огне, грабителях, убийцах. Возникают страшные видения, когда пациент закрывает глаза. Спит, подложив кисти под голову. Тяжелый сон, при этом кожа горячая.

**Лихорадка.** Высокая температура при сравнительно небольшой интоксикации. Ощущение холода внутри, и исходящий от тела едкий, жгучий, пышущий жар. ГОРЯЧАЯ ГОЛОВА и холодные конечности. Кожа горячая; но попеременно то влажная, то сухая. При лихорадке нет жажды.

**Дополнительно.** Borx., Calc, Hep., Merc, Nat-m.

**Диф. диагноз.** Glon., Hyos., Stram.

## BELLIS PERENNIS

**Общее.** Беллис, или маргаритка, широко известна как средство от ран, поэтому, подобно Агл., она является большим «травматическим» средством. Она особенно полезна при глубоких повреждениях или инфицированных ранах органов брюшной полости и таза; после обширных хирургических операций. Она устраняет последствия аутотравмы, то есть повреждений, нанесенных пациентом себе, например, при мастурбации.

Беллис поражает КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, вызывая венозный застой и варикозное расширение вен. Повреждения нервов, сопровождающиеся сильной болезненностью, которая уменьшается от мытья холодной водой. Мышцы становятся БОЛЕЗНЕННЫМИ, КАК БУДТО УШИБЛЕНЫ, ПОБИТЫ. Боли тяжелые, ноющие, сжимающие, стискивающие или пульсирующие. Беллис рассасывает экссудат при разного вида отеках и при опухании вследствие травмы. Это подходящее средство для лечения старых тружеников и коммивояжеров. Пациенты чувствуют себя усталыми и истощенными, им хочется лечь. Гнойники, фурункулы повсюду.

**Свежие и отдаленные последствия:** удара, падения, несчастного случая (автомобильной катастрофы); травматический невроз после крушения поезда. Болезненные последствия употребления холодных напитков, когда пациент перегрелся, а также последствия промокания или охлаждения вслед за перегреванием. Кровотечения. Гной едкий, разрушающий волосы. Невыносимая боль, доводящая до отчаяния; усиливается от жара (от горячего); уменьшается от холода. Растяжения связок и ушибы. Опухоли из-за травмы.

**Хуже.** ОТ ТРАВМЫ, ПОВРЕЖДЕНИЯ, от растяжения связок. ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ. От купания в холодной воде или от холодного питья. Если замерзнет после того, как перегрелся. От горячей ванны; от тепла постели. Перед бурей. После хирургических операций.

**Лучше.** От продолжительного движения. От местного применения холода.

**Психика.** Импульс двигаться.

**Голова.** Головокружение у пожилых и старых людей (застой в сосудах мозга). Головная боль распространяется из затылка в темя или ближе ко лбу — к передней части черепной крышки. Стреляющая боль.

**Желудок.** Последствия употребления холодных или ледяных напитков, когда пациент перегрет, разгорячен.

**Живот.** Болезненность брюшной стенки. Ощущение полноты в области селезенки, и колюще в этой области. Отвратительный, безболезненный желтый стул при поносе; хуже ночью.

**Женские половые органы.** Прилив крови к молочным железам и матке; матка кажется сжатой, болезненная. Не может ходить во время беременности. Варикозное расширение вен при беременности.

**Спина.** Падение на копчик.

**Конечности.** Боль вдоль передней поверхности бедра. Ощущение, что запястья сжаты, как будто эластичным бинтом.

**Кожа.** Нарывы (фурункулы) повсюду. Кровоподтеки (экхимозы), припухание, чувствительна к прикосновению.

**Сон.** Просыпается слишком рано, в 3 ч ночи, и не может заснуть.

**Диф. диагноз.** Arn.

## BENZENUM

**Общее.** Бензол поражает кровь, вызывая снижение числа эритроцитов и увеличение количества лейкоцитов. Поэтому он может быть полезен при лейкозе.

Пациенты усталые и нервничают. Галлюцинации: в темноте перед ним появляется большая белая рука. Боль направляется снизу вверх. Ощущение падения сквозь кровать и пол. Эпилептиформные припадки, кома и отсутствие чувствительности (анестезия).

**Хуже.** Ночью. С правой стороны.

## BENZINUM NITRICUM

**Общее.** Это средство вызывает обморочную слабость, ощущение проваливания, судороги, подергивания и сопор. Синевя губ, лица и ногтей на руках. Голова оттянута назад и влево при судорогах. Характерным признаком

этого препарата является *вращение глазных яблок вокруг вертикальной оси. Зрачки расширены*. Нистагм. Дыхание медленное, затрудненное, как вздохи. Непроизвольный стул. Паралич всех конечностей. Выделения сильно пахнут горьким миндалем.

## BENZOICUM ACIDUM

**Общее.** Это средство для лечения мочекишечного диатеза. Моча насыщенного цвета, с очень неприятным запахом; признаки подагры. Мочеиспускание обильное и скудное попеременно. От пациента сильно пахнет мочой. *Боли внезапно меняют локализацию, но они преимущественно ощущаются в области сердца, или чередуются с симптомами поражения мочевыделительных органов*. Боли чередуются с сердечными симптомами. Почечная недостаточность. Подагра и астма. Гигрома (киста сухожильного влагалища), воспаление синовиальной сумки большого пальца ноги. Болезнь Меньера. Болезненные подагрические узлы (тофусы). Крайне сильный запах у мочи как сопутствующий симптом при любом заболевании. Симптомы меняются в соответствии с изменениями в моче.

**Хуже.** На открытом воздухе. От холода. При перемене погоды. От движения. Если раскроется, разденется.

**Лучше.** От жара. От обильного мочеиспускания.

**Психика.** Склонен застревать на неприятных впечатлениях и т. д. Пропускает слова при письме. Ребенок своенравный, несговорчивый, хочет, чтобы его носили на руках — не будет лежать в кроватке. Человек содрогается, когда видит калеку.

**Голова.** Голова болит, когда мочи выделяется мало. Головокружение со склонностью падать в сторону.

**Уши.** Шум, как от звучащих в ушах неразборчивых голосов; усиливается при глотании или при ходьбе на открытом воздухе.

**Нос.** Кажется, что пахнет капустой, пылью или чем-то вонючим. Зуд в области носовой перегородки.

**Лицо.** Медного цвета пятна на лице. Непроизвольно прикусывает нижнюю губу во время еды.

**Рот.** Язык: сверху рыхлый, с глубокими трещинами и распространяющимися по поверхности язвами. Симптомы со стороны ротовой полости и гортани уменьшаются от еды. Зубная боль усиливается, когда пациент ложится.

**Горло.** Ощущение комка, опухания и сужения, сжатия гортани; лучше от еды.

**Желудок.** Рвота соленой или горькой массой. Пациент потеет во время еды.

**Живот.** Рези возле пупка; лучше после стула. Колотье в области печени. *Обильный сероватый стул*, как мыльная пена; стул с едким запахом мочи; крайне зловонный; белый.

**Мочевыделительная система.** *МОЧА ГОРЯЧАЯ, ТЕМНО-КОРИЧНЕВАЯ, С СИЛЬНЫМ ЗАПАХОМ; зловонная* — с запахом аммиака; или с запахом лошадиной мочи. Недержание мочи (энурез); зловонная моча вытекает по капле, у стариков. Песок в моче. При энурезе пеленки обычно окрашены в коричневый цвет. Задержка мочи у младенцев.

**Женские половые органы.** Выпадение матки сопровождается выделением зловонной мочи.

**Дыхательные органы.** Тяжелый, сухой кашель; вслед за кашлем отхаркивается зеленая слизь. Астма сочетается с ревматическими симптомами. Не выносит давления одежды на грудную клетку. Кашель усиливается ночью, когда пациент лежит на правом боку.

**Сердце.** Боль меняет локализацию, но наиболее постоянно ощущается в области сердца. Пациент просыпается после полуночи из-за неистовой пульсации или жжения в сердце.

**Спина.** Холод в крестце. Тупая боль в области почки; скованность в пояснице (нижней части спины). Дрожание в области поясницы.

**Конечности.** *Хруст в суставах*; в том числе в колене. Киста сухожильного влагалища (ганглион) на запястье. Воспаление синовиальной сумки большого пальца стопы. Боль в ахилловом сухожилии, в пяточной кости, сочетается с болью в сердце, возникает, когда пациент ступает на ногу.

**Кожа.** Красные пятна. Зуд кожи: расчесывание сопровождается приятным ощущением, но после него остается жжение.

**Лихорадка.** Обильный пот, не приносящий облегчения. Ночные поты. Кисти, стопы, спина, колени холодные, как от холодного ветра. Пот имеет ароматический запах.

**Диф. диагноз.** *Calc.*

## BERBERIS AQUIFOLIUM

**Общее.** Растение поражает кожу: она становится сухой, грубой, шелушится (образуются чешуйки), на ней появляются папулы. Высыпания на коже волосистой части головы, распространяющиеся на лицо и шею. Угри. Псориаз. Сухая экзема. Берберис аквифолиум очищает кожу лица. Его следует применять в тинктуре, в достаточно ощутимых материальных дозах.

## BERBERIS VULGARIS

**Общее.** Берберис вульгарис применяется для лечения заболеваний мочевыделительной системы, когда имеется тенденция к образованию камней и мочеиспускательной диатезу. Он имеет выраженное влияние на печень: способствует оттоку желчи, а поэтому полезен толстым людям, имеющим здоровую печень, но невыносливым. Этот препарат часто бывает полезен при артритах и болезнях печени, сопровождающихся симптомами со стороны мочевыделительной системы, геморроем или нарушением менструальной функции. В области малого таза возникает венозный застой, способствующий появлению геморроя.

Пациент умственно и физически утомлен, не расположен что-либо делать. Преждевременно состарившиеся и изнуренные мужчины и женщины. *Боли быстро меняют свой характер и локализацию.* Симптомы *быстро чередуются*: жажда — и отсутствие жажды, голод — и отсутствие аппетита и т. д.

*Боли ИРРАДИИРУЮТ, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ из одного места;* это *стреляющие боли*, распространяющиеся наружу или по всему телу; *колющие боли*; *жгуче-саднящие*; или это ощущение болезненности: болит, как рана. Онемение; отсутствие чувствительности к сильному жару и холоду. Ощущения *БУЛЬКАНЬЯ* или бурления. *Слизистые оболочки становятся сухими* — рот, влагалище и т.д. Выделения или кожа имеют *грязно-серый цвет*. Чувство холода в костях, глазах, ушах и т.д. Заболевания органов грудной клетки после операции по поводу геморроя, свища и т.д. Бывают видения в сумерках.

**Хуже.** *От движения; от сотрясения тела; когда тяжело ступает.* При вставании со стула. Стоя. От утомления, усталости. При мочеиспускании. В сумерки.

**Психика.** Умственный труд, требующий сосредоточенности, представляется очень тяжелым; малейшая помеха прерывает ход мыслей. Апатия, вялость. Равнодушие. Предметы кажутся вдвое больших размеров, чем на самом деле. Пугающие видения в сумерках, особенно у детей.

**Голова.** Ощущение, что голова увеличивается. Холодные виски. Головокружение сопровождается обмороками. Ощущение, как будто на голову одета тесная шляпа.

**Глаза.** Сухие. Ощущение, как будто под веками — между ними и глазными яблоками — песок. Глаза кажутся холодными, как от прохладного ветра, а когда пациент закрывает глаза, возникает слезотечение. Веки дрожат при чтении. Глаза ввалившиеся; вокруг глаз темно-синие круги.

**Уши.** Ощущение заложенности и давления. Узелки на ушной раковине. Опухоль за ухом. Ощущение холода или бульканья в ушах.

**Нос.** Сухость в носу. Ощущение ползающих мурашек, зуд в ноздрях.

**Лицо.** Грязно-серое, болезненное. Желтушное. Нагнаивающиеся угри. Когда выходит на открытый воздух, возникает ощущение, будто в лицо брызжут холодные капли.

**Рот.** Клейкое, липкое ощущение во рту. Слюна вязкая, пенистая, как вата. Язык кажется ошпаренным; болезненная папула на кончике языка. Десны грязно-серые. Мелкие белые узелки на деснах. Зубы кажутся слишком длинными или слишком большими. Горький привкус во рту.

**Горло.** Когда в горле сухо, отмечается ощущение, что сбоку в горло вставлена пробка.

**Желудок.** Тошнота: в том числе перед завтраком; после обеда. Боли из желудка перемещаются в спину; или наоборот. Тошнота перед завтраком; уменьшается после него.

**Живот.** В эпигастрии чувство, что внутри все оторвано и болтается. *Колика*: боль из желчного пузыря распространяется в желудок; усиливается от давления. Камни желчного пузыря. Стул: грязно-серый, плотный и вызывает жгучую боль; водянистый при желтухе. Свищ заднего прохода: сопровождается зудом; сочетается с заболеванием органов грудной клетки. Колика желчная или почечная, боль не дает дышать.

**Мочевыделительная система.** Боль из почки распространяется вдоль мочеточника или в печень, желудок или в селезенку; препятствует дыханию. *Почечная колика*. Жжение, болезненность или бульканье в области почки. Прозрачные выделения из уретры перед мочеиспусканием. *Моча*: густая, *мутная*, желтая; с красным, мучнистым, *в виде песка* или вязким *осадком*. Ощущение, что после мочеиспускания в мочевом пузыре осталось немного мочи. Жжение в уретре ощущается вне акта мочеиспускания — когда пациент не мочится. Боли в бедрах и в боках (в области крыльев таза) при мочеиспускании. Увеличение простаты сопровождается давлением в промежности. Дизурия.

**Мужские половые органы.** Невралгия яичек и семенного канатика. Яички втянуты. Боль возникает то с одной, то с другой стороны. Половые органы холодные и потеют. Холод и онемение в области крайней плоти и головки полового члена. Половой член твердый, сокращен и согнут кверху.

**Женские половые органы.** Менструации слишком незначительные; в виде водянистой крови; или вместо менструации появляются выделения в виде коричневой или серой слизи. Влагалище чувствительное; режущая боль во время полового акта; вагинизм. Отсутствие удовлетворения во время коитуса. Упадок сил после коитуса. Невралгия яичников и влагалища. Боль то с одной, то с другой стороны. Дисменорея: кровь выглядит как сыворотка серого цвета. Мочевые симптомы во время менструации и при белях.

**Дыхательные органы.** Охриплость; полип гортани. При поднимании рук возникает закупорка дыхательных путей. Короткий сухой кашель с колотьем в груди.

**Сердце.** Колотье в области сердца. Пульс становится очень медленным.

**Шея и спина.** Коллющая боль в шее и спине; усиливается при дыхании. *Боль в спине, сопровождается выраженным упадком сил*; хуже сидя или лежа. Болезненный участок под лопаткой (справа). Раздавляющая, коллющая, парализующая боль в области поясницы. Боль *из области гребней подвздошных костей распространяется вниз, по передней поверхности бедер*; возникает при мочеиспускании. Боль в пояснице после хирургической операции.

**Конечности.** Невралгическая боль под ногтями на пальцах рук, сопровождающаяся опуханием суставов пальцев. Наружная поверхность бедер холодная, язвенная боль в пятках. Боль в области возвышения большого пальца стопы возникает, когда пациент ступает на ногу. Выраженная усталость и слабость в голених («ноги не держат, отказывают») после ходьбы на небольшое расстояние. Колотье между плюсневыми костями, как от гвоздя; хуже, когда стоит.

**Кожа.** Плоские бородавки. Зуд, жжение и жгучая боль; усиливаются от расчесывания; уменьшаются от прикладывания холода. Экзема заднего прохода и кистей. После сыпи остаются коричневые пятна.

**Лихорадка.** Зябкий пациент. Ощущение холода в разных частях тела, как будто их обрызгали холодной водой. Нижняя часть спины, области подвздошных костей, бедер теплые. Всё способно вызвать потоотделение.

**Дополнительно.** Mag-m.

**Диф. диагноз.** Benz-ac, Cос-c, Kali-bi., Lyc, Puls.

## BISMUTHUM

Общее. Висмут, в основном, влияет на *желудок и пищеварительный тракт*, вызывая в них катаральное воспаление. *Боли рвущие, щиплющие, жгучие, стискивающие*. Ощущение тяжести во внутренних органах. Общий упадок сил. Болезни после хирургических операций на брюшной полости.

Хуже. *От еды*; от переедания.

Лучше. От холода; от холодного питья; от холодных аппликаций. Когда прогибается назад. От движения.

**Психика.** Безразличный, вялый. Недоволен; жалуется на свое состояние. Желание быть в обществе, компании; ребенок держится за руку матери. Тоскует, мучается; не может долго сидеть в одном положении, не сидит на месте. Непостоянен, переменчив.

**Голова.** Рези или давление над глазницей (правой), распространяющиеся в затылок; усиливаются от еды; уменьшаются от холода; чередуются с болью в желудке. Головная боль возобновляется зимой.

**Глаза.** Глазные яблоки болят, ноют. Сгустки слизи в обоих углах глаз.

**Нос.** Кровотечение темной кровью. Тяжесть в корне носа.

**Лицо.** Лицо землистое; синие круги вокруг глаз. Боль в скуловых костях, уменьшающаяся, когда пациент бегаёт туда-сюда и держит во рту холодную воду. Лицо бледное и холодное. Боль в лице чередуется с болью в желудке.

**Рот.** Десны опухшие. Зубная боль уменьшается, когда пациент держит холодную воду во рту; усиливается, когда вода во рту согреется. Привкус во рту сладковатый, кислый или металлический. Черные клиновидные участки, напоминающие гангрену, на спинке языка и по его краям.

**Горло.** Трудно глотать жидкости, они вытекают обратно через нос.

**Желудок.** *Страстное желание холодного питья*, которые вырывает сразу же или после того, как желудок будет полон; в последнем случае возникает рвота *большим количеством* выпитого; это может произойти и спустя несколько дней. Вырывает только жидкости.

Жжение, схваткообразные боли; чувство, что в желудке лежит груз. Пищеварение медленное, сопровождается зловонными отрыжками. Рвота желчью после еды. Пища, как груз, давит в одном месте. Желудочные боли уменьшаются, когда пациент прогибается назад.

Рак желудка, рвота коричневатой жидкостью. Гастралгия, не связанная с катаром, не сопровождающаяся какими бы то ни было признаками несварения. От холодной воды лучше. Атрофический гастрит. Желудок свисает вниз; ниже пупка ощущаются плотные узлы.

**Живот.** Метеоризм. Полный упадок сил (прострация), в том числе после стула. Безболезненный понос, сопровождающийся жаждой и частой рвотой, а также позывом на мочеиспускание. Безболезненное выделение крови из прямой кишки. Детская холера (cholera infantum): тело пациента остается теплым.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание учащенное, обильное; моча бледная; подавление мочевого выделения.

**Сердце.** Бешеное сердцебиение.

**Конечности.** *Сухие ладони и подошвы*. Рвущая боль под ногтями. Конечности холодные. Предплечье и бедро синего цвета.

**Кожа.** Язвы: гангренозные, черные, синеватые.

**Сон.** Беспокойный из-за сладострастных сновидений; с поллюциями или без них.

**Диф. диагноз.** Ars., Cadm.

## BORICUM ACIDUM

**Общее.** Борная кислота поражает кожу: возникает обширное ее поражение — эксфолиативный дерматит. Отек вокруг глаз. Это средство полезно при климактерических приливах. Во влагалище ощущается холод, как будто оно наполнено льдом. Ощущение холода: в том числе слюна кажется холодной, ощущается холод во влагалище. Диабет: язык сухой, красный и в трещинах. Боль вдоль мочеочника, сопровождающаяся учащенным мочеиспусканием.

**Лучше.** При ходьбе на открытом воздухе.

## BORAX

**Общее.** Бора поражает *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ*, вызывая *афтозное, катаральное воспаление*. *Выделения густые, горячие, причиняют щиплющую боль*. Пациент очень *нервный*; легко пугается; чувствителен к внезапно возникающим звукам. Ощущение жара в отдельных частях тела: во рту, во влагалище, в ладонях и т.д. Колющие, как будто что-то вонзилось, или тянущие боли; *во внутренних органах, в межреберьях, в подошвах и т.д.* Дети с пониженным питанием, с мягким и дряблым телом. Обычно красные части тела становятся белыми. Ощущение паутины на кистях, на лице. Вздрыгивающие люди. Кожа и слизистые оболочки *сморщены*. Двигательное беспокойство после полудня. Общее истощение, исхудание. Маразм, кахексия. Отрыжка возникает, если надавить на больное место. Боракс способствует наступлению зачатия. Дети, синюшные от рождения. Ценное средство при эпилепсии.

**Хуже.** *ПРИ ДВИЖЕНИИ ВВЕРХ ИЛИ ВНИЗ. От внезапных звуков.* От холода; сырости; если хоть немного раскроется, обнажится. От фруктов. У грудных детей; у детей постарше. От курения. В теплую погоду. После менструации. При качании в колыбели; когда ребенка раскачивают вверх и вниз.

**Лучше.** В 23 ч. От давления. Вечером. В холодную погоду.

**Психика.** *Нервный; тревожный; беспокойный, суетливый, непостоянный. Боится движения вниз. Вздрыгивает* или пугается при каждом звуке или *от внезапного шума*; или по пустякам. Раздражителен перед стулом, веселый и счастливый после стула. Младенцы плачут, *кричат во время кормления грудью, или перед стулом, или перед мочеиспусканием*.

Страх грома. Дети внезапно просыпаются, кричат, держатся за кровать — без видимой причины. Придирчивый человек. Не желает ничего делать. Все психические симптомы уменьшаются к 23 ч. Переходит от одного дела к другому, из одной комнаты в другую. Страх заразиться какой-либо инфекционной болезнью.

**Голова.** Головокружение усиливается при ходьбе вверх по лестнице или при движении вверх — в лифте и т.д. Головная боль сопровождается тошнотой и дрожанием всего тела. У младенцев горячая головка. Концы волос запутываются, волосы склеиваются; их невозможно разъединить.

**Глаза.** Веки опухшие, покрыты корочками, склеиваются. Краснота вокруг глаз. Энтропион — заворот века. Ссадины в области краев век. Зернистые веки.

**Уши.** Чувствительны к малейшему шуму, более громкие звуки меньше раздражают. Ощущение, как будто ухо открывается и закрывается.

**Нос.** Едкий насморк. Сухие корки в носу. Красный нос у молодых женщин. Нос опухший, красный, блестящий, при этом в нем ощущается пульсация, напряжение. Ноздри попеременно заложены; в том числе при слезотечении.

**Лицо.** Бледное, грязное. Лицо опухшее; синеватое лицо у младенцев. Тревожное выражение лица при движении вниз. Ощущение паутины на лице. Ощущение, как будто по верхней губе ползет жучок.

**Рот.** Сухой, горячий, чувствительный, покрыт *афтами*; в том числе после кислой или соленой пищи. Язык сухой, потрескавшийся; или отечный, с отпечатками зубов. Зубная боль усиливается при сырой погоде, уменьшается от курения. Небо уплотнено и сморщено; как будто обожжено; боли при жевании; во время кормления — у грудных детей. Болезненный флюс. Вкус горький, даже у слюны. Молочница (афтозный стоматит). Язвы кровоточат после еды или от прикосновения.

**Желудок.** Отрыжки, возникающие при давлении на больное место. Тошнота: возникает, когда пациент напряженно думает; сопровождается дрожанием всего тела и слабостью в коленях. Желание кислого. Колющая боль в области желудка после поднятия тяжести; распространяется в поясницу. Потеет в эпигастральной области. Рвота после питья; в том числе кислой слюной. Рефлекторная гастралгия при заболеваниях матки.

**Живот.** Живот мягкий, дряблый, втянутый. Метеоризм: вздутие живота возникает после каждого приема пищи. Боль с ощущением, что начнется понос. Стул становится зеленым или постоянно зеленый; стул как вареный крахмал. Слизистый понос, после него — слабость. Жидкий, кашицеобразный, зловонный стул. Скудный, незначительный стул. При кашле «схватывает» в паху. Тянет, дергает из селезенки в сторону грудной клетки. Колющие боли в паховых областях перед менструацией и во время нее. Жжение в прямой кишке во время стула.

**Мочевыделительная система.** Горячая, раздражающая, жгучая моча с едким запахом. Ребенок кричит перед мочеиспусканием. Учащенное мочеиспускание: каждые 10—15 минут. Мелкие красные частицы на пеленке. Нефрит. Цистит.



**Мужские половые органы.** Безразличие к коитусу.

**Женские половые органы.** Безразличие к коитусу. Менструации слишком ранние, слишком обильные; сопровождаются коликой и тошнотой. Бели как белок, прозрачные, горячие, тестообразные, сопровождаются ощущением, как будто горячая вода течет по ногам. Мембранозная дисменорея. Ощущение пустоты в молочной железе после кормления ребенка, сопровождающееся колотьем; лучше сжать, сдавить. При кормлении ребенка возникает боль в другой молочной железе.

Родовые схватки сопровождаются частыми отрывками. Материнское молоко густое и с неприятным вкусом. Ощущение, что клитор раздут, увеличен; сопровождается колющим ощущением, будто что-то вонзилось. Бесплодие. Боракс способствует зачатию.

**Дыхательные органы.** Колющая боль в грудной клетке — в межреберье; усиливается от кашля, на вдохе, при зевании или от физического напряжения. Одышка; хуже при подъеме по лестнице; возникает колотье в груди, когда пациент говорит. Отрывистый жестокий кашель; мокрота с прожилками крови или с запахом плесени. Боль в грудной клетке уменьшается, когда пациент лежит на спине, после умывания холодной водой либо от давления. Когда пациент ложится, возникает остановка дыхания: он вскакивает и ловит ртом воздух.

**Сердце.** Кажется, что сердце находится справа; а также, что оно стиснуто. Младенцы, синюшные с рождения. Бешеное сердцебиение.

**Шея и спина.** Боль в спине, пациент не способен наклониться.

**Конечности.** Конечности дрожат в 10 ч утра. Ощущение паутины на кистях. Колотье в подошвах. Ощущение слабости в икрах. Боль в пятке. Экзема пальцев рук и ног с выпадением ногтей. Ощущение, что по бедрам течет теплая вода. Горячие ладони. Зуд тыльной поверхности кистей. Нет силы, особенно в суставах.

**Кожа.** СУХАЯ кожа; легко нагнаивается, не заживает. Псориаз. Высыпания на пальцах рук и на кистях у продавцов, экзема с зудом и жалющей болью. Увядающая, сморщенная кожа. Беловатые папулы, окруженные ободком. Изъязвление кожи стоп от трения обуви.

**Сон.** Сладострастные сновидения; видит во сне половой акт. Вскрикивает во сне, словно от испуга (ребенок). Не может уснуть вследствие ощущения сильного жара, особенно в области головы. Внезапно просыпается, вскакивает из-за ощущения, что падает.

**Лихорадка.** Приливы жара.

**Диф. диагноз.** Bell., Bry., Calc, Nux-v., Sul-ac.

## **BOTHROPS LANCEOLATUS**

**Общее.** Яд этой змеи сильнее прочих повышает свертываемость крови, поэтому можно ожидать, что он будет полезен при тромбозе и заболеваниях, обусловленных тромбозом, например, при гемиплегии.

Афазия, не связанная с поражением языка. Нервная дрожь. Выраженная апатия, вялость. Слепота из-за кровоизлияния в сетчатку. Дневная слепота: пациентка едва разбирает дорогу после восхода солнца. Паралич только одной руки или только одной ноги. Легкая дрожь, после которой возникает обильное потоотделение. Невыносимая боль в большом пальце стопы. Кость обнажается при гангрене и подвергается некрозу. Хуже с правой стороны.

**Хуже.** С правой стороны.

## **BOVISTA**

**Общее.** Этот гриб широко известен как дождевик. Он оказывает влияние на *КРОВООБРАЩЕНИЕ*, вызывая расслабление капилляров, а следовательно, *геморрагический диатез*. На коже он вызывает появление *герпетических высыпаний*. Отмечается общая отечность; поверхность тела вздувается: если слегка надавить тупым предметом (например, ножницами), останутся ямки. Расслабление, *расхлябанность*, особенно ощутимая в суставах: кажется, что они болтаются. Ощущение *увеличения или распухания* головы, сердца и т. д.

Это средство подходит старым девам, страдающим сердцебиением; а также детям, страдающим заиканием. Полиневрит с онемением и пощипыванием, покалыванием. Асфиксия (удушье) вследствие отравления угарным газом. Последствия переутомления, местного применения дегтя. Люди нервные, со слабыми суставами.

**Хуже.** Во время менструации. В полнолуние. В жаркую погоду. Когда согреется. От холодной пищи. От вина. От кофе.

**Лучше.** Согнувшись пополам. От горячей пищи. От еды.

**Психика.** Неловкий, неуклюжий и в речи, и в действиях; роняет вещи, заикается и т. д. Неэмоционален. Рассеян. Слабая память. Пациент раздражителен, неверно все истолковывает, обижается. Смеется и плачет попеременно. Смотрит в пространство (отсутствующий взгляд). Печален, когда остается один. Вздорный, сорится.

**Голова.** Спутанность сознания при пробуждении. Ощущение, что голова увеличивается. Как будто клин вдавлен в затылок. Пошатывается; отмечается спутанность сознания и онемение головы после коитуса. Зуд кожи волосистой части головы усиливается от тепла.

**Глаза.** Кажется, что предметы находятся ближе, чем на самом деле. Пациент смотрит в одну точку. Потеря зрения из-за паралича зрительного нерва.

**Уши.** Нарыв (фурункул) в правом ухе: боль усиливается при глотании. Выделяется вонючий гной. Слух нарушен: не может расслышать, неправильно понимает многое из того, что говорят.

**Нос.** Вязкие, тягучие выделения из носа. Нос заложен; пациент не может дышать через нос; хуже, когда ложится. Мелкие чешуйки и корки возле ноздрей. Утром легко может возникнуть кровотечение; в том числе во время сна; несколько капель крови выделяется при чихании.

Лицо. Щеки и губы опухшие. Корки в углах рта. Угри: хуже летом или от применения косметики. Подергивание мышц лица перед приступом астмы. Губы потрескавшиеся, покрыты корочками.

**Рот.** Онемение. Препарат усиливает слюноотделение. Легко возникает кровотечение из десны, если ее пососать. Режущая боль в языке; в том числе перед приступом астмы.

Желудок. Ощущение, как от куска льда. Тошнота уменьшается от завтрака. Рвота водянистой жидкостью.

**Живот.** Колика сопровождается выделением ярко-красной мочи; лучше от еды и при сгибании вдвое. *Понос: хуже во время менструации и перед ней.* Пациентка не переносит тесной одежды на талии. Колотье через промежность распространяется в прямую кишку и половые органы. Хронический понос у старых людей; хуже ночью, ранним утром. Первая порция стула твердая; последняя — жидкая и водянистая.

Мочевыделительная система. Позывы на мочеиспускание учащены, даже могут возникать сразу после мочеиспускания (сахарный диабет).

**Мужские половые органы.** После коитуса возникает головокружение, пошатывание и спутанность сознания. Сексуальное желание повышено.

**Женские половые органы.** Сладострастное ощущение. *Менструации ранние*, кровь понемногу сочится, менструации возникают каждые две недели, они *обильнее ночью; кровотечение меньше при движении.* Иногда возникают кровянистые выделения между менструациями. Паро-вариальная (околояичниковая) киста. Густые, едкие, желто-зеленые бели, оставляющие зеленые пятна на белье; усиливаются при ходьбе; после менструации. Желтуха новорожденных.

**Дыхательные органы.** Одышка, возникающая при движении рук. Вязкая мокрота. Спастический смех и плач при астме.

Сердце. Видимое биение сердца; в том числе у старых дев. Сердцебиение с ощущением, что сердце работает в воде. Сердцебиение сопровождается дрожанием рук (кистей); сильнее при купании, возбуждении.

**Шея и спина.** Боль в спине с ощущением тяжести возникает после наклона. *Зуд в области копчика.*

**Конечности.** Выраженная слабость во всех суставах. Слабость; неловкие руки. Голени тяжелые, болят. Отечность стопы (правой), даже спустя несколько лет после растяжения связок. Потоотделение под мышками; в том числе с запахом лука. Отек суставов после перелома. Слабость в кистях.

**Кожа.** После надавливания тупым предметом остается глубокая ямка на коже. *Зудящие* высыпания; мокнутие; образование *толстых корок или чешуек*, под которыми скапливается гной. Стреляющая боль в мозолях и бородавках. Крапивница с высыпаниями, захватывающими все тело, сопровождается поносом или метроррагией. Пеллагра. Экзема.

**Лихорадка.** Озноб при боли.

**Диф. диагноз.** Apis, Calc, Rhus-t., Sep., Ust.

## BROMIUM

**Общее.** Выраженное влияние оказывает бром на **ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ**, особенно на **ЮРТ АНЬ** и *трахею*. Бром показан золотушным детям, у которых увеличены железы, в том числе лимфатические узлы. Но в особенности страдают околоушная, щитовидная железы, яичники и молочные железы — они также увеличены, уплотнены, но редко нагнаиваются. Возникает сжатие гортани и образование пленок, оно распространяется вверх.

Пациент *слабый, легко перегревается, затем потеет и становится чувствителен к сквознякам.* Блондины. Дрожание повсюду. Обмороки. Исхудание. Сверлящие боли в костях. Рак.

**Хуже.** *ОТ ТЕПЛА; ОТ ВЛАЖНОГО ТЕПЛА; от перегрева;* в теплом помещении. Если замерзнет в разгоряченном состоянии. От морского купания. От пыли. От сквозняка. Вечером, до полуночи. Лежа на левом боку.

**Лучше.** От носового кровотечения (уменьшается головокружение, симптомы со стороны головы, грудной клетки). В открытом море. От движения. От бритья. От езды.

**Психика.** Кажется, что посторонние люди заглядывают через плечо пациента; или что он увидит кого-нибудь, если обернется; ощущение, как будто у пациента за спиной кто-то стоит. Не проявляет интереса к домашним обязанностям. Приподнятое настроение; желание заняться умственным трудом. Грустный. Равнодушный. Унылый, безутешный. Чувствует дискомфорт, но в чем дело — сказать не может. Пациентка сидит одна в своей комнате и ничего не делает; смотрит все время в одну сторону и ничего не говорит.

**Голова.** Головокружение усиливается на мосту, при виде текущей воды. Прилив крови к голове (конгестия), пациент боится инсульта. Головная боль усиливается от питья молока, от наклона. Головная боль возникает на солнце, проходит в тени. Головная боль глубоко в области темени, сопровождается сердцебиением.

**Глаза.** Слезотечение с опуханием слезных желез. Зрачки расширены. Глаза навывкате, выступают вперед. Вспышки перед глазами.

**Уши.** Околоушная железа опухшая, твердая, теплая на ощупь; в том числе после лихорадки, сопровождавшейся высыпаниями.

**Нос.** *Едкие, жгучие выделения*, сопровождающиеся очень сильным чиханием и болезненностью носа. Щекочет, щиплет, как от паутины. Носовое кровотечение. Веерообразные движения крыльев носа. Упорный продолжительный насморк.

**Лицо.** Ощущение паутины на лице. Кажется, что лицо стянуто к точке на носу. Пепельно-серое лицо. Лицо бледное и красное попеременно.

**Рот.** Сухой, запекшийся. Афты во рту в сочетании с поражением глаз. Вода имеет солоноватый вкус.

**Горло.** Миндалины опухшие, темно-красные, с сетью расширенных кровеносных сосудов; боль в горле сильнее при глотании жидкостей, чем твердой пищи. Даже при небольшом зобе возникает чувство давления. Твердые, как камень, опухшие железы. Дифтерия.

**Желудок.** Острое жжение, распространяющееся от языка к желудку. Давление, как от камня. Гастралгия уменьшается от еды. Кислые продукты неприятны, от них хуже. Рвота; как будто кофейной гущей; кровянистой слизью. Отвращение к курению привычного табака.

**Живот.** Вздутие живота, тимпанит. Понос после употребления в пищу устриц или кислых продуктов. Геморрой: кровоточащий, очень болезненный; хуже от прикладывания холодных или теплых примочек с водой. Селезенка увеличена, плотная.

**Мочевыделительная система.** Моча насыщенного цвета.

**Мужские половые органы.** Опухание и затвердение яичек; хуже от малейшего сотрясения тела.

**Женские половые органы.** Выделение газов из влагалища; в том числе с шумом. Дисменорея. Опухание яичников. Пациентка чувствует недомогание, чувствует себя нездоровой за несколько дней до менструации. Опухоль в молочной железе, колющая боль распространяется из молочной железы в подмышечную область. Менструации сопровождаются выделением пленок. Зуд во влагалище. Подавление менструаций при скирре молочной железы.

**Дыхательные органы.** Вдыхаемый воздух кажется дымным, холодным или сырым. Сухой кашель сопровождается охриплостью и жгучей болью за грудиной. Пациент *хочет сделать глубокий вдох*, но от этого возникает кашель. *Приступы удушья*: пациент вскакивает в постели с кашлем — *удушливым или крупозным, или свистящим, хриплым* — или с сердцебиением. Астма. Спазм голосовой щели. Астма у моряков, сходящих на берег. Сильная охриплость, если согреется (от жара). Кажется, что легкие покрыты пушком. *Простуда, локализующаяся в гортани*. Простуда начинается в гортани, *распространяется вверх и вниз*. Белая густая мокрота. Одышка при сильном отеке.

**Сердце.** Гипертрофия; в том числе вследствие занятий спортом, сопровождается сердцебиением. Режущая боль, распространяющаяся вверх; при болезни сердца. Бешеное сердцебиение; хуже лежа на левом боку. Нервное сердцебиение; в том числе с тошнотой; с головной болью.

**Шея и спина.** Железы увеличены, кистозные опухоли по обеим сторонам шеи.

**Конечности.** Предплечья холодные, как лед, либо только кисти холодные. Сверлящая боль в одной или в обеих большеберцовых костях. Левая рука слабеет, становится ненадежной — при болезни сердца. **Кожа.** Нарывы (фурункулы) на руках и на лице. Угри, папулы и пустулы.

**Сон.** Постоянная зевота при болезни органов дыхания, она сопровождается сонливостью. Сильная сонливость во время чтения.

**Диф. диагноз.** Lach., Samb.

## **BRYONIA ALBA**

**Общее.** Бриония, или переступень белый, оказывает выраженное воздействие на все *СЕРОЗНЫЕ ОБОЛОЧКИ* и на внутренние органы, имеющие их: возникает *ВОСПАЛЕНИЕ и экссудация*. Бриония нарушает *кровообращение*, приводя к застою крови (конгестии). Она поражает саму кровь, способствуя возникновению лихорадки: тифоидной (тифа), желчной, ревматической и ремиттирующей.

**ОТВРАЩЕНИЕ К МАЛЕЙШЕМУ ДВИЖЕНИЮ** - пациент не выносит движения даже частей тела, удаленных от больного места, — объясняется действием Брионии на нервы и *мышцы*. *Слизистые оболочки становятся сухими*, выделения — скудные и клейкие. Заболевания развиваются медленно, но неуклонно.

Боли *С ОЩУЩЕНИЕМ РАСПИРАНИЙ, РАЗРЫВАЮЩИЕ; КОЛЮЩИЕ* или с *ощущением сильной болезненности*; распространяются назад. *Все возникающие симптомы сопровождаются выраженной болезненностью*: при кашле пациент держится руками за бока, придерживает грудную клетку, голову.

Боли в суставах. Красные полосы на коже — лимфангит. Заболевания, характеризующиеся поражением желудка, желчевыводящих путей и суставов. Любой участок тела болезнен при надавливании. Отечность, опухание постепенно усиливается в течение дня и исчезает в течение ночи. Дети не любят, когда их носят на руках или поднимают. Физическая слабость; в том числе от малейшего напряжения; всепоглощающая апатия.

Последствия гнева, испуга, разочарования. Последствия подавления высыпаний и выделений. Употребление алкоголя. Обжорство. Раны. Последствия употребления холодных напитков в жаркую погоду. Бриония часто бывает показана при повреждении суставов, если не помогла *Ат*. Мышцы после невралгии становятся жесткими, твердыми. Сухость везде — во рту, в горле и т.д. Это средство подходит нервным, сухим, стройным людям. Правосторонние симптомы. Викарные кровотечения.

**Хуже.** *ОТ МАЛЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ; ПРИ ПОДНИМАНИИ ВВЕРХ, ПРИ ВСТАВАНИИ; ПРИ НАКЛОНЕ; ПРИ КАШЛЕ; ОТ НАПРЯЖЕНИЯ; ПРИ ГЛУБОКОМ ДЫХАНИИ.* От сухого холода или жара. *КОГДА РАЗОГРЕЕТСЯ, СТАНЕТ ЖАРКО; В ЖАРКОМ ПОМЕЩЕНИИ. В жаркую погоду.* От питья — когда разогрет, если стало жарко. *ОТ ЕДЫ.* От овощей. От кислого. От каломели. *ОТ ДОСАДЫ, НЕПРИЯТНОСТЕЙ. ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ.* От подавления симптомов. При простуде. Рано утром.

**Лучше.** *ОТ ДАВЛЕНИЯ; ЛЕЖА НА БОЛЬНОЙ ЧАСТИ ТЕЛА.* От повязки. *НА СВЕЖЕМ ПРОХЛАДНОМ ВОЗДУХЕ. В ПОКОЕ. ТИШИНЕ. КОГДА НЕПОДВИЖЕН.* В пасмурные, облачные, сырые дни. *Подтянув колени.* Если приложить к воспаленному месту что-нибудь горячее. Когда спускается, идет вниз по лестнице. Если подняться, сесть в постели. От холодной пищи, холодного питья.

**Психика.** Очень раздражителен, *безобразно* ведет себя. Непреклонный. Молчаливый. Бред: *хочет идти домой*, считает, что он находится не дома, а в другом месте. Говорит о работе. Хочет, чтобы его оставили в покое. Просит что-либо, а когда получает желаемое, отвергает его. Оступение. Предчувствия и страх будущего. Отчаяние: пациент не верит в выздоровление, боится смерти.

**Голова.** *ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ИЛИ ОБМОРОК ПРИ ВСТАВАНИИ.* Головокружение ощущается в затылке. При головной боли возникает ощущение, что голову *РАСПИРАЕТ, КАК БУДТО ОНА РАЗРЫВАЕТСЯ; РАСКАЛЫВАЕТСЯ* или *ТЯЖЕЛАЯ*, как будто ее *раздавливают*; боль возникает в *лобно-затылочной области*; усиливается при движении глазами, при кашле, когда пациент тужится во время стула и т.д. Головокружение: как будто все предметы вращаются; или как будто пациент сам проваливается, опускается в постели куда-то глубоко вниз; лучше от холода. Давящая боль над левым глазом распространяется в затылок, оттуда — по всему телу. Волосистая часть кожи головы очень чувствительна, пациент не переносит прикосновения даже мягкой щетки, каждый волос болит. Жирные волосы. Головная боль; в том числе от глаженья белья; при запоре.

**Глаза.** Глазные яблоки болезненные; *боли позади глазных яблок.* Глаукома. Слезотечение в течение дня, особенно на солнце. Веки опухшие, отечные.

**Уши.** Головокружение отогенное. Звон, гудение в ушах. Викарное крово течение из ушей.

**Нос.** Носовое кровотечение; в том числе викарное; в тот момент, когда должна начаться менструация; при беременности. Опухание кончика носа: кажется, что от прикосновения на нем может образоваться язва. Нарывы (фурункулы). Простуда спускается из носа вниз.

**Лицо.** Темно-красное, горячее, одутловатое. При поражении головного мозга у детей возникают жевательные движения. Губы сухие, как будто обожженные, запекшиеся, потрескавшиеся, хочется их увлажнить. Жжение в нижней губе у старых курильщиков. Тербит губы, обрывает на них кожу и т. д.

**Рот.** *Сухость во рту.* Язык очень сухой, шершавый; посередине покрыт налетом; красный у корня. *ГОРЬКИЙ* вкус во рту, пациент не может глотать пищу; лучше от холодного питья. Зубная боль уменьшается от холодной воды; усиливается при чистке зубов. Дергающая зубная боль возникает, когда пациент курит или жует табак. Скопление во рту пенистой слюны похожей на мыло.

**Горло.** Пациент с усилием откашливает коричневые комочки. Горло сухое; ощущение, что в нем скребет, как будто оно шершавое. Задняя стенка глотки выглядит опухшей. Афтозные бляшки; в том числе рецидивирующие.

**Желудок.** *ЖАЖДА: ХОЧЕТСЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ;* а также теплого питья, от которого становится лучше. Пациент страстно желает того, чем не может насладиться. Отвращение к еде. Тошнота усиливается, когда пациент встает со стула, когда лежит на правом боку. Рвота горечью; желчью и водой; возникает сразу после еды. Вырывает только твердую пищу. *Ощущение тяжелого груза в желудке*, хуже после еды. Область желудка чувствительна к прикосновению. Сильное желание кофе, вина и кислых напитков. Отвращение к молоку, но когда пьет его, получает удовольствие. Безвкусные отрыжки. Вырывает теплое питье. Пьет поспешно, с жадностью.

**Живот.** Эпигастрий чувствителен к прикосновению, пульсирует. В печени ощущается тяжесть, она болезненная, увеличенная; лучше, когда лежит на области печени. Стенка живота очень чувствительна к прикосновению. Аппендицит. Перитонит. Стул: *ОБЪЕМНЫЙ, СУХОЙ, ОЧЕНЬ ТВЕРДЫЙ*, как будто обожжен; жидкий, безболезненный, произвольный — во время сна. Запор. При поносе стул выделяется сплошным потоком; хуже утром, когда встанет с постели, после капусты. Понос; в том числе в жаркую погоду; от холодного питья. Выделение комков плотной слизи после стула. Жжение в заднем проходе во время стула. Желтый

кашицеобразный стул. Желтуха. Болезненность в паховых областях перед менструацией. Последствия поднятия большой тяжести, контузии (ушиба).

**Мочевыделительная система.** Моча: красная; коричневая, как пиво; скудная, горячая. Склонность к выделению мочи одновременно с задержкой дыхания, когда поднимает тяжелый груз. Непроизвольное мочеиспускание при напряжении. Жжение в уретре вне мочеиспускания.

**Женские половые органы.** Подавление менструаций сопровождается विकарными выделениями или сильной головной болью, когда кажется, что голова раскалывается. Боль в молочной железе во время менструации. Молочная железа горячая и болезненная, твердая. Лактационный мастит. Боль между менструациями сопровождается сильной болезненностью области живота и таза. Мастит: молочная железа твердая, как камень. Абсцесс молочной железы. Оофорит. Стоматит у грудных младенцев: ребенок не берет грудь, но после увлажнения его рта сосет нормально. Менструации: менструальная кровь темная, зловонная.

**Дыхательные органы.** Кашель: *СУХОЙ, ЖЕСТКИЙ, СОПРОВОЖДАЕТСЯ СИЛЬНОЙ БОЛЬЮ*, возникает ночью, как будто в желудке, пациент при кашле вынужден сесть в постели; хуже от еды и питья. Пациент хочет сделать глубокий вдох, но не может, или при этом появляется кашель. Мокрота: ржавая, с прожилками крови или плотная. Бронхит. Астма. Пневмония. *РЕЗКОЕ КОЛОТЬЕ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ* или в области правой *лопатки*; усиливается при глубоком дыхании и кашле. Плеврит. Когда пациент входит в теплое помещение, у него возникает кашель. Пациент придерживает грудную клетку или придавливает грудину, когда кашляет. Шум трения плевры. Кашель сопровождается чиханием.

Сердце. Колотье в области сердца. Пульс: *ПОЛНЫЙ, ЧАСТЫЙ, жесткий, напряженный*.

**Шея и спина.** Внутри лопатки ощущается онемение или боль, которая распространяется в эпигастрий, а в случае с левой лопаткой — в сердце. Болезненная скованность в шее. Боль в пояснице усиливается при ходьбе или при повороте тела. Колотье и скованность в пояснице. Прострел (люмбаго): хуже при наклоне.

**Конечности.** Суставы красные, опухшие, горячие. Мешает ходить ощущение, что в подошву вонзаются булавки, кнопки и иголки. Пациент постоянно двигает левой рукой и левой ногой, при этом вздыхает. Опухание локтя. Колени ударяются друг о друга и подгибаются при ходьбе. Пациент предпочитает бегать спиной вперед. Ишиас: лучше лежа неподвижно или на больном боку.

**Кожа.** Медленное появление или внезапное исчезновение сыпи при лихорадках, которые обычно сопровождаются высыпаниями. Корь без высыпаний, митигированная корь. Кожа желтая, бледная, опухшая, отечная.

**Сон.** Пациент видит сны: о тяжелой работе, о домашних заботах, о делах прошедшего дня, в том числе в бреду. Сонный, дремлет. Вздрагивает при засыпании. Ходит во сне.

**Лихорадка.** Во время озноба голова горячая, а лицо красное; сильнее в теплом помещении. Сухой жгучий жар; он сопровождается усилением всех симптомов. Кровь кажется горячей. Продолжительные, сопровождающиеся болями лихорадки. Пот кислый или сальный.

**Дополнительно.** Abrot., Alum., Kali-c, Lyc, Nat-m., RHUS-T., SEP., SULPH.

**Диф. диагноз.** Phyt., Rhus-t.

## БУФО

Общее. Яд жабы Буфо оказывает необычайное действие на нервную систему и половые органы. Он пробуждает низменные страсти; *пациент не только сам груб, незврит, но и его болезни вульгарны*.

Это средство для людей порочных вследствие плохой наследственности. Пациенты с рано подорванным здоровьем, преждевременно состарившиеся. Буфо поражает кровообращение, вызывая волнение крови с жаром, приливами; с ощущением жжения в разных местах. Кровянистые выделения: сочится кровянистая жидкость из соска, кровянистая слюна и т.д.

Дрожание, как при паркинсонизме (дрожательном параличе). Во всем теле ощущаются удары, похожие на электрические разряды. У пациента ощущение, что все тело опухло; оно возникает в первой половине дня, до полудня. Ощущение, что происходит нагноение. Пациент падает без сознания с криком, от которого стынет кровь. Ожирение. Эпилептические припадки: возникают ночью; связаны с сексуальной сферой; возникают во время менструации у женщин, находящихся в состоянии сексуального возбуждения; у молодых мужчин вследствие онанизма или во время коитуса; после приступов возникает головная боль.

Ощущение, как будто колышек вбит в сустав. Отеки. Паралич. Рак. Карбункул. Бубоны. Септический лимфангит как следствие травмы, при этом боль распространяется кверху в виде полос. Спазмы у грудных детей после кормления разгневанной или испуганной матерью. Нечувствительные участки на коже (локальная анестезия). Отвращение к блестящим предметам. Перед эпилептическими судорогами возникает целый ряд симптомов. Психика остается детской, растет только тело. Вонючие выделения и запах от тела. Конвульсии вследствие нагноительных процессов.

Хуже. В теплом помещении. От сексуального возбуждения. От мастурбации. От незначительного движения. От травмы.

**Лучше.** От кровотечения. От прохладного воздуха. От купания в холодной воде. Когда стопы погружены в горячую воду.

**Психика.** Порочный человек. Идиотия; пациент ведет себя ребячливо, глупо, хихикает. Слабоумие. Страх животных, незнакомых людей. Пациент несет вздор, чепуху, потом сердится, если его не понимают. Ходит взад и вперед и заламывает руки. Желание быть одному, чтобы заниматься мастурбацией. Склонен кусаться. Злобный. Не выносит музыку.

**Голова.** Как будто горячий пар поднимается к макушке. Ощущение, что мозг онемел. Подушка давит на затылок.

**Глаза.** Не переносит блестящие предметы. Предметы кажутся изогнутыми. Паралич левого века. Зрачки расширены. Ввалившиеся глаза.

**Уши.** Малейший звук раздражает. Музыка невыносима.

**Нос.** Носовое кровотечение: прилив крови к лицу, румянец, и боль в лобной области.

**Лицо.** Одутловатое и перекошенное. Пот течет градом (при спазмах). Губы черные.

**Рот.** Паралич языка, пациент делает лакающие движения языком. Кровянистая слюна. Заикание. Желание сладких напитков. Язык потрескавшийся, синевато-черный. Конвульсии после удаления зуба.

**Живот.** Ощущение холодных шаров, катящихся по кишечнику. Бубоны в паховых областях. После судорог — спастические движения в животе. Рвота после питья. Рвота желтой жидкостью. Рвота кровью и желчью.

**Мужские половые органы.** Спазмы, судороги во время коитуса. Склонность трогать половые органы. Склонность к мастурбации. Импотенция.

**Женские половые органы.** Эпилепсия во время менструации. Менструации слишком ранние и слишком обильные. Опухоли и полипы матки; язвы на шейке матки. Жжение в яичниках и матке. Гидатиды (кисты) в яичниках. Зловонные гнойные бели. Опухание в виде жгута от паха до колена — воспаление бедренной вены. Жесткая боль в молочной железе; хуже ночью. Молоко кровянистое. Рак молочной железы.

**Дыхательные органы.** Жжение, как от огня, в легких. Удушливый кашель. Астма.

**Сердце.** Кажется, что сердце плавает в воде или парит в воздухе. Учащенные сердечные сокращения (тахикардия); в том числе при экзофтальме. Сердце кажется слишком большим. Сердцебиение: при головной боли, во время менструации.

**Шея и спина.** Перед судорогами отмечается подергивание, резкие сокращения в мышцах затылка. Прострел (люмбаго); хуже при вставании или от малейшего движения.

**Конечности.** Дрожание конечностей. Спазмы, судороги. Шатающаяся походка. Чувство, как будто в сустав вогнали колышек. Конечности становятся скованными, деревенеют, немеют.

**Кожа.** Красные полосы под кожей. Лимфангит. Панариций. Желтые буллы (крупные пузыри). Желтоватая едкая жидкость сочится из них. Гусиная кожа.

**Сон.** Коматозный сон после судорог.

**Дополнительно.** Calc.

**Диф. диагноз.** Bar-c, Graph., Tarent-h.

## BURSA PASTORIS

**Общее.** Это средство показано при геморрагическом и мочекишлом диатезах. Оно устраняет болезненные последствия подавления кровотечений или выделений из влагалища или матки.

Хуже. Каждый второй месяц.

**Лучше.** От купания. От сырости. От быстрого движения.

**Психика.** Импульс уйти далеко.

**Голова.** Боль из области над глазами распространяется вверх, через голову — в затылок.

**Нос.** Кровотечение при хирургических операциях на носу.

**Лицо.** Глаза и лицо опухшие.

**Рот.** Привкус тухлых яиц.

**Желудок и живот.** Страстное желание пахты. Метеоризм. Выделение крови или слизисто-гнойные выделения после стула.

**Мочевыделительная система.** Гематурия. Большое количество песка в моче. Дизурия: у стариков — при этом моча выделяется по каплям, подтекает; у женщин — после наложения щипцов в родах. Почечная колика. Моча вытекает в виде коротких толчков. Осадок напоминает толченный кирпич. Альбуминурия при беременности.

**Женские половые органы.** Метроррагия: сопровождается сильной спастической болью в матке; каждая вторая менструация очень обильная. Фиброма матки сопровождается спазмами и изгнанием сгустков крови. Болезненность в области матки; сильнее при вставании. *От менструальных выделений или белей остаются стойкие пятна на белье.* Бели вызывают зуд. Жидкость, похожая на молоко, выделяется из правого соска. Женщина не успевает оправиться после менструации до начала следующей.

**Спина.** Слабость между лопатками.

## CACTUS GRANDIFLORUS

**Общее.** Кактус, в основном, действует на *СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ*. Он поражает *циркулярные (круговые) мышцы*, вызывая *СУЖЕНИЕ, СЖАТИЕ*: в сердце, горле, грудной клетке, мочевом пузыре, прямой кишке, влагалище, шее.

*Нарушается кровообращение, возникает выраженная конгестия (переполнение кровью) или местная пульсация* — позади желудка, в странных местах. Это средство *ПРОТИВ КРОВОТЕЧЕНИЙ*, оно способствует быстрому образованию сгустков. Сжимающие или спастические боли, от которых пациент кричит. *Выраженная периодичность, невралгические боли* периодического характера. *Тело кажется напряженным, сжатым или обернутым, затянутым в ткань*. Поток жара устремляется в грудную клетку.

Токсический зоб; сопровождающийся сердечными симптомами. Общая слабость и прострация. Обморок. Отеки. Последствия пребывания на солнце, в сырости, разочарования в любви. Многие болезни в сочетании с поражением сердца. Отсутствие пульса, пациент часто и тяжело дышит, совершенно без сил. Низкое артериальное давление из-за слабости сердца.

**Хуже.** Лежа: на левом боку, на затылке. Периодически. От напряжения. В 10—11 ч утра или в 23 ч ночью. При ходьбе. Когда идет вверх по лестнице. От шума. От света. От солнечного тепла.

**Лучше.** На открытом воздухе. От давления на темя.

**Психика.** Молчаливый. Плачет, не зная почему; хуже от утешения. Убежден, что его болезнь неизлечима. Печален. В дурном настроении. Легко пугается. Веселый, бодрый. Страх: смерти; что что-то случится.

**Голова.** Сильная боль, как от тяжести, в области макушки; уменьшается от давления; усиливается от разговора, яркого света. Головная боль: усиливается в опере; если пропустит время приема пищи, от шума, света; она периодическая, сжимающая, пульсирующая. Головокружение усиливается от глубокого дыхания, от напряжения.

**Глаза.** Неясное зрение. Глаза красные, налиты кровью. Экзофтальмический зоб.

**Уши.** Пульсация в ушах. Пение, звон в ушах.

**Нос.** Обильное кровотечение, но оно быстро прекращается.

**Лицо.** Правосторонняя невралгия лицевого нерва; хуже, если пропустит прием пищи. *Лицо: красное, одутловатое, бледное, исхудавшее.*

**Горло.** Сжатие пищевода, вынужден запивать еду, чтобы проглотить. Удушающее сжатие горла в сочетании с сильной пульсацией сонных артерий.

**Желудок.** Пульсация в чревной артерии позади желудка. Рвота кровью. Тошнота возникает утром, сохраняется весь день. Отсутствие аппетита. Отвращение к мясу, которое пациент прежде очень любил.

**Живот.** Сильное жжение в животе. Ощущение, как будто в заднем проходе — что-то тяжелое, тяжесть. Покалывание, как будто иголкой, в анусе; лучше от легкого растирания. Свищ заднего прохода, сопровождающийся неистовым сердцебиением. Переполнение печени кровью при заболевании сердца. Резкая боль, стреляющая сквозь диафрагму вверх, в грудную клетку. Ощущение, как будто шнур затягивается все туже и туже вокруг груди в местах прикрепления диафрагмы, из-за чего перехватывает дыхание.

**Мочевыделительная система.** Сокращение, сжатие шейки мочевого пузыря, вследствие чего возникает задержка мочи. Подавление образования мочи при лихорадке. Гематурия; у женщин мочеиспусканию препятствуют сгустки крови во влагалище.

**Женские половые органы.** Менструации: кровь в виде комочков; *черного цвета*; менструации слишком ранние, прекращаются, когда женщина ложится. Сжатие влагалища, препятствующее коитусу; вагинизм. Болезненные менструации, пациентка кричит от боли. Нарушения менструального цикла, сопровождающиеся сердечными симптомами. Пульсация в области яичника. Цианоз у младенцев.

**Дыхательные органы.** Стеснение дыхания при ходьбе вверх по лестнице. Кашель из-за болезни сердца. Постоянное kloкотание слизи в груди. Сжатие грудной клетки, как обручем; оно препятствует дыханию. Периодически возникающее удушье; оно сопровождается потерей сознания, появлением пота на лице, отсутствием пульса. Кровохарканье при судорожном кашле. Воспаление диафрагмы, сопровождающееся затруднением дыхания.

**Сердце.** *КАЖЕТСЯ, ЧТО ЖЕЛЕЗНЫЙ ОБРУЧ ТО СТИСКИВАЕТ, ТО ОТПУСКАЕТ СЕРДЦЕ*; или пациент чувствует, как сердце расширяется и сокращается; ему кажется, что сердце переворачивается. Эндокардит с недостаточностью митрального клапана.

Сердцебиение сильнее, когда пациент лежит на левом боку; накануне менструации; в течение дня при ходьбе; из-за разочарования в любви.

Колотье в сердце. Внутрисердечные шумы. Гипертрофия миокарда. Низкое артериальное давление. Пульс лабильный, перемежающийся, слабый. Пульс аритмичный и перемежающийся после наложения акушерских щипцов в родах. Заболевания сердца, сопровождающиеся отеком левой руки. Когда пациент задерживает

дыхание, кажется, что сердце разорвется. Сердцебиение усиливается, когда пациент задерживает дыхание. Аневризма крупных артерий и сердца. Сердце курильщика.

**Конечности.** Левая рука немеет. Пощипывание, покалывание в пальцах рук. Руки холодные, как лед. Отек руки (левой) при заболевании сердца; а также отек стоп, распространяющийся до коленей. Кисти мягкие, кажутся увеличенными. Боль в левой руке, распространяющаяся вниз, в пальцы.

**Сон.** Бессонница из-за сильной пульсации в разных местах. Сновидения: о падении; страшные; сладострастные. Просыпается в испуге.

**Лихорадка.** Зябкость, озноб не уменьшаются при укрывании. Постоянно пониженная температура тела.

**Диф. диагноз.** Acon., Coc-c, Dig., Lach., Nux-v., Sulph.

## CADMIUM SULPHURATUM

**Общее.** Действие этого препарата, в основном, сосредоточено на желудке и органах дыхания. Отмечается крайнее истощение и упадок сил, прострация, которые сопровождаются рвотой. Пациент должен сидеть неподвижно. Ледяной холод в теле даже у огня, камина.

Тяжелые заболевания со смертельным исходом. Слабость в одной руке и в одной ноге, сохраняющаяся после эпилептического припадка. Ощущение ползания мурашек под кожей. Ощущение онемения: части тела, носа, головы и т.д. Боль или ощущение ползающих мурашек в парализованных частях тела.

**Хуже.** При подъеме. От малейшего движения. Когда несет что-нибудь, от ноши. После сна. От стимулирующих веществ. На открытом воздухе. От холода. На солнце. При ходьбе. При подъеме вверх по лестнице. От неприятностей. При глотании.

**Лучше.** От еды. В покое.

**Психика.** Пациент испытывает ужас перед одиночеством и работой.

**Голова.** Слабость, обморочное состояние при вставании. Головокружение: кажется, что комната и постель вращаются.

**Глаза.** Помутнение роговицы; в том числе после травмы или воспаления. Ночная слепота (гемералопия). Слезы горячие. Пациент не может прочесть мелкий шрифт.

**Нос.** Озена. Полип. Нарыв (фурункул) на носу. Онемение носа.

**Лицо.** Перекошенный рот, в том числе вследствие паралича лицевого нерва. Дрожание нижней челюсти. Паралич лицевого нерва слева; хуже от холодного воздуха; не может закрыть глаза; трудно говорить и глотать.

**Желудок.** Страстное желание пить холодную воду маленькими порциями; ее сразу же вырывает. Жгучая и режущая боль; сильные позывы на рвоту и спазмы в горле: пациент давится. Сильная тошнота и рвота, уменьшается в покое. Рвотные массы черного цвета. Рвота как будто кофейной гущей. Рак желудка. Легкое прикосновение к губам вызывает тошноту и рвоту. Дисфагия. Желудочные симптомы усиливаются, когда несет что-нибудь.

**Мочевыделительная система.** Моча смешана с гноем и кровью.

**Дыхательные органы.** Удушье при засыпании. Сжатие грудной клетки при астме. Симптомы со стороны грудной клетки усиливаются, когда сидит на корточках.

**Кожа.** Синяя, желтая, с чешуйками. Гусиная кожа: в том числе после питья, при этом кисти горячие, в сочетании с изжогой. Пигментные пятна на лице (хлоазма); хуже от пребывания на солнце.

**Сон.** Остановка дыхания при засыпании. Пациент боится заснуть снова. Продолжительная бессонница. Спит с открытыми глазами.

**Лихорадка.** Желтая лихорадка. Тело холодное, как лед.

**Диф. диагноз.** Zinc.

## CALADIUM SEGUINUM

**Общее.** Каладиум оказывает особое влияние на **ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ** — как на мужские, так и на женские.

Мастурбация и ее последствия у мужчин; зуд наружных половых органов (вульвы) у женщин, (его иногда объясняют проникновением во влагалище остриц), который способствует возникновению мастурбации и нимфомании.

Сильное желание лежать и отвращение к движению; но если пациент делает усилие, оказывается, что он достаточно силен. Приступы, напоминающие обморок, после письма и умственных занятий; возникают, когда пациент ложится или встает.

**СУХОСТЬ** частей тела, которые обычно бывают влажными. *Ощущение сухости.* Каладиум ограничивает потребность в табаке. Сердце курильщика. Симптомы астмы чередуются с зудящей сыпью. Чувственные женщины, которые строят глазки на улице; но не способны получить удовлетворение, фригидные. Не может ходить с закрытыми глазами. Укус комара, с сильным зудом и жжением.

**Хуже.** От половых излишеств, сексуальных эксцессов. От движения. От внезапного шума. При засыпании. От табака.



**Лучше.** От холодного воздуха. От кратковременного сна. От потоотделения.

**Психика.** Очень заботится о своем здоровье. Двигательное беспокойство, не владеет собой после курения. Отказывается принимать лекарство. Забывчивость. *Нервная возбудимость.* Боится заразится, «подцепить» что-нибудь. Пугается своей собственной тени. Глупая самоуверенность, наглость.

**Голова.** Головокружение: ощущение, как будто пациента раскачивают, как на качелях; сильнее при закрытых глазах и лежа. Онемение головы сбоку.

**Глаза.** Закрыты, даже когда идет по улице.

**Уши.** Пациент чувствителен к шуму; он просыпается, вскакивает от малейшего шума.

**Нос.** Когда сморкается, выделяется кровянистая слизь.

**Лицо.** Ощущение паутины или ползания мурашек на лице.

**Рот.** Съеденная пища кажется слишком сухой; чтобы проглотить, должен ее запивать. *Красная сухая полоса посредине языка, расширяющаяся по направлению к кончику.* Слюна, как яичный белок. Молоко кажется кислым.

**Желудок.** Кажется наполненным сухой пищей (при астме). Жжение в желудке; усиливается при глубоком дыхании; от чая или шоколада. Ощущение трепетания в желудке. Переносит только теплое питье. Ест без аппетита и пьет без жажды. Жажда отсутствует в течение нескольких дней.

**Живот.** Ощущение длинного червя, извивающегося в поперечной ободочной кишке.

**Мочевыделительная система.** Моча зловонная, скудная.

**Мужские половые органы.** Половые органы вялые, покрыты потом. Импотенция. Зуд. Импотенция после гонореи; в том числе с депрессией. Половые органы кажутся увеличенными, как бы распухшими. Головка полового члена как будто тряпичная. Атонические поллюции. Крайняя плоть сокращена после коитуса. Половые органы холодные.

**Женские половые органы.** *ЗУД НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ВУЛЬВЫ)* приводит к мастурбации, сопровождается жжением; он возникает из-за остриц; во время беременности. Необычайно сильная сексуальная возбудимость или сексуальная неврастения.

**Дыхательные органы.** Катаральная астма, слизь отделяется не без труда, но возникает улучшение после ее отхаркивания. Жесткий кашель при астме. Дыхание как вздохи.

**Конечности.** Слабые конечности, пациент не может встать с постели. Онемение кистей. Не может ходить или стоять с закрытыми глазами.

**Сон.** Тяжело вздыхает и стонет в тревоге; громко стонет во сне. Яркие сновидения.

**Кожа.** На ощупь шершавая и сухая. Жжение на отдельных участках; обязательно нужно дотронуться до этого места, но почесать не может.

**Лихорадка.** Отдельные части тела холодные; в том числе стопы. Пот имеет сладковатый запах, привлекает мух. Септические лихорадки. Засыпает при лихорадке; просыпается, когда она проходит.

**Дополнительно.** Nit-ac.

**Диф. диагноз.** Caps.

## **CALCAREA ARSENICOSA**

**Общее.** Это средство, как показывают клинические наблюдения, показано тучным женщинам во время климакса; когда малейшие переживания вызывают сердцебиение. Калькарея арсеникоза показана детям с увеличенной печенью и селезенкой, а также при недомоганиях у пьяниц при абстиненции.

Нефрит, альбуминурия, отеки. При эпилепсии с приливом крови к голове; аура ощущается в области сердца. Эпилепсия сочетается с болезнью сердца. Ощущение полета, парения, как будто ноги не касаются земли.

Хуже. От незначительного напряжения. От погрешностей в диете. От холодного воздуха.

**Психика.** Депрессия и тревога. Желание быть в обществе, в компании.

**Голова.** Прилив крови к голове, сопровождающийся головокружением. Ежедневные головные боли; лучше лежа на больной стороне. Головная боль с сердцебиением; нарастают и уменьшаются вместе.

**Живот.** Увеличение печени и селезенки при хронической малярии, в том числе у детей. Болезни поджелудочной железы. *Облегчает жгучую боль при раке.* Понос после сладкой картошки или батата. Опухание паховых желез; сопровождается рвущей болью в голени.

**Мочевыделительная система.** Область почки чувствительна к давлению. Выделяет мочу каждый час.

**Женские половые органы.** Зловонные кровянистые бели. Рак матки. Жжение в матке и влагалище.

**Дыхательные органы.** Жгучий жар в грудной клетке. При сердцебиении пациенту кажется, что он задохнется. Ощущение, как будто нить тянут из гортани назад.

**Сердце.** Сердцебиение и боли в сердце перед эпилептическим припадком. Пульс перемежающийся, выпадает каждый четвертый удар.

**Шея и спина.** Боль и скованность в задней части шеи. Жестокая пульсирующая боль заставляет пациента встать с постели.

**Конечности.** Усталость и слабость в нижних конечностях, они «отказывают». Это средство выводит продукты воспаления из вен нижних конечностей.

**Лихорадка.** Типичная малярия. Зябкость.

## **CALCAREA CARBONICA**

Общее. Калькарея карбоника — главный представитель солей кальция. Усвоение кальция активно происходит в детском возрасте, но, когда человек минует рубеж среднего возраста, оно становится недостаточным.

Нарушение усвоения кальция приводит *К НЕПРАВИЛЬНОМУ РОСТУ И РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗ (лимфоузлов) (шейных и мезентериальных у детей); КОСТЕЙ И КОЖИ.* Калькарея карбоника влияет на *КРОВЬ*: она применяется для лечения анемии.

*ОПУХАНИЕ ЖЕЛЕЗ* под нижней челюстью и на шее; *неправильное развитие костей. ОТКРЫТЫЕ РОДНИЧКИ.* Искривление позвоночника, экзостозы, рахит. Мышцы и кожа становятся *расслабленными и дряблыми*; пациент становится *ТУЧНЫМ*, но не сильным. Он *ЛЕГКО ПОТЕЕТ*; потеют отдельные части тела: *ГОЛОВА; ГРУДЬ, в том числе ПОТЕЕТ ВО СНЕ. ВЫДЕЛЕНИЯ ОБИЛЬНЫЕ; ЧАСТО - КИСЛЫЕ*: например, стул, пот, запах тела; слюна и т.д.

Это средство подходит *БЛОНДИНАМ* мягким и медлительным. Недомогания у детей при прорезывании зубов: конвульсии, понос с кислым стулом. *Запаздывает прорезывание зубов и ребенок поздно начинает ходить* — дети не ставят ножки на землю. Дети очень худые, с крупной головой и большим животом. Пациенты чувствительны к *ХОЛОДУ*: *сырой холодный воздух пробирает насквозь, пациенты легко простывают*; особенно часто поражаются при простуде органы грудной клетки.

Легко возникает растяжение мышц. Части тела, на которых пациент лежит, немеют. Склонность к образованию камней. Нарушение обмена веществ, усвоения пищи. Атрофия мышц. Ранняя стадия туберкулеза легких, сопровождающаяся щекочущим кашлем; летучими болями в груди; тошнотой; повышенной кислотностью желудочного сока и отвращением к жирному. Психическое и физическое изнурение вследствие чрезмерной работы. Судороги, спазмы в мышцах, в результате которых конечности, сгибаются, поджимаются. Абсцесс глубоко в мышце. Полипы: носа, матки и т.д.; а также кисты.

Вкратце пациента типа Калькарея карбоника можно описать как *жирного, дряблого, светловолосого, коренастого, потливого, холодного и влажного.*

При эпилепсии аура распространяется вверх из солнечного сплетения; либо ощущается как мышь, бегущая вверх по руке или вниз из эпигастрия в матку или в конечности. Подергивание мышц, дрожание, хорея; не-вралгии; ужасные фантазии, паралич — всё это может быть показанием для применения Калькареи. Варикозное расширение вен; жжение в венах. Остеомиелит. Последствия: употребления алкоголя; потери жидкостей (жизненных соков); половых излишеств; мастурбации; переутомления; поднятия больших тяжестей; подавления потоотделения, высыпаний, менструаций; испуга, проявления эгоизма. Болезни каменотесов. Тупые, вялые дети, не желающие играть. Нарушение функции гипофиза и щитовидной железы. Понос, дрожание — после ожогов.

**Хуже.** *ОТ ХОЛОДА; ОТ ХОЛОДНОГО СЫРОГО ВОЗДУХА; ОТ КУПАНИЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ.* От охлаждения. При перемене погоды — при похолодании. *ОТ НАПРЯЖЕНИЯ* — физического, нервного. *При подъеме вверх по лестнице.* От напряжения зрения. *ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ.* В пубертатном периоде. *ОТ ДАВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ. ОТ МОЛОКА.* От тревоги. При пробуждении. В полнолуние. Стоя. Когда смотрит вверх. Во время климакса. При повороте головы.

**Лучше.** В сухом климате и при сухой погоде. Лежа; в том числе на больной стороне (боку); на спине. От чихания уменьшается головная боль. От растирания, расчесывания. Провести рукой или погладить. После завтрака. В темноте.

**Психика.** Забывчивый, плохо учится. *Подавлен. Меланхолическое настроение или одолевают сомнения.* Страх: болезни, бедности, несчастья, безумия; что за ним наблюдают. Страх, возникающий, когда пациент слышит сообщения о жестокостях.

Осторожный, предусмотрительный. Путается, переставляет слова и неправильно выражает мысль. Печальный. Апатичный. Молчаливый. Ленивый, вялый; в том числе — внезапно. Видит в бреду: огонь, убийство, крыс и мышей. Меланхолия: хочется плакать, хочется пойти домой. Не надеется, что когда-нибудь будет здоров. Подозрителен: пациенту кажется, что люди с подозрением смотрят на него; и он начинает смотреть на них с недоверием. Неспособен заняться чем-либо, приложить силы. Сидит и думает о мелочах, не имеющих никакого значения. Сидит и весь день ломает палочки и т.д. Пациентке кажется, что за ней кто-то идет. Такое чувство, что она должна бегать туда-сюда и кричать. Легко испугать или обидеть. Дети своевольные. Ребенок боится всего, что видит. Злобный. Упрямый. Раздражительный, громко плачет по пустякам; создает себе проблемы — все усложняет.

**Голова.** Головокружение при многих заболеваниях; хуже при ходьбе вверх по лестнице или при повороте головы, когда чешет, царапает голову; а также после приступа эпилепсии. Прилив крови к голове. *Ледяной холод внутри и снаружи*; голова сильно потеет; больше на затылке; подушка намокает. *Чешет, царапает голову, в том числе, при пробуждении.* Боль глубоко в голове — стучащая, как будто голова разобьется вдребезги; хуже от

ветра; лучше в темноте, закрыв Глаза, от давления; боль сопровождается отрыжками. Головная боль от поднятия большой тяжести или мышечного напряжения другого рода. *Толстые зловонные молочные корки* (молочный струп); при этом шейные железы опухшие.

**КРУПНАЯ ГОЛОВА И БОЛЬШОЙ ТВЕРДЫЙ ЖИВОТ. МАКУШКА ХОЛОДНАЯ, КАК ЛЕД.** Голова горячая при умственном напряжении. Холодные участки на голове. Гидроцефалия; в том числе хроническая. Жжение в макушке; в том числе после горя. Голова потеет при сердцебиении. Выпадение волос.

**Глаза. РАСШИРЕНИЕ ЗРАЧКОВ.** Видения: возникают при закрытых глазах; вне поля зрения. Пятна и язвы на роговице. Гнойная фистула (свищ); слезотечение. *Сильная светобоязнь.* Зуд. Не может читать при искусственном (газовом) освещении. У пациентки возникает ощущение, что у нее косоглазие. Воспаление глаз (офтальмия): у новорожденных; после того, как пациент простудился. Неясное зрение из-за постоянного чтения, письма и т.д. Глаза быстро утомляются. Язвы на роговице. Помутнение роговицы.

**Уши.** Глухота, в том числе вследствие работы в воде или после применения хинина. Извращенное восприятие звуков. Кровотокающий полип. Тупая боль возникает, когда пациент сморкается и кашляет. Отвратительные гнойные выделения из уха, а также увеличение желез. Воображаемые (иллюзорные) шумы при глотании, жевании. Пульсирующая боль, сопровождающаяся ощущением, что что-то выделяется из уха.

**Нос.** Ноздри сухие, болезненные, изъязвленные. Насморк в сочетании с полиурией. Отвратительный запах в носу; зловонные желтые выделения. *Опухание носа и ВЕРХНЕЙ ГУБЫ;* в том числе у детей. Полип носа с потерей обоняния. Старческий катар. Пациент часто чихает, не будучи простужен. Носовое кровотечение у детей, склонных к полноте. Заложенность носа.

**Лицо.** Бледное, одутловатое, пастозное. Старое, сморщенное. *Опухание верхней губы,* в том числе утром; сопровождается появлением трещин и кровотечением. Подчелюстные железы опухшие. Пациент жует и глотает во сне, в том числе ребенок. Зудящие высыпания на подбородке.

**Рот.** Кислый вкус во рту. Рот наполнен кислой жидкостью. Киста подъязычной железы (ранула) — под языком. Эпулис; в том числе мягкий, безболезненный. Язык ночью сухой, не хочется разговаривать. Кончик языка кажется ошпаренным; хуже от теплой пищи. Зубная боль; хуже от холодного воздуха или от горячей пищи.

**Горло.** Опухание миндалин. Зоб. Свищ околоушной железы. Колющая боль в горле при глотании. Мелкие язвы, распространяющиеся на нёбо. Нёбный язычок опухший, отечный. Пациент откашливает из горла соленую слизь.

**Желудок.** Отсутствие аппетита (анорексия) из-за переутомления. Страстное желание несъедобных вещей: пациент ест мел, уголь, карандаши; а также желание яиц, мороженого, соли и сладкого. Отвращение к мясу, молоку, вареным продуктам, жиру.

Кислые отрыжки, рвота кислым, свернувшимся молоком. Отсутствие аппетита; но когда начинает есть, получает удовольствие. Жажда холодной воды ночью. *Опухание в подложечной области, напоминающее перевернутое блюдце.* Гиперхлоргидрия — повышенная кислотность. Выпитая вода, как бы ничтожно ни было ее количество, вызывает рвоту; если только она не ледяная. Молоко не усваивается — от него плохо. Ощущение, как будто что-то поднимается к голове.

**Живот. БОЛЬШОЙ И ТВЕРДЫЙ.** Колика сопровождается холодом в бедрах; возникает после прекращения насморка; либо сопровождается ощущением холода в животе. Метеоризм: газы не отходят. Вздутие живота уменьшается от самого слабого давления. Боли в области печени усиливаются при наклоне. Колика при желчно-каменной болезни. Перитонит: боль уменьшается от прикладывания холода. Скручивающая боль или спазмы в области пупка. У младенцев пупок болезненный, в области пупка имеются разрастания, грануляции («дикое мясо»). Мезентериальные и паховые лимфоузлы опухшие и болезненные.

Похожий на мел, серый или зеленый водянистый стул. Понос у детей, сопровождающийся волчьим аппетитом. Стул: сначала твердый, затем кашицеобразный, потом жидкий. Выпадение заднего прохода; ползание мурашек в прямой кишке. Геморроидальные узлы: при ходьбе в них возникает боль; лучше сидеть. Стул возникает после еды и питья. Непереваренная пища в стуле: съеденные продукты выходят без всякого изменения. Самочувствие лучше при запоре. Постоянные тенезмы после дизентерии. Глисты, в том числе ленточные и круглые черви (аскариды). Понос: хронический, после ожогов.

**Мочевыделительная система.** Моча: темная; коричневая, кислая, зловонная или с *сильным запахом.* Белый осадок в моче, если моча напоминает молоко. Кровянистая моча. Полип мочевого пузыря. Почечная колика. Непроизвольное мочеиспускание (энурез), в том числе, в постели (ночной энурез); при ходьбе.

**Мужские половые органы.** Повышенное сексуальное желание, с запаздывающими эрекциями. Частые поллюции. Жжение при семяизвержении. После коитуса наблюдается выраженная слабость, головокружение, раздражительность, слабость в спине и коленях («отказывают»), головная боль и потоотделение. Зуд и жжение в половых органах. Импотенция вследствие сексуального насилия или половых излишеств. Преждевременная эякуляция. Водянка яичка (гидроцеле) у детей.

**Женские половые органы.** Менструации: слишком ранние (у девочек); слишком обильные; слишком продолжительные; сопровождаются головокружением, зубной болью, ноги влажные и холодные. Бели: густые,

как молоко, выделяются сплошным потоком или желтые; обильнее во время мочеиспускания; сопровождаются зудом и жжением. Бесплодие в сочетании с обильными менструациями. Полип матки. Соски с трещинами, изъязвлением; очень чувствительные. Нервное возбуждение вызывает дисменорею или возобновление менструации. Судороги в пальцах стоп или в подошвах, при беременности. Позднее наступление менструаций у тучных, вялых девушек; они сопровождаются сердцебиением, одышкой и головной болью. После коитуса возникает потоотделение и упадок сил, изнеможение. Зуд и жжение в половых органах. Отсутствие менструаций у полнокровных женщин; в том числе после испуга. Во время беременности женщины неповоротливые, неуклюжие и усталые.

Молочные железы чувствительные и опухшие перед менструациями. Молока много, но ребенок его не усваивает. Недостаток молока. Сильное колющее в молочных железах при кормлении ребенка грудью.

**Дыхательные органы.** Безболезненная охриплость сильнее утром. Все вызывает у пациента *одышку*. Эмфизема. Щекочущий кашель, как будто пыль или перо попало в горло. Кашель: усиливается на вдохе, при игре на фортепьяно, во время еды. Резкие боли в грудной клетке, распространяющиеся назад. Гнойная, жидкая, сладкая мокрота. Грудная клетка крайне чувствительна к прикосновению, перкуссии или давлению. Приступы удушья. Чувство слабости в груди, не может даже говорить. Язвы (Ручастики деструкции, каверны) или абсцессы в легких. Привычный кашель.

**Сердце.** *Слабое.* Сердцебиение сопровождается чувством холода, с вызывающим беспокойство стеснением в груди.

**Шея и спина.** Боли в шее усиливаются от поднятия тяжести. Боль в спине, как от растяжения; пациент с большим трудом встает со стула. Боль между лопатками мешает дышать. Ощущение скованности, ригидности в задней части шеи. Пациент не может сидеть на стуле прямо из-за слабости спины. Позвонки как будто не закреплены, смещаются; при надавливании в них возникает боль.

**Конечности.** **ХОЛОДНЫЕ ВЛАЖНЫЕ СТОПЫ;** кажется, что на ногах — мокрые носки. Холодные, липкие кисти и колени. Судороги в икроножных мышцах возникают ночью при вытягивании ног. Жжение в подошвах. Саднение в подошвах. Руки слабые, «не слушаются». Возникает онемение кистей, когда пациент берет что-нибудь в руки, хватается за что-нибудь. Недостаточная подвижность пальцев рук. Ощущение, как будто мышь бежит по конечности. Потрескавшиеся кисти.

Ребенок неповоротливый, неуклюжий, часто падает. Слабость голеностопных суставов у детей; стопы подворачиваются внутрь при ходьбе. Усталость после непродолжительной прогулки. Опухание суставов, особенно коленных. Слабость и дрожание конечностей. Образование узлов в области суставов; деформирующий артрит.

**Кожа.** Кожа холодная, как у змеи; дряблая; нездоровая. Мелкие ранки плохо заживают. Псориаз. Крапивница; лучше на прохладном воздухе. Видимое дрожание, трепетание кожи, распространяющееся от головы к стопам, с последующим головокружением. Кровяные нарывы; в том числе рецидивирующие. Белые, как молоко, пятна на коже. Петехии. Ознобления, обморожения. Кожа **ХОЛОДНАЯ; ХОЛОДНАЯ, КАК ЛЕД,** в том числе *на темени*. Холодные участки на голове, или *холодные на ощупь:* голова, кисти, колени, стопы или больные части тела.

**Сон.** Бессонница из-за наплыва идей; какая-нибудь неприятная мысль всегда всплывает в полудреме. Ребенку снятся *кошмары* после полуночи: ребенок пронзительно кричит, его невозможно успокоить. Страшные и фантастические сновидения. Возникают ужасные видения, когда пациент закрывает глаза.

**Лихорадка.** Озноб с жаждой. *Холод,* в том числе ощущение *ледяного холода* в разных частях тела; а также в больном месте. Ощущение внутреннего жара сопровождается холодом снаружи и потоотделением. Лихорадка сопровождается потоотделением. Пот холодный; в том числе на отдельных частях тела. Жар: ночью, во время менструаций.

**Дополнительно.** Bar-c, Lys, Sil.

## **CALCAREA FLUORICA**

Общее. Это тканевое средство расслабляет *эластические волокна*, особенно образующие стенки вен и входящие в состав желез. *Железы увеличены и ТВЕРДЫЕ, КАК КАМЕНЬ.* Варикозное расширение вен, вены воспалены.

Калькарея флюорика способствует резорбции костных новообразований, остеосаркомы, *экзостозов*; в том числе возникающих после травмы. Кефалогематома. *Гипоплазия зубной эмали.* Калькарея флюорика препятствует образованию спаек после хирургических операций. *Ткани и органы твердые, как камень:* миндалины; опухоли, а также шея после травмы; края язвы и т.д.

Аневризма. Затвердения с угрозой нагноения. Артериосклероз. *Свищ (фистула).* *Катаракта.* *Выделения травянисто-зеленого цвета.* Общая скованность. Слабость утром. Чувство усталости в течение всего дня. Онемение в разных местах. Угроза апоплексии (геморрагического инсульта). Пациент медлителен. Гипертрофия (утолщение) ногтей. Ожоги рентгеновскими лучами. Вонючий гной. Периостит нижней челюсти, ребер и т.д. Врожденный сифилис, проявляющийся изъязвлением полости рта и горла. Узлы в молочных железах.

**Хуже.** В начале движения. От холода; от сырого холода. От сквозняков. При перемене погоды. От растяжений.

**Лучше.** От продолжительного движения. От теплых аппликаций. От жара. От растирания.

**Психика.** Нерешительность. Беспочвенный страх финансового краха. Страх бедности.

**Голова.** Треск, щелчки в голове мешают спать. Кефалогематома у новорожденных.

**Глаза.** Тупые боли в глазах; лучше, когда глаза закрыты, а также от давления. Искры и мерцание перед глазами. Фликтенулезный кератит. Подкожные кисты век. Катаракта. Помутнение роговицы в виде пятен, неравномерное.

**Уши.** Хронические выделения из ушей. Отложения извести (кальцинаты) в барабанной перепонке.

**Нос.** Обильные, желтоватые, густые, в виде комочков, зловонные выделения. Озена.

**Лицо.** Твердая опухоль на нижней челюсти. Опухание щеки: опухоль твердая, боль ощущается в ней или в зубдх. Мелкие, твердые пузырьки на губах при простуде (герпес).

**Рот.** Флюс, сопровождается твердым отеком (опуханием) в области нижней челюсти. Зубы шатаются. Язык плотный, твердый. Зубная боль возникает от соприкосновения любой пищи с зубом. Периостит нижней челюсти.

**Горло.** Поверхность миндалин *неровная, зубчатая*; в миндалинах образуются слизистые пробки. Боль и жжение уменьшаются от теплого питья.

**Желудок.** Рвота непереваренной пищей у младенцев. Острое несварение желудка от усталости и нервного истощения, в том числе у перегруженных детей. Икота возникает при отхаркивании слизи из горла.

**Живот.** Метеоризм, в том числе при беременности. Стул как из крана, водянистый, вонючий. Кровоточащий геморрой; в том числе с болью в крестце. Трещины. Свищ ануса.

**Мужские половые органы.** Водянка яичка. Уплотнение яичек.

**Женские половые органы.** Твердые узлы в молочной железе. Это средство благоприятно влияет на течение родов.

**Дыхательные органы.** Кашель с отхаркиванием крошечных, плотных, желтых комочков. Охриплость после смеха или чтения вслух. Затруднение дыхания, как будто голосовая щель почти закрыта.

**Сердце.** Фиброзные отложения на эндокарде. Заболевание клапанов сер-ДЦА

**Шея и спина.** Зоб. Прострел (люмбаго) от перенапряжения; лучше от движения и от тепла. Боль в спине после продолжительной езды. Рахитическое увеличение бедренной кости у младенцев.

**Конечности.** Инкапсулированные опухоли на тыльной стороне запястья. Бурсит. Хронический синовит; в том числе коленного сустава. Холодные запястья и лодыжки. Опухание и уплотнение в области сухожилий и суставов. Рецидивирующие фиброзные опухоли в подколенной ямке. Заболевание тазобедренного сустава. Рисовые тельца в суставах.

**Кожа.** Потрескавшаяся, сухая, жесткая и белая, как алебастр. Родимые пятна. Язвы с твердыми краями. Бородавки.

**Сон.** Яркие сновидения, сопровождающиеся плачем. Пациент вскакивает во сне с постели.

**Дополнительно.** Rhus-t.

**Диф. диагноз.** Graph., Hecla.

## **CALCAREA HYPOPHOSPHORICA**

**Общее.** Калькарея гипофосфорика показана пациентам бледным, слабым, страдающим от ужасных проливных потов, быстро худеющим, крайне истощенным вследствие потери жизненных соков или длительно существующих абсцессов, подрвавших жизненные силы пациентов. Исхудание, дистрофия у детей.

**Хуже.** От потери жизненных соков.

**Психика.** Нервное возбуждение и бессонница. Говорит быстро и легко гневается.

**Уши.** В ушах звуки: шкварчание, как будто что-то жарится на сковороде или шипение.

**Желудок.** Волчий аппетит, особенно через 2 часа после приема пищи; лучше, когда желудок полный. Отсутствие аппетита.

**Живот.** Болезненная пульсация в селезенке. Туберкулез мезентериальных лимфатических узлов (мезаденит). Понос при туберкулезе легких.

**Дыхательные органы.** Острая боль в грудной клетке. Кашель, в том числе при туберкулезе легких. Кровотечение из легких. Астма. Бронхит.

**Сердце.** Стенокардия. Вены набухшие, как бечевка.

**Конечности.** Все время *холодные конечности*.

**Сон.** Вздрагивает во сне.

**Кожа.** Изнуряющий ночной пот. Пустулезные угри по всему телу.

**Диф. диагноз.** Chin.

## CALCAREA IODATA

**Общее.** Обычно Калькарея йодата применяется при затвердении желез, наличие которого предполагают оба компонента этой соли. Это средство может применяться при увеличенных миндалинах, на поверхности которых множество мелких крипт. Увеличение щитовидной железы в пубертатном возрасте. Аденоиды. Вялые, с дряблым телом дети, подверженные простудам. Выделения обильные и желтые. Трофические, вяло текущие язвы при варикозном расширении вен. Головная боль возникает при езде на холодном ветру. Твердое новообразование в молочной железе: подвижное, болезненное при надавливании и при движении руки. Обильное потоотделение.

## CALCAREA PHOSPHORICA

**Общее.** Это тканевое средство во многом напоминает *Calc.* Однако оно имеет свои особенные признаки.

Оно влияет *НА РАЗВИТИЕ И РОСТ* костей и желез: кости мягкие, тонкие и хрупкие. Калькарея фосфорика способствует оксификации костей при несращении переломов. Желудки опухшие. Особенностью этого средства является его воздействие на места соединения костей — швы и сочленения; характерна жгучая боль вдоль швов.

Пациенты, особенно дети, нежные, высокие, тонкие или очень худые; с грязной, коричневатой кожей. Анемия после острых заболеваний или вследствие хронических истощающих болезней. Дрожание общее или дрожание кистей; оно сопровождается болью или другими симптомами. Ощущение холода или болезненность на ограниченных участках: на темени, в глазных яблоках, на кончике носа, в пальцах рук и т. д. Ощущение ползающих мурашек или онемения; после плохих новостей.

Дети анемичные, капризные, вялые, с холодными конечностями и слабым пищеварением; они судорожно вздрагивают, когда лежат на спине; лучше лежать на боку. У детей захватывает дыхание, когда их поднимают вверх.

Выделения как яичный белок. Летучие боли. Артрит. Ревматизм. Плохое усвоение питательных веществ. Рахит. Болезнь Аддисона.

Болезненные последствия: очень быстрого роста, поднятия тяжести, переутомления во время учебы, сексуальных излишеств или беспорядочных связей, горя, разочарования в любви, неприятных известий, операций по поводу свища, промокания.

Девушки медленно созревают. Последствия простуды во время первой менструации. Медленное окостенение (оксификация); несращение переломов. Идиотия у детей. Диабет, сопровождающийся заболеванием легких.

**Хуже.** Из-за перемены погоды. От сквозняков. От холода; во время таяния снега. При прорезывании зубов. От нервного напряжения. От потери жидкостей, жизненных соков. В пубертатном возрасте. От фруктов, сидра. От движения. Если подумает о своей болезни. От поднятия тяжести. При ходьбе вверх по лестнице.

**Лучше.** Летом. В теплую сухую погоду. Лежа.

**Психика.** Капризничает, жалуется, беспокоится и раздражается. Забывчивый. Пациенту всегда хочется куда-нибудь пойти: когда далеко от дома, хочет домой; а когда дома, хочет уйти куда-нибудь. Идиотия, кретинизм: пациент оживленный, подвижный.

**Голова.** Боль: в затылке; вдоль позвоночника вниз; лучше от холодного купания или от чихания. Головная боль у школьников; в том числе сопровождающаяся поносом. Жжение сильнее в области швов черепа. Как будто мозг прижат к черепу. Закрывание родничков запаздывает, или они открываются снова. Череп мягкий и тонкий, шелестит, как бумага; сильнее в области затылка. Холодная или болезненная макушка. Голова горячая, жгучая боль у корней волос. Как будто лед в затылке. Вдавление на затылочной кости. Гидроцефалия (водянка мозга). Пациент не удерживает голову, она дрожит.

**Глаза.** Ощущение холода позади глаз. Как будто что-то попало в глаз; хуже, когда думает об этом. Диффузное помутнение роговицы. Не может работать, читать — то есть пользоваться глазами при искусственном (газовом) освещении.

**Уши.** Внезапное опухание наружного уха. Чувство холода в ухе; шум в ушах после стула.

**Нос.** Кончик носа холодный, как лед. Полипы: крупные, на ножке. Насморк и слюнотечение.

**Лицо.** Бледное, желтоватое, землистое; со множеством папул. Холодный пот на лице. Верхняя губа опухшая.

**Рот.** Позднее прорезывание зубов. Зубы мягкие, быстро разрушаются. Жалобы при прорезывании зубов: судороги без лихорадки. Зубы чувствительны при жевании. Неприятный вкус во рту; сильнее утром, при пробуждении; горький — при головной боли.

**Горло.** Боль тупая; горло кажется полым. Боль при открывании рта. Увеличенные миндалины. Аденоидные разрастания.

**Желудок.** Грудные дети все время хотят есть (просят грудь), у них легко возникает рвота. Страстное желание: сырой, соленой, пикантной пищи, ветчины, соленого или копченого мяса, или бекона. Слабое пищеварение: даже маленький кусочек пищи причиняет боль. Постоянная рвота молоком: материнским или другого

происхождения. Приятен табачный дым, от него уменьшается головная боль. Рвота при отхаркивании мокроты, сопровождающаяся дрожанием рук.

**Живот.** Колика, спазмы при каждой попытке поесть; а также после мороженого, холодной воды или фруктов. **ДРЯБЛЫЙ, ВПАЛЫЙ** живот. У младенцев из пупка сочится кровянистая жидкость. *Нагноение пупочной ранки.* Склонность к поносу: от сочных фруктов; при прорезывании зубов. Стул: зловонный, горячий, жидкий (и содержит полупереваренную пищу), брызжущий, водянистый, зеленый, слизистый, состоит из непереваренной пищи; сопровождается выделением зловонных кишечных газов. Ощущение, что в животе — что-то живое. Симптомы свища (фистулы) заднего прохода чередуются с симптомами со стороны органов грудной клетки. Трещина заднего прохода у высоких, стройных детей. Геморрой: все время сочится водянистая жидкость.

**Мочевыделительная система.** Выделение повышенного количества мочи сопровождается слабостью. Боль в области почек усиливается, когда пациент сморкается или поднимает что-то тяжелое. Боль в мочевом пузыре сильнее, когда он пуст.

**Мужские половые органы.** Колющая боль в промежности, распространяющаяся в половой член. Эрекции во время езды в экипаже, не сопровождающиеся сексуальным возбуждением. Чувство слабости в половых органах после стула.

**Женские половые органы.** Менструации ранние, скудные; возникают каждые две недели; избыточные, кровь ярко-красная; у девушек — запаздывают, сопровождаются выделением темной крови. Повышенное сексуальное желание: перед менструацией, в период лактации. Желание несъедобных вещей во время беременности. Жгучие бели: как яичный белок, между менструациями, выделяются после боли в животе.

Сладострастное ощущение ползающих мурашек в области половых органов. Выпадение, опущение матки: в том числе у ослабленных женщин; оно сопровождается ухудшением во время мочеиспускания или стула; во время менструации; когда появляются боли в суставах.

Матка тяжелая, слабая или в ней ощущаются тупые боли. Высыпания усиливаются во время менструации. Менструации запаздывают, сопровождаются сильной болью в пояснице.

Молочные железы болезненные, кажутся большими. Ребенок отказывается от груди: молоко соленое на вкус. Опухоли в грудной железе (левой) у мужчин, при надавливании возникает боль. **Дыхательные органы.** У ребенка захватывает дух, прерывается дыхание, когда его поднимают. Кашель уменьшается, когда пациент лежит; возникает при прорезывании зубов. Пациент непроизвольно вздыхает. Туберкулез легких, в том числе с образованием полостей; он сопровождается ночными потами; отхаркивается желтая мокрота. *Боль в груди из-за сквозняков.* Должен откашляться, удалить слизь из гортани, прежде чем сможет пить или говорить. Коклюш с упорным течением.

**Сердце.** Отеки из-за болезни сердца. Сердцебиение сопровождается дрожанием и слабостью в икрах.

**Шея и спина.** *Шея болит из-за сквозняков.* Шея *слабая, тонкая*; голова раскачивается. Искривление позвоночника влево. Жесткая боль; хуже от малейшего напряжения; пациент кричит от боли. Крестец немеет, «отказывает» (ощущение слабости). Поясничные позвонки наклонены влево. Спина бифида. Болезнь Потта (туберкулез позвоночника).

**Конечности.** Ревматизм в холодное время года. Болезненность кончиков пальцев рук. Ощущение, как будто занозы под ногтями. Онемение ягодиц. Чувство слабости в области крыльев таза. Поражение тазобедренного сустава. Конечности холодные при болезнях органов пищеварения. Боль жгучая вдоль краев ногтей. Твердые синеватые узлы в подмышечной области. Дрожание рук и кистей — при многих заболеваниях. Язвы со свищевыми ходами в области голеностопного сустава.

**Сон.** Пациент постоянно потягивается и зевает. Ребенок плачет во сне. Не может проснуться рано утром.

**Кожа.** Темная, коричневая, желтая. Рубцы, шрамы после ампутации изъязвляются. Изъязвление после горчичника.

**Лихорадка.** Легко мерзнет. Пациента знобит при болях. Озноб поднимается вверх по спине, но жар — спускается вниз. Липкий нездоровый пот; сильнее на голове и в области шеи; в том числе ночью.

**Дополнительно.** Her. Ruta.

**Диф. диагноз.** Carb-an., Chin., Ferr-p., Nat-m.

## **CALCAREA SULPHURICA**

**Общее.** Это **СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЕ** средство доктора Шюслера. Калькарея сульфурика воздействует на железы, слизистые оболочки, кости и кожу. Вялотекущие, торпидные процессы, сопровождающиеся опуханием желез. Кистозные опухоли. Фибромы.

**Склонность к нагноению:** когда гной находит выход, наступает черед этого средства. *Гной густой, желтый, в виде комков, кровянистый. Выделения со слизистых оболочек: желтые, густые и комковатые. АБСЦЕССЫ* рецидивирующие или с *оттоком гноя.*

Язвы: злокачественные, глубокие, язвы роговицы. Свищ. Боли режущего характера. Сниженная реактивность организма. У младенцев наблюдается насморк с кровянистыми выделениями; понос или экзема. Ожоги

пламенем и жидкостью, после того, как начнется нагноение. Возникновение злокачественных опухолей в местах изъязвлений.

**Хуже.** *От сквозняков. От прикосновения. От холода, от сырого холода. В жарком помещении.*

**Лучше.** *На открытом воздухе. От купания. От еды. От местного применения тепла. Раскрыться, раздеться.*

**Психика.** Торопливый. Презирует тех, кто с ним не согласен. Ворчит, жалуется, что другие его не ценят. Сидит и размышляет о воображаемом несчастье.

**Голова.** Коросты (парша) у детей; с желтым гнойным отделяемым.

**Глаза.** Конъюнктивит, сопровождающийся густыми гнойными выделениями желтого цвета. Покраснение и зуд по краям век.

**Уши.** Темная, жидкая ушная сера. Прыщики (папулы) вокруг уха. Отит после удара по уху.

**Нос.** Кровянистые выделения из носа при насморке, в том числе у младенцев. Чихание уменьшается на открытом воздухе.

**Лицо.** Папулы и пустулы на лице.

**Рот.** Язык дряблый. Мыльный привкус во рту.

**Живот.** Понос, в том числе у детей, сопровождается выделением чистого гноя или с примесью крови. Стул с белым налетом. Болезненный абсцесс возле ануса при наличии свища. Понос после употребления кленового сахара.

**Мочевыделительная система.** Пиелит. Хронический нефрит.

**Женские половые органы.** Бели густые, белые. Режущая боль в яичнике (правом). Менструации запаздывают, продолжительные.

**Дыхательные органы.** Круп с удушьем. Эмпиема плевры.

**Конечности.** Пот на стопах холодный, зловонный. Жжение, зуд в подошвах.

**Кожа.** *Нездоровая кожа: не заживают порезы, ранки и т.д. Сухая экзема; хуже у маленьких детей.*

**Сон.** Внезапно просыпается, вскакивает ночью, как будто ему не хватает воздуха.

**Лихорадка.** Гектическая лихорадка, вызванная образованием гноя. Отказывается укрыться, когда холодно. Сухой жар ночью. Легко потеет, особенно при кашле.

**Диф. диагноз.** Нер., Sil.

## CALENDULA

**Общее.** Календула действует на *МЫШЦЫ*; а также на *позвоночник*, печень. Она является замечательным заживляющим средством для ран — *открытых, резаных, от тупого предмета, рваных, с зазубренными (рваными) краями или нагнаивающихся.*

*Боль чрезвычайная и совершенно не соответствует тяжести повреждения.* Кровотечения, в том числе из скальпированной раны; после удаления зуба.

Склонность к простуде. Календула *предотвращает пиемию*. Повышенная чувствительность к влажному или к открытому воздуху.

При раке применяется как промежуточное средство. Прикладывание губки, пропитанной горячим раствором Календулы, превосходно успокаивает после родов. Паралич после апоплексии. Календула способствует образованию нормальной грануляционной ткани и заживлению первичным натяжением. Предотвращает гангрену.

**Хуже.** При влажной, пасмурной (облачной) погоде. Во время озноба.

**Лучше.** Когда прохаживается или совершенно неподвижно лежит.

**Психика.** Чрезвычайно нервный пациент, легко пугается, вздрагивает от испуга.

**Голова.** Ощущение, что груз давит на мозг.

**Глаза.** Бленнорея слезного мешка; видение в желтом свете (ксантопсия).

**Уши.** Лучше слышит в поезде, а также удаленные звуки. Обостренный слух.

**Нос.** Насморк; воспаление с одной стороны сопровождается обильными зелеными выделениями.

**Горло.** Боли в опухшей подчелюстной железе; хуже при повороте головы.

**Желудок.** Изжога сопровождается гусиной кожей. Тошнота ощущается в груди. Икота при курении.

**Живот.** Вздутие эпигастрия. Стул выглядит створожившимся, свернувшимся. Желтуха. Натяжение, тянущее ощущение в паховых областях.

**Мужские половые органы.** Ссадина на крайней плоти после коитуса.

**Женские половые органы.** Бородавки на маточном зеве; зев матки расположен ниже, чем бывает в норме. Гипертрофия матки. Меноррагия. Обильные зловонные выделения после наложения акушерских щипцов в родах.

**Спина.** Боль, как от ушиба, в углу правой лопатки. Холодные кисти.

**Кожа.** Желтая кожа. Гусиная кожа.



**Лихорадка.** Тело холодное, пациент мерзнет; повышенная чувствительность к открытому воздуху. Дрожь, содрогание в спине; кожа при этом теплая. Жар вечером.

**Диф. диагноз.** Arn., Bell-p.

## **CAMPHORA**

**Общее.** Холодное тело, судороги и конвульсии, сопровождающиеся тоской, душевной мукой, — это характерные признаки Камфоры. При судорогах губы синеют, появляется пена изо рта и тризм. Это средство для лечения внезапного упадка сил — коллапса — вследствие мощного воздействия на нервные центры.

Пациент становится *ХОЛОДНЫМ, КАК ЛЕД; И ВСЕ ЖЕ ОН НЕ ЖЕЛАЕТ УКРЫТЬСЯ*, или сбрасывает с себя покрывало; а затем, когда появляется *ощущение внутреннего жгучего жара и тревоги*, наоборот, натягивает его на себя.

*Внезапная слабость*; внезапные обмороки, которые становятся всё тяжелее. «Сухой» коллапс с незначительной рвотой и поносом, при холере.

*Тонические* судороги с обнажением зубов, подтягиванием губ, с последующим ступором, с похолоданием тела. Тризм у новорожденных.

Зябкость в начале простуды. *Выделения скудные или подавлены*. Пациент *очень чувствителен к холодному воздуху или подвержен простуде*. Подавленные высыпания. Неловкость, неуклюжесть. Мягкие ткани втянуты (запавшие?).

Последствия: шока, в том числе после травмы; хирургических операций; солнечного удара; неприятностей.

Камфора корректирует запутанные — «испорченные» — случаи и служит антидотом для многих гомеопатических средств, особенно принадлежащих к растительному царству.

Более всего поражаются *ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ*, спинномозговые нервы, мочевыделительная система и нос. Ощущение горячих волн при боли, сопровождающееся двигательным беспокойством.

**Хуже.** *От холода; от сквозняков. Когда дремлет.* От нервного напряжения. От шока. **ОТ ПОДАВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ.** От невнимательности. От движения. Ночью.

**Лучше.** *Когда есть выделения (обильные). От потоотделения. При мысли о симптоме.* От питья холодной воды.

**Психика.** *Нечувствительность*; угасание или внезапное исчезновение всех чувств или тревога. Неловкость. Потеря памяти. Бред. Мания: религиозная, послеродовая (послеродовой психоз). Хочет вскочить с постели или выпрыгнуть из окна. Никто из окружающих пациенту не нравится. Ничто не радует. Возбужден, постоянно говорит; ругается, в том числе непристойными словами. У пациентки чувство, что она умирает; облегчение наступает, когда она убеждается, что жива. Приступы мучительной тревоги, тоски ночью. Неистовство, истерия: царапается; плюется, кусается, рвет на себе одежду. Кричит и зовет на помощь. Пациентка закрывает глаза и не отвечает на вопросы.

**Голова.** Кажется, что она завязана узлом. Пульсация в затылке синхронно с пульсом; уменьшается стоя; когда лишен возможности заниматься сексом. Летучая колющая боль в висках и глазницах. Голова наклонена в сторону (при судорогах). Боль перемещается из головы в кончики пальцев на руках.

**Глаза.** Предметы кажутся слишком яркими; или рывком перемещаются в одно место, в сторону. Взгляд неподвижный, застывший, глаза повернуты вверх или наружу. Зрачки расширены. Глаза выпучены при мании. Глубоко ввалившиеся глаза.

**Уши.** Мочки ушей горячие и красные.

**Нос.** Холодный и заострившийся. *Насморк*, в том числе у стариков. Вдыхаемый воздух кажется холодным. Непрекращающееся носовое кровотечение в сочетании с гусиной кожей.

**Лицо.** Осунувшееся, бледное, синеватое, старое, с заострившимися чертами. Лицо бледное и красное по очереди. Холодный пот. Верхняя губа подтянута. Тризм (сжатие челюстей). Лицо перекошено. Гримасы. Пена изо рта.

**Рот.** Язык синеватый; холодный, дрожащий. Голос прерывается, слабый, хриплый. Холодное дыхание. Чай горячий, как кипятки, кажется холодным. Зубная боль уменьшается от пива.

**Желудок.** Жгучая жажда. Жжение: в желудке, в животе. Азиатская холера. Небольшая рвота или понос сопровождаются обезвоживанием и коллапсом. Стул в виде рисового отвара. Рвота утром: желчью, кислыми массами.

**Мочевыделительная система.** Странгурия. Гематурия. Задержка мочи.

**Мужские половые органы.** Сексуальное возбуждение. Сатириаз. При-апизм во время сновидений. Импотенция.

**Женские половые органы.** Сексуальное желание повышено. Приливы жара и холод в животе и в конечностях во время климакса. Постоянно обнажает свою грудь, в маниакальном состоянии.

**Дыхательные органы.** Асфиксия новорожденных. Хриплый, скрипучий, писклявый голос. Холодное дыхание. Остановка дыхания (временная). Жестокие приступы сухого кашля.

**Сердце.** Пульс слабый, частый, малый, не определяется. Сердцебиение после еды.

**Конечности.** Большие пальцы на руках оттянуты назад. Судороги в икроножных мышцах. Хруст в суставах. Конечности холодные, онемение и покалывание в них. Стопы холодные. Боли, как при растяжении.

**Кожа.** Сухая кожа; мертвенно-бледная, синяя, *холодная*; пациент не переносит укрывания. *Рожистое воспаление*. Все остаточные явления кори.

**Сон.** Бессонница и холодные конечности. Выраженное двигательное беспокойство. Коматозный сон.

**Лихорадка.** Потрясающий озноб; *кожа холодная*; пациент укрывается только в период жара. Внезапно возникающие воспалительные лихорадки с частой сменой фаз (жара и холода), впоследствии быстро наступает упадок сил, протрация. Жар или потоотделение уменьшаются от укрывания. Зябкость ощущается ниже лопаток; в том числе перед простудой, в Пациент потеет, когда укрыт; тело становится холодным, если он раскрывается.

**Дополнительно.** Canth.

**Диф. диагноз.** Carb-v., Cupr., Op., Sec.

## CANCER (ASTACUS) FLUVIATILIS

**Общее.** Широко известен как речной, или пресноводный, рак. Тинктура готовится из целого животного. Это средство заметно влияет на *печень* и на лимфатические узлы.

Астакус вызывает *КРАПИВНИЦУ*, которая сопровождается поражением печени; желтуху у детей. Зуд в разных местах. Молочный струп и увеличение лимфатических узлов. Увеличение шейных лимфатических желез у детей и стариков. *Жалящие боли* в разных местах. Ощущение внутреннего холода или дрожание. Нервного происхождения ощущение ползающих по всему телу насекомых. *Рожистое воспаление*, сопровождающееся крапивницей. Спазмы в области печени, воспаление печени; хуже от давления. Кашель уменьшается при ходьбе, но возобновляется, как только пациент садится. Тяжелая лихорадка с головной болью; с красным, пылающим лицом. Возможен спазм — сужение и даже полная непроходимость — как двенадцатиперстной кишки, так и, в особенности, спазм фатерова соска (сфинктера Одди).

**Хуже.** На воздухе. От раскрывания.

**Диф. диагноз.** Calc, Rhus-t.

## CANNABIS INDICA & SATIVA

**Общее.** Индийская конопля применяется в качестве одурманивающего средства. Самое значительное влияние она оказывает на *ПСИХИКУ И ЭМОЦИИ*: отмечается выраженная *ЭКЗАЛЬТАЦИЯ*, когда *МЫШЛЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ УСИЛЕНЫ* до предела. У пациента возникают самые *удивительные галлюцинации и фантазии*; он чувствует себя очень счастливым и довольным; но иногда галлюцинации вызывают переживание мучительного, смертельного страха и боли. Отсутствует чувство соразмерности, пропорции, пациент не ориентируется во времени и пространстве. Мания величия. Левитация. Разнузданная веселость; неконтролируемый смех. Жестокость. Белая горячка (алкогольный делирий). Пациент чувствует слабость, всё исчезло, превратилось в ничто. Экзофтальмический зоб. Катаlepsия.

В случаях, когда наиболее выражены *СИМПТОМЫ ПОРАЖЕНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ и признаки острой гонореи*, следует предпочесть *cann-s*, а не *cann-i*. Ощущение *тонкой струйки воды или воды, капающей сверху*: как будто горячая вода течет сверху на пациента или как будто *капли холодной воды падают* на него, в том числе на голову; ощущение, что сочится жидкость из ануса, *из сердца* — все это характерно для *cann-s*. Паралич с покалыванием, пощипыванием в больной части тела.

**Хуже.** ОТ МОЧЕИСПУСКАНИЯ, (*cann-s*). ОТ ТЕМНОТЫ. От напряжения. От разговора. От ходьбы. От кофе. От алкоголя. От табака. Когда ложится и когда поднимается по лестнице (*cann-s*).

**Лучше.** От свежего воздуха. От холодной воды. В покое.

**Психика.** Болтливость. Пациент очень забывчивый, не может закончить фразу. Кажется, что время тянется слишком долго. Расстояние кажется бесконечным, безмерным. Страстно желает света. Лектофобия: боится лечь в постель (*cann-s*). Неумеренный смех: по поводу серьезных замечаний или из-за сущих пустяков. Смеется и плачет. Экстаз, восторг. Слышит голоса, колокола, музыку. Навязчивые идеи; *чрезвычайная психическая возбудимость*, лабильность. Думает, что все нереально. Ясновидение. Когда пациент говорит, кажется, что это говорит кто-то другой. Стонет и плачет.

**Голова.** Жестокая головная боль; в том числе с галлюцинациями. Кажется, что *макушка открывается и закрывается*; хуже от шума. Кажется, что голова отделена от тела. Пациент непроизвольно трясет головой. Удары, проходящие через мозг.

**Глаза.** Неподвижный, пристальный взгляд, уставившись в одну точку. Буквы сливаются при чтении. Слабое зрение. Видит предметы, расположенные вне поля зрения. Помутнение роговицы (*cann-s*).

**Уши.** Шум в ушах, как от кипящей воды.

**Лицо.** Кожа на лице кажется натянутой. Выглядит удрученным и измученным заботами. Губы слипаются. Подбородок прижат к груди.

**Рот.** *Скрежещет зубами* во сне. Слюна белая, густая, пенистая. Заикается и запинается. Любая пища чрезвычайно приятна на вкус. Отвращение к мясу, которое прежде пациентка очень любила (*canns*).

**Живот.** Ощущение, что в животе находится что-то живое. В анусе ощущение шара: как будто пациент сидит на нем. Пульсация в разных местах.

**Мочевыделительная система.** Боль в почке, в том числе при смехе. Пациент должен тужиться при мочеиспускании; должен подождать некоторое время, пока начнет выделяться моча; моча подтекает, сочится по капле после того, как мочеиспускание завершено. *НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖГУЧЕЙ МОЧИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ПО КАПЛЕ*; при этом ощущается боль, распространяющаяся назад, к мочевому пузырю. Острая стадия гонореи: уретра чувствительна; пациент ходит, широко расставляя ноги (*cann-s*). Сильная боль при воспалительном заболевании почек. Раздражимость, повышенная чувствительность семенного бугорка.

**Мужские половые органы.** Опухание крайней плоти. Повышенное сексуальное желание. Приапизм. Эрекции без эротических фантазий.

**Женские половые органы.** Обильные менструации; в том числе с сильной спастической болью в матке (коликой); с дизурией. Сексуальное желание повышено у женщин, страдающих бесплодием, или при дисменорее. Угроза прерывания беременности из-за слишком частых половых актов или вследствие гонореи (*cann-s*). Бели у девочек (*cann-s*).

**Дыхательные органы.** Влажная астма. Затруднение дыхания с сердцебиением; лучше при вставании (*cann-s*). Не владеет голосом. Приступы удушья.

**Сердце.** Пациент просыпается от сердцебиения. Пульс медленный. Ощущение, что капли падают из сердца (*cann-s*).

**Спина.** Боль поперек плеча и позвоночника, пациент вынужден наклониться; не может ходить прямо. Кривошея: подбородок прижат к груди.

**Конечности.** Боль в конечностях усиливается при глубоком дыхании. Полный паралич нижних конечностей. Контрактура пальцев после растяжения (*cann-s*). Пациент чувствует себя очень усталым после непродолжительной прогулки. Ощущение, как будто птичьи когти сжимают колени. Вывих (смещение) коленной чашечки при подъеме по лестнице (*cann-s*).

**Сон.** Сновидения: эротические; видит во сне мертвых. Сонливость, но не может уснуть.

**Антидот.** *Apis*.

## **CANTHARIS**

**Общее.** Кантарис широко известен как шпанская мушка. Он поражает *МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ*, извращая их деятельность и вызывая в них жестокое воспаление, способствуя возникновению неистового бреда.

Кантарис действует быстро и сильно. *ВОСПАЛЕНИЕ ПРОТЕКАЕТ ЧРЕЗ-ВЫНАМНО ОСТРО* или *быстро появляется повреждение тканей* — слизистых и серозных оболочек. *БОЛИ РЕЖУЩИЕ, САДНЯЩИЕ ИЛИ ЖГУЧИЕ, ЩИПЛЮЩИЕ*, или как будто *ссадина* («голое мясо»); они вызывают нервное возбуждение. Выделения кровянистые, едкие, водянистые, тягучие. Внезапные приступы слабости, из-за которой пропадает голос. Выпот в серозных полостях. Нефрит, в том числе острый паренхиматозный. Кантарис способствует изгнанию пузырного заноса, погибшего плода, плаценты; способствует зачатию. Гемиплегия (правосторонняя) с афазией. При любом заболевании, когда моча скудная, беспокоят рези и жжение, нужно иметь в виду Кантарис. Конвульсии в сочетании с дизурией и симптомами бешенства (водобоязни). Возбужденное состояние при болях. Кантарис — это ценное средство *при ожогах пламенем и жидкостью*. Болезненное мочеиспускание как сопутствующий симптом при любом заболевании.

**Хуже.** *ПРИ МОЧЕИСПУСКАНИИ. От питья; от холодных напитков. От блестящих предметов. От звука текущей воды.* От прикосновения, особенно к гортани. От кофе.

**Лучше.** От тепла. В покое. От растирания.

**Психика.** Эротическое безумие. Острая мания, в том числе сексуального характера. Чрезмерное сексуальное возбуждение, не уменьшающееся после коитуса. Приступы гнева: пациент кричит, лает, кусается; хуже от блестящих предметов; от прикосновения к гортани, от питья холодной воды. Внезапная потеря сознания, лицо при этом красное (при прорезывании зубов). Пациент постоянно предпринимает попытки что-нибудь сделать, но ничего не доводит до конца. Поет непристойные песни. Болтает о половых органах, о моче, о фекалиях. Наглый и склонен противоречить, возражать.

**Голова.** Ощущение жжения, как будто в мозге — кипящая вода. Голова тяжелая; болит после купания или умывания. Волосы выпадают, когда причесывается.

**Глаза.** Предметы выглядят желтыми. Огненный, сверкающий, пристальный взгляд.

**Уши.** Ощущение, как будто из уха дует ветер или горячий воздух.

**Лицо.** Бледное, несчастное, как у мертвеца. Выражение крайнего страдания, ужаса или отчаяния. Горячее и красное. Зудящие пузырьки на лице. Челюсти плотно стиснуты; в том числе при острой мании.

**Рот.** Скрежещет зубами при спастическом сжатии челюстей (тризме). Жжение во рту, глотке и горле. Опухший, *дрожащий язык*; по краям языка — ссадины. Слюна кажется отвратительно сладкой.

**Горло.** *Как будто горит в огне.* Болезненное сжатие; пациент испытывает большие затруднения при глотании жидкостей. Все горло в пузырях.

**Желудок.** *Жгучая жажда*; но пациент испытывает отвращение ко всем жидкостям. Жестокие позывы на рвоту и рвота. Чувствительность области желудка: малейшее давление вызывает судороги. Ухудшение от питья кофе, даже небольшого количества. Отвращение ко всему.

**Живот.** Жестокая жгучая боль по всему кишечнику; причем живот болезненно чувствителен к прикосновению. *ЖГУЧИЙ СТУЛ С ПЛЕНКАМИ* (похожими на обрывки слизистой оболочки) *сопровождается тенезмами прямой кишки и мочевого пузыря*; содрогание после стула. Дизентерия или понос сопровождаются нарушением мочеиспускания (дизурией). Рези в прямой кишке несколько уменьшаются после выделения кишечных газов, полностью проходят после стула. Запор при задержке мочи. Позыв на стул при мочеиспускании.

**Мочевыделительная система.** *Область почек очень чувствительна. МОЧА ЖГУЧАЯ, КАК КИПЯТОК; МОЧЕИСПУСКАНИЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ РЕЗЯМИ, НЕВЫНОСИМЫМИ ИМПЕРАТИВНЫМИ ПОЗЫВАМИ И СТРАШНЫМИ ТЕНЕЗМАМИ; ИЛИ МОЧА ВЫПЕКАЕТ ПО КАПЛЯМ, СЛАБОЙ СТРУЙКОЙ.* Странгурия (болезненное, затрудненное мочеиспускание). Дизурия. Кровянистая моча. Сжимающая боль в мочевом пузыре. Острый нефрит; сильная боль при воспалении в почке (при нефрите); цистит. Отеки. Почечная колика несколько облегчается от давления на головку полового члена. Атония мочевого пузыря после продолжительной задержки мочи.

**Мужские половые органы.** Болезненное опухание половых органов. При-апизм. Пациент дергает себя за половой член. *Сексуальное желание повышено*, оно не снижается после полового акта. Кровянистая сперма. Поллюции. Гонорея. Жжение в уретре после коитуса.

**Женские половые органы.** Нимфомания. Рези и жжение в области яичников; оофорит. Менструации слишком ранние; слишком обильные, менструальная кровь черная или выделения скудные. Болезненность молочных желез сочетается с дизурией. Кантарис способствует удалению из матки заноса, погибшего плода и плаценты. Зуд, сопровождающийся сексуальным возбуждением; в том числе при климаксе. Бели сопровождаются сексуальным возбуждением, провоцируют зуд и мастурбацию.

**Дыхательные органы.** Голос хриплый, слабый. Тягучая слизь в дыхательных путях. Приступы отрывистого сухого кашля. Плеврит с образованием выпота. Боли в грудной клетке уменьшаются от отрыжки. Жжение в груди. Колотье в области грудины.

**Сердце.** Склонность к глубокому обмороку (syncope). Перикардит с образованием выпота. Пульс слабый, аритмичный.

**Спина.** Эмпростотонус (сгибание туловища вперед) и опистотонус (разгибание). Боль в нижней части спины в сочетании с частыми позывами на мочеиспускание.

**Конечности.** Колени трясутся, когда поднимается по лестнице. Язвенная боль в подошвах, не может ступить на ногу.

**Кожа.** Везикулезная сыпь; пузырьки становятся черными; сыпь сопровождается жжением и зудом. Рожистое воспаление, в том числе с образованием пузырей. Ожоги пламенем и жидкостью; лучше от холодной 'воды'. Склонность к гангрене. Возникает жжение в области высыпаний, когда к ним прикасаются.

**Лихорадка.** Зябкость; ощущение как будто пациента облили холодной водой; в том числе во время стула. Кисти и стопы холодные. Пот с запахом мочи; в том числе на половых органах.

**Дополнительно.** Apis.

**Диф. диагноз.** Apis., Ars., Merc-c.

## CAPSICUM

**Общее.** Капсикум оказывает сильное воздействие на *слизистые оболочки*, а также на кости, особенно на *сосцевидный отросток*. Слизистые оболочки становятся темными, красными, рыхлыми или с них стекает кровянистая слизь. Боли *ЖГУЧИЕ, САДНЯЩИЕ*, едкие, как от перца, или *сжимающие, стягивающие, как нитью*; они усиливаются от холодной воды. Ощущение **БОЛЕЗНЕННОСТИ** и сжатия.

Считается, что это средство подходит пациентам *рыхлым, слабым, ленивым, праздным, тучным, красным, неуклюжим, бестактным и неопрятным*. Подобные люди избегают физических усилий; они не желают нарушать привычный ход событий, покидать родные для них места; у них быстро возникает *тоска по дому*, ностальгия. Это старые люди, которые истощили свои жизненные силы, чаще всего, занимаясь умственным трудом или живя в бедности. У таких людей отмечается *вялая реакция*, они *боятся холода*.

Абстинентный синдром при алкоголизме. Зловонные выделения. Миал-гия. Невралгия. Глубокие абсцессы. Кровообращение вялое; если ущипнуть, складка долго не расправляется. Дрожь, *содрогание* при боли или при питье.

**Хуже.** ОТ МАЛЕЙШЕГО СКВОЗНЯКА; даже *теплого*. ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА, от холодной воды. Если раскроется, разденется. От сырости. От купания. Когда делает глотательное движение. *От питья*: усиливаются симптомы со стороны горла или возникает позыв на мочеиспускание. После еды. От пьянства.

**Лучше.** От продолжительного движения. От жара, от горячего. Во время еды.

**Психика.** Пациент капризный, у него изменчивое настроение. *Тоска по дому*, ностальгия: лицо красное, бессонница, а также склонность к самоубийству. Брюзгливый, раздражительный, сердитый, обидчивый. Грубый, бестактный. Неуклюжий: наталкивается на предметы. Упрямый, непокорный, особенно ребенок. Пьянство. Шутит и поет, но из-за мелочи начинает сердиться. Всегда насторожен — ждет оскорблений. Если пациентке что-нибудь нужно, но ей предлагают вместо этого что-то другое, она отреагирует враждебностью. Плачет и смеется попеременно.

**Голова.** Головная боль: голову распирает, как будто она может лопнуть, взорваться; хуже при кашле; лучше от жара (от горячего), движения, лежа на высоких подушках.

**Глаза.** Предметы кажутся черными. Глаза выдаются вперед, выпучиваются; жжение и слезотечение; в том числе при кашле.

**Уши.** Поражаются по очереди. Опухание и боль за ушами. Мастоидит. Повышенная чувствительность в области каменистой части височной кости. Горячие уши. Боль в ухе (оталгия); потом глухота. Заболевание ушей при беременности. Перфорация барабанной перепонки.

**Нос.** КРАСНЫЙ, НО ХОЛОДНЫЙ; кончик носа очень горячий. Носовое кровотечение утром; в постели.

**Лицо.** КРАСНОЕ, НО ХОЛОДНОЕ; или бледное и красное попеременно. Боль распространяется в виде тонкой линии, соответствующей ходу нерва. Губы: опухшие, потрескавшиеся, горят.

**Рот.** Пузырьки или плоские болезненные афты. Стоматит. Вонючий запах изо рта. ЯЗЫК ЗЕЛЕНОВАТЫЙ У КОРНЯ. Десны горячие, рыхлые, осевшие. Жжение и саднение на кончике языка. Повышенное слюноотделение. Вкус во рту отвратительный, как протухшая вода; у пищи кислый привкус.

**Горло.** Жжение и жгучая боль, саднение в горле. Сжатие горла при попытке что-нибудь проглотить. Боли в горле, фарингит у курильщиков и пьяниц. Боль и сухость, распространяющаяся в уши. Небный язычок опухший, удлиннен; ощущение, что он прижат к чему-то твердому. Горячий, жгучий, как перец, воздух выходит из горла, а при кашле ощущается отвратительный запах из горла. Боли в горле при кашле. Дисфагия при параличе.

**Желудок.** Страстное желание тонизирующих, острых продуктов; желание взбодриться алкоголем. Сильная жажда, но от питья возникает дрожь, содрогание. Изжога. Кислая диспепсия: жжение или дрожание в желудке, или ощущение ледяного холода, или как будто в желудке холодная вода. Желание кофе; но от него возникает тошнота. От овощей возникает метеоризм.

**Живот.** Колика при метеоризме. Спастическая боль в области пупка в сочетании со слизистым стулом. Стул: в малом количестве, горячий, жгучий, кровянистый, слизистый; он сопровождается тенезмами прямой кишки и мочевого пузыря; затем возникает жажда, которая усиливается от питья. Жжение в области геморроидальных узлов; кровотечение при геморрое, болезненность заднего прохода. Дизентерия. Очень сильная пульсация артерий брюшной полости. Слизистый понос.

**Мочевыделительная система.** Учащенные, почти безрезультатные позывы на мочеиспускание. Странгурия. Жжение в области наружного отверстия уретры. Моча сначала вытекает по каплям, потом толчками. Густые, белые, похожие на сливки выделения из уретры; в том числе при гонорее. Питье провоцирует мочеиспускание и стул. Выворот наружного отверстия уретры.

**Мужские половые органы.** Мошонка холодная и сморщенная. Атрофия яичек, они становятся мягкими, утрачивают чувствительность; семенные канатики сморщиваются. Сильнейшая жгучая боль в предстательной железе; гонорея. Дрожание всего тела во время любовных ласк. Опухание крайней плоти. Спазмы в яичках, в том числе после семяизвержения.

**Женские половые органы.** Климактерические расстройства, сопровождаются жжением в кончике языка. Ощущение, как будто что-то толкает или тычется в области яичника (слева) при нарушении менструального цикла. Меноррагия сопровождается тошнотой.

**Дыхательные органы.** Желание сделать глубокий вдох: пациентке кажется, что от этого все ее недомогания уменьшатся. Кашель вызывает боли в отдаленных местах: в мочевом пузыре, в ухе, в голенях и т.д.; или приводит к появлению зловонной отрыжки — лучше, если выпить холодной воды. Пациент слишком слабый, чтобы откашлять мокроту. Сжатие грудной клетки препятствует дыханию. Охриплость; в том числе у певцов и священников. Астма сопровождается покраснением лица; хуже при подъеме по лестнице. Кажется, что ребра сместились, вывихнуты. Гангрена легкого.

**Спина.** Боль в пояснице после стула. Боль в крестце при геморрое и дизентерии. Боль в спине возникает, когда пациент пьет воду. Ощущение, как будто холодная вода капает на спину и стекает по ней.

**Конечности.** Хруст в суставах; тугоподвижность; суставы болезненные в начале движения; боль с ощущением, что конечность парализована. Боль распространяется из области крыльев таза в стопы; хуже при кашле. Ишиас:

боль усиливается, когда прогибается назад, или *при кашле*. Атрофия голени (левой), сопровождающаяся жестокой болью. Пациент пошатывается при ходьбе.

**Сон.** Бессонница: от переживаний, эмоций; из-за тоски по дому или из-за кашля. Сонливость после приема пищи. Во время сна у пациента возникает ощущение, как будто он падает с высоты. Зевает днем.

**Кожа.** Жжение. Кожа вздутая, дряблая.

**Лихорадка.** *Зябкость при болях.* Озноб начинается в спине, сопровождается сильной жаждой, но *каждый раз при питье в теле возникает дрожь*; при этом пациент испытывает мучительную боль в спине. Озноб чередуется с жаром; жар поднимается к голове; затем возникает потоотделение. Большая часть тела холодная. Пациент легко потеет. Холодный пот на бедрах. Лихорадка: после переживаний, от эмоций; при ностальгии.

**Дополнительно.** Nat-m.

**Диф. диагноз.** Canth.

## CARBO ANIMALIS

**Общее.** Карбо анималис — это животный уголь. Гомеопатический препарат готовят из воловьей skóry, он содержит в небольшом количестве фосфорнокислый кальций (*Calc-p.*).

Это средство подходит *старым людям со слабой конституцией* или пациентам, которые утратили свои жизненные силы в результате какой-либо тяжелой или глубоко укоренившейся болезни, или вследствие потери жизненных соков. *Пациенты подвержены простуде, и у них легко возникают растяжения. Они необычайно страдают от небольших потерь жизненных соков.* Вследствие венозного застоя *кожа становится синей. Железы увеличиваются* медленно, но при этом они *болезненные, становятся плотными*. Жжение, как от огня.

Склонность к злокачественным опухолям. Изъязвления, омертвление ткани (некроз). *Выделения едкие и зловонные.* Ощущение, что орган болтается, не фиксирован; что ползают насекомые, например, жучки. Гуммы. Запущенные бубоны. Слабость у кормящих женщин: они плачут во время еды, не могут даже пройти по комнате. Колющая боль, остающаяся после плеврита. Кровотечения. Высыпания цвета меди.

Медленно протекающие *процессы, сопровождающиеся болями, затвердением.* Это средство действует глубже, чем *Carb-v.* Последствия употребления в пищу испорченной рыбы или гнилых овощей.

**Хуже.** *От незначительных причин:* небольшой потери жизненных соков, от растяжения, от поднятия тяжести. При простуде. *От сухого, холодного ветра.* После менструации. От бритья. *ОТ ЕДЫ, во время еды.*

**Лучше.** Если положить руку на больное место.

**Психика.** *Хнычет.* Желание быть одному. Грустный и задумчивый. Избегает разговоров. Плачет во время еды. Пугливый. Тоскует по дому — ностальгия. Страх темноты: хуже, когда закрывает глаза.

**Голова.** Кажется, что мозг болтается; это ощущение усиливается при движении и кашле. Как будто череп расколот или разбит вдребезги; пациент должен сдавить голову обеими руками; лучше от еды. Пульсирующая головная боль после менструации. Головокружение, после которого возникает носовое кровотечение. Головокружение, в том числе после бритья; лучше — повернуть головой.

**Глаза.** Боли, проходящие через глаз (правый) и направленные вниз. Ощущение, как будто что-то лежит на глазах (на них) и поэтому пациентка не может посмотреть вверх. Ощущение, как будто глазное яблоко болтается в глазнице. Кажется, что предметы удалены, на большом расстоянии. Неясное зрение во время чтения; лучше потереть глаза. Старческая катаракта.

**Уши.** Пациент не понимает, с какой стороны доносится звук. Слышит звон в ушах, когда сморкается. Опухание околоушной железы. Пронзающая боль в ушах. Выделения из уха при опухании сосцевидного отростка.

**Нос.** Нос твердый, красный, опухший, горячий, покрыт зудящими папулами и шелушится. Коричневая полоса поперек носа. Твердые синеватые опухоли на кончике носа. Жидкие выделения из носа при насморке; сопровождаются потерей обоняния; сопровождаются зевотой и чиханием.

**Лицо.** Синеватые щеки и губы. Высыпания медного цвета. Угри. Большое количество папул на лице.

**Рот.** Узловатое уплотнение языка. Пациент прикусывает щеку во время еды. Зубы шатаются; хуже от жевания и от малейшего холода. Зубная боль уменьшается от соленой пищи.

**Горло.** Ощущение жгучего саднения, как при изжоге; лучше от еды.

**Желудок.** Еда вызывает утомление, усталость. Солоноватая жидкость течет изо рта. Позывы на рвоту; рвота; икота; рак желудка. Ощущение слабости и пустоты в желудке, не уменьшающееся от еды; в том числе у кормящих матерей. Вся пища вызывает дискомфорт, неприятное ощущение в желудке.

Тошнота от курения, из-за которой возникает отвращение к табаку. Слабое пищеварение. Тошнота усиливается ночью; в том числе при беременности. Ощущение холода в области желудка; лучше от растирания и давления.

**Живот.** Сильное вздутие живота; после хирургической операции. Ощущение твердого тела в паху (слева); хуже сидя; лучше от давления и выделения кишечных газов. Запущенные бубоны. Болезненный анус. Мок-нутие заднего прохода и промежности; жидкость сочится из ануса. Чувство холода, поднимающееся в горло. Уплотнение поджелудочной железы.

**Мужские половые органы.** Сифилис. Бубоны.

**Женские половые органы.** Менструации: менструальные выделения темные, со сгустками, гниlostные; только утром. После менструации наступает истощение: женщина настолько ослаблена, что едва может говорить. Правый яичник кажется тяжелым шаром.

Бели водянистые; жгучие, едкие (от них щиплет); хуже при ходьбе или когда стоит; оставляют желтые пятна.

Рак матки: жгучая боль распространяется вниз, вдоль бедер; боли в костях таза возникают, когда женщина сидит. Маточный зев уплотнен; в нем ощущается жжение.

Пронзающие (стреляющие) боли в молочных железах во время кормления ребенка грудью, не позволяющие дышать. Болезненное затвердение в молочной железе (справа). Твердые болезненные узлы в молочных железах. Маточное кровотечение при заболеваниях желез (лимфатических узлов). Лохии: продолжительные, жидкие, зловонные; сопровождаются онемением конечностей.

**Дыхательные органы.** Когда пациент закрывает глаза, возникает удушье. Нервная одышка. Язвы в легких [очаги деструкции, полости?], сопровождающиеся ощущением холода в легких. Кашель с отхаркиванием зеленоватого гноя. Колотье, сохраняющееся после плеврита. Мокрота темная, коричневая, плотная, как сироп.

**Сердце.** Сердцебиение возникает, когда пациент слышит церковное пение; или когда находится в общественных местах. Ощущение холода за грудиной; при этом у пациента возникает гусиная кожа.

**Спина.** Кажется, что копчик ушиблен; когда к нему прикасаются, возникает жжение; хуже сидя или лежа. Холод и тупая боль в пояснице при кашле.

**Конечности.** Подмышечные железы (лимфатические узлы) опухшие, твердые. Ноги легко подворачиваются в голеностопных суставах. Онемение кистей при заболеваниях органов грудной клетки. Суставы слабые, легко возникает вывих.

**Кожа.** Синеватая кожа, в том числе на пораженной части тела. Рыхлые, губчатые язвы. Высыпания цвета меди. Безобразные рубцы после высыпаний.

**Сон.** Сны полны ярких фантазий; пациент говорит, стонет, плачет во сне.

**Лихорадка.** Приливы крови или жара. Пот: зловонный, изнуряющий, ночной, оставляет на белье *желтые пятна*.

**Дополнительно.** Calc-p.

**Диф. диагноз.** Calc-f., Graph.

## CARBO VEGETABILIS

**Общее.** Карбо вегетабилис, или древесный уголь, — это продукт неполного окисления. Поэтому несовершенное окисление и распад — ключевые признаки средства. Карбо вегетабилис в небольшом количестве содержит *Kali-c*. Дезодорирующие, дезинфицирующие и антисептические свойства этого вещества усиливаются, когда из него готовят потенцированный гомеопатический препарат.

Карбо вегетабилис действует на **ВЕНОЗНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ**, особенно на капилляры: кажется, что здесь возник застой крови, а вслед за ним — цианоз, охлаждение и кровоизлияния (экхимозы). *Малый запас жизненных сил* вследствие потери жизненных соков; *из-за опасных или тяжелых болезней; из-за побочного действия лекарств или последствий основного заболевания*, вследствие стойких осложнений болезни.

Карбо вегетабилис соответствует состоянию атонии, когда имеется *недостаточная реакция*. Типичный пациент Карбо вегетабилис — тучный, вялый, ленивый, склонен к хроническим заболеваниям. Болезни стариков. Люди, которые так и не оправились после какой-либо предшествующей болезни.

Коллапс при холере, тифе или других опасных заболеваниях, когда пациент почти лишен признаков жизни: тело холодное, дыхание холодное, пульс не определяется, дыхание учащенное; больной требует, чтобы его усиленно обмахивали, но при этом его *голова остается горячей*.

**КРОВОТЕЧЕНИЯ** темной кровью, когда кровь сочится; кровотечения вследствие шока, после хирургических операций, продолжающиеся в течение нескольких часов или дней. Онемение части тела, на которой пациент лежит. *Жжение, ощущение тяжести, груза или сильной ноющей боли* в костях, в области язв и т.д.

**СЛАБОСТЬ, МЕТЕОРИЗМ, ЗЛОВОННИЕ ИЛИ ГИПОКСИЯ** имеются при большинстве заболеваний. *Дрожание*. Пациент **ВСЕГДА СЛАБЫЙ, БОЛЬНОЙ И ИЗНУРЕННЫЙ**; но подобное состояние может возникнуть и внезапно. Обмороки. *Густые, едкие выделения. Холодное тело, но пациент хочет, чтобы его обмахивали; или жаждет холодной воды*.

**ЦИАНОЗ** и *деструкция (некроз)*. Сепсис. *Ощущение переполнения. Венозный застой. Язвы, афты*. Общее чувство разбитости, болезненности; старые катары.

Школьники — девочки и мальчики — вялые, с трудом учатся, их мучают ночные страхи, кошмары, они не станут спать одни или не лягут в постель в темноте. Недостаточная реакция: после какого-либо тяжелого приступа, сильного шока, жестокого страдания. «Не чувствовал себя здоровым, с тех пор как». Лимфатические железы опухшие; твердые или нагнаиваются. Гангрена влажная, старческая.

**Хуже.** ОТ ТЕПЛА. ОТ ВЫДЕЛЕНИЙ, потери жизненных соков. От охлаждения. ВСЛЕДСТВИЕ ИСТОЩАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. ОТ ИЗЛИШЕСТВ, РОСКОШИ; ОТ СЫТНОЙ ПИЩИ; от гнилой пищи; от домашней птицы. ОТ РАСПУТНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. От поднятия большой тяжести (если надорвался). При ходьбе на открытом воздухе. От давления одежды. Из-за воздействия крайних температур; от холодного ночного воздуха; при морозной, влажной погоде; от ветра, дующего в голову. От подавления симптомов. В пожилом возрасте. От чтения вслух. От пения. От напитков со льдом.

**Лучше.** ОТ ОТРЫЖКИ. От прохладного воздуха. От обмахивания, овеивания (веером и т.д.) Приподняв ноги.

**Психика.** Медленно думает. Ленивый. Тревожный. Раздражительный. Удручен. Несчастлив. Безразличие: услышанное не доставляет удовольствия, не причиняет боли. Отвращение к темноте. Страх привидений. Внезапная потеря памяти. Вялый, тупой, ленивый. Легко пугается или вздрагивает.

**Голова.** Тупая, сдавливающая, тяжелая головная боль; сильнее в затылке; хуже от перегревания, лежа или от давления шляпы, от излишеств. Головокружение сопровождается тошнотой и шумом в ушах. Зуд кожи головы возникает, когда пациент согревается в постели. Кожа волосистой части головы болезненная, волосы выпадают целыми прядями после тяжелой болезни, после родов. Холодный пот на лбу. Голова горячая, а конечности холодные. Легко простывает, появляется насморк.

**Глаза.** Ощущение, как будто тяжелый груз давит на глаза. Кровотечения из глаз при конгестии — переполнении кровью сосудов головы. Видит перед глазами плавающие черные пятна. Жжение в глазах. Боль в глазных мышцах при взгляде вверх. Зрачки не реагируют на свет.

**Уши.** Кажется, что перед ушами лежит что-то тяжелое. Глухота или выделения из уха, появившиеся после экзантемы. Скудная или с неприятным запахом ушная сера. Паротит, сопровождающийся метастазом.

**Нос.** Чихание из-за раздражения гортани; хуже, когда сморкается. Безрезультатная попытка чихнуть. Кровотечения в виде ежедневных приступов — лицо бледное. Простуда спускается ниже. Нос красный. «Розовая лихорадка» (вид поллиноза); сенная астма. Частое чихание, обильные выделения из носа. Чем больше чихает, тем больше потребность чихать.

**Лицо.** ЧЕРТЫ ЗАОСТРЕННЫЕ, «МАСКА ГИППОКРАТА» или темное лицо. Лицо холодное, покрыто холодным потом. Подергивание верхней губы. Губы коричневые или черноватые на вид, потрескавшиеся. Выраженная бледность.

**Рот.** Дыхание холодное. Язык холодный, черный; опухший; покрыт белой, желто-коричневой слизью. Афты: синеватые, черноватого цвета язвы, сопровождающиеся жжением. Зубы шатаются. Десны, как при цинге. Кровь сочится из десен, когда пациент чистит зубы. Пиорея. Вкус во рту горький, кислый. Плохой запах изо рта. Повышенное слюноотделение. Болезненность десен при жевании. Десны черного цвета. Зубы болят, когда пациент ест горячую или холодную пищу.

**Горло.** Ощущение, как будто горло закрыто. Афты — язвенная ангина. Откашливает из горла кровянистую черную слизь. Больно глотать пищу.

**Желудок.** Пищеварение замедлено, пища превращается в газы. Отвращение к мясу, к жирному, к молоку, от которого возникает вздутие. Противна даже мысль о еде. Желание кисло-соленых продуктов или сладостей, кофе. Тошнота утром.

**ОТРЫЖКИ ПРОГОРКЛЫЕ, громкие, не приносящие облегчения;** отрыжки при кашле. Тяжесть, чувство полноты в желудке и сонливость после еды. Сжимающая боль, распространяющаяся в грудную клетку. Жжение в желудке, распространяющееся в спину, вдоль позвоночника, сопровождающееся холодом в теле. Гастралгия у кормящих матерей. Несварение желудка. Отвращение к наиболее легко усвояемой, самой лучшей пище. Рвота кровью, в том числе при язве, раке желудка.

**Живот.** ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ МЕТЕОРИЗМ: сильно вздутый живот, особенно верхние отделы; хуже лежа. Кишечные газы не отходят; это, соответственно, сопровождается дискомфортом. Простейшая пища или самое малое количество еды вызывает ухудшение. Из-за колики пациент сгибается пополам. Область эпигастрия очень чувствительна. Боль в печени. Не переносит тесной одежды на талии. Кажется, что живот свисает вниз: пациент ходит согнувшись.

Жжение в прямой кишке. Зуд в заднем проходе. Кишечные газы горячие, влажные, зловонные. Мокнутие заднего прохода — едкие выделения из прямой кишки. Мокнутие промежности. Синеватого, белого цвета геморроидальные узлы, жжение в области узлов, боль после стула. Колика, вызванная ездой в автомобиле, лучше после выделения газов. Болезненный понос у стариков. Стул гнилостный; безрезультатный позыв на стул; даже мягкий стул выходит с трудом. Выделение стула вместе с газами. Желтуха от переедания или употребления слишком сытной, тяжелой пищи.

**Мочевыделительная система.** Белок в моче. Нефрит: септического происхождения или алкогольный. Моча: обильная, светло-желтая или несколько сгущенная и беловатая — при диабете. Ночное недержание мочи (энурез). Отсутствие мочи при холере; задержка мочи после того, как пациент постоял на холодной мостовой.

**Мужские половые органы.** Преждевременная эякуляция во время коитуса; после нее ощущается рев в голове.



Простаторея возникает, когда пациент тужится во время стула. Зуд и мокнутие бедер возле мошонки. Опухание яичек из-за метастаза болезни — при паротите.

**Женские половые органы.** Метроррагия: жжение поперек крестца, пассивное кровотечение. Болезненность, жар, зуд и опухание наружных половых органов (вульвы). Бели густые, зеленоватые, как молоко; вызывают зуд и жжение; хуже перед менструацией. Возникновение узлов в молочных железах сопровождается уплотнением подмышечных лимфатических желез. Молочные железы твердые, опухшие при угрожающем абсцессе. Пациентка лучше всего чувствует себя, когда у нее обильные бели. Менструации слишком ранние. Варикозное расширение вен промежности и вульвы сопровождается жжением, образованием синеватых язв. Изнеможение, упадок сил после кормления ребенка грудью. Свищ влагалища, сопровождающийся жгучими болями.

**Дыхательные органы.** Голос хриплый вечером. Кашель с зудом в гортани. Приступы мучительного, гулко-го или удушливого кашля, сопровождающиеся головной болью и рвотой, а также жжением в груди; ухудшение от холодного питья и в постели. У пациента грубый низкий голос, при этом гортань кажется шероховатой внутри. Когда отхаркивается, возникают позывы на рвоту.

Коклюш: в том числе с осложнениями, лицо синеватое. Сильная болезненность или слабость в груди; при пробуждении. Дыхание затрудненное, учащенное и короткое; хуже при ходьбе. Астма; в том числе у стариков и сопровождается цианозом; лучше летом. Дыхание Чейна-Стокса при органическом заболевании сердца.

Хочется сделать глубокий вдох. Жжение в груди, в том числе при кровохаркании. Коричнево-желтые пятна на груди. Болезни легких, сопровождающиеся распадом ткани, деструкцией. Болезненность ребер. Мокрота густая, клейкая, желтоватая и обильная.

**Сердце.** Продолжительное тревожное сердцебиение; хуже от еды, сидя. Пульс нитевидный, слабый и малый, перемежающийся. Жжение в области сердца. Пульсация во всем теле.

**Спина.** Сильная боль в пояснице сопровождается ощущением, как от вставленной пробки; пациент не может сесть; он вынужден подкладывать под поясницу подушку, когда ложится. Жжение на задней поверхности плеча.

**Конечности.** Тяжесть, скованность в конечностях, как будто они парализованы. Конечности немеют, когда пациент лежит на них. Паралитическая слабость в запястьях и пальцах рук, когда хватается за что-нибудь. Руки устают при письме. Судороги в подошвах. Стопы немеют и потеют. Ноги холодные, начиная с коленей и ниже. Старческая гангрена пальцев на руках и ногах, сопровождающаяся появлением пузырей: в них ощущается жжение, как от огня; из них сочится кровянистая жидкость. Зловонный пот на стопах; хуже при ходьбе.

**Кожа.** Саднение на коже, она пятнистая, синяя, холодная, с кровоподтеками (экхимозами). Язвы: зловонные, жгучие и кровоточащие. Варикозные язвы. Карбункулы. Старческая гангрена, начинающаяся с пальцев ног. Пролежни, из них легко возникает кровотечение. Варикозное расширение вен во время беременности. Раны заживают и снова открываются. Жжение в разных местах. Синий цвет кожи (цианоз). Мелкая сыпь с мокнутием и жжением. Варикозные язвы: легко возникает кровотечение, выделяется гной с запахом растения ферула вонючая; язвы заживают и возникают вновь, рецидивируют.

**Сон.** Пациент испытывает ужас во сне. Часто просыпается из-за холода в конечностях, особенно в коленях. Неосвежающий сон. Коматозный сон с хрипением в горле. Частая зевота и потягивание, от которых, как кажется пациенту, становится лучше.

**Лихорадка.** Чередование озноба и жара. **ЛЕДЯНОЙ ХОЛОД:** с одной стороны; на языке; в коленях; в голени; в стопах ночью. Теплая голова и холодные конечности. *Ощущение жгучего жара внутри:* в сердце, грудной клетке; в сочетании с холодной, как лед, кожей и холодным потом. Потливость. Пот кислый, холодный; хуже от кашля, в том числе на лице. Желтая лихорадка.

**Дополнительно.** Ars., CHIN., Kali-c, Lach., Phos.

**Диф. диагноз.** Am-c, Ars., Colch., Graph., Lyc.

## CARBOLICUM ACIDUM

**Общее.** Карболовая кислота обладает мощным антисептическим, раздражающим и обезболивающим действием. Она поражает *слизистые оболочки; сердце; кровь и органы дыхания*. Для отравления карболовой кислотой характерны *вялость (апатия), отсутствие болей, зловоние и распад*.

**ПРОСТРАЦИЯ** резко выражена, вплоть до паралича — с потерей чувствительности и способности двигаться. Выделения *зловонные, жгучие*. Ужасные боли появляются и исчезают внезапно. Обостренное обоняние — важный ключевой симптом. Ощущение покалывания, жжения. Злокачественные **и септические процессы**.

Физическое напряжение способствует возникновению абсцесса. Аци-дум карболикум показан при холере: если имеются показания для *Verat.*, но это средство не помогает. Коллапс. Кровянистый экссудат. Не может учиться, так как от чтения все симптомы усиливаются. Дрожание; неустойчивая, шатающаяся походка.

**Хуже.** От сотрясения. От чтения. При беременности. От расчесывания волос.

**Психика.** Психическая и телесная вялость; пациент не расположен учиться или выполнять какую-либо физическую работу.

**Голова.** Ощущение стягивания, как от давления резиновой ленты; лучше от зеленого чая и от курения. Ощущение, как будто во лбу горячий шар. Чувствительность кожи волосистой части головы. Головные боли появляются во время менструации.

**Глаза.** Тяжелая надглазничная невралгия — над правым глазом.

**Нос.** Обоняние крайне обострено. Озена сопровождается сильным запахом и образованием язв.

**Лицо.** БЛЕДНОСТЬ ВОКРУГ НОСА И РТА. Темное лицо.

**Рот.** Крайне зловонное дыхание, при запоре. Жжение изо рта распространяется в желудок.

**Горло.** Как будто покрыто глазурью. Нёбный язычок белый и сморщенный. Дифтерия: вонючее дыхание, регургитация жидкостей при глотании, но боли незначительные.

**Желудок.** Тошнота и рвота: в том числе при беременности, при морской болезни, при раке; рвотные массы темные или оливково-зеленые. Изжога. Желудок болезненный. Бродильная диспепсия сопровождается зловонным дыханием и скверным привкусом во рту. Страстное желание стимулирующих веществ или потребность в курении.

**Живот.** Метеоризм. Запор сопровождается втягиванием живота. В стуле содержатся пленки, похожие на обрывки слизистой оболочки. При мочеиспускании из заднего прохода выделяется слизь. Понос: стул в виде рисового отвара, вонючий.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная, зеленого цвета или темная, почти черная. Учащенное мочеиспускание ночью у стариков. Диабет. Альбуминурия.

**Женские половые органы.** Бели: густые, вызывающие зуд. Сильная боль поперек нижней части спины (поясницы), сопровождающаяся тянущим вниз, вдоль бедер ощущением; при смещении матки. Вонючие, едкие выделения, в том числе при эрозии шейки матки.

**Сердце.** Нитевидный пульс.

**Спина.** Тупая боль, ломота между лопатками.

**Кожа.** Везикулы и пустулы, сопровождающиеся жжением и зудом. Ожоги склонны изъязвляться. Рожистое воспаление. Кровянистые пузыри или гнойники.

**Сон.** Сильная сонливость.

**Лихорадка.** Обильный холодный пот.

**Диф. диагноз.** Kreos.

## CARBONEUM SULPHURATUM

**Общее.** Это средство отличается особым сродством к глазам. Оно применяется при потере зрения; прогрессирующем снижении зрения, сопровождающемся центральной скотомой. Цветовая слепота: пациент не различает красный и зеленый цвета, белый цвет различает. Отравление угарным газом.

## CARCINOSIN

**Общее.** Этот нозод готовят из карциномы. Кацинозин применяют для смягчения симптомов заболевания у пациента, в анамнезе которого имеется указание на карциному или в случае, если он страдает этим заболеванием в настоящий момент. Карцинозин может применяться в качестве промежуточного средства наряду с препаратом, для которого имеются показания.

## CARDUUS MARIANUS

**Общее.** Это, прежде всего, средство для лечения заболеваний печени и селезенки — оно показано при кровотечениях, связанных с поражением упомянутых органов.

Кардуус марианус действует на вены, приводя к застою крови, варикозному расширению вен и образованию язв. Болезни у шахтеров, сопровождающиеся затруднением дыхания. Отеки, связанные с застоем крови в системе воротной вены и в тазовых органах. Злоупотребление пивом. Слабость, утомление; хуже от еды и от езды; сопровождается частой зевотой. Колющие, тянущие, жгучие боли. Заболевания печени, сочетающиеся с болезнью легких.

Хуже. Лежа на левом боку. От пива. От еды. От прикосновения. От движения. В погребе, подвале.

Лучше. От кровотечения.

**Психика.** Пациент забывает, что он только что собирался сделать. Ипохондрия. Унылый, безрадостный.

**Голова.** Тупая боль в лобной области. Головокружение со склонностью падать вперед; лучше от носового кровотечения.

**Глаза.** Жжение и давление в глазных яблоках.

**Нос.** Привычное носовое кровотечение у молодых людей с псорическими чертами.

**Лицо.** Землистое, желтовато-серое или цветущее, румяное. Слабая верхняя губа.

**Рот.** Язык белый посередине, края красные, с отпечатками зубов. Язык слабый. Горький привкус во рту.

**Желудок.** Плохой аппетит. Тошнота, позывы на рвоту и *рвота зеленой кислой жидкостью* или кровью. Отвращение к соленому мясу.

**Живот.** *Печень переполнена кровью*, увеличена; ее край болезнен при пальпации, давлении. Желтуха. Колющая боль вблизи селезенки; хуже, когда пациент делает вдох, при наклоне. Колющая боль в печени усиливается, когда пациент лежит на левом боку. Заболевания печени приводят к болезням легких, сопровождающимся кровохарканьем. Камни желчного пузыря. Цирроз печени, сопровождающийся отеками. Вздутие живота и урчание в нем. Высокое стояние диафрагмы. Твердый, узловатый, затрудненный, *глинистый* стул. Кровоточащий геморрой. Профузный понос при раке прямой кишки. Мелена (стул черного цвета, как кофейная гуща). Ощущение движения в кишечнике, возле пупка, на выдохе.

**Мочевыделительная система.** Моча мутная; а также *золотисто-желтая*.

**Женские половые органы.** Хроническое маточное кровотечение при нарушении кровообращения в системе воротной вены.

**Дыхательные органы.** Боль *в грудной клетке*, распространяющаяся в плечи, спину, поясницу и живот; сопровождающаяся позывом на мочеиспускание. Астматическое дыхание. Кашель; в том числе с колющей болью в боковых отделах грудной клетки, с отхаркиванием кровянистой мокроты.

**Конечности.** Боль в тазобедренном суставе, распространяющаяся через ягодицы вниз, вдоль бедер; хуже при наклоне, пациенту трудно выпрямиться. Слабость в стопах, в том числе когда садится на стул. Тянущая боль во всей спине.

Кожа. *Разрыв или тромбоз вен*. Варикозные язвы.

**Лихорадка.** Озноб и лихорадка при желтухе.

**Диф. диагноз.** Calc, Sang.

## CASTOR EQUI

Общее. Растирания (тритурации) готовят из рогового нароста на рудиментарном большом пальце лошади. Это средство действует на кожу, вызывая ее утолщение, а также на ногти — они становятся хрупкими и выпадают. Болезненность костей, особенно большеберцовой и копчика.

Кастор экви — в высшей степени полезное средство при трещинах и изъязвлении сосков у кормящих матерей: соски становятся крайне чувствительными, не переносят прикосновения одежды. Молочные железы опухшие, чувствительные; хуже при спуске по лестнице. Зуд молочных желез, покраснение ареолы. Соски почти свисают. Бородавки на лбу и на молочных железах. Псориаз языка.

## CASTOREUM

**Общее.** Тинктуру готовят из секрета, содержащегося в препуциальном мешке бобра. Кастореум подходит *нервным*, истеричным женщинам, которых беспокоят спазмы, судороги, боли, слабость после тяжелой болезни. Это нервные женщины, которые не оправились полностью после болезни: они все время раздражаются, страдают от изнуряющих потов. *Слабость и недостаточная реакция*. Рефлекторные симптомы, связанные с поражением матки: нервного характера и спастические. Фибриллярные подергивания. Тяжесть во всем теле. Пациент постоянно зевает. Хорея. Эпилепсия. Нервное сердцебиение.

**Хуже.** От эмоций, переживаний. От холода. Во время менструации. От истощающего заболевания.

**Лучше.** От давления.

**Психика.** *Раздражительность*. Легко плачет. Меланхолия, полон тревожных ожиданий.

**Глаза.** Дневная слепота. Не переносит свет.

**Рот.** Язык опухший; подергивается. Круглые, как горошины возвышения посередине языка, красные в окружности. Язык чувствителен к прикосновению или к пище, тянущая боль в языке по направлению к подъязычной кости.

**Живот.** Колика или другие симптомы со стороны живота сопровождаются зевотой. *Колика сопровождается слабостью*; лучше от давления. Летний понос со стулом в виде зеленой слизи. Жесткая жажда, пациент никак не может ее утолить.

**Женские половые органы.** Жестокие рези при дисменорее: выделяется несколько капель крови, затем выступает холодный пот. Аменорея с болезненным вздутием живота.

**Сон.** Постоянная зевота в качестве сопутствующего симптома. Беспокойный сон: пациент видит страшные сновидения и вздрагивает. Зевает во сне.

**Лихорадка.** Зябкость сопровождается ледяным холодом в спине. Изнуряющие поты после лихорадки.

**Диф. диагноз.** Mosch., Valer.

## CAULOPHYLLUM

**Общее.** Это средство для лечения женских болезней, а также заболеваний суставов, особенно мелких. Каулофиллум показан при *ЛЕТУЧИХ БОЛЯХ*, которые ощущаются то в одном месте, то в другом, — болях

тянущих, судорожных, стреляющих, *ревматического характера*; они заканчиваются в шее, где появляется скованность. Многие жалобы связаны с патологией матки. Ощущение *внутреннего дрожания* в сочетании со слабостью. Пониженный тонус матки. Истерические или эпилептиформные судороги в пубертатном возрасте, при дисменорее. Паралегия после родов. *Истощение*. Общая слабость. Хорея в период полового созревания.

**Хуже.** При беременности. При подавлении менструаций. На открытом воздухе. От кофе.

**Психика.** Раздражительный, беспокойный и пугливый. *Нервный*. Возбудимый. Легко рассердить.

**Голова.** Голова болит вследствие заболевания матки или спинного мозга, сопровождается давлением за глазами; хуже при наклоне, от света, от полудня до ночи.

**Лицо.** Хлоазма, в том числе на лбу, в сочетании с белями. Тяжелые верхние веки: пациентка вынуждена поднимать их пальцами; бели.

**Рот.** Афты. Молочница (применяется местно и внутрь).

**Желудок.** Часто приходится сдерживать отрыжку — кислую, горькую, сочетающуюся с головокружением. Рвота при болезни матки.

**Женские половые органы.** Жестокие, перемежающиеся судорожные боли при скудных менструациях; отклонение матки назад (ретроверсия). **СХВАТКОБРАЗНЫЕ БОЛИ, ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ В ОБЛАСТЬ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ.** В родах схватки *СЛАБЫЕ И НЕРЕГУЛЯРНЫЕ*, прекращаются от изнеможения, или они слишком болезненные. *Ложные схватки.* Каулофиллум облегчает роды, в том числе когда пациентка истощена продолжительными родами. *Привычный выкидыш*, в том числе из-за гипотонии матки. Послеродовые схватки: после затяжных или истощающих родов. Ригидность шейки матки, боли в шейке матки, как от иголок. Обильные едкие бели; часто применяется у маленьких девочек. Менструации запаздывают. Чувствительность влагалища повышена, сильные спастические боли. Ме-норрагия, в том числе; после быстрых родов, кровотечение при этом очень сильное. Лохии обильные и продолжительные.

**Шея.** Скованность в шее. Голова наклонена влево.

**Конечности.** *Болезненные узлы в области суставов на пальцах рук. Ревматизм мелких суставов.* Режущая боль в суставах пальцев рук при сжимании пальцев. Болезненность, тупая боль в нижних конечностях перед менструацией. Паралегия после родов.

**Кожа.** Хлоазма, в том числе на шее.

**Лихорадка.** Ощущение, как будто тело переполнено кровью. Высокая температура.

**Диф. диагноз.** Cimic, Puls., Sep.

## CAUSTICUM

**Общее.** Химический состав препарата Каустикум все еще не определен, хотя считается, что это гидроокись калия, или едкое кали.

Это великий полихрест, воздействующий на *НЕРВЫ, двигательные и чувствительные*, и на *МУСКУЛАТУРУ*, произвольную и произвольную, а также на *МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ, гортань* и конечности.

Прогрессирующая *слабость*; снижение мышечной силы; нарастающее чувство неуверенности, связанное с потерей контроля над мышцами. В конце концов, наступает *ПАРАЛИЧ отдельных органов или частей тела*. Паралич: от воздействия холода; после дифтерии; вследствие отравления свинцом. Хронические ревматические заболевания сопровождаются контрактурами сухожилий и деформацией суставов.

Боли рвущие, тянущие, *жгучие* — в местах, за которые схватился рукой. *Болезненность, саднение. Дрожание, конвульсии, хорея* у нервных девушек; хуже во время менструации. Другими характерными симптомами являются содружественное подергивание, резкое сокращение мышц, вздрагивание и двигательное беспокойство. Спазмы в разных местах. Исхудание: вследствие болезни, испуга, забот, горя и продолжительной болезни. Дети поздно начинают говорить и ходить. Отсутствие чувствительности (анестезия). При эпилепсии пациент бежит по кругу, потом падает; в пубертатном возрасте. Пациент чувствителен и к жаре, и к холоду. Скованность в суставах.

Это средство подходит сломленным, измученным старикам или темноволосым, смуглым людям с жесткими, ригидными мышцами. Двигательное беспокойство ночью, особенно в голенях: они всегда в движении.

Последствия: ожогов пламенем и жидкостью, испуга, горя, забот, тревог, скорби, ночного бдения. Язвы, после неправильного лечения свинцом. Бородавки. Холодная вода повышает тонус мышц при параличе. Трещины возникают от незначительной причины — возле крыльев носа, на губах, в области ануса и т.д. Движения, как во время коитуса; при хорее. Пациент неловок, когда говорит, жуёт, ходит. Психические симптомы; а также конвульсии из-за подавления высыпаний. Ощущение, как будто холодная вода течет из ключицы вниз, к пальцам стоп.

**Хуже.** ОТ *ХОЛОДНОГО* или сырого воздуха. *От ветра*. От сквозняков. От крайних температур. При наклоне. От подавления высыпаний. От кофе. От жирного. В 3—4 ч утра или *ВЕЧЕРОМ*. От напряжения. При перемене погоды. После стула. От движения экипажа во время езды. В сумерки. В темноте. Когда держит что-нибудь, хватается за что-нибудь. От кислого. От купания в реке летом.

**Лучше.** ОТ ХОЛОДНОГО ПИТЬЯ (даже озноб уменьшается). При влажной, сырой погоде. От умывания. От тепла, в теплой постели. От спокойного движения.

**Психика.** Безднадежный, унылый, хочет умереть. Нечестолубивый. *Нервное истощение.* Тревожные предчувствия усиливаются в сумерки. Скрытный, сдержанный. Сильно сочувствует, необычайно участливый. Ребенок не хочет спать один; незначительная причина вызывает у него слезы. От мысли о болезни становится хуже, особенно при геморрое. Плачет, смеется, в том числе при хоре. Смеется до, во время или после спазмов. Пациентка испытывает угрызения совести, как будто совершила какое-то преступление. Печаль. Хнычет, жалуется. Подозрительный, недоверчивый; рассеянный. Пессимист. Не владеет собой, неуравновешен. Непроизвольно переставляет звуки в словах, путает буквы и звуки. Досадует, сердится из-за проблем на работе.

**Голова.** Пациент ощущает безболезненное сотрясение всей головы. Как будто между лобной костью и мозгом — пустое пространство; лучше от горячего компресса (аппликации). Пациент качает головой из стороны в сторону или совершает кивательные движения, или поворачивает голову вправо. Кожа головы кажется тесной, натянутой. Колотье в висках от нервного напряжения. Тошнота и рвота или слепота во время головной боли; затем наступает паралич. Головокружение; во время сна; ночью; утром; когда ложится, при наклоне; во время менструации; когда смотрит вверх. Мелкие круглые гладкие узелки на коже волосистой части головы или над переносицей.

**Глаза.** Искры и темные пятна перед глазами. Паралич одного века (правого). Тяжелые, нависающие веки. Птоз. Слабость прямых мышц — диплопия; уменьшается при взгляде вправо. Постоянная боль в глазах, пациент склонен их трогать и тереть: кажется, что от этого уменьшается давление в глазах. Зрение неясное, как будто пелена возникает перед глазами, когда пациент сморкается. Предметы кажутся слишком большими. Обильные едкие слезы. Катаракта. Пациент вращает глазами, в том числе при эпилепсии. Веки дрожат. Бородавки на бровях. Трещины в углах глаз. Глаза остаются открытыми; пациент не моргает; при параличе.

**Уши.** Звон, рев, пульсация в ушах при глухоте. Слова и шаги отдаются эхом в ушах. Жжение в ушах, они краснеют. Обильная, зловонная ушная сера, в том числе коричневого цвета. Болезнь Меньера. Густые, клейкие гнойные выделения из уха.

**Нос.** Насморк сопровождается охриплостью. Папулы на кончике носа. Старые бородавки. Чихание утром. Густые желтые или зеленовато-желтые выделения. Носовое кровотечение при судорогах, спазмах.

**Лицо.** Лицевая невралгия; лучше от холодной воды. Паралич лицевого нерва (справа); хуже при открывании рта. Боль в нижней челюсти, пациент не может открыть рот. Лицо желтое, вид болезненный. Судороги в губах. Кажется, что лицо покрытым мехом. Высыпания на лице.

**Рот.** Прикусывает внутреннюю поверхность щеки при жевании. Паралич языка: речь невнятная, говорит отрывисто, «конвульсивно». Опухание у корня языка. Кровоточивость десен. Рецидивирующий абсцесс десен — зубная фистула. Жирный привкус во рту. Десны рыхлые, отстают от зубов. Кажется, что зубы шатаются, стали длиннее; боль в зубах; хуже от холодного или теплого. Припухлость на внутренней поверхности щек; либо уплотнение. Язык красный посередине, покрыт налетом по краям. Болезненные пузырьки на кончике языка.

**Горло.** Постоянная потребность сделать глотательное движение, как будто горло слишком узкое. Когда глотает, пища попадает «не в то горло» или вытекает через нос. Симптомы со стороны горла усиливаются при наклоне. Затруднение глотания из-за паралича мышц горла; пациент не может откашлять слизь и глотает ее. Скрежет, жжет и саднит в горле.

**Желудок.** Отрыжки с жирным привкусом. Отрыжка соленой жидкостью. Отвращение к сладкому. Чувство, как будто в желудке гасят известь. Боль в желудке от воды со льдом. Ощущение шара, который подкатывается к горлу. Рвота кислым, затем — кислые отрыжки. От свежего мяса возникает тошнота; больше подходит копченое. Женщина чувствует себя голодной, но аппетит пропадает при виде пищи или от ее запаха, или при мысли о ней — у беременных. Кровавая рвота ночью. Кислая диспепсия.

**Живот.** Увеличен у детей. Колика, спастическая боль. Боль распространяется в спину и в грудную клетку; уменьшается при сгибании тела пополам; усиливается от малейшего количества пищи.

Стул: твердый, плотный; покрыт слизью, блестит, как будто масляный; мягкий и маленький, размером с луковку гусяного лука. Стул выделяется без усилия, когда пациент стоит.

Спазмы в прямой кишке при наклоне, сопровождающиеся позывом на мочеиспускание. Выпадение ануса при кашле. Зуд в заднем проходе уменьшается от холодной воды. Мелкие твердые пустулы вокруг ануса. Большие геморроидальные узлы, препятствующие выделению кала; хуже от ходьбы, стоя, при мысли о них. При наличии свища ощущается пульсация и боль в промежности. Прямая кишка нечувствительна к твердому стулу. Понос от холода. Болезненное опухание пупка. Запор с частыми безрезультатными позывами.

**Мочевыделительная система.** Паралич мочевого пузыря после длительной задержки мочи с последующим недержанием мочи (во сне или у школьников). НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ: ПРИ КАШЛЕ, ходьбе, когда сморкается, чихает. Задержка мочи: после родов, после хирургических операций. Жжение в уретре при мочеиспускании; хуже после коитуса. Моча выделяется по каплям или медленно. Нечувствительность уретры во

время мочеиспускания. Моча выделяется лучше в положении сидя. Недержание мочи (энурез): во время первого сна; ночью. Моча черная, мутная, белая. Зуд наружного отверстия уретры.

**Мужские половые органы.** Повышенное образование смегмы в области головки полового члена. Во время коитуса выделяется кровянистая сперма. Красные пятна на половом члене. Ощущение болезненности в яичках, как при ушибе.

**Женские половые органы.** Отвращение к половому акту. Для менструаций характерно: выделение крови только днем; кровь смешана со сгустками; кровотечение скудное, сопровождается лицевой невралгией. Бели: обильные, выделяются ночью, сопровождаются выраженной слабостью. Слабость родовой деятельности. Жгучая боль, саднение в промежности после мочеиспускания. Бели имеют такой же запах, что и менструальная кровь. Дисменорея сопровождается рвущими болями в спине и бедрах. Тревога, грусть и слабость во время менструации. Грезы во время менструации. Менструации задерживаются, обильные. Колющая боль ниже левой молочной железы, в том числе при дисменорее.

Соски болезненные, потрескавшиеся, окружены герпетическими высыпаниями. Исчезновение молока: вследствие утомления, ночного бдения или тревоги. Сильный зуд в области молочных желез у кормящих матерей.

**Дыхательные органы.** Афония либо *охриплость*: сопровождаются болью в грудной клетке; хуже в первой половине дня — до полудня; возникают у ораторов, певцов; хуже при наклоне; лучше от разговора.

Кашель: гулкий, жесткий, сухой; возникает во время беременности; начинается из-за щекотания в яремной ямке или гортани; кашель непрекращающийся; сухой кашель — ночью и утром; усиливается от наклона, от тепла постели, от холодного воздуха; уменьшается, когда пациент пьет глоточками холодную воду. Не может откашлять мокроту из нижних отделов дыхательных путей: *мокрота соскальзывает обратно*; она скудная; жирная, тягучая, как мыльная пена, приходится ее глотать.

Болезненная полоса в гортани. Ощущение болезненного стеснения в груди, стеснения в верхней части туловища. Одышка перед кашлем. Симптом «кошачьего мурлыканья», дрожание грудной клетки. Блуждающие боли в грудной клетке уменьшаются от давления, усиливаются от чихания. Боль в гортани усиливается, когда пациент сморкается. Стесненное дыхание во время разговора или при ходьбе. Ощущение стеснения или царапанья в груди.

**Сердце.** Сердцебиение сопровождается болью в грудной клетке, жжением и вялостью.

**Шея и спина.** Скованность в шее или спине при вставании со стула. Скованность в шее: едва может повернуть голову. Боль из спины распространяется вперед или в бедра. Боль в позвоночнике усиливается при глотании. Боль в боках (в области крыльев таза) усиливается от кашля. Кривошея. Боли, как от ушиба, пронзающие — в области копчика. Спазмы в поясничной области и ягодице.

**Конечности.** При параличе языка возникает ощущение, что правая рука парализована. Паралич дельтовидной мышцы, пациент не может поднять руку к голове. Дрожание кистей. Писчий спазм. Онемение кистей. Ощущение полноты в руках возникает в момент, когда берется, хватается за что-нибудь. Распирающие, разрывающие боли в кончиках пальцев рук; бородавки на них. Судороги в икроножных мышцах, в стопах, в пальцах ног и в ахилловых сухожилиях.

Неустойчивая походка, пациент легко падает; (в том числе, у детей). Слабые голеностопные суставы. Рвущие ревматические боли в конечностях уменьшаются от тепла; в теплой постели. Хруст и ощущение напряжения в коленных суставах. Склонность потягиваться, сгибать конечности или хрустеть суставами. Скованность в области подколенной ямки; хуже сидя; лучше от продолжительной ходьбы. Жжение в суставах. Контрактуры сухожилий. Скручивание и подергивание конечностей; хорея. Деформирующий артрит. Хруст в коленях сильнее при ходьбе и при спуске по лестнице. Беспокойство в ногах ночью. Боли в голених, как разряды электричества. Не может стоять на пятках. Панариций большого пальца стопы.

**Кожа.** Трещины, язвы. Болезненность в складках кожи. Бородавки: зернистые; большие, с зубчатым краем, кровоточащие, изъязвляющиеся; бородавки на кончиках пальцев рук, на носу, на веках, на бровях. *Зуд кожи. Глубокие ожоги и их последствия.* Рубцы лопаются, растрескиваются. Склонность к опрелости кожи при прорезывании зубов.

**Сон.** Частые движения рук и ног во время сна. Пациент смеется и плачет во сне. Выраженная сонливость, стоит труда не заснуть. Зевает и потягивается. Бессонница ночью с ощущением сухого жара, беспокойством. Просыпается от малейшего шума. Зевота: когда слушает или обращает внимание на кого-нибудь.

**Лихорадка.** Ощущение холода, не уменьшающееся от тепла. Потоотделение возникает около 4 ч утра; потеет сильно, от малейшего напряжения; на открытом воздухе. Чувство жара вечером, с 18 до 20 ч. Ощущение холода: с левой стороны, в больной части тела, при боли. Приливы жара с последующим ознобом.

**Дополнительно.** Carb-v., Graph., LACH., STANN., Staph.

**Диф. диагност.** Gels., Kal-bi., Phos., Rhus-t., Sep.

## CEANOTHUS

**Общее.** Отличительная особенность Цеанотуса — это его влияние на селезенку: она увеличивается чрезвычайно. Боль в левом подреберье; в том числе, сопровождающаяся одышкой, поносом, обильными менструациями или их задержкой (подавлением), беями. Менструации возникают каждые две недели. Анемия у пациентов с поражением печени и селезенки. Лейкоз. Увеличение печени. Моча зеленая, пенная. Периодическая невралгия.

**Хуже.** В холодную погоду. Лежа на левом боку. От движения.

**Дополнительно.** Nat-m.

**Диф. диагноз.** Chin.

## CEDRON

**Общее.** Невралгии, возникающие *С ЧЕТКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ*, — наиболее яркий признак Цедрона. Это средство подходит людям сладострастным, с возбудимой нервной системой. Цедрон является антидотом при укусах змей и насекомых. Недомогания после коитуса: хорея — у женщин, невралгия — у мужчин. Дрожание. Онемение всего тела. Малярия во влажной, теплой, болотистой местности. Конвульсии во время менструации. Лектофобия (страх постели).

**Хуже.** *Периодически*; в один и тот же час. На открытом воздухе. Когда ложится. Перед бурей. После сна.

**Лучше.** Стоя прямо.

**Голова.** Глазничная невралгия. Безумное чувство, возникающее из-за боли, проходящей поперек лба. При головной боли все тело кажется онемевшим. Пациент заикается после коитуса. Голова кажется опухшей.

**Глаза.** *Жжение в глазах, как от огня.* Сильная боль в глазных яблоках и боли, расходящиеся вокруг глаз; текут обжигающие слезы. Ирит. Хориоидит. Глаза красные. Боль над глазом усиливается после коитуса. Предметы ночью кажутся красными, днем — желтыми.

**Конечности.** Острая, внезапная боль из возвышения большого пальца правой руки, поднимающаяся вверх, вдоль руки к плечу; похожее ощущение возникает в правой стопе и колене — из-за этого женщина падает на пол.

**Лихорадка.** Возбуждение перед ознобом. Малярия.

**Диф. диагноз.** Aran.

**СЕРА** - см. ALLIUM CERA

## CHAMOMILLA

**Общее.** Это средство соответствует в высшей степени *ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ, ТЕМПЕРАМЕНТНЫМ И КРАЙНЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЛЮДЯМ*. Повышенная чувствительность в результате злоупотребления кофе или наркотиками. Хамомила в особенности показана для лечения беременных женщин, сиделок, медицинских сестер и маленьких *ДЕТЕЙ*.

*Скверный характер; безумная раздражительность и придирчивость. Боль невыносима; пациентка сходит с ума от боли* или преувеличивает свои страдания и *теряет от боли силы*. Очень несговорчивый, своенравный пациент, ему трудно угодить. Беспокойно мечется. Горько рыдает, кричит или ходит взад и вперед. Пациент требует, чтобы немедленно облегчили его страдания; он скорее умрет, чем будет страдать.

Психические и телесные симптомы возникают в виде пароксизмов: *раздражительность, двигательное беспокойство, КОЛИКА*, кашель и т.д. *Онемение; после боли; при пробуждении*. Повторяющиеся спазмы мышц лица, рук, ног и т.д. Колика, понос, желтуха, подергивание мышц и конвульсии после гнева. Нервно-артритический или мочекишный диатез. *Судороги, спазмы*: сопровождаются рвотой желчью; возникают в мышцах. Конвульсии при прорезывании зубов. Пациент *жаркий и страдает от жажды. Горячий пот при болях*. Хамомила — это гомеопатический опиум.

Последствия плохого поведения, дурного нрава. Во время конвульсий тело становится скованным, деревенеет; возникает опистотонус; глаза вращаются, лицо искажено; большие пальцы на руках загнуты внутрь.

**Хуже.** *ОТ ГНЕВА. НОЧЬЮ. ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ.* От холодного воздуха, от влажного воздуха. От ветра. Когда простужен. *ОТ КОФЕ. От наркотиков.* От алкоголя. Лежа в постели. От музыки. От отрыжек. От жара. От теплой пищи, если тепло укроется. От прикосновения. Когда на него смотрят.

**Лучше.** *КОГДА НОСЯТ НА РУКАХ.* При мягкой погоде. От жары, от горячего. *От потоотделения.* От холодных аппликаций (компрессов).

**Психика.** *БЕЗОБРАЗНОЕ поведение: НЕСГОВОРЧИВЫЙ, СВОЕНРАВНЫЙ и ГРУБЫЙ человек. ВЗДОРНЫЙ, СКЛОЧНЫЙ.* Сердится из-за любого пустяка. Резкий. *Не желает, чтобы с ним разговаривали или прикасались к нему; либо смотрели на него.*

*ДЕТИ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ИХ НОСИЛИ НА РУКАХ* и ласкали. *Требуется много разных вещей, но когда получает желаемое, отвергает его.* Жалобно причитает из-за того, что не может получить желаемое. Не хочет

разговаривать. Пропускает слова, когда пишет или говорит. Перед менструацией женщина вдруг становится капризной, вздорной, упрямой. Торопливый, спешит. Не выносит, когда рядом с ним кто-то есть.

**Голова.** Пульсирующая головная боль в одной половине мозга; склонность запрокидывать голову назад. Когда дрожит, возникает ощущение, что волосы встали дыбом. Горячий, липкий пот на лбу и на коже волосистой части головы, в том числе, во сне — волосы становятся мокрыми. Головная боль у нежных женщин, страдающих от переутомления. Головная боль уменьшается, когда мысли чем-то заняты. Головная боль усиливается утром и в 21 ч.

**Глаза.** Конъюнктивит желтый. Спастическое смыкание век. Выделение кровянистой жидкости из глаз у новорожденных детей.

**Уши.** Область уха чувствительна к холодному ветру или к шуму. Боль в ухе с ощущением, как будто что-то втыкается, уменьшается от тепла. Кажется, что уши заложены. Слышит ночью голоса отсутствующих людей. Звон в ушах после кровоизлияний. Рев в ушах, как от стремительно несущейся воды. Музыка невыносима. Ощущение, как будто из ушей течет горячая вода.

**Нос.** Крайне повышенная чувствительность ко всем запахам. Горячие выделения из носа, сопровождающиеся заложенностью носа; пациент не может спать. Кожа сморщена на носу. Ощущение, как будто в носу что-то ползает, доводит до слез.

**Лицо.** Опухание или **ПОКРАСНЕНИЕ ЩЕКИ**. Одна щека красная и горячая, другая — бледная и холодная. Лицо бледное, осунувшееся; искажено от боли. Лицевая невралгия, сопровождающаяся появлением горячего пота на голове; боль распространяется в ухо. Подергивание мышц лица. Чувство усталости в челюстях. Лицо потеет после еды или питья.

**Рот.** Зубная боль усиливается от теплого питья; а также во время беременности, от кофе. Подергивание мышц языка. Густой бело-желтый налет на языке. Слюнотечение ночью, слюна сладковатая. Зловонное, кислое дыхание. Горький привкус во рту. Зубы кажутся удлиненными.

**Горло.** Пациент не может проглотить твердую пищу, когда лежит. Ощущение сжатия или пробки в горле.

**Желудок.** Отрыжка с запахом тухлых яиц. Сильная рвота горечью, желчью сопровождается сжимающей болью. Рвота после употребления морфина. Гастралгия с ощущением, что на области желудка лежит камень. Потоотделение после еды и питья. Жажда: холодной воды; кислых напитков. Отвращение к кофе. Жестокие позывы на рвоту перед тем, как она начнется.

**Живот.** Вздутие живота. **ПРИСТУПЫ КОЛИКИ**; возникают время от времени. Боль перемещается из одной стороны тела в другую; или распространяется вверх; в том числе после гнева. *Рези* при наличии газов в кишечнике усиливаются ночью; при мочеиспускании; уменьшаются от теплых аппликаций.

**СТУЛ:** горячий, **КИСЛЫЙ**; **КАК ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА**; **СЛИЗИСТЫЙ**; **КАК БУДТО РУБЛЕННЫЙ**; желтый, зеленый; или содержит **ПОЛУПЕРЕВАРЕННУЮ ПИЩУ**; пахнет тухлыми яйцами.

Понос: при прорезывании зубов, от холода, от гнева. Желтуха, в том числе после гнева. Во время колики щека краснеет, появляется горячий пот. Ощущение, как будто кишки завязаны в узел, а живот пустой.

Задний проход опухший, выпячивается. Геморрой в сочетании с болезненными трещинами ануса.

**Мочевыделительная система.** Моча горячая и желтоватая. Колотье в уретре.

**Женские половые органы.** Нерегулярные, неритмичные схваткообразные боли; распространяющиеся вверх; а также вниз, вдоль внутренней поверхности бедер; сопровождаются выделением большого количества свернувшейся темной крови.

Экламптические судороги (после родов), конвульсии от гнева. Мучительные послеродовые схватки. Молочные железы болезненные, соски воспалены и очень чувствительные. Спазмы, возникающие во время кормления ребенка. Чувствительность молочных желез у младенцев.

Желтые, темные, в виде комочков, едкие бели. Мембранозная дисменорея, особенно в пубертатном возрасте. Материнское молоко плохое, ребенок не сосет. Дисменорея: от гнева или эмоций, переживаний у женщин, прежде не страдавших этим расстройством, в сочетании с сексуальным возбуждением. Считается темная зловонная кровь, изредка изливается ярко-красная кровь. Меноррагия сопровождается выделением черных сгустков, при этом кровотечение обильное, конечности холодные, беспокоит сильная жажда. Невыносимые родовые схватки; женщина прогоняет врача и сиделку, потом зовет их снова. Лохии слишком обильные и кровянистые или подавлены.

**Дыхательные органы.** Приступы сухого, щекощущего кашля. Астма; в том числе от гнева; хуже в сухую погоду, лучше — запрокинуть голову назад. Клокотание слизи в груди у ребенка. Гнев способствует возникновению кашля, в том числе у детей. Коклюш: кашель сопровождается удушьем, после него возникает рвота. Кашель усиливается в 21—24 часа; во время сна; ребенок не просыпается от кашля.

**Спина.** Сильные боли в пояснице и в боку (в области крыла таза) на стороне, противоположной той, на которой лежит пациент. Прострел (люмбаго).

**Конечности.** Онемение и скованность в кистях, когда хватается за что-нибудь, берет в руки. Судороги в икроножных мышцах. Жестокие ревматические боли, вынуждающие пациента встать ночью с постели; боли



заставляют пациента прохаживаться. Жжение в подошвах ночью. Лодыжки слабеют, «отказывают» после полудня. Пациентке кажется, что при ходьбе она опирается на кости голеней. Стопы, как будто парализованы, не может ступить на них ночью. Сухие ладони.

**Сон.** Сонливость, дремота; стоны, плач и причитания во сне. Из-за боли прерывается сон. Бессонница вследствие злоупотребления наркотиками. Спит, раздвинув бедра. Сонливость, но уснуть не может.

**Кожа.** Сыпь у младенцев и у кормящих матерей. Желтуха. Жжение, саднение в язвах ночью. Кожа не здоровая, каждая ранка нагнаивается.

**Лихорадка.** Зябкий, и все же быстро перегревается; поэтому простывает. Одна часть тела холодная, другая — горячая; сильнее, если раскроется, разденется. Чередование озноба и жара. Пациента лихорадит из-за подавления выделений. Пот на голове. Жажда при лихорадке.

**Дополнительно.** BELL., Mag-c, Sanic.

**Диф. диагноз.** Nux-v., Staph.

## HELIDONIUM

Общее. Это преимущественно средство для лечения *правосторонних* симптомов. Оно действует *на печень; систему воротной вены; правую часть живота* и нижнюю долю правого легкого.

Хелидонииум очень близок *Лус*: когда создается впечатление, что пациенту подходит *Лус*, но он не оказывает эффекта, следует дать Хелидонииум.

**ЖЕЛТУШНОСТЬ и нарушения в системе желчевыделения** — характерные признаки этого средства. Постоянная боль у нижнего угла правой лопатки — это его главное показание для назначения Хелидонииума. Боли стреляющие, распространяются *назад* или во всех направлениях. Колющие боли при наличии серозного выпота. Чувство *тяжести*, скованности, болезненности, паралича, вывиха или разбитости. Онемение. Отмечается выраженная общая вялость, болезненная сонливость и нежелание сделать какое-либо усилие. Пациент испытывает ужас перед движением. Чувствует усталость от малейшего напряжения. Осложнения со стороны желчевыделительной системы: во время беременности, при заболеваниях легких. Желтуха.

**Хуже.** *От движения. От кашля.* От прикосновения. *При перемене погоды.* От северо-восточного ветра. В 4 ч утра и в 16 ч. При взгляде вверх.

**Лучше.** *От горячей пищи.* От еды. От обеда. От молока. От давления. От горячей ванны. Если прогнуться назад. Лежа на животе.

**Психика.** Отвращение к умственному напряжению или к разговору. *НУ* ны-лый, подавленный. У пациентки тревога, сопровождающаяся ощущением, что она совершила преступление; страх сойти с ума. Склонна плакать, когда в плохом настроении или без всякой причины. Двигательное беспокойство; а следовательно, подвижность.

**Голова.** Головокружение: ощущается в макушке; усиливается, когда пациент закрывает глаза; сопровождается рвотой желчью и болью в печени. Головная боль распространяется назад. Тяжесть в затылке, как от свинца; *ледяной холод в затылке, возникающий в задней части шеи.* Невралгия над правым глазом, в правой скуловой кости и в правом ухе, сопровождающаяся сильным слезотечением. Череп кажется слишком маленьким.

**Глаза.** Грязно-желтый цвет склер. Ощущение болезненности в глазах усиливается, когда пациент смотрит вверх. Ослепительно-яркое пятно перед глазами. Слезотечение; в том числе, когда пристально смотрит, при боли в глазах или из-за щекотания в гортани. Слизь в глазах. При лицевой невралгии пациент не может открыть глаза.

**Уши.** В обоих ушах ощущение, как будто вырывается ветер или что-то выползает из ушей. Слух пропадает при кашле.

**Нос.** Красный. *Раздувание крыльев носа.* Заложенность носа при болезни печени. Кончик носа опухший и красный. Сухость в носу.

**Лицо.** Темно-красное или *желтоватое, осунувшееся.* Желтое лицо, особенно лоб, нос и щеки. Кажется, что правая скуловая кость опухла, при этом в ней ощущается разрывающая боль. Приливы жара к лицу. Высыпания на лице в виде узелков (узловатые).

**Рот.** Горький привкус во рту. *Язык: желтый*, с отпечатками зубов; большой, дряблый. Отвратительный запах изо рта. Язык узкий, заострен. Слюнотечение при тошноте, головокружении. Во рту скапливается горькая жидкость.

**Горло.** Ощущение удушья: усиливается при дыхании; пациент давится, как будто в спешке что-то глотает; или как будто проглотил слишком большой кусок. Левосторонний зуб.

**Желудок.** Страстное желание молока, пикантной или горячей пищи и питья. Тошнота уменьшается от питья молока. Рвота уменьшается от питья очень горячей воды. Боли в желудке грызущие, скребущие; уменьшаются *ОТ ЕДЫ.* Ощущение, как будто пробка в желудке. Отвращение к мясу; к кофе, сыру. Отсутствие аппетита.

**Живот.** Чувствительность области эпигастрия. **БОЛИ ИЗ ПЕЧЕНИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НАЗАД; или сосредотачиваются в области угла правой лопатки.** Печень увеличена; чувствительная. Камни желчного пузыря.

Живот как будто сжат в поперечном направлении, перетянут веревкой. Стул: тестообразный (вязкий), бледный, ярко-желтый, глинистый или в виде твердых шариков. Чередование поноса и запора. При асците ладони желтого цвета. Ощущение ползания мурашек и зуд в прямой кишке. Ощущение, как будто в эпигастрии извивается что-то живое. Пупок втянут при колике.

**Мочевыделительная система.** Обильная, желтая, пенистая, как пиво, моча. Спастическая боль в правой почке и в печени. Моча оставляет на пеленке темно-желтые пятна.

**Мужские половые органы.** Частые эрекции, даже в течение дня. Боль в головке полового члена. Зуд с ощущением ползания мурашек в области мошонки и головки полового члена.

**Женские половые органы.** Менструации слишком поздние и слишком обильные. Желание необычной пищи во время беременности. Бели белого цвета, оставляют желтые пятна на белье. Жжение во влагалище; повторяется в одно и то же время в течение дня.

**Дыхательные органы.** Одышка и ощущение стеснения, сжатия в груди, одежда кажется слишком тесной; лучше, когда глубоко дышит. Одышка усиливается при мочеиспускании. Когда пациент делает глубокий вдох, возникает давящая боль в грудной клетке. *Кашель: как от пыли; он сопровождается большим количеством хрипов, но скудной мокротой; или мокрота вылетает изо рта.* Боль глубоко в груди или ощущение гвоздя, торчащего глубоко в правой половине грудной клетки. Желчная пневмония (печеночной природы, сопровождается поражением желче-выводящих путей). Симптомы со стороны дыхательных органов сопровождают печеночные симптомы. Давление в гортани, как будто воздух не может пройти через нее. Колотье в груди.

**Сердце.** Бешеное сердцебиение, сопровождающееся ощущением сжатия в груди. Периодическое сердцебиение.

**Шея и спина.** Боль сосредоточена под внутренним и нижним углом правой лопатки; она может распространяться в грудную клетку и желудок, вызывая тошноту или рвоту. Боль распространяется из шеи в висок, в том числе правый. Давящая боль в позвонках усиливается при запрокидывании головы и при ее наклоне вперед. Тяжесть в затылке сочетается с болью в спине справа. Ощущение, как будто веревка завязана вокруг шеи. Невралгия в области шеи и плеча.

**Конечности.** Конечности очень болезненны при прикосновении к ним. *Кон-чики пальцев холодные.* Боль в пятках, как от давления слишком тесной обуви. Жжение и скованность в правом колене усиливается при движении. Кажется, что конечности парализованы. Тяжесть в нижних конечностях. Скованность в голеностопных суставах. Отек в области лодыжек и стоп. Парез нижних конечностей, сопровождающийся ригидностью мышц. Одна стопа холодная, другая — горячая.

**Кожа.** Желтая. Зуд, уменьшается от еды. Болезненные папулы и пустулы. Кожа сморщенная.

**Сон.** *Летаргический сон. СОНЛИВОСТЬ и зябкость.* Во сне видит трупы и похороны. Пациент испытывает сонливость, но уснуть не способен. Пациент засыпает, когда говорит.

**Лихорадка.** Жгучий жар распространяется из кистей по всему телу. Потоотделение, не приносящее облегчения, пациент не желает раскрыться. Потоотделение: во сне, после полуночи, от незначительного напряжения. Колебания температуры тела. Высокая температура.

**Дополнительно.** LYS, Merc-d.

**Диф. диагноз.** Bry., Kali-bi., Merc, Op.

## CHENOPODIUM ANTHELMINTICS

**Общее.** Также, как и *CheL*, Хеноподиум вызывает тупую боль ниже угла правой лопатки, но ближе к позвоночнику. Это средство показано при апоплексии (геморрагическом инсульте), с последующим возникновением правосторонней гемиплегии и афазии. Хриплое дыхание с клототанием, как от болтающегося в трахее шарика. Тяжелое дыхание, сопровождающееся раздуванием щек.

Пациент повторяет одно и то же действие снова и снова. Нарастающая глухота с ухудшением восприятия человеческого голоса наряду с высокой чувствительностью к звукам, например, проезжающих автомобилей, к отдаленным звукам. Паралич: сопровождающийся спазмом мышц-сгибателей предплечья и кисти; сопровождающийся контрактурами конечностей. Желтуха. Отогенное головокружение. Болезнь Меньера. Моча: обильная, пенистая, желтая, жгучая.

## CHIMAPHILA UMBELLATA

**Общее.** Это растение действует, главным образом, на почки и мочевой пузырь, способствуя возникновению песка в почках, а также острого или хронического катара мочевого пузыря (цистита). Кроме того, Химафила оказывает влияние на мезентериальные лимфатические узлы, *простату*, молочные железы и печень. Это средство полезно при отеках почечного и печеночного происхождения. Это женщины с большими молочными железами или полнокровные, страдающие дизурией. Начинаясь или прогрессирующая катаракта.

**Хуже.** От сырого холода. Стоя. Сидя, в том числе на холодных камнях. В начале мочеиспускания.

**Лучше.** При ходьбе.

**Голова.** Боль в области лобного бугра.

**Глаза.** Ореол (гало) вокруг источника света. Колющая, как ножом, боль в левом глазу, сопровождающаяся слезотечением.

**Рот.** Чувство скованности в челюстях, пациент не может закрыть ночью рот; спит с открытым ртом. Зубная боль, как будто зуб осторожно тянут; хуже после еды или от напряжения; лучше от холодной воды.

**Мочевыделительная система.** Моча *ВЯЗКАЯ, ТЯГУЧАЯ или слизисто-гнойная, зловонная; скудная; густая; мутная.* Пациент вынужден тужиться, пока не потечет моча. Острый простатит с задержкой мочи и дизурией, а также с *ощущением шара в промежности*; с ощущением, как будто *сидит на шаре*. Гонорейный простатит. Трепетание в области почки. Тенезмы мочевого пузыря: хуже сидя; лучше при ходьбе. Моча отходит только когда пациент стоит расставив ноги, наклонив туловище вперед. Острое воспаление мочевыводящих путей. Задержка (подавление) мочи у младенцев. С мочой выделяются сгустки крови.

**Женские половые органы.** Болезненная опухоль в молочной железе; сопровождается секрецией молока; возникает у женщин с крупными молочными железами, сопровождается резкой болью, проходящей сквозь молочную железу. Быстрая атрофия молочных желез.

**Дополнительно.** Kali-m.

**Диф. диагноз.** Verb., Coc-c, Sabal.

## CHINA OFFICINALIS

**Общее.** Хина была первым средством, которое испытал Ганеман. Она поражает *кровь*, делая ее более жидкой, вызывает малокровие. Хина делает слабым сердце и нарушает *КРОВООБРАЩЕНИЕ*, способствуя возникновению конгестии и *КРОВОТЕЧЕНИЙ*; анемии, крайней слабости и коллапса.

*Слабость* в случае Хины является следствием *ОБИЛЬНЫХ ИСТОЩАЮЩИХ ВЫДЕЛЕНИЙ*: потери жизненных соков, сильного нагноения, поноса, кровотечений и т.д. *ПЕРИОДИЧНОСТЬ*, ритмичность очень характерны для лихорадки и невралгии. Пациент становится *слабым, чрезмерно чувствительным и нервным*; все раздражает его: *свет, шум, запахи, боль и т.д.* Боль с *ощущением распираания, разрывающая боль*.

Невралгия. Отеки после потери жидкости, кровотечений. Исхудание, особенно у детей. Анемия. Плотные отеки, плотное припухание. Ревматизм. Сепсис. После кровотечения кровоточивший орган воспаляется и быстро чернеет. Конвульсии во время кровотечений. Обильные кровотечения; сопровождающиеся потерей зрения, слабостью и звоном в ушах. Боли после хирургических операций, связанные с кишечными газами, не уменьшающиеся после отхождения газов.

Последствия: мастурбации, неприятностей, воздействия холода, прекращения насморка, употребления чая, алкоголя, лечения ртутью. Абсцесс поясничной мышцы (Psoas abscess). Это средство подходит худым, сухим, желчным людям. Раны чернеют, возникает гангрена. Эпилепсия; хорея; паралич, в том числе вследствие потери жидкостей.

**Хуже.** *ОТ ПОТЕРИ ЖИЗНЕННЫХ СОКОВ. ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ. От сотрясения. От шума. ПЕРИОДИЧЕСКИ; через день. От холода. От ветра, сквозняка.* На открытом воздухе. От еды. *От фруктов.* От молока. От некачественной воды. От испорченного мяса, рыбы. От чая. От нервного напряжения. Во время и после стула. От курения. Осенью. Летом.

**Лучше.** *От сильного давления.* В свободной одежде. Согнувшись пополам. В помещении, в теплом помещении.

**Психика.** Непослушный; упрямый; испытывает отвращение ко всему. Навязчивые идеи: что он несчастлив; что его преследуют враги. Склонность обижать других людей, причинять им боль. Страх собак и других животных, в том числе ночью. Будучи веселым, вдруг начинает плакать и беспокойно метаться. Плохое настроение усиливается, когда его жалеют и ласкают. Отвращение ко всякому умственному и физическому труду. Строит воздушные замки. Безразличие, печаль, нежелание жить. Хочет покончить с собой, но не хватает смелости. Неохотно разговаривает. Делает ошибки в речи и письме. Непроизвольно переставляет звуки в словах. Теряет контроль над своим разумом.

**Голова.** Распирающая боль с ощущением, что голова лопнет, пульсирующая боль, сопровождающаяся пульсацией сонных артерий. Ощущение, что мозг плещется, переливается в черепе туда-сюда, вызывающее боль; боль в мозгу, как от ушиба, сильнее в висках.

Головокружение: пациент падает назад при ходьбе. Колотье из виска в висок. *Болезненная чувствительность* кожи волосистой части головы; хуже от прикосновения или причесывания волос. Головная боль: усиливается на солнце; уменьшается от движения головой вверх-вниз, от сильного давления, от растирания. Голова потеет при ходьбе на открытом воздухе. Тяжесть в голове.

**Глаза.** Синевя вокруг глаз. Ночная слепота из-за обескровливания (анемии) сетчатки. Обжигающие слезы. Давление в глазах, как при сонливости. Черные пятна перед глазами. Зрачки расширены. Периодическая (пере-межающаяся) цилиарная невралгия. Саднит, щиплет, как от соли. Колющие боли, как от песка. Глаза болят при чтении и письме.

**Уши.** Красные, горячие. Звон в ушах, в том числе при головной боли. *Шум в ушах*; затем — головокружение. Колющая боль в ушах. Тугоухость. Зловонные гнойные, кровянистые выделения.

**Нос.** Вредные последствия подавления насморка (ринита), в том числе головная боль. Привычные кровотечения из носа, особенно утром, когда встает с постели. Обоняние слишком обострено. Холодный пот в области носа. Нос горячий, красный. Жестокое чихание, когда сухо в носу и нет насморка.

**Лицо.** Землистое, болезненное, бледное; «маска Гиппократова», синева вокруг глаз. Лицо одутловатое; может быть красное. Губы сухие, черноватые, сморщенные. Набухание вен. Горячее красное лицо в сочетании с холодными руками. Лицо румяное: после кровотечения; после сексуального экстаза или потери физиологических жидкостей организма; во время комы.

**Рот.** Зубная боль у матери во время кормления ребенка грудью; лучше, когда стискивает зубы и от тепла. Зубная боль, сопровождающаяся потоотделением. Горький привкус у пищи, даже у воды, или пища кажется слишком соленой. Язык: толстый, с грязным налетом; жжение в кончике языка, после которого возникает слюнотечение. Во рту *горький привкус*, соленый или резкий. Десны опухшие.

**Желудок.** *Горькие* или кислые отрыжки после молока. Страстное желание: деликатесов; кислого или сладкого; остро приправленной пищи; хочется разного, сам не знает чего (ребенок). Быстро насыщается. Отсутствие аппетита (*анорексия*), пациент все время чувствует сытость, испытывает отвращение к любой пище, к хлебу, сливочному маслу, кофе. Волчий аппетит у истощенных детей. *Громкая отрыжка, не приносящая облегчения*. Замедленное пищеварение. Молоко не усваивается, от него хуже. Чувство тяжести после того, как немного поест. Болезненные последствия употребления чая. Ощущение холода в желудке. Жажда холодной воды, от которой усиливается понос. Пульсация и урчание в эпигастрии. Частая рвота. Икота. Кровяная рвота. Желудок болезненный. Брожение после фруктов. Жажда при нормальной температуре тела, а также перед ознобом. Голоден, и все же аппетита нет; только во время еды появляется желание немного поесть и нормальное восприятие вкуса пищи.

**Живот.** Печень и селезенка увеличены. *Вздутие живота кишечными газами*; уменьшается от движения. Колики уменьшаются от сгибания тела пополам. Боли после хирургических операций вследствие метеоризма; не уменьшающиеся после отхождения газов. Жар в животе, как будто в нем течет горячая вода. Периодически возникающие печеночные симптомы. Боль, распространяющаяся из прямой кишки в половые органы. Колики при желчнокаменной болезни. Желтуха, в том числе после белей, мастурбации, половых излияний, поноса.

**СТУЛ:** СОДЕРЖИТ НЕПЕРЕВАРЕННУЮ ПИЩУ; *темный, зловонный; водянистый; КРОВЯНИСТЫЙ*; безболезненный; хуже от еды; ночью; после фруктов; от молока, пива; в жаркую погоду. Понос у грудных детей после отнятия от груди. Хронический понос у детей: дети становятся сонными, впадают в дремоту, у них расширяются зрачки, тело становится холодным, особенно подбородок и нос, дыхание учащается. Непроизвольный стул.

**Мочевыделительная система.** Частое мочеиспускание. Жжение в наружном отверстии уретры; хуже от трения одежды. Моча мутная, темная, скудная. Розоватый осадок в моче. Гематурия. Недержание мочи (энурез) у ослабленных детей.

**Мужские половые органы.** Импотенция или нездоровое сексуальное желание, сопровождающееся сладострастными фантазиями. Частые поллюции с последующей выраженной слабостью. Опухание яичек и семенного канатика после гонореи. Орхит. Сексуальное возбуждение сопровождается страстным желанием деликатесов.

**Женские половые органы.** Оофорит из-за сексуальных излияний. Очень сильное сексуальное желание у рожениц. Менструации слишком ранние, темные, обильные, со сгустками, сопровождающиеся вздутием живота. Кровянистые бели; кажется, что они возникают вместо обычных менструальных выделений. Метроррагия: кровь темная; кровотечение сопровождается обмороком, конвульсиями. Асфиксия новорожденных вследствие большой кровопотери у матери. Болезненное уплотнение влагалища.

**Дыхательные органы.** *Кровохарканье*. Пыхтящее, клопочущее дыхание; катар, сопровождающийся удушьем; пациент не может дышать, когда голова низко лежит, на маленькой подушке. Астма: хуже при влажной погоде, осенью или после потери жидкостей, истощения. От любого движения возникает сердцебиение и одышка. *Болезненность грудной клетки* сопровождается болезненностью между лопатками — пациент не переносит перкуссии или аускультации. Туберкулез легких с нагноением. Приступы кашля после еды или смеха; хуже вечером, ночью. Пациентка хочет, чтобы ее обмахивали (веером и т.д.), но не сильно, иначе перехватывает дыхание.

**Сердце.** Любое движение вызывает сердцебиение.

**Шея и спина.** Давление, как от камня, между лопатками. *Боли в грудном отделе позвоночника* — между лопатками. Резкие боли, проходящие поперек почек; усиливаются от движения, ночью. Кинжальные боли в области спины. Сильное давление в крестце. Боль в спине, как будто долго сидел согнувшись. Прострел (люмбаго) с ухудшением от малейшего движения.

**Конечности.** Как будто тяжелый груз лежит на плечах. Спастическое вытягивание рук, при этом пальцы сжаты в кулаки. Кисти дрожат (при письме). Подергивание коленей. Ощущение повязки вокруг голеней или рук. Одна кисть холодная, как лед, другая — теплая. Набухание вен на кистях. Ногти синие. Боль в конечностях и суставах, как от растяжения; хуже от легкого прикосновения; лучше от сильного давления. Чувство усталости в суставах; сильнее утром, когда пациент сидит. Боль в костном мозге. Кариес костей (остеомиелит), с обильным потоотделением.

**Кожа.** Крайняя чувствительность к прикосновению; лучше от сильного давления. Дерматит. Влажная гангрена. Кожа желтого цвета.

**Сон.** Сонливость. Тяжелый, сопровождающийся храпом, сон; особенно у детей. Тревожные, страшные сновидения; страх остается после пробуждения. Бессонница встречается как предвестник болезни (продрома), предшествует ей.

**Лихорадка.** Отчетливо выражен продромальный период — период предвестников. Хорошо выражены стадии лихорадки: озноб, жар и потоотделение. Озноб, затем жажда, затем жар, потом снова жажда. Озноб начинается в груди. Красное, горячее лицо в сочетании с холодными кистями. *Гектическая лихорадка. ПРОЛИВНЫЕ ПОТЫ: НОЧЬЮ; от малейшего движения; от слабости; из-за потери жизненных соков и т.д.* Тропические лихорадки. Сепсис.

**Дополнительно.** Carb-v., Ferr., Kali-c.

**Диф. диагноз.** Carb-v.

## CHININUM ARSENICOSUM

**Общее.** Слабость, усталость, упадок сил и нежелание заниматься умственным трудом — это характерные признаки Хининум арсеникозум.

Раздражительность предшествует головной боли. Внезапные приступы головокружения; хуже при взгляде вверх. Гемикрания, (мигрень) левосторонняя, от испуга. Анорексия — отсутствие аппетита. От яиц и рыбы возникает понос.

Одышка при ходьбе вверх по лестнице. Сердечная астма: ранняя дистрофия миокарда после острых инфекционных заболеваний. Сердцебиение. Ощущение, как будто сердце остановилось. Периодические приступы астмы, сопровождающиеся сильным изнеможением.

Бессонница нервного происхождения. Холодное тело, в том числе кисти и стопы; колени и конечности. Продолжительная лихорадка; сопровождается колебаниями температуры тела. Пот: обильный, истощающий; ночью.

Последствия употребления табака. Ощущение давления и чувствительность в области солнечного сплетения. Чередование повышенной и пониженной кислотности желудочного сока.

**Хуже.** В покое. С полуночи и до полудня. Когда желудок пустой.

**Лучше.** От движения.

## CHININUM SULPHURICUM

**Общее.** Сульфат хинина оказывает влияние на *НЕРВНУЮ СИСТЕМУ*, вызывая *повышение чувствительности к внешним воздействиям* и появление периодической невралгии. В *КРОВИ* происходит быстрое снижение числа эритроцитов и уровня гемоглобина; оно сопровождается лейкоцитозом.

Слабые и нервные пациенты; небольшое усилие вызывает сердцебиение. Ретробульбарный неврит зрительного нерва с внезапной потерей зрения. Пациент не может стоять. Падает на улице. Желание лечь. Смертельная слабость и дурнота; у пациентки чувство, что она может проваливается сквозь постель.

**Хуже.** ЧЕТКАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ СИМПТОМОВ. От холода. В 10-11 ч. От прикосновения.

**Лучше.** От зевания. От давления. Согнуться — наклонить тело вперед.

**Психика.** Нервный. Не хватает сил, чтобы назвать предмет.

**Голова.** Головная боль малярийного происхождения, нарастающая постепенно к полудню; сильнее слева. Головокружение с шумом в ушах; с подергиванием век; с пульсирующей головной болью. Глазничная невралгия.

**Глаза.** Сетка, туман или точки, как пылинки, перед глазами. Может видеть предмет только если смотрит в сторону — боковым зрением. Косит глазами периодически — через день (ребенок).

**Уши.** Шум в ушах. Глухота. Болезнь Меньера.

**Лицо.** Невралгическая боль рецидивирует с четкой периодичностью; уменьшается от давления. Перемежающаяся невралгия верхней ветви тройничного нерва, мигрень (brow ague). Лицо бледное, тревожное.

**Мочевыделительная система.** В моче осадок соломенно-желтого цвета, зернистый или цвета красного кирпича. Кровянистая моча.

**Спина.** Боли в шейно-грудном отделе позвоночника или выраженная чувствительность в этой области; сопровождаются стеснением дыхания.

**Конечности.** Острый суставной ревматизм. Суставы очень чувствительные.

**Кожа.** Зуд. Петехии. Крапивница.

**Лихорадка.** Озноб в ожидании события, от волнения. Жажда во всех периодах лихорадки. Бред во время жара. Повышение температуры и упадок сил, сопровождающиеся обильными ночными потами. От обильного потоотделения становится лучше, но оно истощает. Четкие периоды апиреksии (без лихорадки). Типичная малярия. Пониженная температура тела.

**Диф. диагноз.** Chin.

## CHIONANTHUS

**Общее.** Хионантус обладает мощным влиянием на *ПЕЧЕНЬ*, на голову. Он бывает полезен при неврастении; при периодических головных болях; при мигрени, при болях, связанных с менструациями и патологией желчных путей.

В разных органах возникает *ощущение разбитости, как от ушиба, болезненность*; в том числе *в печени*; в глазных яблоках и т.д. Боль поднимается кверху — из области лба, из желудка и т.д. Желтуха, возникающая каждое лето.

**Хуже.** От сотрясения тела. От движения. От холода.

**Лучше.** Лежа на животе.

**Психика.** Пациент чувствует, что он выдохся. Не желает ничего делать;

хочет, чтобы его оставили в покое. **Голова.** Тяжелые мигрени, «желчные» головные боли; усиливаются от наклона, движения, сотрясения.

**Глаза.** Кажется, что глазные яблоки ушиблены. Желтая конъюнктивит.

**Нос.** Давление в корне носа или ощущение сжатия в переносице.

**Рот.** Сухость, не уменьшающаяся от воды. Язык широкий, с толстым зеленовато-желтым налетом; кажется, что язык поджат. Слюнотечение.

**Желудок.** Рвота: кисло-горьким, горячим содержимым; желчью; вязкими, тягучими массами в виде сплошного потока; от рвоты появляется оскомина. Рвота сопровождается коликой и появлением *холодного пота* на лбу и на тыльной поверхности кистей.

**Живот.** Печень ужасно увеличена; это сопровождается ощущением дискомфорта, тупой болью и желтухой. Сжимающая боль в области пупка. Как будто веревка завязана петлей (stop-knot) вокруг кишечника: и ее то внезапно туго затягивают, то постепенно отпускают. Холецистит. Камни желчного пузыря. Желтуха сопровождается прекращением менструаций. Ощущение слабости внизу живота. Стул: дегтеобразный; цвета глины или в виде непереваренной пищи. Холодный пот на лбу и на тыле кисти во время стула. Заболевания поджелудочной железы.

**Мочевыделительная система.** Моча оранжево-желтого цвета; густая, черная, как сироп. Желчь и сахар в моче. Сахарный диабет. Высокий удельный вес мочи.

**Дыхательные органы.** Вяжущий, терпкий вкус у мокроты.

**Кожа.** Вся кожа желтая. Желтуха: хроническая; рецидивирующая каждое лето; возникает, если пациент пьет слишком много сидра (яблочного вина).

**Лихорадка.** Во время жара пациент не желает раскрыться. Холодный пот на тыльной поверхности кистей.

**Диф. диагноз.** Bry., Iris., Lept., Merc.

## CHLORAL HYDRATE

**Общее.** Это вещество действует на *головной мозг*, вызывая возбуждение с галлюцинациями и ночные страхи у детей.

Сердце расширено или слабое, при этом возникает особое чувство переполнения и легкости в грудной клетке, а также ощущение пустоты в желудке. Выраженная мышечная слабость, изнеможение. Хорея: продолжительная, упорная; пациент не может ни лежать, ни стоять.

**Хуже.** От алкоголя. Ночью. От напряжения. Лежа. От горячего питья. От стимуляторов — тонизирующих веществ.

**Лучше.** На открытом воздухе. Когда обмахивают (от веера, от вентилятора).

**Психика.** Меланхолия, идиотия и безумие. Пациент торопливый, возбужденный, ходит взад и вперед по комнате, разговаривая с воображаемым собеседником или сам с собой.

**Голова.** Ощущение, как от горячей повязки, ленты, протянутой от виска к виску.

**Глаза.** Глазные яблоки кажутся слишком большими; налиты кровью и влажные. Предметы кажутся белыми; цветовая слепота. Веки тяжелые, пациент едва может их поднять.

**Уши.** Слышит голоса.

**Лицо.** Лицо и веки опухшие, едва может видеть, крапивница.

**Стул.** Не содержит желчи (ахоличный).

**Мочевыделительная система.** Ночное недержание мочи (энурез): обильно мочится в постель, не замечая этого, под утро.

**Дыхательные органы.** Одышка. Ощущение, как от лежащего на груди груза. Когда лежит на спине, вдох делает через нос, выдох — через рот.

**Сердце.** Слабое или расширено.

**Кожа.** Крапивница: усиливается ночью, проходит днем; внезапно появляется от озноба; уменьшается от тепла; усиливается от алкоголя. Кожа холодная, как камень.

**Сон.** Бессонница от утомления. Ужасные сновидения.

**Диф. диагноз.** Apis, Astac.

## CHLORUM

**Общее.** Испытания этого газа проводили, используя хлорированную воду. Она оказывает выраженное воздействие на *дыхательные органы*, вызывая спазм голосовой щели. Другая характерная черта — ощущение *сжатия*. Пациенты быстро худеют. *Слизистые оболочки* воспаляются и покрываются язвами.

**Хуже.** На выдохе. После полуночи. Лежа.

**Лучше.** На открытом воздухе. От движения.

**Психика.** Боится сойти с ума или потерять сознание. Забывает имена и людей.

**Глаза.** Выпученные, навывкате.

**Нос.** Как будто закопченный или в саже. *Насморк; с едкими выделениями из носа;* в сочетании с головной болью — внезапно из носа начинает капать, появляется слезотечение.

**Лицо.** Опухшее, глаза вылезают из орбит (экзофтальм).

**Рот.** Гнилостный запах изо рта. Гнилостные афты. *Язык сухой, черный.*

**Горло.** Ощущение удушья, пациент не может глотать. Тупые боли, щекотание или свистящий звук в яремной ямке.

**Дыхательные органы.** Внезапная *ОДЫШКА* из-за спазма голосовых связок, с выпучиванием глаз, синим лицом, холодным потом. Вдох свободный, но *ВЫДОХНУТЬ НЕ МОЖЕТ*. Ларингит. Ларингизм, стридор, спазм гортани. Сенная астма. Ощущение, как будто воздух накачан в верхнюю часть грудной клетки.

**Кожа.** Чувствительная, сухая, желтая, сморщенная.

**Лихорадка.** Пациент легко потеет.

**Диф. диагноз.** Ars-i., locL, Merph., Merc.

## CHOLESTERINUM

**Общее.** Холестерин в большом количестве содержится в желчи и желчных камнях. Гомеопатический Холестерин — полезное средство при упорном застое в печени; при раке печени; при упорном образовании желчных камней; при помутнении стекловидного тела и при упорной желтухе.

**Хуже.** От прикосновения или сотрясения. Лежа на боку. При сгибании тела или от внезапного движения.

## CICUTA VIROSA

**Общее.** Цикута широко известна как вех ядовитый. Она, в основном, действует на *ГОЛОВНОЙ МОЗГ И НЕРВНУЮ СИСТЕМУ*, вызывая жестокие спазмы.

Конвульсии, тризм, столбняк, икота. *Резкие сокращения мышц; судорожное подергивание* головы, подергивания в разных частях тела; в руках и пальцах рук. Пациент *ужасно корчится*. *Спазмы перемещаются вниз с пугающей интенсивностью*, сопровождаются внезапными ударами, проходящими через голову и тело, затем возникает *ригидность* тела или пациент пронзительно кричит; потом наступает продолжительная потеря сознания; *ОПИСГОТОНУС со страшно перекошенным лицом;* а также с кровавистой пеной изо рта, затем — *совершенное изнеможение*. Спазмы возобновляются от прикосновения, шума, от громкого разговора.

**Эпилепсия.** *Спазмы диафрагмы, икота; спазмы пищевода.* Мышцы становятся ригидными, коченеют. Цереброспинальный менингит. Сотрясение мозга. Проблемы, возникающие из-за бритья. Катаlepsия. Пациент не помнит, что случилось, не узнает никого, но отвечает правильно.

**Хуже.** После *ТРАВМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА;* пищевода; из-за попадания заноз в мягкие ткани. От сотрясения тела. От шума. От прикосновения. От холода. При прорезывании зубов. От подавления высыпаний. От сквозняков. От табачного дыма. При повороте головы.

**Лучше.** Когда думает о боли. От тепла.

**Психика.** Ребяческое поведение. Поет, танцует, кричит. Стонет, воет и плачет. Пациент крайне сильно переживает рассказы о печальных событиях. Не доверяет людям и избегает их. Презирает других людей. Путает настоящее с прошлым. Маниакальное состояние, сопровождающееся танцами, смехом и нелепыми жестами. Чувство, как будто он находится в незнакомом месте. Все кажется чужим, странным и внушает ужас. Пациент жестокий, бесчеловечный. Неосмотрительный. Бред, делирий. Грустный, подавлен, когда видит другого челове-

ка счастливым. Провалы в памяти: не помнит события нескольких часов или дней. Падает на землю и катается по земле в конвульсиях или без них. Не помнит, что произошло, не узнает никого, но отвечает верно.

**Голова.** Голова повернута или наклонена в сторону (при спазмах). *Дергает головой.* Конгестия, сопровождающаяся рвотой и поносом. *Головокружение:* предметы двигаются из стороны в сторону или приближаются и отступают. Внезапные сильные удары проходят через голову. Симптомы со стороны головы уменьшаются, когда пациент думает о них, когда сидит прямо или выпускает кишечные газы. Толстые желтые струпья на голове. Голова потеет во время сна. Менингит. Головокружение при гастралгии и мышечных спазмах. Голова втянута в плечи, позвоночник скован.

**Глаза.** Расширение зрачков при сотрясении мозга; сужение — при судорогах, спазмах. Когда читает, буквы поднимаются и опускаются или исчезают. Когда пристально смотрит на предмет или когда сидит в состоянии мнимого сна, то голову наклоняет вперед.

Косоглазие: периодическое, спастическое; после падения или удара по голове. Симптомы появляются после того, как попал в снегопад, в метель и т.д. Предметы кажутся удвоенными и черными. *Глаза вращаются, дергаются и застывают неподвижно.* Подергивание век.

**Уши.** Кровотечение из ушей, в том числе при поражении головного мозга. Внезапно возникает звук взрыва, особенно при глотании. Уши горячие или холодные.

**Нос.** Легкое прикосновение вызывает кровотечение. Частое чихание без насморка.

**Лицо.** Красное или бледное, искаженное, потное; гримасы страшные или нелепые, вызывающие смех. Тризм (спастическое сжатие челюстей). Сливающиеся между собой пустулы приводят к образованию толстых корост, струпьев. Эпителиома губы.

**Рот.** Пена во рту и возле него. Пациент скрежещет зубами при тризме. Опухание языка; затруднение речи. Прикусывает язык.

**Горло.** Кажется, что оно перекрыто или его *стенки срослись.* Спазм пищевода, пациент не может глотать, в том числе из-за травмы; из-за застрявшей рыбьей кости и т.д. Симптомы возникают после того, как проглотил острую рыбью кость. Сужение (стриктура) пищевода.

**Желудок.** Желание угля, мела и многих других странных вещей — из-за неспособности отличить съедобное от несъедобного и т.д. *Громкая икота:* сопровождается плачем; чередуется со спазмами в грудной клетке. Рвота желчью, кровью, при наклоне, при вставании; а также при беременности. Пульсация под ложечкой при вздутии живота. Изжога; слюна вытекает изо рта, ощущается жар во всем теле.

**Живот.** Колика в сочетании с конвульсиями, со рвотой. При метеоризме пациент тревожен и несговорчив, сердит.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание у стариков. Мочеиспускание сопровождается большими усилиями. Стриктура уретры, в том числе после воспаления; после гонореи. Паралич мочевого пузыря.

**Мужские половые органы.** Яички подтянуты к поверхностным паховым кольцам.

**Женские половые органы.** Если не наступают менструации, возникают спастические состояния. Копчик болезненный во время менструации. Экламптические (послеродовые) судороги.

**Дыхательные органы.** Ощущение напряжения, стеснения в грудной клетке, пациент едва может дышать. Ощущение жара или холода в груди.

**Сердце.** Трепетание сердца. Кажется, что сердце сейчас остановится; это ощущение сопровождается слабостью.

**Шея и спина.** Спазмы и судороги в мышцах шеи; голова наклонена назад. Опистотонус. Резкие сокращения, подергивание мышц в области копчика во время менструации.

**Конечности.** Подергивание и резкие сокращения мышц руки и пальцев на руках. Резкие сокращения мышц левой руки в течение всего дня. Дрожание левой голени. Стопы наклонены внутрь при ходьбе. Стопы повернуты внутрь, а пальцы подняты кверху при спазмах мышц. Изогнутые конечности не удается выпрямить; выпрямленные — не удается согнуть. При ходьбе стопы описывают полукруг в воздухе.

**Сон.** Прикусывает язык во сне. Глубокий сон. Сновидения яркие, но пациент их не запоминает.

**Кожа.** Пустулы сливаются, образуя *толстые, желтые,* массивные струпья; хуже на голове и лице. Импетиго. *Экзема без зуда.* Подавление высыпаний приводит к возникновению заболевания головного мозга. Сикоз области бороды и усов, экзема булочников (на руках).

**Диф. диагноз.** Cupr., Stry.

## CIMICIFUGA

(*Actea racemosa*)

**Общее.** Это растение оказывает разностороннее действие на *НЕРВЫ* и на *МЫШЦЫ*. Оно вызывает *уныние и подавленность*; истощение наряду с *повышенной чувствительностью*, особенно к боли.



Цимицифуга — это большое женское средство. Пухлые, нежные, чувствительные, *нервные*, зябкие женщины, которые жалуются на тупые боли в спине, шее, в разных местах; многие их болезни объясняются раздражением яичников и матки.

*Чувство общего недомогания*; в том числе сопровождающееся упадком сил. *Появление* многих симптомов не имеет закономерности, они непостоянны, изменчивы; или группы симптомов возникают поочередно; чередуются физические и психические симптомы. Чередование психических и ревматических симптомов. Боли жестокие, тупые, стреляющие, блуждающие — возникают *то в одном, то в другом месте*, боли, как удары; они *сопровождаются криками, обмороками* и т.д. Боли распространяются вверх или переходят с *одной стороны на другую* — вдоль шеи; в области горла; *из одного яичника в другой*. *Брюшко мышц как будто ушиблено, болезненное, сильно ноет*. *Дрожание*, подергивание в разных органах или в части тела, на которой пациентка лежит. Сдавливающие боли.

Истерические и эпилептические судороги во время менструаций. Чередование тонических и клонических судорог. По ходу боли отмечается болезненность и чувствительность тканей. *Нервная дрожь*, пациентка содрогается.

Если дать Цимицифугу беременной женщине, то роды будут протекать легче; уменьшатся недомогания, связанные с беременностью; а также послеродовые схватки. Цимицифуга также способствует рождению живого ребенка у женщин, у которых по неустановленным причинам рождались только мертвые дети: следует давать ежедневно в низкой потенции (D1) в течение двух месяцев перед родами.

Миалгия. Невралгическая боль в яичнике. Прострел (люмбаго). Судороги при цереброспинальном эпидемическом менингите. Грипп. Хорея: в том числе в пубертатном возрасте; когда задерживается наступление менструаций; когда имеется болезнь сердца.

Болезненные последствия: тревоги; испуга; разочарования в любви; переутомления; неудачи в бизнесе; рождения ребенка. Дети во время прорезывания зубов.

**Хуже.** Во время менструации, при ее подавлении. Во время родов. От переживаний, эмоций. *От алкоголя*. Ночью. При перемене погоды. От жары и от холода. Сидя. В пубертатном возрасте и во время климакса. От движения. *При влажной, холодной погоде*. *От вина*. От сквозняка.

**Лучше.** Тепло укутаться. На открытом воздухе. От давления. От еды. От продолжительного движения. Когда держится, хватается за что-нибудь.

**Психика.** Желание бродить с места на место. Меланхолия. Волнение, тревога. *Нервная, суетливая, возбудимая* и порывистая женщина. Раздражительная; пустяковые проблемы сводят ее с ума. Подавлена и разговорчива; постоянно меняет тему разговора. Подозрительна.

*Мрачные предчувствия*, в том числе касающиеся смерти, потери рассудка, надвигающейся беды и т.д. *Считает, что она сходит с ума*. Когда встречает знакомого человека, в эпигастрии возникает чувство слабости, дурноты. Боится ездить в закрытом экипаже. Боится, что люди, находящиеся в доме, убьют ее. *Смертельно боится крыс*. Видения — видит крыс, мышей, разного цвета пятна и фигуры. Мания: перед менструацией; от употребления алкоголя; с попыткой нанести себе повреждение; послеродовая (послеродовой психоз); возникающая после исчезновения невралгических болей.

Безволие. Не интересуется домашними делами. Безразличие. Уныние, депрессия: как будто ее накрыло тяжелое черное облако. Подозрительность; не станет принимать лекарство. Сидит безучастная, подавленная; когда спрашивают, заливается слезами. Психические симптомы уменьшаются от поноса или во время менструации; усиливаются после ревматических болей.

**Голова.** В головном мозге ощущение колебания или неразберихи («дикое чувство»). *Голова втянута* (при менингите). Стреляющие, пульсирующие головные боли после тревог, забот, чрезмерных учебных занятий или возникающие рефлекторно при болезни матки; лучше на открытом воздухе.

Голова или головной мозг кажутся слишком большими. Ощущение, что мозг открывается и закрывается. *Кажется, что макушка слетит с головы, оторвется*; хуже, когда поднимается по лестнице. Или как будто темя приподнялось, и в голову попал холодный воздух; или как будто холодный воздух дует на мозг или жар пышет на него. Ощущение, как от удара, или как будто в затылок вбит стержень, который направлен к темени и далее к глазам (слева). Головная боль у студентов.

**Глаза.** *Сильная тупая боль в глазных яблоках или позади них*; уменьшается от давления; усиливается от малейшего движения. Боль распространяется из глаз в темя. Глаза кажутся большими; взгляд безумный. Видит перед глазами красные вспышки с темными краями. Не переносит искусственный свет. Ощущение, как будто в глаза воткнули иглы; хуже, когда закрывает их. Цилиарная невралгия.

**Уши.** Шум в ушах. Уши чувствительны к незначительному шуму; в том числе при судорожных родовых схватках. Жестокие шумы в ушах при глухоте.

**Нос.** Чувствителен к холодному воздуху; кажется, что при каждом вдохе холодный воздух соприкасается с мозгом.

**Лицо.** Бледное, горячее. Невралгическая боль в области скуловых костей; лучше ночью; возобновляется на следующий день. Лоб холодный. Пятна, прыщики и другие недостатки — у молодых женщин. Лоб кажется холодным. Дикое, перепуганное лицо.

**Рот.** *Густая слюна.* Медный привкус во рту. Отхаркивает изо рта вязкую слизь с привкусом меди. Язык дрожит. Густая слизь на зубах. Пациентка не может выговорить ни слова, хотя очень старается. Язык и рот кажутся теплыми. Язык опухший.

**Горло.** Жжение в горле. Щитовидная железа болит перед менструацией.

**Желудок.** *Тошнота:* утром; при беременности; у алкоголиков; ощущается в кишечнике; усиливается от давления на позвоночник и область шеи. Рвота зеленой массой, при этом пациент стонет, воет и, чтобы облегчить страдания, сдавливает голову обеими руками. Ощущение пустоты в эпигастрии, как будто желудок опустился, провалился вниз («замирает внутри»); в том числе, когда встречает друга. Отрыжки сопровождают тошноту, рвоту и головную боль (у женщин).

**Живот.** Колика уменьшается, когда пациент сгибается пополам и после стула. Частый, жидкий, темный, зловонный стул. Утренний понос у детей. Резкие боли поперек живота — в гипогастрии. Чередование запора и поноса.

**Мочевыделительная система.** Обильная, прозрачная моча; вызывающая слабость; моча содержит желтый песок. Мочеиспускание — когда нервничает.

**Женские половые органы.** Менструации обильные, темные, с выделением свернувшейся крови, *скудные*, сопровождающиеся болью в спине, нервозностью; нерегулярные и в ненадлежащем количестве; *чем обильнее кровотечение, тем сильнее боль.* Выраженная слабость между менструациями.

Невралгия яичника: ощущается боль в тазу в поперечном направлении, она проходит *из одного яичника в другой*; или распространяется вверх или вниз, вдоль бедер. Подавление менструаций из-за переживаний, эмоций или от холода.

Истериические или эпилептические судороги во время менструации. Атония матки. Женщина придавливает молочную железу, как будто она болит. Мания. Жжение в молочной железе. Вялые родовые схватки, сопровождающиеся нервной дрожью. Невыносимо болезненные послеродовые схватки; боли сильнее в паховых областях. Бели сопровождаются ощущением тяжести в матке. Невралгическая боль в сердце во время родов. Боли воспалительного характера, сильнее слева. Подавление лохий вследствие переживаний или от холода. Нервничает, когда кашляет и мочится. Содрогается всем телом, ежится.

**Дыхательные органы.** Щекочущий, короткий, сухой постоянный кашель; сильнее ночью, когда говорит. Резкие колющие боли в грудной клетке слева; от движения вырывается крик. Плевродиния. Нервный кашель.

**Сердце.** Сердце болит; как будто набухло, переполнено; или как будто увеличено. Боли в сердце, как от иголок. Стенокардия: боль распространяется по всей грудной клетке, в спину и вдоль левой руки, рука немеет, и кажется, будто она привязана к туловищу сбоку. Внезапно сердце останавливается, возникает угроза удушья. Пульс слабый, аритмичный, дрожащий; выпадает каждый 3-й или 4-й удар.

**Шея и спина.** Боль в шее, пациент запрокидывает голову назад. Скованность в шее; хуже, когда двигает кистями. Шея втянута. Шейный и верхне-грудной отделы позвоночника очень чувствительны, особенно при давлении — от него возникает тошнота и позывы на рвоту. Болезненность всех мышц. Скованная, зажатая шея и спина. Боль в области угла левой лопатки. Сильная пульсирующая боль в пояснице, проходящая через боковые отделы таза и распространяющаяся вдоль бедер.

**Конечности.** Чувство неловкости и беспокойство в конечностях. Левая рука, как будто привязана к туловищу сбоку; постоянные беспорядочные движения левой рукой (хорея). Кисти дрожат при письме. Судороги в конечностях; в том числе в икроножных мышцах. Ригидность и контрактура ахиллова сухожилия. Зуд в подошвах. Холодный пот на кистях и стопах. Чередование ревматических и психических симптомов. Дрожание голеней, едва может идти. Онемение конечностей.

**Сон.** Коматозный; как будто пациент пьян. Бессонница. Спит, положив руки выше головы или зевает во сне.

**Диф. диагноз.** Bap., Caul., Gels., Ign., Puls.

## CINA

**Общее.** Растение полынь цитварная является источником алкалоида сантонина (*Santin.*).

Симптомы со стороны *НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ*, а также психические и телесные симптомы, которые служат показанием для применения Цины, можно объяснить наличием круглых червей или рефлексом с *раздраженных органов брюшной полости*, а также поражением *желудочно-кишечного тракта*.

Цина — это детское средство: дети крупные, толстые, розовощекие, золотушные; дети напрягаются, когда *на них смотрят, во время кашля, или когда сердятся, проявляют характер*. Ребенок подвижный, беспокойный — места себе не находит.

Подергивание мышц. Спазмы, судороги; в том числе при наличии глистов; односторонние. При судорогах ребенок размахивает руками из стороны в сторону. Все тело болит: больно двигаться; боль возникает, когда к нему прикасаются; болезненность, как от ушиба, разбитость.

Дети чувствуют голод; но чем сильнее голод, тем больше исхудание. Жалобы возникают вслед за зевотой; а зевота возникает всякий раз, когда кто-нибудь зевает. Тело имеет кислый запах, особенно у ребенка. Сотрясение тела, как от боли. Пациент внезапно вскакивает, как будто почувствовал боль. Пациент дрожит; по телу пробегает дрожь, когда он зевает. Судороги при ясном сознании. Параплегия сопровождается неестественным чувством голода. Хорея.

**Хуже. ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ.** От глистов. От неприятностей. *Когда на пациента смотрят. ВО ВРЕМЯ СНА.* Когда пациент смотрит пристально, не мигая. Когда зевает. *В полнолуние.* На солнце, летом. Когда смотрит, не отрываясь, на какой-нибудь предмет, вглядывается.

**Лучше.** *Лежа на животе.* Потереть глаза. От движения. Потрясти головой. Когда качают.

**Психика.** *ОЧЕНЬ ОБИДЧИВЫЙ; вздорный, своенравный, сердитый; капризный и недовольный.* Дети не желают, чтобы к ним прикасались или брали на руки; они *хотят, чтобы их качали;* требуют многого, но затем отвергают всё, что им дают; ребенок беспокоен и страдает все время. Нервный. Заблуждение: считает, что сделал что-то плохое. Конвульсии у детей, когда их ругают или наказывают. На детей не действуют никакие ласки — дети не чувствительны к ним. Добродушные дети становятся несговорчивыми, сердитыми.

**Голова.** Головная боль чередуется с болью в животе, уменьшается при наклоне. Боль возникает, когда пациент читает или пристально смотрит, вглядывается. Ребенок все время наклоняет голову набок. Вертит головой из стороны в сторону. Женщины при головной боли вынуждены распустить волосы. Детям невозможно расчесать волосы, сделать прическу. Головная боль перед приступом эпилепсии и после него.

**Глаза.** *Зрачки расширены.* Пульсация в области мышц надбровья. Брови подергиваются, когда пациент пристально смотрит на предмет; видит, как сквозь пелену, дымку; лучше - потереть глаза. Утомление глаз. Видит в желтом, синем, фиолетовом или зеленом цвете. Косоглазие, в том числе из-за глистов. *Темные круги вокруг глаз.* Слабое зрение из-за мастурбации.

**Нос.** Чешется. Ребенок *ТЕРЕБИТ НОС И КОВЫРЯЕТ В НОСУ* до крови; хочется потереть нос. Чихание при коклюше. Ноздри втянуты.

**Лицо.** Бледное, болезненное; в том числе при кашле. Область *ВОКРУГ РТА СИНЕВАТО-БЕЛОГО ЦВЕТА.* Лицо поочередно то бледное и холодное, то красное и горячее. Подвижные лицо и кисти, как при хорее.

**Рот.** Пациент *СКРЕЖЕЩЕТ ЗУБАМИ:* в том числе ночью; *во время сна.* Жует и глотает во сне. Язык чистый.

**Горло.** Трудно глотать жидкости; глотает с шумом. Из горла и желудка доносится кудахтанье; оно возникает после кашля или конвульсий. Постоянно непроизвольно делает глотательные движения.

**Желудок.** *Голод: волчий; в том числе после еды; после рвоты;* сопровождающийся гложущим чувством в желудке; чередуется с отсутствием аппетита; возникает перед ознобом или после потоотделения; при параплегии. Хочется много разных вещей; страстное желание сладкого, хлеба. При рвоте язык чистый. Рвота и понос немедленно после еды и, особенно, после питья. Отвращение к материнскому молоку.

**Живот.** Скручивающая боль возле пупка уменьшается от давления. Живот вздутый и твердый. Режущая, щемящая боль в животе из-за глистов. Стул белый, водянистый. Зуд в заднем проходе. Неприятное ощущение тепла в животе.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание ночью (энурез) с ухудшением в полнолуние. Моча мутная, *БЕЛАЯ; КАК МОЛОКО;* или становится как молоко, когда постоит.

**Мужские половые органы.** Болезненные последствия онанизма; в том числе, снижение зрения.

**Женские половые органы.** Маточное кровотечение до наступления полового созревания. Менструации слишком ранние и обильные. Ребенок отказывается от груди.

**Дыхательные органы.** Удушливый кашель, возникающий через одинаковые промежутки времени и сопровождающийся чиханием. Жестокий кашель, из-за которого текут слезы и появляются боли в области грудины; кажется, будто что-то оторвалось. Бульканье из горла распространяется в желудок после кашля. Ребенок неподвижен и не разговаривает или двигается из-за того, что боится кашля. Как будто грудина расположена слишком близко к спине. Кашель заканчивается спазмом. Приступы удушья. Отхаркивание мокроты затруднено.

**Конечности.** Никак не найдет места для своих рук — беспокойство (у детей). Внезапно пальцы правой руки резко дергаются, сгибаясь. Судорожным движением вытягивает стопы (ребенок). Подергивание и спастические сокращения мышц конечностей. Левая стопа постоянно судорожно двигается. Параплегия; возникает внезапно, сопровождается неестественно сильным чувством голода.

**Сон.** Беспокойный. Во время сна встает на руки и на колени или ложится на живот. Ночные страхи у детей. *Горько плачет,* пронзительно кричит, просыпается испуганный. Кричит и разговаривает во сне.

**Лихорадка.** При лихорадке лицо бледное и холодное, а руки теплые. Высокая температура; язык при лихорадке чистый. Холодный пот на лбу, на носу и на кистях. Чувствует голод перед ознобом и после потоотделения.

**Дополнительно.** Calc, Dros., Rat.

**Диф. диагноз.** Cham., Nat-p.

## CINNABARIS

**Общее.** Киноварь в гомеопатии — это противосикотическое и противосифилитическое средство. Леность и нежелание заниматься умственным трудом. Общая повышенная чувствительность к прикосновению; в том числе чувствительность костей, кожи волосистой части головы и т.д. Когда пациент лежит на правом боку, кажется, что его внутренности тянет в правую сторону.

**Хуже.** От прикосновения. От света. От сырости. При ходьбе.

**Лучше.** На открытом воздухе. От солнечного света. После обеда.

**Глаза.** Боль распространяется наружу вдоль бровей; как бы окружая глаза, или как седло охватывает корень носа. Покраснение всего глаза.

**Нос.** Сильное давление в корне носа; хуже от давления очков. Выделения из носа едкие, зловонные, жгучие, водянистые или в виде темных комочков.

**Рот.** Сухость во рту и в горле, пациент просыпается ночью; должен прополоскать рот. Отхаркивает тягучую слизь из горла; либо комочки слизи попадают в полость рта из задних отделов носа. Катар носоглотки.

**Живот.** Ощущение ползания мурашек в заднем проходе; как будто большой червяк. Дизентерия с кровавистым стулом. Жидкий белый стул. Понос с зеленой слизью в стуле, из-за которой кожа вокруг заднего прохода и мошонка окрашиваются в медный цвет.

**Мужские половые органы.** Подергивания в половом члене; в том числе во время сна. Зловонный едкий пот в складках между мошонкой и бедрами. Бородавки на крайней плоти, особенно веерообразные. Мелкие красные папулы на головке полового члена. Старые твердые шанкры. Зуд в области венца головки полового члена. Покраснение и опухание крайней плоти.

**Женские половые органы.** Бели сопровождаются ощущением давления во влагалище.

**Сердце.** Трепетание сердца, после которого возникает прилив крови к голове.

**Конечности.** Узлы на большеберцовых костях. При ходьбе левая нога (голень) кажется короче, чем правая. Судорога в икроножных мышцах после ходьбы. Боль в ахилловом сухожилии и пяточной кости при ходьбе. Холодные колени; или суставы вообще. Боль из локтя распространяется вниз, в кисть.

**Кожа.** Огненно-красные язвы на коже и слизистых оболочках. Высыпания красного цвета. Жестокий зуд и покалывание. Пот на носу. Язвы, как пчелиные соты.

**Дополнительно.** Thuj.

**Диф. диагноз.** Merc.

## CISTUS CANADENSIS

**Общее.** Широко известен как скалистая роза (в России — как солнцезвезд канадский). Это старинное лекарство для лечения золотухи. Это растение поражает **ЖЕЛЕЗЫ**, особенно *носоглотки*; *шеи*, а также молочную железу (левую). Оно также вызывает герпетические высыпания, состояния, напоминающие цингу, хронические отеки, набухание и гангренозные, ползучие язвы.

Пациент *болезненно чувствителен к холоду; к вдыхаемому холодному воздуху. Чувство холода* в разных местах: холодные язык и слюна, холод в *горле*; холодная отрыжка, холод в желудке; это ощущение усиливается, когда человек потеет; даже выделения кажутся холодными. Выделения со слизистых оболочек *густые, желтые, зловонные*; они вызывают болезненное чувство саднения. *Нагноение.* Зуд внутри и снаружи. Ощущение ползания мурашек по всему телу, сопровождающееся затрудненным, беспокойным дыханием. Злокачественные заболевания шейных желез (лимфатических узлов). Ядовитые укусы, отравленные раны, гангренозные язвы. *Жжение.* Уплотнение, затвердение. Мозоли с трещинами.

**Хуже.** От холода; от простуды; от холодных сквозняков; от вдыхания холодного воздуха. От холодной воды. От нервного напряжения; от психического возбуждения, волнения. От прикосновения. От движения.

**Лучше.** От еды. После отхаркивания мокроты.

**Психика.** Болезненные последствия неприятностей. Страх.

**Голова.** Болит, если пациент пропускает прием пищи; лучше от еды. Голова наклонена набок из-за опухания шеи.

**Глаза.** Чувство, как будто что-то двигается вокруг глаза. Трещины в углах глаз.

**Уши.** Водянистые, вонючие гнойные выделения; возникают после болезни, сопровождавшейся высыпаниями. Лишай или экзема в области уха, вокруг него, распространяется на наружный слуховой проход.

**Нос.** Чувство холода или жжения в носу. Кончик носа болезненный. Экзема носа. Ощущение, как будто в носоглотке — комок. Хронический катар носа (ринит), частое жестокое чихание. Давящая боль в корне носа при головной боли.

**Лицо.** Зуд, жжение и корки в области скуловой кости. Кариез (остеомиелит) нижней челюсти с нагноением шейных лимфатических узлов. Рак нижней губы с изъязвлением и кровотечением. Трещины на губах.

**Рот.** Десны, как при цинге, отстают от зубов, кровоточат; отвратительный гнилостный запах. Язык кажется холодным. Дыхание прохладное. Слюна холодная. Больно высунуть язык. Пиорея.

**Горло.** Простуда поражает горло; горло кажется холодным. Горло кажется мягким, рыхлым; зуд в горле. После вдыхания малейшего количества холодного воздуха горло начинает болеть. Сухой участок в горле — лучше, когда пьет маленькими глотками воду. Боли в горле при кашле. Железы (лимфатические узлы) опухают и нагнаиваются. Зоб, который сопровождается частым поносом.

**Желудок.** Чувство прохлады в желудке; в том числе перед едой и после еды. Желание сыра; острых продуктов. Холодные отрыжки.

**Живот.** Чувство прохлады повсюду. Понос: от кофе, фруктов; при зобе; сопровождается тошнотой. Учащенный жидкий стул; хуже утром.

**Мужские половые органы.** Зуд мошонки.

**Женские половые органы.** Бели с неприятным запахом. Уплотнение и воспаление молочной железы (слева). Чувствительность к холодному воздуху. Рак.

**Дыхательные органы.** При вдыхании холодного воздуха в гортани и трахее возникает чувство прохлады. Чувство холода в груди. Когда пациент ложится, в большом количестве отхаркивается тягучая, похожая на яичный белок слизь. Трахея кажется узкой, дыхание становится затрудненным, но перед этим возникает ощущение ползания мурашек. Саднение в груди после отхаркивания мокроты.

**Шея и спина.** *Твердые, опухшие железы (лимфатические узлы)* на шее. Жжение и боль, как от ушиба, в копчике, она не позволяет сидеть, усиливается от прикосновения.

**Конечности.** Холодные стопы. Кончики пальцев рук потрескавшиеся, чувствительны к холоду. У рабочих на руках возникают затвердения (мозоли) с трещинами.

**Кожа.** Жесткая, толстая, сухая, *потрескавшаяся*. Зуд, ощущение ползающих мурашек повсюду, не сопровождающееся высыпаниями.

**Лихорадка.** Зябкость. Легко потеет; потливость ночью.

**Диф. диагноз.** Calc, Hemo-h., Нер.

## CLEMATIS ERECTA

**Общее.** Ломонос поражает *слизистые оболочки глаз* и уретры, а также *ЖЕЛЕЗЫ*, особенно *ЯИЧКИ*, молочные железы, яичники: они становятся *ОЧЕНЬ ТВЕРДЫМИ, опухшими и БОЛЕЗНЕННЫМИ*. Невралгические боли в разных частях тела. Жжение, зуд, жгущая боль, ощущение ползания мурашек. Выраженная слабость. Мышцы вялые или спастически сокращаются. Когда пациент ложится, в теле возникает ощущение вибрации. Исхудание. Отвращение к умыванию. Пациенты, страдающие ревматизмом, гонореей и сифилисом. Стриктуры органической природы.

**Хуже.** После *ГОНОРЕИ*. *От жаркой постели. НОЧЬЮ. От умывания холодной водой.* От холодного воздуха. От света. Вместе с фазами луны происходит усиление (при растущей луне) и ослабление (при убывающей) симптомов. От ртути.

**Лучше.** От потоотделения. На открытом воздухе.

**Психика.** *Безразличие.* Страшно быть одному, но и желания находится пусть даже в приятном обществе нет. Болезни вследствие тоски по дому, ностальгии. Раздражителен, недоволен без всякой причины. Меланхолия.

**Голова.** Чувство замешательства, спутанности в голове; лучше на открытом воздухе. Высыпания: на затылке, по краю роста волос, мокнущие, пустулезные, чувствительные к прикосновению, зудящие.

**Глаза.** Ирит. Хронический конъюнктивит. Слезотечение. Глаза чувствительны к воздуху, вынужден их закрыть. Недомогания из-за яркого солнечного света. Жжение, как будто огонь вырывается из глаз и вызывает жгучую боль; хуже, когда закрывает глаза.

**Уши.** Звон в ушах, как будто колокольный.

**Лицо.** Боль в правой половине лица, распространяющаяся в глаз, ухо и висок; уменьшается, когда пациент держит холодную воду во рту. Опухание подчелюстных желез; можно нащупать твердые, пульсирующие при прикосновении бугорки. Рак губы.

**Рот.** Зубная боль усиливается ночью и от табака; уменьшается при втягивании воздуха через рот, от холодной воды. Окружающие чувствуют отвратительный запах изо рта пациента.

**Желудок.** Слабость во всех членах после еды, сопровождающаяся пульсацией артерий. Тошнота после курения, сопровождающаяся слабостью в голенях. Неприятное ощущение холода в желудке.

**Живот.** Боль из живота распространяется в грудную клетку, усиливается при дыхании и во время мочеиспускания. *Опухание паховых лимфатических узлов*, сопровождающееся дергающими болями; при скирре, при подавленной гонорее, суставном ревматизме.

Мочевыделительные органы. Струя мочи прерывистая, или моча *выделяется по капле* после мочеиспускания, *подтекает*. Приходится тужиться, чтобы выделилось несколько капель, потом струя мочи бывает нормальной. Стриктура уретры. Уретра кажется большой бечевкой, болезненной при надавливании. Жжение в уретре во время мочеиспускания. Пациент не может опорожнить мочевой пузырь за один прием. Последние капли мочи вызывают сильное жжение.

**Мужские половые органы.** Отвращение к половому акту. Яички твердые, в них болезненное ощущение, как после ушиба. Орхит. Яички низко свисают или втянуты. Опухание семенного канатика, сопровождающееся жжением и болезненностью, распространяющееся в живот. Жжение в половом члене во время эякуляции. Опухание правой половины мошонки. Жестокие эрекции, сопровождающиеся колющими болями в уретре.

**Женские половые органы.** Молочные железы набухшие, тяжелые, чувствительные; в них ощущается пронзающая боль, направленная наружу. Опухание и затвердение молочных желез. Стреляющая боль в молочной железе усиливается при мочеиспускании. Рак молочной железы сопровождается колотьем в плечах и матке. Менструации слишком ранние.

**Дыхательные органы.** Дыхание нарушается в особенности при ходьбе в гору или по неровной дороге. Лающий сухой кашель с колотьем в грудной клетке.

Сердце. Резкие колющие боли в сердце, направленные изнутри наружу.

**Конечности.** Слабость в конечностях после еды; или в сочетании с тошнотой — после курения табака. Опухание подмышечных лимфатических узлов.

**Кожа.** Жестокий зуд, обильное шелушение — усиливаются после умывания холодной водой. Везикулы, пустулы. Разъедающие высыпания превращаются в плоские разъедающие язвы, которые сопровождаются образованием толстых корок, возникновением экземы; хуже в области затылка и на коже нижней части голени. Варикозные язвы. Опоясывающий лишай.

**Сон.** *Сонливость.* Беспокойный сон со сновидениями; сопровождается ощущением вибрации во всем теле.

**Дополнительно.** Merc.

**Диф. диагноз.** Phos., Rhod., Staph.

## СОСА

**Общее.** Растение кока является источником алкалоида кокаина (*Cocain.*), который имеет свойство вызывать местное обезболивание. Это средство показано при истощении **ГОЛОВНОГО МОЗГА** и **НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ**; в том числе после физического и психического напряжения, а также в случаях *головокружения, одышки и упадка сил* при попадании в местности, расположенные высоко над уровнем моря, при восхождении на горы, при полетах на самолете и т.д.

Характерно ощущение, что под кожей находится червяк или маленькое инородное тело, исчезающее при прикосновении; если этот симптом сопровождает какое-либо заболевание, показана Кока. Это средство подходит старым людям. Пациенты с одышкой, слабые, нервные, тучные, полнокровные. Дети с признаками дистрофии. Мышечная слабость, сильное утомление мышц.

**Хуже.** При подъеме по лестнице, в гору — при восхождении. Высоко над уровнем моря. От холода. От нервного напряжения. От ходьбы. Сидя. От соленой пищи.

**Лучше.** *От быстрого движения, от езды на открытом воздухе.* После захода солнца. Когда лежит лицом вниз.

**Психика.** Признаки нервного истощения чередуются с воодушевлением. *Робкий*, застенчивый, неловко чувствует себя в обществе, конфузится; страстно желает уединиться, быть незаметным. Чувство приближающейся смерти. Слуховые галлюцинации; в том числе неприятные, как будто говорят о нем. Возбуждение с разговорчивостью, сопровождается видениями блаженства, счастья. Воодушевление, в том числе перед менструацией. Не имеет представления о том, что хорошо, а что — плохо. Не заботится о своей внешности, не следит за собой.

**Голова.** Головная боль сопровождается головокружением, ей предшествуют вспышки света перед глазами. При головокружении в затылке возникают удары. Мигрень: хуже при кашле; лучше от еды; лучше после захода солнца.

**Глаза.** Мерцание перед глазами. Белые, темные и огненные пятна перед глазами. Зрачки расширены. Диплопия.

**Уши.** Шум, звон в ушах.

**Нос.** Обоняние резко снижено.

**Рот.** Кариес зубов. Язык покрыт налетом. Во рту ощущение, как от перца.

**Горло.** Отрыжки: шумные, с напором, как будто пищевод разорвется.

**Желудок.** Долго чувствует себя совершенно сытым. Кока уменьшает чувство голода и жажду. Страстное желание алкоголя и табака. Не хочется ничего, кроме сладостей. Отвращение к твердой пище.

**Живот.** Дизентерия в местности, расположенной высоко над уровнем моря, в горах. Вздутие живота.

**Мужские половые органы.** Ощущение, что половой член отсутствует.

Импотенция при диабете.

**Женские половые органы.** Менструальная кровь изливается сплошным потоком, из-за этого женщина просыпается ночью.

**Дыхательные органы.** При потере голоса (афонии) применяется по 5—6 капель каждые полчаса перед предполагаемым выступлением. Старческая астма. Эмфизема. Пациент задыхается, возникает одышка, особенно у старых спортсменов. Охриплость усиливается от разговора.

**Сердце.** Сердцебиение; пульс резко учащен; наблюдаются приливы; сильное потоотделение.

**Конечности.** Ощущение ползания мурашек на руках, онемение рук. Когда идет, непроизвольно ускоряет шаг, голову наклоняет вперед при головокружении.

**Кожа.** Как будто под кожей — червяк, исчезающий при прикосновении.

**Сон.** Бессонница. Не может уgomониться, вертится, хотя сонный. Просыпается из-за удара, толчка в мозг.

**Диф. диагноз.** Cann-i.

## COCAINA

**Общее.** Симптомы двух препаратов, Кокаина и *Coca*, во многом сходны. Выражены сильнее у Кокаина, чем у *Coca* следующие симптомы: ощущение, как будто небольшое инородное тело или червяк находится под кожей; пациент видит и чувствует на своем теле и на одежде жуков; ему кажется также, будто часть тела отсутствует.

Представления о морали смутные. Страшные галлюцинации: как будто пациента преследуют. Он не заботится о своей внешности. Считает, что слышит неприятные замечания в свой адрес. Абсурдная, необоснованная ревность. Постоянное желание совершить что-то значительное, великое; совершить многочисленные подвиги, проявить необыкновенную силу. Хорея. Дрожательный паралич (паркинсонизм). Алкогольное и старческое дрожание.

## COCCULUS

**Общее.** Кукольван вызывает отупение, поскольку он нарушает деятельность *органов чувств* и поражает *центральную нервную систему*; он вызывает паралитическое расслабление мышц, сопровождающееся чувством тяжести.

Пациент очень подвержен страху, гнев, страдает от горя — он вообще предрасположен к психическим расстройствам. *Пациент слишком слаб, чтобы держать голову, стоять и даже говорить.* Паралич: лица; языка; глотки; паралич с ощущением онемения и покалыванием, пощипыванием.

Коккулюс подходит светловолосым, робким, нервным людям; это «книжный червь»; незамужние бездетные женщины; а также чувствительные романтические девушки. Истерия. Онемение. Ощущение *ПУСТОТЫ, ПУСТОГО ПРОСТРАНСТВА* или *ОПУСТОШЕНИЯ*: в голове, в грудной клетке, в животе. Как будто часть тела *онемела, утратила чувствительность.* Дрожь, содрогание. Болезненные сокращения (спазмы) в конечностях и в туловище. *Дрожание (тремор):* головы, нижней челюсти; возникает от волнения, от напряжения, от боли. Интенционный тремор. *Спазмы, судороги:* в мышцах; отдельно — в жевательных мышцах; в животе; как проявление их — дисменорея; спазмы в сердце. Спазмы проходят через тело, как разряды электричества.

Если не наступает или внезапно прекращается менструация, возникают судороги, конвульсии. Чередуемость симптомов. Последствия гнева, испуга, горя, тревоги, разочарования, ночного бдения, переутомления нервного и физического, путешествия, поездки, действия солнца, питья чая. *Чувствительность к холоду.* Пациент внезапно падает на землю без сознания. Обострены все чувства. *Кинетозы: морская болезнь, укачивание в поезде.* Пациент медлителен; он медленно двигается; отвечает; ему на все требуется много времени. Односторонние поражения. Подергивание отдельных мышечных групп.

**Хуже.** *От движения:* от поездки *НА СУДНЕ; В АВТОМОБИЛЕ; от плавания. От потери сна, бессонницы.* От прикосновения. От шума. От сотрясения. От переживаний, эмоций. Когда стоит на коленях. При наклоне. Во время менструации. От еды. *От тревоги. От холода.* На открытом воздухе. От напряжения. От боли.

**Лучше.** Сидя. В помещении. Лежа на боку.

**Психика.** Ошеломлен, оглушен. Глубокая печаль. Мысли сосредоточены на одном неприятном предмете; пациентка сидит, как будто погружена в глубокие и печальные размышления и не замечает ничего вокруг. Внезапная сильная тревога. Окружающее кажется нереальным. Медленно соображает. Обидчивый, не выносит возражений. Крайне печальный, молчаливый и раздражительный, капризный. Пессимист.

Время идет слишком быстро. Пьяница: ходит пошатываясь, орет, придирается, скандалит, поет. Пациент очень тревожится за здоровье других людей. Разговорчив, острит, шутит, танцует, жестикулирует. Видит что-то живое

на стенах, на полу, на стуле и т.д. Женщина непостоянна, на работе не доводит ничего до конца. Боится смерти и неизвестной опасности.

**Голова.** *ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ*; сопровождается тошнотой; сердцебиением; хуже в первой половине дня, до полудня; хуже, когда поднимает голову; головокружение ощущается в лобной области. Голова тяжелая. Боль в затылке и задней части шеи; хуже, когда лежит на затылке; лучше, выгнувшись назад; хуже от кофе. При головной боли не может лежать на спине. *Ощущение, что голова открывается и закрывается*, больше выражено в затылке. Судорожное дрожание головы из-за слабости мышц шеи. Спазмы в мышцах левой височной области.

**Глаза.** Боль в глазах, как будто они вырваны из глазниц (при головной боли). Глаза закрыты, при этом глазные яблоки постоянно вращаются; при судорогах. Глаза выпучены, экзофтальм. Зрачки сужены или расширены. Кажется, что предметы двигаются вверх и вниз. Подергивание век.

**Уши.** Чувствительность к звукам; пугается внезапного шума. Кажется, что ухо закрыто (правое). Шум в ушах, как от несущегося потока воды. Тугоухость.

**Нос.** Обостренное обоняние.

**Лицо.** Паралич половины лица. Спазмы в жевательных мышцах усиливаются, когда пациент открывает рот. Лицевая невралгия: боль иррадирует в пальцы на руках. Нижняя челюсть дрожит, зубы стучат, когда пациент пытается заговорить. Лицо одутловатое, перекошенное и холодное на ощупь.

**Рот.** Язык, как будто парализован, речь затруднена; или торопливая. Боли в корне языка возникают, когда пациент его высовывает. Металлический привкус во рту. Пища кажется недосоленной; табак кажется на вкус горьким. Боль в зубах уменьшается, если пациент сжимает зубы (когда во рту ничего нет). Чувство холода в зубах.

**Горло.** Паралич с нарушением глотания. Щекотание в горле сопровождается слезотечением. Сухость и жжение в пищеводе. Ощущение сжатия в горле; сопровождается затруднением дыхания и кашлем.

**Желудок.** Отвращение к любой пище и питью. Тошнота: подкатывает к голове или ощущается в ней. Позывы на рвоту. *Рвота*; сопровождается обильным выделением слюны; возникает при головной боли, боли в кишечнике; при простуде; рвотные массы кислые, горькие, с неприятным запахом. Ощущение, как будто в желудке шевелится червяк. Икота и спастическая зевота. Отвращение к запаху пищи. Рвота сопровождается продолжительной потерей сознания (syncope). Рвота при опухоли мозга; возникает от громкого разговора. Страстное желание пива. Ощущение, как будто человек долго был лишен пищи, оно проходит вместе с чувством голода.

**Живот.** Вздутие живота. *Кажется, что он наполнен острыми камнями*; возникает при каждом движении; сопровождается поносом; уменьшается, когда лежит на боку. *Колика* при метеоризме, живот «крутит», колика истерическая, нервного происхождения, она сопровождается обморочной слабостью, слюнотечением. Спазмы в эпигастрии, сопровождающиеся затруднением дыхания. Печень более болезненна после гнева, от малейшего сотрясения тела. Слабость мышц живота. Боль в области пахового кольца, как будто что-то выдавливается через него.

**Мочевыделительная система.** Частые позывы на мочеиспускание с выделением небольшого количества мочи; у беременных женщин. Водянистая моча.

**Мужские половые органы.** Болезненность, тянущая боль в яичках при пальпации, прикосновении к ним. Половые органы чувствительные, возникает сексуальное возбуждение.

**Женские половые органы.** Менструации ранние, обильные, слишком частые, кровь течет сплошным потоком, когда женщина встает на цыпочки. Выраженная слабость во время менструации, пациентка едва может стоять на ногах. Дисменорея, вслед за которой возникает геморрой. Матка сжата, как в тисках.

Гнойные, обильные (как из крана) бели между менструациями; или вместо менструации; бели изнуряющие; женщина едва может говорить. Бели выделяются сплошным потоком, когда женщина сидит на корточках или наклоняется; во время беременности, в сочетании с частыми позывами на мочеиспускание.

Чувство холода, дрожания в области молочных желез.

**Дыхательные органы.** Ощущение пустоты или спазмов в грудной клетке.

Истерическая астма. Кашель из-за ощущения удушья в горле. На расстоянии слышно гроыхание в грудной клетке (слева), как будто там пусто; оно усиливается при ходьбе. Сердце. Сердцебиение усиливается от быстрого движения, от нервного возбуждения; сопровождается головокружением и обморочной слабостью; затем возникает выпрямление рук, при этом большие пальцы на руках согнуты, приведены к ладони.

**Шея и спина.** Шея слабая, не может держать голову прямо. Боль в шее и хруст в шейных позвонках возникают, когда пациент поворачивает голову, когда зевает. *Слабость в позвоночнике; слабость в поясничном отделе позвоночника*; усиливается при ходьбе. Паралитическая боль в пояснице.

**Конечности.** Боль в плече, в руках, как будто они ушиблены. Кисти немеют; или попеременно то горячие, то холодные; немеют, когда пациент хватается за что-нибудь; дрожат во время еды. Неловко берет предмет в руку и роняет его. Конечности немеют, в них пропадает чувствительность. Дрожание и боль в конечностях. Колени слабые; при движении слышен хруст. Параплегия. Симптомы возникают то в одной, то в другой руке по очереди.



Конечности вытянуты, при сгибании в них возникает боль или наоборот. Неуклюжая походка. Отек стоп при параличе нижних конечностей. Кажется, что плечевая кость сломана. Онемение подошв; в том числе когда пациент сидит. Непроизвольные движения правой руки и правой ноги; лучше во время сна.

**Сон.** Бессонница вследствие нервного и физического истощения. Постоянная сонливость, дремота: после бессонной ночи; ухода за больным и т.д. Судорожная зевота в сочетании с икотой. Тревожные, страшные сны.

**Кожа.** Сильный зуд: хуже, когда раздевается; а также в пуховой постели. Язвы очень чувствительны к прикосновению.

**Лихорадка.** Зябкость с потоотделением, ощущением жара в коже. Озноб чередуется с жаром. Нервного происхождения лихорадка, напоминающая тяжелые, септические лихорадки; в том числе из-за приступов гнева. Озноб при колике, тошноте, головокружении. Потоотделение: от малейшего напряжения, оно возникает на большой части тела.

**Дополнительно.** Petr.

**Диф. диагноз.** Gels., Ign.

## COCCUS CACTI

**Общее.** Кошениль — это насекомое, которое живет *на кактусах*. Тинктура готовится из высушенных телец самок кошенили.

Коккус какти характеризуется поражением **СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК**: возникает *катар* (воспаление) и раздражение горла, дыхательных и мочеполовых путей. **ВЫДЕЛЕНИЯ ТЯГУЧИЕ, ВЯЗКИЕ**; в том числе кровь *при кровотечениях*: часто она представляет собой крупные черные сгустки. *Невыносимый внутренний зуд*, жжет, как от перца. *Пульсация* в разных органах. При боли возникает ощущение, как будто жидкость пробивается, прокладывая себе дорогу. *Спазмы*. *Мочекислый диатез*; подагра, ревматические заболевания. Анурия. Анасарка. Асцит. Общая усталость, апатия.

**Хуже.** Периодически. От жара. Лежа. От охлаждения. При пробуждении. От прикосновения. От давления одежды. При чистке зубов. От малейшего напряжения. **ИЗ-ЗА РАЗДРАЖЕНИЯ ЮРЛА**. При полоскании рта.

**Лучше.** От умывания холодной водой. При ходьбе. От холодного питья.

**Психика.** Печаль, грусть возникает ранним утром, при пробуждении, или после полудня, в 14—15 часов.

**Голова.** Пульсирующая боль с ощущением, что жидкость бьется, прокладывает себе дорогу.

**Глаза.** Ощущение инородного тела между верхним веком и глазным яблоком.

**Уши.** Треск в ушах при глотании.

**Нос.** Жжение, как от перца, в ноздрях. Скопление густой, вязкой слизи в носоглотке.

**Лицо.** Ощущение ползания мурашек. Лицо становится багровым, краснеет, особенно при кашле.

**Рот.** Когда громко говорит или чистит зубы, возникает кашель. В кончике языка ощущается жжение, как от перца. Сладковатый, металлический привкус во рту. Слюнотечение, постоянное желание сплевывать.

**Горло.** В большом количестве скапливается вязкая слизь; пациент *сплевывает* ее; из-за скопления слизи возникает кашель, позывы на рвоту, рвота. Ощущение, что нить свисает у задней стенки глотки. Любое раздражение горла вызывает кашель, позывы на рвоту и собственно рвоту. Ощущение сжатия горла; или как будто пробка вставлена в него. Обильные выделения из задних отделов носа. Ощущение, что нёбный язычок удлинён: пациент постоянно покашливает.

**Желудок.** Из-за раздражения горла, покашливания, чистки зубов возникают позывы на рвоту и рвота. Жажда: пьет воду часто и в большом количестве.

**Живот.** Мучительная боль из левой подвздошной области распространяется в паховые области и ниже, до середины бедра; возникает ощущение, как будто здесь пробивается жидкость, прокладывая себе дорогу.

**Мочевыделительная система.** Пронзающая, жестокая боль из почек распространяется в мочевой пузырь; в том числе в сочетании с дизурией. Сильные боли в почке при ее воспалении. Постоянно возникает позыв на мочеиспускание; улучшение у женщин наступает после выделения сгустков крови из влагалища. Боль вдоль мочеточников с ощущением, как будто что-то втыкается. Моча: скудная, густая, насыщенная, кислая; с осадком; *содержит песок*, темно-красная, коричневая или белая; содержит кровянистую слизь. Нефрит.

**Мужские половые органы.** Пульсация в головке полового члена.

**Женские половые органы.** Наружные половые органы (вульва) чувствительные, особенно — при мочеиспускании. Менструации слишком ранние, обильные, менструальная кровь черная и густая, с черными сгустками, менструации сопровождаются дизурией. Большие сгустки выделяются из влагалища, когда женщина мочится, когда не двигается или когда встает. Менструации прерывистые; кровь выделяется только вечером или ночью.

**Дыхательные органы.** РЕГУЛЯРНЫЕ ПРИСТУПЫ ЖЕСТОКОГО ЩЕКОЧУЩЕГО, МУЧИТЕЛЬНОГО КАШЛЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩЕЮСЯ РВОТОЙ ИЛИ ОТХАРКИВАНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПРОЗРАЧНОЙ ТЯГУЧЕЙ СЛИЗИ, свисающей изо рта; при этом ощущается *внутренний жар*, *лицо багрово-красное*. Хронический бронхит, осложненный появлением песка в моче. Коклюш. Кашель: периодический, медленно усиливающийся и затем

постепенно ослабевающий; лучше от холодного холода или холодного питья. Когда пациент идет против ветра, у него перехватывает дыхание. Болезненность или колющая боль в верхушках легких. Одышка. Кашель у пьяниц.

**Сердце.** Ощущение, как будто всё прижато к сердцу.

**Спина.** Ощущение холода в спине. Область почек болезненна при надавливании.

**Конечности.** Ощущение, как будто под ногтями пальцев рук — тонкие занозы.

**Лихорадка.** *Жгучий жар*; как от перца.

**Диф. диагноз.** *Apis, Verb., Lach., Phos.*

## COFFEA CRUDA

**Общее.** Между симптомами Коффея круда (сырой кофе) и *Coff-t.* (жареный кофе) не существует различий. Считается, что кофе является антидотом по отношению почти ко всем гомеопатическим средствам. Однако, вряд ли кофе может быть подобным антидотом, особенно если гомеопатические препараты назначаются в высоких потенциях (Clark). Опыт показывает, что правильно подобранное гомеопатическое средство действует, несмотря на употребление кофе.

Кофе повышает чувствительность *НЕРВОВ, ДЕЛАЯ ИХ ЧРЕЗМЕРНО ВОЗБУДИМЫМИ И ЧРЕЗМЕРНО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ*; все чувства *КРАЙНЕ ОБОСТРЕНЫ*; а эмоции, особенно чувство радости и *приятного удивления*, вызывают опасные симптомы.

*Боль*, прикосновение, *шум*, запахи становятся невыносимыми. Необыкновенно высокая активность ума и тела. Конвульсии у детей при прорезывании зубов, сопровождающиеся скрежетанием зубов и похолоданием конечностей. Судороги из-за неумеренных игр и чрезмерного смеха, хохота — у слабеньких детей.

Это средство подходит высоким, худощавым, сутулящимся смуглым людям; обладающим холерическим темпераментом.

Последствия таких переживаний, как страх, испуг, разочарование в любви, последствия *переутомления*; неумеренного смеха, продолжительного путешествия. Ощущение теплоты. Сильное нервное возбуждение и двигательное беспокойство. Истерия; крики, плач. Боль невыносима, доводит до отчаяния.

**Хуже.** *От шума.* От прикосновения. От запахов. На открытом воздухе, от холодного ветра. *От нервного напряжения*; от переживаний, эмоций. От переедания. От алкоголя. Ночью. От наркотиков. От сильных неприятных запахов.

**Лучше.** Лежа. Во сне. От тепла.

**Психика.** Экстаз; человек действует быстро, полон идей, поэтому *бодрствует, не может спать. Плачет, жалуется, беспокойно мечется*; из-за пустяков. Легко смеется и плачет; пациент плачет, потом вдруг начинает от всего сердца смеяться и, наконец, снова плачет. То веселый, то мрачный. Обижается и негодует, когда ему сочувствуют. Легко падает в обморок. *Раздражительный и беспокойный, не спит.* Испуг из-за приятной неожиданности, сюрприза. Пациент дрожит. Разбрасывает вещи.

**Голова.** Кажется, что мозг разорван на части, разбит вдребезги или раздавлен. Как будто гвоздь вколочен в голову. Сжимающая боль, с ощущением напряжения в голове. Голова кажется слишком маленькой. Чувствует и слышит хруст в темени. Биение в висках сопровождается жжением в глазах.

**Глаза.** Мелкий шрифт различает лучше. Зрачки расширены. Блестящие глаза.

Уши. Шум причиняет боль. *Слух обострен*; невольно слышит отдаленные звуки. Тугоухость с жужжанием в ушах, как будто пчелиный рой.

**Нос.** Обостренное, чувствительное обоняние. Носовое кровотечение; сопровождается тяжестью в голове, плохим настроением; возникает, когда пациент тужится во время стула.

**Рот.** Зубная боль: уменьшается, когда пациент держит ледяную воду во рту; боль усиливается, когда вода согревается; боль распространяется вдоль рук в кончики пальцев; возникает во время менструации. Вкус изысканный. Слюнотечение, в том числе во время беременности.

**Лицо.** Боль (справа), расходящаяся в стороны, иррадирующая. Лицо красное, горячее, с красными щеками.

**Горло.** Боль, как от пробки, с постоянным желанием сделать глотательное движение. Небный язычок слишком длинный.

Желудок. Чрезмерно сильный голод; ест и пьет торопливо. Желудок кажется перегруженным; в том числе при колике.

**Живот.** Одежда стесняет. Боли в животе, вызывающие чувство отчаяния (у женщин). Понос: у домохозяек из-за излишней загруженности домашними делами; у детей при прорезывании зубов.

**Мочевыделительная система.** Подавление мочеиспускания. Учащенное, обильное мочеиспускание с выделением бесцветной мочи.

**Мужские половые органы.** Половые органы горячие, чешутся.

**Женские половые органы.** Менструации слишком ранние и продолжительные. Дисменорея; выделяются крупные сгустки черной крови. Сладострастный зуд наружных половых органов (вульвы), но влагалище и вульва слишком чувствительны, чтобы их можно было потереть или почесать; вследствие этого возникает отвращение к

половому акту. Послеродовые схватки. Зубная боль, в том числе во время менструации. Сильные послеродовые схватки или схватки в родах; сопровождаются страхом смерти. Нимфомания.

**Дыхательные органы.** Отрывистый, сухой постоянный кашель; в том числе при кори; у нервных, нежных детей.

**Сердце.** Нервное сердцебиение, сопровождающееся дрожанием конечностей; хуже от солнечного тепла; возникает от неумеренного веселья или от удивления, от неожиданности. Внезапный подъем артериального давления.

**Конечности.** Дрожание кистей, не может держать ручку. Ишиас или невралгия бедренного нерва; хуже от движения; лучше от давления. Подергивание конечностей.

**Кожа.** Болезненно чувствительная. Зуд — пациент расчесывает кожу до крови.

**Сон.** **НЕРВНАЯ БЕССОННИЦА:** из-за наплыва мыслей; вследствие повышенной умственной активности; пациент слышит каждый звук или просыпается от него; бессонница возникает после радостного волнения.

**Лихорадка.** Лихорадка — при боли, пациент всегда готов расплакаться. Травматическая лихорадка.

**Дополнительно.** Асон.

**Диф. диагноз.** Coca, Ign.

## **COLCHICUM AUTUMNALE**

**Общее.** Безвременник оказывает выраженное воздействие на *МЫШЦЫ, соединительную ткань, серозные оболочки, СУСТАВЫ*, особенно мелкие. Это растение вызывает крайне выраженное расслабление мускулатуры: когда пациента приподнимают в постели, голова падает вперед или назад; руки беспомощно свисают.

Пациент *СЛАБЫЙ*, жалуется на ощущение внутреннего *ХОЛОДА*; **НО ОН ЧУВСТВИТЕЛЕН И БЕСПОКОЕН**. Боли рвущие, ковыряющие, тянущие. Они усиливаются от нервного напряжения и от переживаний, от малейшего прикосновения и вибрации. Одновременно поражается много суставов. Сильная боль на небольших участках, быстро меняющая локализацию; опухание при этом незначительное. Покалывание, пощипывание, ощущение ползания мурашек. Заболевания, характеризующиеся поражением сердца и суставов. Отеки. Гидроперикард, гидроторакс; асцит, гидрометра. *Склонность к коллапсу:* «влажный коллапс»; вследствие дегидратации, например, после повторной рвоты или поноса. Удары, как будто разряды электричества, проходящие через одну половину тела; хуже от движения.

Последствия: горя; плохого поведения других людей; промокания; *прекращения потоотделения*; ночного бдения; интенсивной учебы. Пациент раздражительный и впечатлительный, чувствительный к сильным запахам и т.д. *Быстро развивающаяся слабость, как будто все провалилось вниз*. Ощущение ползания мурашек. Даже небольшое повреждение ужасно болит. Когда пациент спотыкается, возникает очень сильная боль в пальцах ноги. Паралич после внезапного прекращения потоотделения, особенно на стопах, после промокания.

**Хуже.** *От движения. От прикосновения. Ночью.* Ехли споткнулся. От вибрации, сотрясения. **ИЗ-ЗА ПОГОДЫ** холодной; холодной и влажной. В сыром помещении. При перемене погоды. Осенью. От незначительного напряжения, как нервного, так и физического. Когда потягивается. От прекращения потоотделения. От захода солнца до восхода. От бессонницы. От запаха пищи.

**Лучше.** *От тепла.* В покое. Согнувшись пополам. Сидя. После стула. При наклоне.

**Психика.** Подавленный; раздражительный и чувствительный пациент. Может прочитать, но не может понять смысл маленького предложения. Слабая память. Сильные впечатления, такие как яркий свет, резкие запахи, прикосновение, дурные поступки других людей совершенно выводят пациента из себя.

**Голова.** Ощущение ползания мурашек в области лба. Давящая головная боль уменьшается после ужина, от тепла, если лежать неподвижно.

**Глаза.** Зрачки неодинаковые. Боль в глазном яблоке и вокруг него, распространяющаяся в затылок. Едкие слезы. Разная острота зрения. Глаза наполовину открыты. Видимое на глаз сокращение нижнего века. Неясное зрение после чтения.

**Уши.** Слух сильно обострен. Зуд в ушах. Кажется, что уши заложены.

**Нос.** Ноздри сухие и черные. **ОБОНЯНИЕ БОЛЕЗНЕННО ОБОСТРЕНО**; *тошнота от запахов*, вплоть до обморока и т.д. Упорный насморк.

**Лицо.** Черты заострившиеся. Лицо осунувшееся. Покалывание, пощипывание и отеки; щеки красные, горячие, потные. Боль позади угла нижней челюсти.

**Рот.** Язык ярко-красный, тяжелый, как будто одеревеневший и онемевший, высовывается с трудом. Глоссит. Вкус во рту пресный, горьковатый. Рот открыт. Слюнотечение сопровождается ощущением сухости во рту. Жар во рту сопровождается жаждой. Зубная боль усиливается от холодного и теплого.

**Горло.** В горле много зеленоватой жидкой слизи; она непроизвольно скапливается во рту.

**Желудок.** Голоден, но **ИСПЫТЫВАЕТ ОТВРАЩЕНИЕ К ЗАПАХУ И ВИДУ ПИЩИ**; лучше — полежать неподвижно. **ТОШНОТА**; позывы на рвоту. Жжение или ощущение ледяного холода в желудке; в том числе при колике. Страстно хочется разных продуктов, но после того как пациент их понюхает, возникает отвращение.

Хочется газированных или шипучих напитков. Плохо от яиц. Когда глотает слюну, возникает тошнота и позыв на рвоту.

**Живот.** Вздут; от прикосновения он сокращается; при этом пациент не может выпрямить ноги. Асцит: над паховой областью нависает кожная складка. Понос, после него возникают проявления подагры.

Стул очень болезненный, зловонный, холерный; либо содержит пленки, кровянистый, желеобразный, слизистый; после стула возникают тенезмы или спазмы в заднем проходе. Слизистый колит; в том числе после дизентерии. Осенняя дизентерия. Спастические, схваткообразные боли — колика. Мучительная боль сохраняется долго после стула.

**Мочевыделительная система.** Чем чаще позывы на мочеиспускание, тем больше выделяется мочи. Моча горячая, ярко окрашена, водянистая, мочеиспускание учащенное; моча кровянистая, черная, почти как чернила; с черным осадком. Альбуминурия, диабет. Нефрит.

**Мужские половые органы.** Отек мошонки.

**Женские половые органы.** Холодные бедра, в том числе после менструации. Ощущение опухания наружных половых органов и клитора. Лихорадочное беспокойство в последний месяц беременности.

**Дыхательные органы.** Кажется, что грудная клетка сжата рукой. Ночной кашель с непроизвольным выделением мочи. Сильная одышка.

**Сердце.** Режущие или жалющие боли в области сердца; слабое сердце. Заболевание сердца; в том числе после ревматизма. Гидроперикард. Сердечная астма. Перикардит. Давление и чувство стеснения в области сердца уменьшается при ходьбе. Пульс нитевидный, не определяется.

**Спина.** Тупая боль уменьшается от давления и в покое. Напряжение шейных мышц ощущается даже при глотании. Жесткая боль в области почек; лучше только, когда лежит на спине.

**Конечности.** Конечности холодные. Ощущение покалывания иголками в кистях и запястьях; онемение кончиков пальцев. Суставы красные, горячие, опухшие; скованные; летучие ревматические боли; хуже ночью. Опухание большого пальца ноги. Пациент не выносит прикосновения к нему. Покалывание, пощипывание в ногтях пальцев рук. Суставы пальцев рук деформированы, пальцы согнуты, но постоянно двигаются. Колени ударяются друг о друга, пациент с трудом ходит. Стопы и голени отекающие и холодные. Ягодицы горячие.

**Кожа.** Розовые пятна на коже спины, живота и грудной клетки. Крапивница. Кожа сухая, потоотделение подавлено или обильное.

**Сон.** Засыпает во время чтения. Спит на спине.

**Лихорадка.** Внезапно появляется и исчезает обильный кислый пот, в том числе при ревматизме. Тело горячее, конечности холодные. Холодный пот на лице. Кислый пот, в том числе по ночам.

**Дополнительно.** Ars., Spig.

**Диф. диагноз.** Ars., Carb-v., Verat.

## COLLINSONIA

**Общее.** Коллинзония вызывает *конгестию* — полнокровие тазовых органов, особенно заднего прохода, прямой кишки и матки; она приводит к возникновению *геморроя* и запору, особенно у женщин. Коллинзония показана *при заболеваниях, возникающих из-за геморроя или чередующихся с геморроем*, особенно при заболеваниях сердца.

Полнокровие в системе воротной вены приводит к хроническому катару, то есть воспалению в носу, глотке и желудке. Запор у детей из-за атонии кишечника. Ощущения сжатия и *увеличения* возникают в разных органах и частях тела — в конечностях, наружных половых органах, клиторе и т. д. Если это средство дать пациенту перед операцией по поводу болезни прямой кишки, то вероятность осложнений снизится. Отеки при болезни сердца.

**Хуже.** Из-за *геморроя*: когда он имеется или при его подавлении. *Ночью. Во время беременности.* От холода. От волнения, возбуждения.

**Лучше.** От горячего. Утром.

**Психика.** Мрачный человек.

**Голова.** Тупая боль в лобной области при запоре или геморрое, или из-за подавления геморроидальных кровотечений.

**Рот.** Язык желтый, горький привкус во рту.

**Горло.** Фарингит у ораторов, лекторов.

**Живот.** Неприятная тупая боль в области печени. Сильная роющая боль в области таза. Стул: светлый, в виде комков, приходится сильно тужиться. Слизистый или черный стул. Понос: стул едкий, вызывающий выпадение волос. Запор или геморрой у беременных женщин. *В прямой кишке* ощущается ломота, жжение, она кажется сухой, наполненной щепками или песком; эти ощущения сопровождаются *болью в сердце. Геморрой*: кровоточащий; хронический; *чередуются с сердечными* или ревматическими симптомами, или симптомами со стороны органов грудной клетки. *Выпадение заднего прохода. Зуд ануса.* Чередование запора и поноса. Хронический понос у детей. Понос после родов. Тяжелый запор при геморрое сопровождается твердым стулом.

**Мужские половые органы.** Варикоцеле, в том числе в сочетании с симптомами со стороны прямой кишки.

**Женские половые органы.** Выпадение матки; в том числе в сочетании с геморроем. *Зуд наружных половых органов (вульвы)*, в том числе при геморрое, во время беременности. Ощущение опухания половых губ и клитора. Дисменорея: мембранозная, в сочетании с геморроем. Ощущение холода в бедрах после менструации.

**Дыхательные органы.** Кашель от перенапряжения голоса. Пациент сплевывает кровянистую слюну после подавления геморроя. Боли в грудной клетке чередуются с геморроем.

**Сердце.** Сердцебиение, в том числе у лиц, страдающих геморроем. Когда уменьшаются сердечные симптомы, возобновляется геморрой или менструация.

**Конечности.** Ощущение, что конечности увеличились. Пациенту кажется, что нижние конечности ему не принадлежат.

**Лихорадка.** *Приливы жара*, в том числе в сочетании со стесненным дыханием; при геморрое.

**Диф. диагноз.** *Lycps-v., Nux-v., Sulph.*

## COLOCYNTHIS

**Общее.** В обычной врачебной практике растение колоцинт применялось как сильнейшее слабительное.

Гомеопатическое средство Колоцинт используется не только при острых заболеваниях **ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА** и, в частности, **КИШЕЧНИКА**: он оказывает продолжительное воздействие на крупные **НЕРВЫ**, особенно **ТРОЙНИЧНЫЙ**, а также **СЕДАЛИЩНЫЙ** и другие **спинномозговые нервы**.

В животе колоцинт вызывает боли — **ВНЕЗАПНЫЕ УЖАСНЫЕ («ЗВЕРСКИЕ»)**, **СУДОРОЖНЫЕ**, *сжимающие, рвущие*, из-за которых пациент *СКРЮЧИВАЕТСЯ, вертится, горько плачет, кричит*. Чтобы облегчить боль, он извивается или сгибается пополам; прижимает к животу что-нибудь твердое. Эти боли сопровождаются тошнотой и мочеиспусканием; боль так сильна, что возникает рвота.

Невралгия имеет характер *РЕЖУЩИХ, а также щемящих, сжимающих, грызущих или ковыряющих* болей, после которых возникает онемение; улучшение наступает от давления. Возникают спазмы и подергивание, а также укорочение мышц; или кажутся слишком короткими част<sup>Т</sup> тела. Возникает *сжатие, сокращение*.

Колоцинт подходит людям, легко гневающимся, раздражительным; в том числе склонным к полноте. Это средство подходит и женщинам, ведущим сидячий образ жизни, с обильными менструациями. Спазмы мочевого пузыря после хирургической операции на наружном отверстии уретры.

Последствия гнева, возмущения, досады, разочарования; горя, простуды. Сексуальные излишества. При боли возникают судорожные подергивания мышц и сжатие, сокращение. Ощущение, как будто большая часть тела туго стянута железным обручем. Биение, пульсация во всем теле. Ощущение жжения. Прострация, как будто совершенно выбился из сил. Падает в обморок: от боли, от холода. Ощущение ползания мурашек в больном месте.

**Хуже.** **ОТ ЭМОЦИЙ, ПЕРЕЖИВАНИЙ; ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ, разочарования.** От гнева. *Лежа на здоровом боку* — на том, которой не болит. Ночью в постели. От сквозняка. Когда простывает. Перед мочеиспусканием и после него.

**Лучше.** **ОТ СИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**, в том числе, если прижаться к острому краю. *От жара. В покое. От спокойного движения.* После стула или отхождения кишечных газов. Согнувшись пополам.

**Психика.** Сильно огорчается из-за несчастий, бед других людей. *Гневается, легко сердится, когда испытывает боль.* Отсутствует религиозное чувство. Кричит от боли; предпочитает ходить взад и вперед, не расположен разговаривать, не отвечает. Нетерпеливый. Не желает встречаться с другом. Угрюмый; обижается на все.

**Голова.** Головокружение, когда быстро поворачивает голову; в том числе влево. Головные боли усиливаются при наклоне, когда пациент лежит на спине и двигает веками; боли сопровождаются тошнотой, рвотой. Боли в корнях волос. Голова горячая.

**Глаза.** Когда пациент наклоняется, возникает ощущение, что глаза вывалятся. Жестокие боли в глазах перед возникновением глаукомы; глаза становятся твердыми, как камень. Боль в веках и подергивание их. Жжение в веках.

**Уши.** Звуки отдаются в ушах эхом. Ощущение ползания мурашек, зуд, колющая боль, тупая боль в ушах — все уменьшается, если засунуть в ухо палец.

**Лицо.** Невралгия тройничного нерва сопровождается глазными симптомами или чередуется с ними; эта невралгия сопровождается болью в животе, зябкостью. *Лицо искажено.* Щеки холодные. Боль, где бы она ни возникала, отражается на лице.

**Рот.** Постоянно ощущается горький привкус во рту. Жжение на кончике языка. Ощущение, что язык ошпарен. Зубы кажутся слишком длинными.

**Горло.** Спазмы в пищеводе, сопровождающиеся отрывкой воздухом и сердцебиением.

**Желудок.** Рвота из-за боли. Ощущение, что в желудке что-то упругое, неподатливое; тянущая боль в желудке. Сильная жажда. Рвота горькой жидкостью. Боль в желудке сочетается с болью в зубах и головной болью. Не усваивается картофель и крахмалистая пища. От кофе уменьшаются спастические боли — колика.

**Живот.** *ЖЕСТОКИЕ РЕЖУЩИЕ, СЖИМАЮЩИЕ, КАК В ТИСКАХ, СХВАТКООБРАЗНЫЕ, СХВАТЫВАЮЩИЕ, КАК БУДТО КОГТЯМИ, ИЛИ РАСХОДЯЩИЕСЯ, ИРРАДИИРУЮЩИЕ СПАСТИЧЕСКИЕ БОЛИ; ОНИ ВОЗНИКАЮТ В ВИДЕ ПРИЛИВОВ, ВОЛНООБРАЗНО; УМЕНЬШАЮТСЯ ПРИ СГИБАНИИ ПОПОЛАМ; ОТ СИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ; усиливаются от малейшего количества пищи; или* питья, исключая кофе, а также курение табака.

Колика при метеоризме. *Кишечник кажется сдавленным, зажатым между камнями.* Колика сопровождается судорогами в икроножных мышцах; возникает, если пациент пьет, когда перегреется. Рези в кишках в области пупка. Давление уменьшает острую боль в животе, но если боль сохраняется продолжительное время, живот становится чувствительным, в этом случае от давления боль усиливается.

*Стул: пенистый, водянистый, с пленками, желтый, кисловатый или желеобразный; сопровождается метеоризмом и болью.* Дизентерийный стул, возникает всякий раз после незначительного количества пищи или питья. Из ануса выскакивают скользкие пузырьки. Во время колики младенец лежит на животе и кричит, если его слегка пошевелят. Хронический водянистый понос с ухудшением утром. Понос: из-за боли, от гнева, сопровождающегося негодованием, возмущением.

**Мочевыделительная система.** Во время стула вдоль уретры ощущается жжение. После мочеиспускания боль распространяется на весь живот. Почечная колика сопровождается выделением мочи. Спазмы мочевого пузыря после хирургической операции на наружном отверстии уретры.

Моча: желеобразная, клейкая, тягучая. Твердые красные кристаллы оседают на стенках сосуда. Моча белая, как молоко, свертывается, когда постоит; диабет.

**Мужские половые органы.** Ощущение, как будто по обеим сторонам живота все стекает по направлению к половым органам, вызывая семяизвержение. Парафимоз.

**Женские половые органы.** Сжимающая, как когтями, боль в области яичников; лучше, когда женщина поджимает ноги, сгибаясь пополам; эта боль сопровождается двигательным беспокойством. Дисменорея с ухудшением от еды и питья. Киста яичника: боль уменьшается при сгибании ноги и подтягивании бедра к животу. Подавление менструации или лохий из-за негодования. Обильные менструации у женщин, ведущих малоподвижный образ жизни. Болезненные узлы в молочных железах. Опухоли яичников, кисты.

**Дыхательные органы.** Когда пациент курит, возникает сухой отрывистый кашель. Затруднение дыхания во время менструации; при опухоли яичника.

**Сердце.** Кажется, что растянутый желудок толкает сердце кверху. Сильная пульсация во всех кровеносных сосудах.

**Спина.** Боль под правой лопаткой; лучше от давления. Тупая боль в пояснице уменьшается от давления. *Боли, похожие на судороги, в области крыльев таза (в верхней части бедер);* лучше, когда пациент лежит на больном боку. Скованность в шее усиливается при движении головой. Ощущение, как от тяжелого груза, в области поясницы и спины; лучше, когда пациент лежит на левом боку.

**Конечности.** Контрактуры мышц. Ишиас: боли стреляющие, как от повязки, сжимающие; уменьшаются от давления, от горячего (от жара); усиливаются от малейшего движения, от вращательного движения (ротации), ночью. Конечности подтянуты, как у ежа. Судороги в мышцах во время коитуса. Боль в дельтовидной мышце (справа). Колени кажутся скованными, холодными. Стопы при колике холодные.

**Сон.** Бессонница и двигательное беспокойство при болях; в том числе после гнева.

**Лихорадка.** Кисти и стопы холодные, все тело теплое. Озноб, дрожь, пациент ежится при болях. Потоотделение: возникает ночью, пот холодный, пахнет, как моча.

**Дополнительно.** Caust.

**Диф. диагноз.** Staph.

## **СОМОСЛАДИЯ**

**Общее.** Это растение оказывает раздражающее действие, подобно *Rhus-t*. Оно вызывает злокачественное воспаление кожи, сопровождающееся ужасным опуханием или *ОТЕКОМ*, в частности, левой голени и стопы. Жжение, зуд в глазах — они кажутся слишком большими. Сильная боль в правом глазу, он кажется большим, выступает вперед больше, чем левый. Цилиарная невралгия. Жгучий зуд носа, сопровождающийся сильным чиханием.

При кашле возникает боль под левой молочной железой или ниже соска, распространяющаяся в левую лопатку. Блуждающие суставные (ревматические) боли. Глубокие язвы с твердыми краями. Лепра. Кожа красная повсюду. Рецидивирующая экзема.

**Хуже.** От прикосновения. От тепла. В покое. Ночью.

**Лучше.** На открытом воздухе. От движения. Если почесать кожу.

## CONIUM MACULATUM

**Общее.** Это тот яд, который, как полагают, принял греческий философ Сократ и который стал причиной его смерти.

Болиголов поражает *НЕРВЫ И МЫШЦЫ*, вызывая нарушение координации и паралич; возникает неуверенная походка; затруднение речи; пациент постепенно *СЛАБЕЕТ. Неправильное, беспорядочное действие*, а также возникновение симптомов. Пациент при ходьбе внезапно теряет силы. *Дрожание* всех конечностей. Пациент *внезапно чувствует дурноту и слабость*, сопровождающуюся онемением.

Это средство полезно пожилым людям, а также преждевременно состарившимся; старым девам, холостякам, юношам, страдающим от болезненных последствий мастурбации.

Железы, особенно *МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ* и яичники, переполнены кровью, *УПЛОТНЕНЫ ТВЕРДЫЕ, КАК КАМЕНЬ. Ощущение комка: в мозгу; в эпигастрии.*

Восходящие симптомы — распространяются снизу вверх: восходящий паралич; в том числе после дифтерии. Рвущие, колющие, как ножом, боли. Новообразования. Артериосклероз. Полиневрит. Предрасположенность к раку — раковый диатез. Пациентам становится хуже, когда они ничем не заняты, бездельничают. Приступы истерии и ипохондрии из-за сексуального воздержания или после сексуальных излишеств. Истерические судороги.

Последствия контузии, удара, перенапряжения, чрезмерной работы, горя. Пациент быстро пьянеет. Женщины с подорванным здоровьем, уставшие от жизни, упавшие духом; им кажется, что они вот-вот заплачут; они делают глотательные движения, давятся, ощущение комка в горле. Нарастающая *слабость. Хронические состояния.* Одежда мешает. Пациент падает в обморок во время стула. Ощущение обруча или повязки, или чего-то, что плотно обхватывает большую часть тела.

**Хуже.** КОГДА СМОТРИТ НА ДВИЖУЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ. ОТ АЛКОГОЛЯ. При поднимании рук. После напряжения — физического или нервного. От травмы. После сексуального насилия или сексуальных излишеств. От воздержания. От холода, при простуде. В старческом возрасте. Лежа; когда лежит с низко опущенной головой. Когда поворачивается в постели. От давления тесной одежды. От сотрясения. Ночью. Стоя. Перед менструацией и во время нее. От сухого, горячего воздуха. Весной.

**Лучше.** Свесить большую часть тела вниз. Когда наклоняется. От движения, при ходьбе. На солнце. В темноте. От давления. Когда ходит согнувшись. Когда садится. Когда голодает.

**Психика.** Подавлен, робок, не любит общество, и все же боится оставаться один. Медленно соображает; с трудом понимает. Слабая память. Нет желания заниматься ни делами, работой, ни учебой. Безразличие. С трудом понимает то, что читает. Суеверный. Не способен на продолжительное умственное напряжение. Периодическое безумие, циркулярный психоз (маниакально-депрессивный психоз).

Когда идет по дороге, возникает желание остановить кого-нибудь и оскорбить. Пустяки кажутся важными. Считает, что животные прыгают по его постели. Женщина печальна; недовольна собой и окружающим. Не может думать после напряжения зрения. Очень мало заботится о вещах; делает бесполезные покупки, не бережет или ломает, портит вещи. Пациент любит носить свою лучшую одежду. Печаль усиливается от сочувствия. Как будто великая вина тяготит пациента. Женщине страшно, когда она остается одна; но она очень боится незнакомцев или общества, компании — во время менструации.

**Голова.** ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: *вращательное; усиливается, когда пациент лежит; когда он поворачивается в постели; от малейшего движения глаз или головы;* в том числе у стариков. Горячие участки на голове. Ощущение, что виски сдавлены; хуже после приема пищи. Как будто комок в правой половине мозга. Мигрени, при которых пациент не может помочиться. Головная боль из свода черепа распространяется в затылок; уменьшается при наклоне и при движении головы. Ощущение полноты, распирающего, как будто мозг лопнет, возникает при головной боли. Одна сторона головы онемевшая и холодная.

**Глаза.** Пациенту кажется, что у него косоглазие. Веки тяжелые, нависают; сильнее снаружи. Светобоязнь и сильное слезотечение; без воспаления или из-за малейшей ссадины или изъязвления глаза. Жжение в глазах. Предметы окрашены, в том числе в красный цвет (эритропсия). Ощущение, как от челки, спадающей на глаза. Снижение зрения при искусственном освещении. Катаракта после травмы глаза. Птоз век. Пациент потеет после того, как закроет глаза. Диплопия. Черные пятна перед глазами при головокружении. Близорукость (миопия). Когда пациент сердится, зрение становится неясным. **Уши.** Скопление ушной серы, похожей на мягкую, мятую бумажку; или кроваво-красной плотной ушной серы, из-за которой снижается слух. Повышенная чувствительность к шуму. Околоушная железа опухшая и твердая. Когда пациент сморкается, кажется, что уши заложены.

**Нос.** Обоняние обострено. Легко возникает кровотечение, пациент постоянно ковыряет в носу. Полип носа. Частое чихание. Упорная заложенность носа.

**Лицо.** Мокнувший, расплывающийся по лицу герпес. Рак нижней губы (от давления курительной трубки). Подчелюстные железы опухшие и твердые.

**Рот.** Зубная боль усиливается от холодной пищи, но не от холодных напитков. Речь затруднена из-за паралича языка. Рак языка. Слюна кислая. Перекошены рот и язык.

**Горло.** Как будто из желудка подкатывает к горлу округлое тело (globus). Пища попадает не в то горло и не двигается во время глотания. Парез пищевода. Постоянное желание сделать глотательное движение, как будто комок в горле; сильнее при ходьбе на открытом воздухе. Миндалины увеличены.

**Желудок.** Едкая изжога и едкие отрыжки; сильнее, когда пациент ложится спать. Вздутие желудка после питья молока. Боль в желудке уменьшается от еды, но усиливается через несколько часов после еды (через 2 или 3 часа); уменьшается в коленно-грудном положении. Тошнота и рвота во время беременности. Страстное желание кофе, соли, кислого. Отвращение к хлебу. Рвотные массы в виде кофейной гущи, в виде комков шоколадного цвета или прозрачной кислой жидкости. Рак, язва желудка.

**Живот.** Вздутие живота усиливается после питья молока. Режущая боль в животе возникает перед тем, как отойдут кишечные газы. Сильная тупая боль в печени и вокруг нее. Хроническая желтуха и боль в правом подреберье. Дрожание всего живота. Живот твердый, вздутый. Каждый раз после стула появляется слабость с дрожанием, сердцебиение. Непроизвольный стул; в том числе во сне. Холодные кишечные газы, холодный стул. Запор: стул бывает через день. Жжение или ощущение холода в прямой кишке. Боль из подчревной области (из гипогастрия) распространяется вниз, вдоль голеней. Безрезультатные позывы на стул.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание прерывается: то прекращается, то возобновляется; лучше стоя. Подтекание мочи, выделение по каплям у стариков. Рези и жжение после мочеиспускания. Трудно начать мочеиспускание, даже стоя, затем моча выделяется без труда. Моча кажется горячей.

**Мужские половые органы.** Яички увеличены. Эрекции недостаточные и продолжаются слишком недолго. Поллюции может спровоцировать простое присутствие женщины или ее прикосновение. Нервозность и уныние по поводу секса; в том числе после коитуса. Болезненные последствия подавления сексуального желания. Рези в уретре во время семяизвержения. Подтекание секрета простаты (простаторея); хуже во время стула, от эмоций и т.д. Зуд крайней плоти. Сексуальное желание без эрекции. Импотенция.

**Женские половые органы.** Менструации нерегулярные; слишком поздние; скудные. Дисменорея сопровождается тянущим ощущением — вниз, вдоль бедер. *Молочные железы увеличены и становятся болезненными* перед менструацией и во время нее; боль усиливается при каждом шаге. Хочется с силой придавить грудь рукой. Молочные железы дряблые и сморщенные, при этом сексуальное желание имеется или отсутствует. Твердые опухоли в молочных железах; в том числе сопровождающиеся колющей или пронзающей болью. Рак. Колотье в молочной железе и в сосках, когда женщина делает глубокий вдох или при ходьбе. Перед менструацией выделяется большое количество молока.

**Бели:** белого цвета, *едкие*; им предшествуют сжимающая, как тисками, боль в животе; они выделяются, в том числе, после мочеиспускания. Режущая боль в яичниках и матке. Яичники увеличены и плотные; пронзающие боли в них. Оофорит. Во время менструации женщина боится оставаться одна, но в то же время сильно пугается чужих людей и боится компании. Болезненные последствия подавления сексуального желания, подавления менструаций. Болезненные движения плода при беременности. Выпадение матки, когда при твердом стуле приходится тужиться. Зуд глубоко во влагалище.

**Дыхательные органы.** Постоянный мучительный кашель, возникающий из-за участка сухости в гортани или из-за щекотания в груди и в яремной ямке; усиливается, когда пациент ложится, смеется, говорит, а также во время беременности; вынужден сесть, подняться в постели. Кажется, что кашель возникает в животе. Влажный кашель без отхаркивания мокроты, приходится глотать то, что откашливает. Кариес (остеомиелит) грудины. Одышка усиливается от малейшего усилия. Одежда, как груз, давит на грудную клетку и плечи. Пациент кашляет, когда делает глубокий вдох. Ощущение сжатия, стеснения в груди уменьшается от кашля. Резкая боль распространяется из грудины в позвоночник.

**Сердце.** Сердцебиение: усиливается от напряжения, когда пациент пьет, во время стула и т.д. Пульс неравномерный, аритмичный.

**Спина.** Боль между плечами. Травма позвоночника. Тянувшая боль в поясничных позвонках усиливается, когда пациент стоит. Кокцигодия. Опухоль на ножке в середине спины. Шея холодная. Утолщение шеи. Маленькие плоские бородавки, как наросты, на ягодицах.

**Конечности.** Плечи, как будто ушиблены; одежда на них давит, как тяжелый груз. В кистях *ощущается* усталость, они тяжелые, дрожат, нетвердые. Увеличение подмышечных лимфатических узлов. Ногти желтые. Онемение пальцев на руках и ногах. *В пятках* ощущение, как будто кость вылезает наружу. Стреляет в пятках. Пот на кистях. Слабость в нижних конечностях, как будто они парализованы. Хруст в коленном суставе. С закрытыми глазами пациент устойчив, может ходить ровно, но пошатывается и чувствует головокружение, тошноту, когда идет с открытыми глазами.

**Сон.** Сонливость, дремота днем. Спит после полуночи. Кошмарные сновидения.

**Кожа.** *Зеленоватая*, как старый синяк. Красные пятна становятся желтыми или зелеными. Крапивница из-за сильного физического напряжения. Зловонные или экзематозные высыпания. Гангренозные язвы. Петехии у ста-



риков. Анестезия или вялость, бездеятельность кожи. Папулы мелкие, красные, жгучие, появляются при скудных менструациях и исчезают после менструаций.

**Лихорадка.** Холод в задней части шеи, в области икроножной мышцы и т.д. *Приливы* жара; или *потоотделение*; возникают *при засыпании* или даже когда пациент закрывает глаза. Пот: на коже под глазами, на подбородке, в подколенной ямке; холодный пот на задней поверхности шеи и на ладонях; зловонный пот, из-за которого возникает жжение, саднение на коже.

**Дополнительно.** Phos.

**Диф. диагноз.** Arn., Bar-c, Calc-f., Caust., Gels., Iod.

## CONVALLARIA MAJALIS

**Общее.** Это средство полезно при болезнях сердца.

Расширение сердца, не сопровождающееся компенсаторной гипертрофией; в том числе когда имеется выраженный венозный застой. Конвал-лярия усиливает сердечную деятельность, делая ее более ритмичной. Болезненность области матки сочетается с сердцебиением. Ощущение, как будто сердце перестало биться, а затем совершенно неожиданно начинает снова работать. Движение в животе, как от кулачка ребенка. Одышка; отеки; склонность к задержке мочи — анурии. Сердце курильщика.

**Хуже.** Лежа на спине. В теплом помещении.

**Лучше.** На открытом воздухе.

## СОРАІВА

**Общее.** Копайва действует на *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ мочеполовой системы* и бронхиального дерева, вызывая обильные выделения. *ЗЛОВОННЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ; БЛЕННОРЕЯ* (выделения при гонорее); *бронхорея*, нагноение.

**Хуже.** Утром. При простуде.

**Психика.** Плачет, когда слышит звуки фортепьяно.

**Голова.** Головная боль в затылке; лучше от легкого давления руки. Приливы крови к голове и лицу.

**Уши.** Чрезвычайная чувствительность к резким звукам.

**Нос.** Жжение и сухость в носу. Носовое кровотечение у маленьких мальчиков, продолжающееся несколько дней. Обильные густые вонючие выделения.

**Лицо.** Угри. Обезображивание лица. Лицо красное, румяное.

**Рот.** Хронический катар. Зубы холодные.

**Желудок и живот.** Пища на вкус кажется слишком соленой. Стул представляет собой слизистую массу или покрыт слизью. Слизистый колит.

**Мочевыделительная система.** Пульсация в половом члене. Кажется, что уретра зияет, широко раскрыта. Моча едкая, скудная, кровянистая; с запахом фиалок. Дизурия. Катар мочевого пузыря. Нагноение, распространяющееся ретроградно, в направлении почек. Гнойные или едкие, похожие на молоко, гонорейные выделения.

**Дыхательные органы.** Кашель сопровождается отхаркиванием обильной, серой, гнойной, зеленоватой, зловонной мокроты. Бронхоэктазы. Болезненный кашель с жаром и стеснением в груди. Жжение в легких. Зловонная кровянистая мокрота.

**Кожа.** Крапивница, сопровождающаяся лихорадкой и запором. Хроническая крапивница у детей.

**Дополнительно.** Ser.

**Диф. диагноз.** Tег.

## CORALLIUM RUBRUM

**Общее.** Красный коралл содержит карбонат кальция (*Calc.*) и окись железа.

Кораллиум рубрум показан при поражении *СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК*, в особенности, *ДЫХАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ*; при появлении изъязвлений и тягучих выделений.

Чувство, как будто холодный воздух проходит сквозь череп и через дыхательные пути. Пациенту слишком холодно, когда он раскрывается, и слишком жарко, когда он укрыт; лучше от искусственного тепла, с обогревателем. Кораллиум подходит нервным людям; включает признаки сифилиса и псоры.

**Хуже.** От вдыхания воздуха; при перемене обстановки; от еды. Ближе к утру.

**Психика.** Сварливый, неуживчивый пациент; склонен ссориться и проклинать свои боли.

**Голова.** Лоб как будто стал плоским. Головная боль сопровождается сильной болью в задней части глазных яблок; хуже при вдыхании холодного воздуха. Голова кажется большой, пустой, как сосуд. Как будто холодный воздух продувает голову, когда пациент ее медленно поворачивает или трясет.

**Глаза.** Горячие и болезненные; слезятся после того, как пациент закрывает их.

**Нос.** Обильная секреция слизи, капающей из задних отделов носа; из-за нее приходится часто откашливаться. Катар задних отделов носа (рино-фарингит). Воздух кажется холодным. Носовое кровотечение.

**Лицо.** При кашле становится багровым или черным.

**Рот.** Пища имеет вкус опилок. Хлеб на вкус кажется соломой. Пиво кажется сладким. Страстное желание соли.

**Дыхательные органы.** *Почти постоянные приступы жестокого спастического кашля*, кашель начинается с затруднения дыхания, лицо становится багровым; затем возникает рвота тягучей слизью и *истощение*. Кашель с реверберацией, отдается, как пушечные выстрелы во время салюта. Кашель возникает, как только пациент начинает есть. Продолжительный истерический кашель; или кашель, характеризующийся возникновением отдельных кашлевых толчков через правильные промежутки времени в течение всего дня. Дыхательные пути кажутся холодными, когда пациент делает глубокий вдох. Коклюш.

**Кожа.** Очень красные плоские мягкие шанкры на головке полового члена и на внутреннем листке крайней плоти. Псориаз ладоней и подошв. Гладкие пятна очень темного красного цвета; который впоследствии изменяется на цвет меди.

**Сон.** Спит, укрывшись с головой одеялом.

**Дополнительно.** Sulph.

**Диф. диагноз.** Сос-с.

## CORNUS CIRCINATA

**Общее.** Это средство для лечения старой малярии.

Пациент слабый и подавленный. *Печеночные симптомы сопровождаются тупыми болями в глазных яблоках*. Темный зловонный стул, сопровождающийся жжением в заднем проходе. Понос: стул темный, с желчью, с неприятным запахом; при этом лицо пациента болезненно-желтое. Везикулезная сыпь на лице у грудных младенцев, страдающих молочницей. Сонливость перед ознобом, в сочетании с жаром; а также после приема пищи.

**Хуже.** Когда простывает. Ночью.

## CRATAEGUS

**Общее.** Боярышник действует на сердечную мышцу — он усиливает работу сердца. Он совершенно не обладает кумулятивным действием. Пациент ослаблен и истощен, иногда внезапно слабеет.

Поражение сердца в случае кровопотери и при мочекишечной диатезе, подагре. Высокое артериальное давление. Артериосклероз. Коллапс при брюшном тифе. Кровотечения из кишечника. Одышка. Отеки.

**Хуже.** В теплом помещении.

**Лучше.** В покое. В тишине. На свежем воздухе.

**Психика.** Раздражается, сердится, делает все по-своему, грустит; в отчаянии.

**Мочевыделительная система.** Диабет, особенно у детей.

**Дыхательные органы.** Кашель с мокротой, напоминающей яичный белок.

**Сердце.** *СЛАБОЕ*; чувство стеснения, колющая боль и *бессонница*. Сердечная астма. Миокардит. Недостаточность сердечных клапанов. Расширение сердца. Стенокардия. Сердечные отеки. Пульс частый, аритмичный и малый, перемежающийся. Боль под левой лопаткой, а также под левой ключицей.

**Кожа.** Жгучие, саднящие высыпания на задней части шеи, в подмышечных впадинах и на подбородке; хуже от жара и от потоотделения; лучше от умывания. Пальцы рук и ног синие.

**Лихорадка.** Пациент очень сильно потеет. Потливость ладоней.

**Диф. диагноз.** *Apos, Stroph-h.*

## CROCUS SATIVA

**Общее.** Шафран оказывает влияние на *НЕРВЫ* и *ПСИХИКУ*, вызывая *быструю смену настроения или чередование противоположных психических состояний*: гнев с неистовством быстро сменяется уничижением и раскаянием; вслед за смехом появляются слезы. Симптомы быстро перемещаются с одной стороны на другую, или происходит чередование психических и физических симптомов.

Судорожное подергивание или спастическое сокращение отдельных групп мышц. Хорея и истерия. Приступы хореи каждые семь дней, сопровождаются веселостью, пением и танцами. Изнеможение, усталость и обморок: при носовом кровотечении, метроррагии. Сонливость; уменьшается, если заняться литературой. Ощущение покалывания, пощипывания, ползания мурашек, а также зуд. *Ощущение, как будто внутри шевелится что-то живое*: в животе, в грудной клетке и т.д.; это сопровождается тошнотой, слабостью, дурнотой и дрожанием тела; либо отдельные части тела *подскакивают*.

**КРОВОТЕЧЕНИЕ:** кровь темная, вязкая, со сгустками, в виде длинных черных нитей, свисающих из кровоточащего отверстия тела.

Крокус подходит истеричным личностям. Опухоли. Липома. Опухоль головного мозга. Последствия удара.

**Хуже.** От движения. В пубертатном возрасте. Во время беременности. От жара. Когда голодает. Когда ложится. От чтения. В новолуние и в полнолуние. Когда пристально смотрит.

**Лучше.** После завтрака. На открытом воздухе. Когда зевает.

**Психика.** Впечатлительный; нежный, человек настроения. Колеблется, нерешительный. Переменчивое настроение. Веселая мания. Подпрыгивает, танцует, смеется, насвистывает, хочет всех целовать. Начинает петь, услышав единственную ноту из песни. Непроизвольный смех и слезы; сильнее от музыки.

**Голова.** Стучащая, пульсирующая головная боль во время климакса, во время менструации или вместо менструации; уменьшается от давления.

**Глаза.** Сухость, жжение в глазах, как после плача; как будто холодный воздух с силой дует сквозь глаза. Как будто в глаза попал дым. Пациент вынужден часто моргать и тереть глаза, как будто их покрывает пленка слизи; должен крепко зажмуриться. Ощущение, как будто смотрит сквозь очень сильные очки. Электрические искры или прыгающие пятна перед глазами. Когда читает, возникает слезотечение. Подергивание верхнего века.

**Уши.** Шум в ушах при тугоухости; сильнее при наклоне.

**Нос.** Носовое кровотечение: нити темной крови свисают из носа; при этом пациент чувствует слабость, на лбу выступает холодный пот. Носовое кровотечение в пубертатном возрасте; в том числе у юных девушек.

**Лицо.** Горячее, красное или попеременно бледное и красное.

**Рот.** Необычно тепло во рту. Кислый привкус. Скверный запах изо рта.

**Горло.** Ощущение, как будто нёбный язычок стал длиннее: при глотании и когда не глотает; при истерии. Чувствует тошноту в горле и в груди.

**Желудок и живот.** Необычайная жажда холодного питья. Ощущение, как будто что-то живое подпрыгивает в желудке и животе (с левой стороны). Стул содержит темную вязкую кровь. Стойкий запор; в том числе у младенцев. Ощущение ползания мурашек и колющая боль в анусе. Проблемы с желудком, вздутие живота, отрыжки, рвота и т.д. после хирургического лечения геморроя.

**Мужские половые органы.** Сексуальное возбуждение.

**Женские половые органы.** Менструальные выделения темного цвета, зловонные, тягучие. Угрожающий выкидыш. Маточное кровотечение: усиливается от малейшего движения; усиливается в новолуние или в полнолуние. Метроррагия. «Прыгающая» боль в левой молочной железе; как будто она подтянута к спине; как будто что-то живое прыгает в правой молочной железе. Ложная беременность. Движения плода сильные и болезненные.

**Дыхательные органы.** Сухой кашель уменьшается, если положить руку на область эпигастрия. Мокрота тянется нитями. Тяжесть в грудной клетке, пациент должен сделать глубокий вдох.

**Сердце.** Ощущение жара, поднимающегося к сердцу, мешает дышать; лучше, когда зевает. Тупые уколы в левой половине грудной клетки.

Сердце бьется беспокойно; хуже, когда пациент поднимается по лестнице.

**Спина.** Внезапное чувство холода: как будто на пациента вылили холодную воду.

**Конечности.** Хруст в коленных и тазобедренных суставах; сильнее при наклоне. Конечности холодные, как лед; при метроррагии, при носовом кровотечении.

**Кожа.** Ощущение покалывания и ползания мурашек на коже. Кожа ало-красная или в пятнах; старые рубцы раскрываются и нагнаиваются. Крокус рассасывает опухоли. Липома. Опухоль головного мозга.

**Сон.** Глубокий сон. Поет во сне.

**Лихорадка.** Приливы внутреннего жара, сопровождающиеся ощущением ползания мурашек и покалыванием на коже. Потеет только нижняя половина тела. Постоянный, со скверным запахом пот, из-за него нарастает слабость; наблюдается в том числе при кровотечениях после родов.

**Диф. диагноз.** Ign., Tarent.

## **CROTALUS HORRIDUS**

**Общее.** Яд гремучей змеи поражает *КРОВЬ; сердце; печень*. Он вызывает глубокий нервный шок, сопровождающийся *смертельной дурнотой, дрожью и упадком сил, протрацией*.

Пациент быстро устает даже от незначительного напряжения. Паралич; в том числе после дифтерии, прогрессивный паралич. Кроталюс вызывает деструкцию крови и тканей. *КРОВОТЕЧЕНИЯ*: кровь течет медленно, сочится, она темная, жидкая, без сгустков; выделяется изо всех отверстий тела и со всех поверхностей, особенно *из глотки*. Кровянистый гной, кровавый пот. Быстрое разрушение тканей, сопровождающееся *гниением* и возникновением *ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ*. *Части тела* темные или *синеватые*. *Септические состояния*, включая воспаление миндалин; а также зоб, язвы, абсцессы, *кровяные гнойники*. Петехии. Гангрена. Невралгия как осложнение сепсиса. Хроническая желтуха, климакс. Обмороки. Конвульсии; эпилепсия; сопровождающиеся дрожанием конечностей, появлением пены изо рта, нечеловеческим криком, бредом. Чума. Желтая лихорадка. Желтуха. Генерализованное ощущение жжения (?или обширные ожоги). Запах плесени; в том числе от выделений. Рассеянный склероз, амиотрофический боковой склероз. Прогрессирующая мышечная дистрофия.

Кроталюс подходит людям, подорвавшим свое здоровье, а также в случаях нарушения питания и усвоения пищи в старческом возрасте.

Последствия: испуга; пребывания на солнце; удара молнией; употребления испорченной воды; вдыхания ядовитых испарений. Поражается правая сторона тела. Отек генерализованный или больной части тела.

**Хуже.** Лежа на правом боку. Когда засыпает. В теплую погоду. Весной. От алкоголя. От сырости и влаги. Каждый год. От сотрясения тела. При пробуждении.

**Лучше.** От света. От движения.

**Психика.** Плаксивость. Слабая память; пациент не может объяснить, правильно выразить свои мысли. Речь заунывная. Робкий. Боится не счастья. Делает ошибки при письме. Бред, делирий: с бормотанием; пациент что-то бубнит, суетится, запинаясь, когда говорит. Алкогольный делирий. Старческое слабоумие (деменция): в начальной стадии — забывает цифры, имена, места; либо становится подозрительным по отношению к своим друзьям; либо ему кажется, что его окружают враги или страшные животные. Отвращение к собственной семье. Раздражительный, своенравный, сердитый.

**Голова.** Головокружение: сопровождающееся дурнотой; слабостью; дрожанием. *Боль в затылке:* как от удара; в виде волн, которые исходят из позвоночника. Сильная боль в середине лба. Головная боль в сочетании с болью в сердце возникают, когда пациент лежит на левом боку. Головная боль усиливается от сотрясения, вынужден ходить на цыпочках.

**Глаза.** Жжение в глазах, покраснение глаз; в том числе, со слезотечением. Желтизна глаз. Невралгия с ощущением, что вокруг глаза был сделан надрез. Кроталюс способствует рассасыванию внутриглазных кровоизлияний, особенно невоспалительного характера, а также кровоизлияния в сетчатку. Слабое зрение (амблиопия) из-за горя или вследствие чрезмерной нагрузки на глаза.

**Уши.** Отогенное головокружение. Кровь сочится из уха.

**Нос.** Носовое кровотечение, особенно во время дифтерии; или при другом заболевании септического характера. Озена: сифилитическая; из-за появления кожной сыпи (экзантемы). Кончик носа синий и красный.

**Лицо.** Искажено, когда пациент просыпается. Губы опухшие, одеревенелые и онемевшие. Темное, одурманенное лицо. Желтое лицо; смертельная бледность. Тризм. Угри: у занимающихся мастурбацией, у пьяниц; при задержке менструации.

**Рот.** Запах плесени изо рта. Пациент скрежещет зубами ночью. Язык: желтый, опухший, высовывается изо рта; отклоняется вправо. Полный рот слюны. Слюна кровянистая, пенная. Рак языка, сопровождающийся кровотечением. Небо как будто одеревенело. Не может говорить из-за ощущения сжатия в области языка и гортани.

**Горло.** Сухость в горле и жажда. Ощущение, что горло плотно сжато. Глотание твердой пищи затруднено. Гангренозное воспаление, отек горла.

**Желудок.** Страстное желание: свинины, стимулирующих продуктов, сахара. Рвота: желчью; массой травянисто-зеленого цвета. Ничто не задерживается в желудке. Пациент не выносит давления одежды в области желудка. Рвота, жидкий стул и мочеиспускание одновременно. Рак, язва желудка; рвота возникает, когда пациент лежит на правом боку. Рвота кровью, в том числе черной кровью. Каждый месяц возникает тошнота и рвота; в том числе перед менструацией.

**Живот.** Распухший, горячий, чувствительный. Перитонит. Увеличение паховых лимфатических узлов. Кровотечение из заднего прохода — когда пациент стоит или идет. Стул: черный, жидкий, зловонный. Абсцесс промежности. Желтуха, в том числе гемолитическая, злокачественная. Ощущение холода в желудке или в животе, как от куска льда. Боль в печени и в верхней части плеч. Кишечное кровотечение.

**Мочевыделительная система.** Моча: темная, кровянистая; содержит белок, скудная, зеленовато-желтая. Гематурия при раке мочевого пузыря или предстательной железы.

**Женские половые органы.** Дисменорея с болью внизу живота, распространяющейся вдоль бедер, а также в сочетании с ноющей болью в области сердца. Ощущение, что матка вывалится наружу. Родильная горячка — послеродовой сепсис. Зловонные лохии. Белый болевой флебит — послеродовой тромбофлебит; хуже от прикосновения.

**Дыхательные органы.** Тревожное, затрудненное, тяжелое дыхание. Кашель сопровождается выделением кровянистой мокроты с запахом плесени. Стеснение в груди у старых людей.

**Сердце.** Слабое сердце, трепетание сердца; кажется, что оно болтается, переворачивается. Сердцебиение во время менструации. Сердце становится чувствительным, когда пациент лежит на левом боку.

**Конечности.** Руки и голени немеют; сначала одна конечность, потом другая. Боль в верхней части плеч. Правосторонний паралич. Паралич левой руки (кисти) и ноги (голени). При шитье кисти немеют. Ноги — голени — не могут стоять неподвижно.

**Кожа.** Желтая кожа при желтухе, септицемии. Геморрагическая пурпура. Кровяные нарывы, карбункулы; панариций. Края старых зарубцевавшихся ран расходятся. Отек вокруг больного места. Кожа холодная и сухая. Кожа всевозможных оттенков.

**Сон.** Сонливость, но уснуть не может. Бессонница из-за нервного возбуждения. *Ужасные сновидения*, сны о мертвецах. Удушье после пробуждения.

**Лихорадка.** Злокачественные лихорадки, высокая температура тела; желтая лихорадка; цереброспинальный менингит. Острая гемоглобинурийная лихорадка. Пот холодный; кровавый.

**Дополнительно.** Lyscps-v.

**Диф. диагноз.** Lach., Sul-ac.

## CROTON TIGLIUM

**Общее.** В обычной врачебной практике Кротон применялся как мощное слабительное, а также раздражающее кожу средство. Следовательно, это растение поражает *слизистые оболочки* кишечника, способствуя появлению водянистых выделений.

Более всего страдает кожа, особенно *НА ЛИЦЕ и на мошонке*. Для Кротона характерно особое ощущение: как будто *часть тела, орган тянет назад*; например, глаза, соски и т.д. Отмечается чередование кожных симптомов и симптомов со стороны внутренних органов, с поносом и т.д. Кожа кажется туго натянутой, обтягивающей кости.

**Хуже.** *ОТ ПИТЬЯ; от незначительного количества пищи.* От мытья, умывания. Летом. От прикосновения. От движения. Когда исчезают высыпания.

**Лучше.** После сна. От легкого растирания.

**Психика.** Чувство тревоги; как будто с пациентом должно случиться какое-то несчастье. Не расположен к работе. Не может думать ни о чем постороннем, внешнем, не относящемся к нему. Чувствует, что выдохся, устал. Угрюмый, недовольный.

**Голова.** Давление шляпы, ее вес вызывает головную боль. Головокружение усиливается от питья.

**Глаза.** Гнойное воспаление: глаза красные и выглядят как ободранные. Пустулы на роговице, сопровождающиеся высыпаниями вокруг глаз. Кажется, что глаза тянет назад. Стягивающая боль, напряжение выше глазницы (справа).

**Уши.** Выделения из уха в сочетании с сильным зудом.

**Лицо.** Пустулы на лице. Ощущение, как будто по лицу ползают насекомые.

**Рот.** Невралгия языка. Жжение в пищеводе.

**Желудок.** Чрезвычайная тошнота, сопровождающаяся ухудшением зрения.

**Живот.** Давление на область пупка вызывает боль в прямой кишке или позыв на стул. Боль в заднем проходе, как будто пробка выталкивается наружу. *Бульканье и плеск в кишках, как от воды; ЗАТЕМ ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЕТ СТУЛ: С СИЛОЙ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ЖИДКОСТЬ В БОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ;* хуже от питья малейшего количества жидкости или во время еды; после стула наступает изнеможение. Летний понос. Детская холера. Колика уменьшается от горячего молока.

**Мочевыделительная система.** Ночная моча пенистая, темно-оранжевого цвета, она становится мутной, когда стоит; жирные частицы плавают на поверхности. Дневная моча бледная, с белым осадком.

**Мужские половые органы.** Экзема мошонки. Пузырьки (везикулы) на мошонке и половом члене. Левое яичко втянуто, правое свисает.

**Женские половые органы.** Сильный зуд в области половых органов; лучше от легкого растирания. Во время кормления ребенка боль из соска распространяется в спину. Узлы в молочной железе; боль распространяется из соска в область лопатки. Молочная железа твердая, опухшая. Соски очень болезненны при прикосновении к ним.

**Дыхательные органы.** Как только пациент касается головой подушки, возникает кашель — приходится подняться и сесть в постели. Пациенту *кажется, что он не может достаточно глубоко вдохнуть. Не может расправить легкие.*

**Конечности.** Шея и плечи болезненные.

**Кожа.** Кажется, что кожа туго натянута, напряжена. Жестокий зуд, жжение, кожа красная; она становится болезненной, если ее расчесать; лучше от легкого растирания. *Высыпания в виде пустул, пузырей*, которые собраны в группы; пузыри лопаются, образуются корки; сильнее — в области половых органов, на висках, на макушке. Опоясывающий лишай. Экзема.

**Диф. диагноз.** *Rhus-t.*

## CUBEBA

**Общее.** Кубеба вызывает катар *слизистых оболочек: УРЕТРЫ*, мочевого пузыря, влагалища. Жжение, саднение ощущается в горле, в желудке, животе, прямой кишке, уретре, в ладьевидной ямке. Выделения густые, едкие, *желтые*, похожи на гной, зеленые, зловонные, возникают после сильного воспаления.

Это средство подходит людям с желчным характером, склонностью к запору.

**Хуже.** Ночью, в постели.

**Лучше.** Подняться и прохаживаться туда-сюда.

**Голова.** Расширение вен на лбу и на висках.

**Рот.** Когда человек пытается улыбнуться или что-то сказать, кажется, что его рот искривляется, перекашивается в сторону.

**Горло.** Постоянно глотает слюну, чтобы облегчить жжение, уменьшить сухость в горле. Катар.

**Желудок.** Страстное желание апельсинов, лука, миндаля и лесных орехов.

**Живот.** Жжение в желудке и животе. Стул желеобразный, в виде прозрачной слизи, смешанной с беловатыми блестящими частицами, напоминающими зерна риса; хуже ночью, лежа в постели; лучше, если встанет и начнет прохаживаться. Стул холодный.

**Мочевыделительная система.** Спазмы, рези, жжение в уретре после мочеиспускания. Цистит. Простатит с густыми, желтыми выделениями. Вязкие, тягучие выделения при гонорее.

**Женские половые органы.** Хронический уретрит в сочетании с вагинитом, они сопровождаются обильными выделениями. Едкие бели у девочек.

**Дыхательные органы.** Катар горла и носа с выделением вонючей мокроты.

**Диф. диагноз.** *Cist., Cop.*

### **CULEX MUSCA** (москит, комар)

**Общее.** Когда пациент сморкается, возникает головокружение. Ощущение, как будто холодный воздух дует через отверстие в одежде на груди или на спине. Менструальная кровь оставляет на белье пятна, которые не отстирываются. Сжимающая боль распространяется вниз, в область крыла подвздошной кости, затем — в область матки. Опухание вследствие отека.

### **CUNDURANGO**

**Общее.** Марсдения кондуранго — «дерево кондора» — была введена в гомеопатию как противораковое средство.

Болезненные трещины в углах рта — ведущий симптом при заболевании раком или сифилисом. Опухоли; стриктуры пищевода. Рак желудка: постоянное жжение и рвота; кажется, что пища застревает за грудиной. Рак молочной железы: соски втянуты; пронзающие боли, исходящие из опухоли и распространяющиеся на всю молочную железу. Язвы на языке с зазубренными, неровными краями. Это средство стоит попробовать, когда другие, казалось бы, подобные средства не оказывают влияния на болезнь.

**Диф. диагноз.** *Aster., Con., Hydr.*

### **CUPRUM ACETICUM**

**Общее.** Голова кружится, когда человек находится в помещении с высоким потолком. Лицевая невралгия с локализацией боли в скуловой кости, верхней челюсти и за ухом; уменьшается при жевании; от давления и горячих аппликаций. Хорея: периодическая, сопровождается меланхолией и страхом общества. Хронический псориаз и похожие на лепру высыпания на всем теле — в виде пятен разного размера, без зуда. Аура при эпилепсии возникает в колене и поднимается в подчревную область (гипогастрий). Затяжные роды.

**Хуже.** От жары. От движения. От нервных переживаний, эмоций. От прикосновения.

**Лучше.** От жевания. От давления. От тепла.

### **CUPRUM ARSENICUM**

**Общее.** Это средство показано при воспалении в *ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ*, которое сопровождается сильнейшей коликой, рвотой, поносом; *при уремии*, сопровождающейся упорной икотой и охлаждением тела (оно холодное, как лед); при холере.

*Жестокие спазмы, судороги* в мышцах груди, в пальцах рук, в икроножных мышцах, в пальцах ног и т.д. Висцеральная невралгия: резкие стреляющие боли в животе. Стул, как рисовый отвар; детская холера. Слабое сердце. Холодный, липкий перемежающийся пот. Конвульсии; в том числе при уремии; либо судорогам предшествуют желудочно-кишечные симптомы. Судороги в мышцах голени уменьшаются, если придавить стопу к полу. В голени возникает ощущение паралича с онемением. Хорея после испуга. Когда пациент пытается идти, все тело дрожит, трясется. Моча имеет запах чеснока.

**Хуже.** От прикосновения. От давления. От сырости. От движения.

### **CUPRUM METALLICUM**

**Общее.** Купрум металликум — препарат из металлической меди — одно из самых важных средств, которые применяются при ухудшении здоровья пациента из-за того, что в ходе болезни не появляются характерные высыпания или выделения или их подавляют.

Поражаются *НЕРВЫ, центральная нервная система и мышцы*, возникают *СПАСТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ*; конвульсии, *жестокие спазмы и судороги*. Судороги могут быть либо тонические, либо клонические; начинаются

с коленей, пальцев ног или рук и распространяются на все тело. Они сопровождаются *пронзительным криком*, выворачиванием головы в одну сторону; *тризмом*. После судорог возникает головная боль спастический смех, крупная дрожь, смертельное изнеможение, холодный пот и т.д. Эпилепсия: приступы ночью, во время менструации. При эпилепсии пациент падает с пронзительным криком, непроизвольно выделяется моча и кал. После спазмов, судорог возникает головная боль; либо возникает группа симптомов, после исчезновения которых кажется, что пациент умер или впал в состояние экстаза.

Конвульсии у детей при прорезывании зубов: ребенок лежит на животе, а ягодичы дергаются вверх. Спазмы, судороги: лицо синее, большие пальцы на руках согнуты, зажаты в кулак. Судороги могут возникать в груди; возможны судорожные боли за грудиной (стенокардия); судороги в пальцах рук и ног, в икроножных мышцах — *при этом в мышцах образуются узлы*; лучше — вытянуть ногу; судороги в подошвах и в других местах, *при спазмах пациент кричит. Резкое сокращение, подергивание мышц*, в том числе во сне. Боли усиливаются от прикосновения и движения. Боли *давящие*; как от удара, с ощущением, как будто часть тела разбита, сломана; мучительные, пронзающие все тело боли.

Хорея от испуга, периодическая. Симптомы возникают группами; периодически или повторяясь через короткие промежутки времени. Заболевание начинается на левой стороне. Нервная дрожь, все чувства обострены. Постоянная слабость. Слабая, недостаточная реакция, снижение защитных сил организма. Латентное течение. Последствия нервного и физического истощения; бессонницы. *Синюшность (цианоз). Легко возникает рецидив заболевания.* Пациент *гиперчувствительный*: любое лекарство вызывает чрезмерную реакцию, не излечивая. Коллапс. Паралич отдельных мышц. Многократные женщины (послеродовые схватки).

**Хуже.** От эмоций, переживаний; от гнева, испуга. *От подавления симптомов.* От переутомления, нервного и физического. От движения. *От прикосновения.* От бессонницы. *В жаркую погоду.* От рвоты. При поднимании рук. Перед менструацией. В новолуние.

**Лучше.** От гипнотического воздействия; если положить руку на больное место. *От холодного питья.* От давления на область сердца.

**Психика.** Нервный. *Чувствует неловкость, «не в своей тарелке».* Говорит слова, которые не собирался сказать. *Пронзительный крик.* Сильный плач. Судорожный, спастический смех. Бред; в том числе с холодным потом. Пациент боится общества; избегает всех. Спутанность сознания; боится любого, кто приближается к нему. Болтливость; затем меланхолия, в том числе сопровождающаяся приступами страха смерти. Ощущение, что потеряет сознание. Приступы ярости; хочет укунить стоящих рядом. Угрюмый; хитрый, ловкий; попеременно покладистый и упрямый. Злобный. Мания: кусается, дерется, рвет вещи. Подражает; передразнивает.

**Голова.** Головокружение: сопровождается ощущением внутренней дрожи, при этом голова падает на грудь; лучше от стула; лучше — лечь; хуже при взгляде вверх. Пациент не может держать голову прямо или зарывается головой в подушку; менингит. Странное покалывание, пощипывание, чувство ползания насекомых на коже темени (при подавлении менструаций). Ощущение пустоты в голове при боли. Головная боль после приступа эпилепсии. При головной боли возникает ощущение, как будто на голову вылили воду. Дергает себя за волосы. Качает головой из стороны в сторону.

**Глаза.** Взгляд пристальный, застывший; глаза ввалившиеся, блестящие, повернуты вверх. Глазные яблоки быстро вращаются *под закрытыми веками*; или перекачиваются из стороны в сторону. Боль, как от ушиба, в глазницах — усиливается при движении глазами. Веки спастически сомкнуты. Подергивание век (слева) и светобоязнь, в том числе при астме.

**Лицо.** *Синее, мертвенно-бледное*; бледное или перекошенное; осунувшееся, с заострившимися чертами. Холодное, как лед. Губы синие. Тризм. Жующие движения нижней челюсти.

**Рот.** Плотно сжат или открыт; язык быстро высовывается и прячется, как у змеи (при судорогах). Скрежещет зубами. Слизистый или металлический, сладковатый привкус во рту. Речь отсутствует; пациент заикается; паралич языка. Пена идет изо рта. У пищи вкус, как у чистой воды.

**Горло.** Не может говорить из-за спазма в горле. Когда пациент глотает жидкости, слышен булькающий звук.

**Желудок.** Желание холодного питья. Молоко вызывает жгучую отрыжку. Икота: перед рвотой; при конвульсиях или при астме. Резко выраженная тошнота. Рвота жестокая, мучительная; сопровождается *смертельной спастической болью* (коликой); поносом; пронзительным криком или конвульсиями; лучше от холодного питья. Болезненное судорожное давление в эпигастрии усиливается от прикосновения и движения. Пациент лежит на области желудка, а ягодичы дергаются кверху (при колике, конвульсиях). Обязательно возникает рвота, если просыпается в первой половине дня (с полуночи до полудня). Рвота от малейшего движения. Периодические приступы рвоты. Как будто что-то горькое было внутри желудка.

**Живот.** Живот напряжен, мышцы его сокращены, живот горячий и чувствительный к прикосновению. *Ужасная колика*, сопровождающаяся сокращением мышц живота, уменьшается от давления; хуже при поднимании рук. Инвагинация (кишечная непроходимость); в том числе с каловой рвотой. Понос: стул обильный; выбрасывается сильной струей; стул представляет собой зеленую жидкость. Холера; летний понос у детей. Глисты: аскариды,

ленточные черви, острицы. Запор, сопровождающийся ощущением сильного жара в теле. Спастические движения мышц живота. Цирроз печени.

**Мочевыделительная система.** Подавление мочевого выделения (при холере); при уремии. Во время или после судорог выделяется прозрачная водянистая моча.

**Мужские половые органы.** Судороги в икроножных мышцах препятствуют совершению полового акта, особенно у старых или у нервных молодых мужчин.

**Женские половые органы.** Менструации прекращаются из-за подавления потоотделения на стопах. Жесткие спазмы в животе, распространяющиеся в грудную клетку, возникают перед менструацией или во время нее; либо они появляются при подавлении менструаций; конвульсии перед менструацией. Судороги при эклампсии характеризуются открытым ртом и опистотонусом. Необычайно мучительные послеродовые схватки, особенно у женщин, много рожавших.

**Дыхательные органы.** Спазм голосовой щели. Одышка — пациент не переносит, когда что-либо находится вблизи рта; она усиливается от кашля, смеха, когда пациент прогибается назад, перед менструацией. Астма: перед приступом возникает икота; удушье чередуется со спастической рвотой. Кашель в виде жестоких пароксизмов; пациентка задыхается от кашля; лучше *от холодного питья*; хуже от глубокого дыхания, когда прогибается туловище назад; кашель сопровождается судорогами в мышцах, слезотечением. Коклюш. Болезненное сжатие в грудной клетке (в нижних ее отделах). *Громкие хрипы (клокотание) в груди.* Дрожание после кашля. Ощущение, что круглые шары перекачиваются туда-сюда под ребрами; лучше от стягивающей одежды и лежа, не двигаясь. Охриплость, которая усиливается от вдыхания холодного воздуха. Перемежающаяся — непостоянная — афония у профессиональных певцов.

**Сердце.** Стенокардия, сопровождающаяся затрудненным, астматическим дыханием и судорогами в мышцах. Сердцебиение перед менструацией. Пульс медленный, твердый, полный и частый.

**Шея и спина.** Паралич всех мышц вплоть до шейных.

**Конечности.** Подергивания, резкие мышечные сокращения в кистях и стопах. Большой палец руки зажат в кулаке. Судороги в ладонях, икрах и подошвах. Контрактуры суставов. Болезненная тяжесть в лодыжках. Аура возникает в коленях; колени как будто разбиты. Анкилоз плечевого сустава. Колени непроизвольно подгибаются при ходьбе, и пациент резко опускается вниз.

**Кожа.** Подавленные или так и не появившиеся высыпания. Язвы; зуд кожи на отдельных участках и папулы в суставных сгибах. Сильный зуд кожи без высыпаний. Желтые чешуйчатые высыпания (в локтевом сгибе). Хронический псориаз. Лепра.

**Сон.** Глубокий сон; пациент ощущает удары, толчки в теле. Постоянное урчание в животе во время сна.

**Лихорадка.** Кожа холодная, как лед. Зябкость. Пот: холодный, липкий, потоотделение ночью; пот с кислым запахом после конвульсий.

**Дополнительно.** Calc.

**Диф. диагноз.** Verat.

## CURARE

**Общее.** Это мышечный яд: он вызывает паралич, не изменяя чувствительности, не приводя к потере сознания.

Ощущение, что в мозгу много жидкости. Выделения вонючие. Паралич: лица, щеки; угрожающий паралич дыхательных мышц; псевдогипертрофический паралич (миопатия Дюшенна). Сахарный диабет. Катаlepsия (оцепенение). Лепра. Ощущение, как будто большой груз подвешен к части тела, к конечностям — к рукам, ногам и т.д.

**Хуже.** От движения. От сырости. В холодную погоду. В 2 ч ночи. С правой стороны тела.

## CYCLAMEN

**Общее.** Это растение поражает пищеварительный тракт и *женские половые органы*; а вследствие поражения желудка или нарушения менструального цикла возникает расстройство *ЗРЕНИЯ или головокружение*. Анемичные люди. Не расположены к труду и быстро утомляются. Очень боятся открытого воздуха. Давящие боли в костях, покрытых тонким слоем мягких тканей. Колющие боли. Последствия переживания личного горя и угрызений совести.

**Хуже.** От холода. Вечером. Сидя. Стоя. На свежем воздухе. От жирного.

**Лучше.** От движения. Во время менструации. От растирания. В теплом помещении. От лимонада. От плача. Вымыть, умыться больное место, больную часть тела.

**Психика.** Тупой, сонный, угрюмый. Радостное чувство чередуется с раздражительностью. Недоволен собой, упрекает себя. Пациент печальный, чувство, как будто он совершил что-то плохое или не выполнил обязанности. Тихо плачет. Помещение кажется слишком маленьким. Галлюцинации: как будто в постели пациентки лежат два человека. Плаксивость, мрачные раздумья по поводу воображаемого горя. Считает, что она одинока и ее преследуют.



**Голова.** Головокружение: предметы вращаются по кругу или выглядят бледными; хуже на открытом воздухе; лучше в помещении и сидя. Мозг как будто обернут тканью. Головные боли с мерцанием перед глазами — лучше от холодной воды. Боль *в левом виске*. Продолжительная мигрень. Ощущение, как будто мозг колеблется, дрожит при ходьбе; в том числе, когда менструации отсутствуют или скудные.

**Глаза.** При головной боли зрение неясное. *Трепещущие, блестящие или черные пятна* перед глазами, косоглазие, особенно при нарушении менструального цикла. Сходящееся косоглазие после конвульсий; левый глаз тянет внутрь. Пациент видит перед глазами бесчисленные звезды. Диплопия. Гемиопия.

Уши. Зуд в ушах при повышенном количестве ушной серы.

**Нос.** Чихание с зудом в ухе. Потеря обоняния.

**Лицо.** Бледное, анемичное. Верхняя губа как будто онемела или затвердела.

**Рот.** Пациент не чувствует вкус или во рту ощущается соленый привкус, который передается всей пище. Пища кажется пересоленной. Слюна соленая.

**Желудок.** Насыщается после нескольких кусочков пищи; потом чувствует отвращение к пище и тошноту от малейшего количества еды. Отсутствие аппетита после крепкого бульона или чашки чая. Отрыжка, похожая на икоту. *Икота:* усиливается при беременности; сопровождается зевотой. Тошнота ощущается в горле. Неукротимая рвота, в том числе при беременности. Желание лимонада; а также несъедобных вещей. От свинины становится хуже. Страстное желание сардин. Отвращение к хлебу, сливочному маслу, к мясу, жиру, к пиву.

**Живот.** Понос усиливается от кофе. Движение в кишечнике, как будто там что-то живое. Боль в области заднего прохода и промежности, как будто здесь имеется нагноение; хуже при ходьбе или сидя.

**Мочевыделительная система.** Моча обильная, водянистая, мочеиспускание учащенное.

**Мужские половые органы.** От незначительного трения крайняя плоть и головка полового члена становятся болезненными. Колотье и давление в предстательной железе, сопровождающееся позывом на стул и мочеиспускание.

**Женские половые органы.** Менструации обильные, менструальная кровь черная, менструации изменчивые, с пленками, в виде сгустков крови, слишком ранние, сопровождаются схваткообразной болью, идущей из спины в лонную область и уменьшающейся при движении. Дисменорея. Послеродовое кровотечение, сопровождающееся болями; лучше после выброса большой порции крови. Менструации подавлены. Набухание молочных желез, выделение молока после менструации. Кажется, что из сосков дует воздух. Секретция молока у девушек и небеременных женщин. Подавление менструаций после чрезмерных занятий танцами или после перегревания. Бели в случае задержки или при скудной менструации.

**Дыхательные органы.** Пациент кашляет, не просыпаясь.

**Сердце.** При подавлении менструаций часто возникает сердцебиение.

**Конечности.** Боли в тех местах, где кости расположены близко к поверхности тела. Пятки болезненные, в них ощущается жжение; лучше при ходьбе; хуже сидя, стоя. Слабость в коленях. Похожие на судорогу медленные сокращения мышц большого и указательного пальцев правой кисти; их приходится разгибать с силой. Писчий спазм.

**Сон.** Видит сны, в том числе страшные, сладострастные.

**Кожа.** Угри у молодых женщин. Зуд кожи уменьшается от расчесывания и при наступлении менструации; усиливается ночью в постели.

**Лихорадка.** Пациент мерзнет весь, ощущение холода не уменьшается при укутывании. Зловонный пот.

**Диф. диагноз.** *Puls.*

## **DAPHNE INDICA**

**Общее.** Действует на низшие ткани — мышцы, кости и кожу. Внезапные, как удары молнии, сокращения мышц в разных частях тела. Страстное желание табака. Кажется, что части тела отделены друг от друга. Боль, как от ушиба. *Вонючие выделения* — моча, пот, скверный запах изо рта. Изнеможение. Экзостозы, сопровождающиеся колющей, давящей или тупой болью, которая усиливается ночью.

**Хуже.** От холодного воздуха. На убывающей луне. Вечером, в постели.

**Психика.** Печальный. Рассеян и нерешителен. Подавлен. Возбужден.

**Голова.** Голова как будто отделена от тела; голова кажется большой. Мягкие узловатые образования на костях в области темени, боль в них усиливается ночью и от прикосновения.

**Рот.** Язык покрыт налетом только с одной стороны. Слюна горячая, с отвратительным запахом.

**Живот.** Стул скудный, в конце — кровавый.

**Мочевыделительная система.** Моча густая, желтая, мутная, зловонная — с запахом тухлых яиц.

**Мужские половые органы.** Простаторея; хуже от табака. Эрекция при зубной боли. Зубная боль после коитуса.

**Конечности.** Стреляющие боли быстро меняют локализацию: распространяются вверх, в живот и в сердце. Ягодицы холодные.

**Сон.** Бессонница *из-за ноющей боли, ломоты в костях*. Во сне видит черных кошек.

**Лихорадка.** Липкий пот; пот с отвратительным запахом.

**Диф. диагноз.** *Rhus-t.*

## DISTAMNUS

**Общее.** Это средство действует на женские половые органы.

Повышенная секреция. Ощущение комка, подкатывающего к горлу. Часто, в большом количестве выделяются зловонные кишечные газы. Повышенная секреция мочи. Ощущение давления на низ, сопровождающееся рвотой желчью, усиливается, когда женщина стоит. *Менструации:* ранние, в виде черных сгустков; их наступлению предшествует слепота. Ощущение, что молоко течет в молочные железы. Судороги перед менструацией, возникающие в передней части бедер, распространяются в матку. Обильные, разъедающие бели, сопровождающиеся тенезмами.

*Снохождение (сомнамбулизм).* Видит сны, как соединяются в одно целое тела ее детей

**Хуже.** Стоя.

**Диф. диагноз.** *Puls.*

## DIGITALIS

**Общее.** Дигиталис — это сердечное средство. Оно также воздействует на печень, легкие, желудок и мочеполовые органы. О Дигиталисе следует помнить в случаях, когда страдает преимущественно сердце, когда у пациента патологически *МЕДЛЕННЫЙ, аритмичный* или перемежающийся пульс в сочетании с неопределенными и необъяснимыми симптомами.

*ВЫРАЖЕННАЯ СЛАБОСТЬ*, пациент едва может говорить; *упадок сил, обморочная слабость*; холодная кожа, нерегулярное дыхание — это также симптомы органического поражения сердца. При *гипертрофии печени*, сопровождающейся ее уплотнением, желтухой, может потребоваться Дигиталис, если у пациента при этом будет характерный пульс.

Когда пациент лежит, пульс редкий; при движении — частый пульс; аритмичный и дикротический пульс бывает, когда пациент поднимается и садится в постели. Медленный пульс бывает после сексуального насилия или в пубертатном возрасте.

Когда возникает «предсердечная тоска», пациент *вынужден прохаживаться*; при этом возникает позыв на мочеиспускание. Цианоз. Отеки при подавлении мочевого выделения. Ощущение, как будто сквозь тело проходит электрический разряд как удар током. Упадок сил, протрация от малейшего напряжения. Болезненные последствия жизни в роскоши, сексуального насилия или сексуальных излишеств, употребления алкоголя.

**Хуже.** *От напряжения. Когда встает, поднимает, например, руки. Лежа на левом боку.* От движения. От запаха пищи. От холода; от холодного питья, холодной пищи, в холодную погоду. От жара. Из-за сексуального насилия или сексуальных излишеств. От музыки.

**Лучше.** В покое. От прохладного воздуха. Лежа ровно на спине. На пустой желудок. Сидя прямо.

**Психика.** Тревога за будущее. Печаль, в том числе с бессонницей, из-за несчастной любви; из-за музыки. Сладострастные мысли у стариков, страдающих увеличением простаты. Страхи. У пациента ощущение, что он может рассыпаться, разбиться вдребезги. Страх удушья ночью. Хочет быть один. Подавлен. Каждый удар, толчок, сотрясение отдается в эпигастрии. Сильная тревога, как будто совесть мучает.

**Голова.** Головокружение: при ходьбе, во время езды, оно сопровождается дрожанием; усиливается при вставании; является следствием болезни сердца или печени. Боль в лобной области: распространяется в нос, возникает после холодного питья или после мороженого. *Грохот в голове*, когда пациент засыпает. Зарывается головой в подушку; дергает себя за волосы. Спастического происхождения мигрень — гемикрания. Голова запрокинута назад, когда сидит или идет.

**Глаза.** Желтоватые, красные. Слезотечение усиливается на ярком свете или от холодного воздуха. Предметы кажутся либо зелеными, либо желтыми. Глаза повернуты влево. Отслойка сетчатки. Зрачки неправильной формы. Диплопия. Веки синие. Вены на глазах расширены.

**Уши.** Шипение в ухе, как будто кипит вода. Расширение вен на ушах.

**Нос.** Боль в корне носа после рвоты.

**Лицо.** Бледное, *синеватое*; губы синие. Вены на лице расширены. Губы сухие.

**Рот.** Язык синий; язык чистый при тошноте и рвоте. Язык толстый, дряблый. Горький привкус во рту. Сладковатый вкус во рту; в том числе при слюнотечении; после курения табака. Вены языка расширены.

**Желудок.** Сильная жажда, но плохой аппетит. *Смертельная тошнота*, которая не уменьшается после рвоты или *сопровождается слабостью, ощущением пустоты под ложечкой* (как будто желудок провалился). Упорная тошнота и рвота в сочетании с чистым языком. Один только вид или запах пищи вызывает тошноту. Чувствительность области эпигастрия. Невралгическая боль в желудке, не связанная с приемом пищи. Пьет много, а ест мало. Желание горьких продуктов. Тошнота перед мочеиспусканием и после него.

**Живот.** Печень увеличенная, болезненная, чувствительная, твердая, в ней ощущается боль. Стул белый, как мел, пепельный, тестообразный. Понос во время желтухи. Асцит.

**Мочевыделительная система.** Чувство полноты мочевого пузыря после мочеиспускания. Постоянные позывы на мочеиспускание; моча подтекает, выделяется слабой струйкой (при увеличенной простате); она горячая, ощущается жжение и пульсирующая боль в области шейки мочевого пузыря; ощущение, как будто соломинку двигают взад и вперед. Моча отсутствует, задержка мочи; выделяется с трудом. Уремия; в том числе при сморщенных почках.

**Мужские половые органы.** *Атонические ночные поллюции*; в том числе после коитуса. Гонорея; баланит, сопровождающийся отеком крайней плоти. Увеличение предстательной железы; у стариков. Отечность половых органов. Яички опухшие. Водянка яичка. Обильные густые желто-белые выделения при гонорее. Эрекции рано утром. Сексуальное желание — при импотенции. После поллюции возникает ощущение, будто что-то вытекает из уретры.

**Женские половые органы.** Схваткообразные боли в животе и спине перед менструацией. Викарные менструации — кровотечения из легких.

**Дыхательные органы.** Желание сделать глубокий вдох; в том числе при одышке. Медленное дыхание; сильнее выражено при разговоре, при ходьбе, от холодного питья. От кашля возникает боль в плечах и руках или болезненность, чувство саднения в груди. Мокрота сладковатая, как вареный крахмал; смешанная с кровянистой слизью. Кровохарканье: при слабом сердце (при сердечной недостаточности) или вследствие хронического бронхита; перед менструацией. Пневмония у стариков. Не может просто откашляться: обязательно возникает рвота. Выраженная слабость в груди, пациент не в состоянии говорить. Задыхается, когда засыпает; поэтому ночью возникает страх удушья. Кашель из-за подавления менструаций.

**Сердце.** *Слабое, кажется, что оно остановится*, если пациент пошевелится; вынужден задержать дыхание и не двигаться. От малейшего движения возникает сердцебиение. Часто ощущается колотье в сердце. Приступы стенокардии: хуже, когда поднимает руки. Утомление сердца; в том числе после перегрузки, переутомления. Расширение сердца. Гипертрофия миокарда и расширение полостей сердца (дилатация). Сердечные отеки. Сердцебиение: при депрессии; от горя. Пульс: медленный, слабый, аритмичный, перемежающийся.

**Конечности.** Онемение; тяжесть или паралитическая слабость; хуже — в левой руке. Легко и часто возникает онемение пальцев на руках. Пальцы рук опухают ночью. Стопы и кисти холодные. В голени ощущение, как будто раскаленная докрасна проволока внезапно пронзает их. Ногти синие. Одна кисть горячая, другая — холодная.

**Кожа.** Синеватая. Отечная. Холодная. Высыпания, как при кори, на спине. Повсюду ощущение ползающих мурашек; в том числе при стенокардии.

**Сон.** Пациент внезапно просыпается в тревоге с ощущением, что падает с высоты, в том числе видит падение с высоты во сне. *Сонливость, Дремота.*

**Лихорадка.** Приливы жара, затем выраженная нервная слабость — во время климакса. Зябкость, все тело дрожит от холода. Холодный, липкий пот.

**Диф. диагноз.** *Glon., Spig.*

## DIOSCOREA

**Общее.** Это средство показано при многих видах болей, при колике. Оно воздействует на *НЕРВЫ* — *абдоминальные* (нервы брюшной полости); на седалищный нерв, а также на позвоночник.

*БОЛИ НЕВЫНОСИМЫЕ, РЕЗКИЕ; РЕЖУЩИЕ, СКРУЧИВАЮЩИЕ, СТИСКИВАЮЩИЕ, ГЛОЖУЩИЕ. Они пронзают прилежащие области или распространяются в отдаленные части тела; они возникают в виде приступов, внезапно прекращаются в одном месте, затем возобновляются в другом. Нервная дрожь, содрогание тела; (?в том числе от боли).*

Это средство подходит людям со слабым пищеварением: излишества в еде или погрешности в диете легко расстраивают их пищеварение. Последствия чрезмерного употребления чая, голодания, мастурбации. Хорея, сопровождающаяся поллюциями.

**Хуже.** Лежа; если лежит, *согнувшись пополам*. От чая. От еды. Вечером. Ночью.

**Лучше.** *Вытянутость*; или выгнуться, прогнуться назад. От движения; на открытом воздухе. От сильного давления. Стоять выпрямившись.

**Психика.** Называет вещи не своими именами, неправильно. Чувствует раздражение, нервничает, у пациента легко возникает беспокойство. Подавлен — после поллюций.

**Голова.** Тупая боль в обоих висках; или как будто голова зажата в тисках; боль уменьшается от давления, но впоследствии усиливается. Ощущение, как будто голова размозжена, раздавлена. Спутанное сознание, ощущение полноты в голове.

**Глаза.** Как будто в глазу круглый шарик или щепка. Ощущение, что из глаз струится горячий воздух.

**Уши.** Боль, которая усиливается, когда пациент сморкается или кашляет. Тошнота ощущается в ушах. Из ушей выпадают маленькие шарики ушной серы.

**Нос.** После вдыхания любого неприятного запаха ощущение его долго сохраняется в носу.

**Рот.** Горечь, сухость во рту утром. Пациент прикусывает язык, когда не ест и не пьет — независимо от еды или питья. Спастическое сжатие челюстей.

**Желудок.** Отрыжки; в том числе при икоте. Резкая судорожная боль под ложечкой, затем — шумная отрыжка, икота и отхождение газов; лучше, когда стоит выпрямившись. Гастродиния (боль в желудке).

**Живот.** Резкие боли в печени, распространяющиеся в соски. Желчная колика: боль распространяется в грудную клетку, спину и руки. Боль внезапно перемещается в другое место, появляется в дистальных отделах тела, например, в пальцах рук и ног. Почечная колика: боль распространяется в яички и в конечности. Метеоризм. Геморроидальные узлы, как горсть вишни; геморрой сопровождается стреляющей болью из ануса в область печени. Утренний понос, заставляющий встать с постели, вызывающий слабость. Учащенные позывы на стул. Боль в животе не облегчается после стула. Стреляющая боль из заднего прохода в печень. Постоянные ноющие, режущие, сжимающие, спастические боли в пупке и вокруг него.

**Мужские половые органы.** Эрекции продолжаются всю ночь. Холодные, расслабленные половые органы. Поллюции без эрекции; после них возникает слабость, особенно в коленях. Пот с резким запахом на мошонке и на лобке.

**Женские половые органы.** Тяжелая дисменорея — боли исходят из матки, чередуются с судорогами в пальцах рук и ног.

**Дыхательные органы.** Кажется, что грудная клетка не расширяется при дыхании. Боли из грудной клетки иррадиируют в обе руки. Одышка из-за незначительного напряжения.

**Сердце.** Боль из области за грудиной распространяется в руки; стенокардия; сопровождается тяжелым дыханием и слабой деятельностью сердца.

**Спина.** Слабая, отказывает; хуже при наклоне.

**Конечности.** Панариций: Диоскорея показана вначале, когда пациент чувствует покалывание, или когда ощущаются резкие, мучительные боли. Чувство слабости в конечностях, особенно в коленях; в том числе после поллюции. Ишиас (справа): боль стреляет вниз вдоль бедра, сопровождается жжением или онемением; усиливается от движения, когда пациент поднимается и садится в постели; уменьшается, если человек стоит на цыпочках, лежит неподвижно. Подколенные сухожилия кажутся слишком короткими. Ногти хрупкие.

**Лихорадка.** При ознобе легко потеет. Пот: холодный, липкий; с резким запахом — на половых органах.

**Диф. диагноз.** *Coloc, Mag-c.*

## DIPHTHERINUM

**Общее.** Гомеопатический препарат, потенцированный нозод, готовят либо из токсина дифтерийной палочки, либо из дифтерийных пленок.

Дифтеринум полезен для профилактики дифтерии и для лечения осложнений заболевания, например, паралича, в тех случаях, когда обычно **применяется противодифтерийный антитоксин**.

Дифтерия с самого начала имеет злокачественное течение. У пациента **сильное изнеможение, и все же он беспокойно двигается; причем, совсем не испытывая боли**. Пациент хочет, чтобы его держали за руку. Резкие сокращения отдельных мышц. Ощущение внутренней дрожи. Тянущее ощущение в мышцах, затем — внезапный щелчок. Катар дыхательных путей. Зловонные выделения. Непроизвольные движения пальцев («обирание», карфология). Рецидив дифтерии.

**Хуже.** Лежа.

**Лучше.** От холода. Когда пьет молоко маленькими глотками.

**Психика.** Карфология (непроизвольные движения пальцев, например, когда перебирает складки белья и т.д. — «обирается»). Видит несуществующие — воображаемые — предметы.

**Голова.** Мокнет по краю роста волос.

**Глаза.** Имеет видения.

**Нос.** Пациент храпит, при этом крылья носа раздуваются. Желтые густые выделения из носа. Носовое кровотечение.

**Лицо.** Румяное, щеки посередине багровые.

**Рот.** Язык влажный, с красным кончиком; или темно-красное пятно на языке вблизи его кончика. Красные сосочки.

**Горло.** Темное. Толстая серая пленка; в том числе на миндалине (левой). Боль отсутствует, глотание безболезненное, но жидкости вырывает, или они вытекают через нос. Рецидив дифтерии. Упорный, тяжелый тонзиллит. Пациенту хочется, чтобы в горло попадал холодный воздух, или ему очень хочется холодных напитков.

**Желудок.** Чувство обморочной слабости в области желудка; лучше, когда пьет маленькими глоточками молоко.

**Кожа.** Сухие, горячие ладони; они кажутся усохшими. Сухая кожа.

**Сон.** Пациент разговаривает во сне — с открытыми глазами.

**Лихорадка.** Озноб, потом жар. Низкая температура тела.

**Диф. диагноз.** Carb-ac.

## DOLICHOS

**Общее.** Сильный зуд кожи, не сопровождающийся сыпью или опуханием. Желтые пятна повсюду. Сильный зуд кожи ночью; в том числе при желтухе. Невралгия после опоясывающего лишая (herpes zoster). От холодной воды зуд уменьшается, но она жжет кожу и вызывает дрожание.

## DROSERA

**Общее.** Дрозера оказывает выраженное влияние на *ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ*, вызывая спазмы, катар (воспаление) и кровотечения.

Поскольку Дрозера повышает иммунитет против туберкулеза, она бывает полезна *при туберкулезе легких*, гортани и костей, а также суставов. Туберкулез лимфатических узлов.

Сжимающие боли в горле, гортани, желудке и т. д. Колющие, пронзающие боли. Конвульсии, после которых возникает кровохарканье и сон. Кровотечение ярко-красной кровью из носа, рта, кишечника (в стуле кровь) и т.д.

**Хуже.** После полуночи. Когда приляжет. От тепла. От разговора. От холодной пищи. От смеха. После кори. От пения. При наклоне. От рвоты. От кислых продуктов.

**Лучше.** От давления. На открытом воздухе.

**Психика.** Пациент легко гневается: пустяк способен вывести его из себя. Человек склонен утопиться. Не может сосредоточиться на одном предмете, должен что-то изменить, заняться чем-то другим. Боится быть один и подозрителен в отношении своих друзей. Заблуждение: кажется, что его преследуют. Двигательное беспокойство. Когда остается один, возникает тревога. Чувствует себя крайне неловко, не в своей тарелке. Воображает, что его обманули злобные, завистливые люди.

**Голова.** Тяжесть, давящая боль. Головокружение, когда идет по улице (на открытом воздухе).

**Глаза.** Выступают вперед, возникает экзофтальм от кашля, во время кори, при судорогах.

**Нос.** Чувствителен к кислым запахам. Болезненное чихание. Кровотечение из носа: из-за кашля, при наклоне.

**Лицо.** Левая половина холодная, правая — горячая; при жалящей боли. Лицо горячее, в то время как кисти холодные.

Рот. Гнилостный привкус. Кровянистая слюна. Зубная боль от горячего питья. Маленькая круглая безболезненная припухлость в середине языка.

**Желудок.** Тошнота после жирной пищи. Отвращение к свинине и к кислому: эта пища не усваивается, от нее хуже. Трудно глотать твердую пищу.

**Живот.** Болит после кислой пищи.

**Женские половые органы.** Бели, сопровождающиеся схваткообразными болями.

**Дыхательные органы.** ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ПРИСТУПЫ ЧАСТОГО, ГЛУБОКОГО, ЛАЮЩЕГО ИЛИ УДУШЛИВОГО, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ИЛИ НЕПРЕКРАЩАЮЩЕГОСЯ КАШЛЯ. Кажется, что кашель возникает в животе; он вызывает одышку, заставляет держаться за бока. После такого кашля возникает позыв на рвоту и рвота, сначала пищевой, потом слизью; носовое кровотечение; холодный пот и болтливость. Коклюш. Щекотание в гортани, как от перышка или хлебной крошки. Низкий хриплый голос; чтобы говорить, требуется приложить усилие. Голос гулкий, без интонаций.

Кровянистая, желтая гнойная мокрота. Ощущение сжатия грудной клетки; хуже, когда говорит, поет. Приступ астмы возникает, когда пациент говорит; каждое слово, которое он произносит, сопровождается сжатием, стягиванием в горле. Колотье в грудной клетке ниже подмышки. Кровохарканье после конвульсий. Кашель сопровождается сопутствующими симптомами. После еды царапает в гортани, возникает кашель. Колющие боли в грудной клетке возникают, когда пациент чихает или кашляет. Как только пациент коснется подушки, возникает не дающий покоя кашель; бывает только ночью. Кашель усиливается от пения, разговора.

**Конечности.** Пальцы рук спастически сжимаются и делаются ригидными, когда пациент хватается что-нибудь рукой. Писчий спазм. Боль, мешающая ходить, в правом тазобедренном суставе и бедре сочетается с болью в голеностопном суставе; пациент вынужден прихрамывать при ходьбе. Конечности болезненные; постель кажется слишком жесткой. Боль в длинных костях. Боль в плечевой кости только ночью.

**Кожа.** Зуд уменьшается, если потереть или провести рукой; усиливается при раздевании.

**Лихорадка.** Всегда слишком холодно, даже в постели. Лихорадка при коклюше. Пациент дрожит в покое, лучше в движении. Лицо становится горячим, а кисти холодными, когда дрожит. Корь.

**Дополнительно.** Sulph.

**Диф. диагноз.** Cocc, Cor-r.

## DULCAMARA

**Общее.** Это средство полезно тем пациентам, которые склонны к катарам, ревматизму и герпетической сыпи и болеют от воздействия холода и сырости.

Дулькамара поражает *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ*, вызывая появление *обильного секрета*, особенно на слизистой оболочке бронхов, мочевого пузыря и глаз. Скованность, онемение, тупая боль, ломота, болезненность *мышц*, каждый раз после охлаждения, особенно *СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ*.

Кожные заболевания имеют склонность возникать перед менструацией. *Паралич*: отдельной части тела, голосовых связок, языка и т. д. *Парализованная часть тела холодная, как лед*. Рвущие боли. *Сжимающие, спастические боли в кишечнике в области ПУПКА*; а также в яичках. Односторонние спазмы, сопровождающиеся потерей речи. Увеличение желез.

При простуде каждый раз поражаются глаза; горло или мочевой пузырь, дыхательные органы или кишечник. Отеки. Заболевания у работников фабрик, производящих мороженое, имеющих дело с холодильными установками. Люди, которые постоянно подвергаются перепадам температур (кондиционирование воздуха). Железы опухшие, плотные. Отеки; анасарка. Экзостозы. Кровотечения: кровь водянистая или ярко-красная.

**Хуже.** ЗАМЕРЗНУТЬ ПОСЛЕ СОГРЕВАНИЯ, КОГДА РАЗГОРЯЧЕН. При внезапной перемене температуры воздуха. ОТ СЫРОГО ХОЛОДА. От холодного питья, мороженого. На влажной земле, в погребе, в сырой постели. От охлаждения стоп. От подавления выделений; высыпаний, потоотделения и т.д. Осенью. Ночью. В покое. От травмы, повреждения. Перед бурей. От употребления ртути. Если раскроется, разденется. Когда дни жаркие, а ночи холодные.

Лучше. Когда прохаживается. От тепла. В сухую погоду.

**Психика.** Спутанность сознания, не может подобрать нужное слово, не может сконцентрироваться, собраться с мыслями. Депрессия. Ругается, не будучи разгневан. Отвергает ту вещь, которую просил. Легко возникает бред, в том числе при боли. Речь затруднена.

**Голова.** Затылок кажется большим; холодным. Ощущение, что ко лбу прижата доска. Головная боль уменьшается от беседы, разговора. Стригущий лишай волосистой части головы. Парша: толстые коричневые корки, после удаления которых возникает кровотечение, из-за которых выпадают волосы. Ощущение, как будто волосы встали дыбом.

**Глаза.** Тупые боли в глазах при чтении. Воспаление глаз из-за простуды. Паралич верхнего века. Густые желтые выделения. Подергивание век на холоде.

**Уши.** Тупая боль, ломота: сопровождается тошнотой; продолжается всю ночь, мешает спать. Опухание околоушных желез; в том числе после кори. Жужжание в ушах.

**Нос.** Тупые боли в носу. Сухой насморк или обильные выделения из носа. Нос закладывает во время холодного дождя. Простуды, возникающие летом; сопровождающиеся поносом. От самого незначительного холода закладывает нос. Пациент греет нос платком, смоченным горячей водой. Носовое кровотечение; вместо менструации. Выделения из носа — насморк — у новорожденных.

**Лицо.** Толстые, коричневые, желтые корки на лице. Рвущая боль в щеках, распространяющаяся в ухо, в глазницу и челюсть; перед болью ощущается холод в больном месте, кроме того, боль сопровождается волчьим голодом. Лицевая невралгия: хуже от малейшего холода. Лихорадка на губах (герпес). Бородавки и высыпания на лице. Подергивание губ на холоде.

**Рот.** Перекошен в одну сторону. Язык опухший; не позволяет говорить; парализован; невнятная или затрудненная речь. Слюна вязкая, тягучая; в том числе при зубной боли.

**Горло.** Давление в горле, как будто нёбный язычок слишком длинный. Тонзиллит при каждом похолодании.

**Желудок.** Отвращение к пище. Сильное желание холодного питья. Тошнота сопровождается позывом на стул. Дрожь во время рвоты. Отрыжки сопровождаются содроганием тела.

**Живот.** Режущая боль в области пупка, после которой возникает болезненный, зеленый, *слизистый стул*. Понос. Кислый, водянистый стул; хуже ночью, летом, при влажной, холодной погоде. Кишечник холодный. Высыпания или боль в области пупка.

**Мочевыделительная система.** Учащенное мочеиспускание. Цистит. Стран-гурия (болезненное, затрудненное мочеиспускание). Задержка мочи от холода или холодного питья. Непроизвольное мочеиспускание из-за паралича мочевого пузыря. Моча: *мутная, со слизью или зловонная*. Нефрит, возникающий от охлаждения. Утолщение стенок мочевого пузыря.

**Мужские половые органы.** Увеличение яичек; сопровождается сжимающей, спастической болью. Импотенция. Герпетическая сыпь на крайней плоти.

**Женские половые органы.** Менструальные выделения водянистые. Перед менструацией появляется сыпь на коже. Дисменорея, повсюду на коже прыщики. Герпес на молочных железах у кормящих матерей. Подавление менструаций, секрети молока, лохий от холода. Молочные железы набухшие, твердые, болезненные при задержке менструации или при белых. Высыпания на коже после отнятия ребенка от груди.

**Дыхательные органы.** Кашель возникает из-за щекотания на задней стенке глотки; протекает в виде продолжительных приступов; при кашле без труда выделяется большое количество жидкой мокроты; кашель возникает после физического напряжения. Кашель зимой. Боль в левой половине грудной клетки, как будто легкое раскачивается на волнах.

**Шея и спина.** Скованность в шее. Боль в пояснице, как после продолжительного наклона. Поясничная область и крестец мерзнут.

**Конечности.** Экзостозы на руках после подавления зуда (чесотки). Ладони потеют. Дрожание руки (правой), когда затруднено мочеиспускание. Симптомы ревматизма чередуются с поносом или с острой сыпью. Боли в родах на кистях и пальцах рук. Опухание области икроножной мышцы.

**Кожа.** *Высыпания:* с чешуйками, с толстыми корками, мокнущие, кровоточащие или герпетические; усиливаются перед менструацией. *Крапивница* уменьшается от холода, усиливается при повышенной кислотности желудочного сока. Бородавки крупные, гладкие, мясистые, плоские. Зуд. Сыпь у новорожденных. Стригущий лишай на голове, в том числе у детей. Экзема у младенцев. Мелкие гнойники (фурункулы) появляются на больной части тела. Толстые корки по всему телу.

**Лихорадка.** *Холодными* могут быть разные места; *холодные, как лед*, — парализованные части тела; в том числе при боли. Озноб начинается в спине, не уменьшается от тепла; усиливается вечером. Озноб сопровождается позывом на стул и мочеиспускание. Пот с отвратительным запахом.

**Дополнительно.** Bar-c, Nat-s.

**Диф. диагноз.** Rhus-t.

## ESCHINACEA

**Общее.** Это средство нормализует состав *крови*, поэтому оно бывает полезно при любом виде заражения крови.

Аутоинфекция, септические заболевания, укусы ядовитых животных, лимфангит, гангрена, вакциноз и т.д. Болезни с тенденцией к злокачественному течению как в острых, так и в подострых случаях.

Пациент чувствует *слабость* и *усталость*, а также *тупую боль, ломоту* в мышцах. Все совершается медленно — пациент медленно говорит, медленно отвечает, медленно ходит. *Слабость* ощущается более всего в желудке, кишечнике; в сердце, в коленях; сопровождается головокружением. Ревматизм. *Эхинацея облегчает боли на поздней стадии рака*. Зловонные выделения. Эхинацея ценится как очищающее рану и антисептическое средство для местного применения.

**Хуже.** От еды. От травмы, повреждения. После хирургического вмешательства. От холодного воздуха.

**Лучше.** Лежа. В покое.

**Психика.** Подавлен или сердит, своеволен. Пациент гневается, когда его поправляют; не желает, чтобы ему возражали. Не в духе. Не может сделать умственное усилие, «напрячь мозги». Не хочет думать или учиться.

**Голова.** Головокружение сопровождается слабостью. Головная боль с приливом крови к лицу, румянцем. Резкая боль глубоко в мозгу; мозг кажется слишком большим. Пульсация проходит сквозь виски. Жар и жжение во лбу.

**Глаза.** Подергивание бровей. Чувство жара в глазах, когда пациент закрывает их.

**Нос.** Зловонные выделения. Кажется, что нос заложен. Кровотечение из правой ноздри.

**Лицо.** Синеватое.

**Рот.** Пенистая слюва во рту; отхаркивается из горла. Покалывание в языке, губах и зеве, возникающее вместе с ощущением страха в области сердца. Язык немеет, ощущение перца на нем. Афты. Зубы чувствительны к потоку воздуха.

**Желудок.** *Тошнота с зябкостью*. Кислая, кровавая рвота; рвота кофейной гущей.

**Живот.** Как будто груз лежит в задней части печени. Кровотечение после стула.

**Мужские половые органы.** Поллюции.

**Женские половые органы.** Послеродовая септицемия; подавление выделений. Живот чувствительный и вздутый.

**Дыхательные органы.** Боль, как будто комок за грудиной. Жжение под левой лопаткой.

**Сердце.** Ощущение страха в области сердца. Пульс усиливается, но не одинаковый, не стабильный.

**Конечности.** Тупые боли, ломота в конечностях. Кисти поочередно немеют и становятся беспокойными; при пробуждении.

**Кожа.** Рецидивирующие гнойники. Карбункулы.

**Сон.** Сны о трудностях: о труде или о ссорах.

**Лихорадка.** *Неправильного типа; ознобы; подъем температуры и потоотделение*. Озноб ощущается в левой части затылка. Пот на верхней части тела; на лбу.

**Диф. диагноз.** Arn., Pyrog., Rhus-t.

## ELAPS CORALLINUS

**Общее.** Подобно всем змеиным ядам, яд коралловой змеи разрушает кровь, вызывая появление *черных выделений*, особенно кровотечений. Чувство *внутреннего холода* в грудной клетке, в желудке усиливается после холодного питья. Вялотекущий сепсис, хронический сепсис. Спазмы, затем паралич. Колебательные движения. Правая половина тела кажется слабой, нечувствительной или парализованной. Слизистые оболочки сморщенные. Ощущение, как будто тяжелый груз, что-то тяжелое лежит на больной части тела. Ощущение скручивания.

**Хуже.** Когда приближается буря. От холода; от холодного питья, холодной пищи, холодного воздуха. От сырости. Ночью. В помещении. От прикосновения. От тепла постели. От фруктов.

**Лучше.** В покое. При ходьбе уменьшается носовое кровотечение, боль в животе и в грудной клетке.

**Психика.** Ужасно боится дождя. Страх: боится оставаться один; из-за этого начинают стучать зубы и возникает дрожь. Содрогание тела от малейшего возражения, сопровождается покалыванием, как иголками. Кажется, что слышит, как кто-то говорит; боится оставаться один. Может говорить, но не может понимать речь. Сердится на себя, не хочет, чтобы с ним разговаривали.

**Голова.** Головокружение, падает вперед. Тяжесть и боль в лобной области. Кровь ударяет в голову. Обморок во время рвоты или при наклоне.

**Глаза.** Черные кольца перед глазами (слева). Большие огненно-красные пятна перед глазами.

**Уши.** Ушная сера черная и твердая. Внезапная глухота по ночам, сопровождающаяся ревом, треском в ушах. Слуховые иллюзии. Выделения из уха: зловонные, водянистые; сопровождаются глухотой и зудом.

**Нос.** Заложенность носоглотки. Хронический катар носа (ринит): отвратительный запах и зеленоватые корки. Боль из носа распространяется в уши при глотании. Озена. Носовое кровотечение: кровь черная, как чернила; после удара.

**Лицо.** Красные пятна на лице. Лицо одутловатое. Лицо тусклого желтоватого цвета.

**Горло.** Спастические сокращения пищевода и глотки; пища и жидкость внезапно останавливаются, затем тяжело опускаются в желудок. Ощущение губки в пищеводе. Глотание твердой пищи и жидкостей затруднено, сопровождается болью. Паралич пищевода.

**Желудок.** Напитки и фрукты ощущаются в желудке холодными, как лед, из-за этого возникает ощущение холода в грудной клетке. Желание подслащенной пахты. Ощущение, что пища при глотании поворачивается, как штопор, по спирали. Жажда.

**Живот.** Ощущение, что кишки закрутились в узел. В стуле черная пенистая кровь.

**Мочевыделительная система.** Моча красная. Выделение слизи из уретры.

**Женские половые органы.** Дисменорея сопровождается выделением черной крови. Ощущение, как будто что-то разорвалось, лопнуло в матке; затем возникают продолжительные выделения крови темного цвета; лучше при мочеиспускании. Выделение черной крови между менструациями.

**Дыхательные органы.** Ощущение нехватки воздуха. Холод в груди после питья. Колотье в верхушке правого легкого. Кашель сопровождается ужасной болью, пронизывающей легкие. Кажется, что легкие с силой отодвинуты друг от друга, раздвинуты. Кровохарканье: кровь черная, как чернила, и водянистая.

**Конечности.** Руки слабые. Кисти и руки в целом опухшие, синеватые. Ощущение, что имеется растяжение в области коленных суставов. Покалывание, как иголками, под ногтями. Шелушение кожи на ладонях и кончиках пальцев рук. Стопы холодные, как лед.

**Сон.** Сны о работе; видит во сне мертвецов. Кусает руку во время сна.

**Лихорадка.** Холодный пот повсюду. Кожа горячая, сухая.

**Диф. диагноз.** *Crot-h., Hela.*

## ELATERIUM

**Общее.** Это ценное средство для лечения определенных видов отеков, например, для лечения бери-бери (авитаминоз B1). Эллатериум показан при жестокой рвоте и поносе, когда стул извергается с силой; он водянистый, оливково-зеленый, желчный или пенистый. Холера. Понос у младенцев. Желтуха новорожденных: стул желчный, моча окрашивает пеленку. Непреодолимое желание бродить из дома в дом. Когда пациент мерзнет, он много зеваает и потягивается. Симптомы крапивницы уменьшаются от растирания.

**Хуже.** В сырую погоду. Если стоит на сырой земле.

## EPINEGUS

**Общее.** Применение этого средства связано исключительно с головными болями у страдающих неврастениями людей, в особенности женщин. Эти боли появляются или усиливаются от необычных усилий, ходьбы по магазинам за покупками, нервного напряжения и т.д.

Давящая боль, как будто кончики пальцев вдавливаются в виски; либо сжимающая боль, распространяющаяся назад, она усиливается до 16 ч, затем уменьшается; при этом пациент *сплевывает вязкую слюну* и его тошнит.



Мигрень повторяется каждую неделю. Головной боли предшествует голод. Зубной камень. Неврастения. Спутанность сознания.

**Хуже.** От утомления, нервного; после того, как сделает покупки в магазине. От перенапряжения зрения.

**Лучше.** От сна.

**Диф. диагноз.** Ign., Ins.

## EQUISETUM

**Общее.** Эквишетум действует преимущественно на мочеполовую систему. Тупая боль, ощущение переполнения, чувствительность мочевого пузыря; она не уменьшается после мочеиспускания. Постоянное желание помочиться и обильное мочеиспускание: выделяется в большом количестве прозрачная, светлая моча, но это не приносит облегчения. Покалывание, жжение, режущая боль в уретре во время мочеиспускания. Цистит. Дизурия. *НОЧНОЕ недержание мочи (энурез)*, в том числе у детей, в тех случаях, когда это объясняется только привычкой. Задержка мочи и дизурия у беременных, а также после родов. Подтекание мочи, выделение по каплям: у старых женщин, в сочетании с произвольным стулом. *Много слизи в моче.*

**Хуже.** В конце мочеиспускания. От давления. От движения. Когда садится (из положения стоя).

**Лучше.** После полудня. Лежа.

**Дополнительно.** Sil.

**Диф. диагноз.** Canth.

## ERIGERON

**Общее.** Это средство для лечения кровотечений, особенно когда они обильные, *кровь ярко-красная, течет сплошным потоком*. Эригерон действует также на мочеполовые органы; применяется при хронической гонорее. *Конгестии: саднение, жжение.* Сильная ломота.

**Хуже.** В дождливую погоду. От напряжения.

**Голова.** Конгестия, лицо красное. Носовое кровотечение.

**Глаза.** Жгучая боль, саднение, жжение. Кровоподтек (синяк) вокруг глаза от удара.

**Желудок.** Жжение в желудке и животе. Рвотные массы или стул представляют собой чистую кровь. Вздутие живота. Анус как будто разорван. Геморрой.

**Мочевыделительная система.** Непрерывное кровотечение из мочевого пузыря. *Дизурия*, в том числе при прорезывании зубов; ребенок плачет, когда мочится. Тупая боль в мочевом пузыре. Задержка мочи. *Тенезмы мочевого пузыря и прямой кишки* при метроррагии.

**Мужские половые органы.** Липкий пот на половых органах. Гонорея и хронический гонорейный уретрит. Синие, черные пятна на половых органах.

**Женские половые органы.** Метроррагия: сопровождается тенезмами мочевого пузыря и прямой кишки; возникает после аборта; при поносе или дизентерии; от малейшего движения. Бели сопровождаются раздражением мочевого пузыря (неврозом мочевого пузыря). Выкидыш из-за перенапряжения.

**Дыхательные органы.** Кашель, кровавистая мокрота. Начинаяющаяся чахотка (туберкулез легких).

**Конечности.** Сильная тупая боль, ломота во всех конечностях.

**Кожа.** Кровоподтеки (синяки).

**Диф. диагноз.** Canth., Ter.

## EUCALYPTUS

**Общее.** Эвкалипт обладает мощным антисептическим и дезинфицирующим действием. Он показан при поражении *слизистых оболочек, обильных катаральных выделениях*; они едкие, зловонные; сопровождаются *тупыми болями, скованностью и усталостью*, как бывает при простуде. Малярия. Грипп. Покалывание, дергающие боли ночью. Истощение вследствие интоксикации и кровотечения. Ревматизм. Эвкалипт считается средством, предупреждающим возникновение гриппа.

**Хуже.** Периодически. Ночью.

**Психика.** Радостное настроение, веселость. Желание двигаться, переходить с места на место.

**Голова.** Конгестивная головная боль. Мигрень. Головокружение во всех периодах лихорадки.

**Глаза.** Саднение, жгучая боль и жжение.

**Уши.** Шум в ушах.

**Нос.** Насморк с водянистыми выделениями из носа. Ощущение, что нос заложен. Хронические гнойные, вонючие выделения из носа. Напряжение поперек носа.

**Рот.** Язык толстый, дряблый. Афты; жжение во рту и ощущение переполнения.

**Горло.** Афты, сопровождающиеся жжением. Постоянное ощущение, что в горле — слизь.

**Желудок.** Пищеварение замедленное, выделяются газы с гнилостным запахом. Пульсация в желудке. Тошнота и рвота при ознобе. Рвота кровью и кислой жидкостью. Рак желудка.

**Живот.** Ощущение, как от груза, в кишках. Острый понос: стул жидкий, водянистый; ему предшествуют резкие боли. Дизентерия с ощущением жара в прямой кишке.

**Мочевыделительная система.** Острый нефрит, осложняющий течение гриппа. Полиурия. Катар мочевого пузыря. Карбункул уретры. Моча пахнет фиалками.

**Женские половые органы.** Маленький узелок ниже соска (правой) молочной железы; боли протыкающие (как ножом), стреляющие.

**Дыхательные органы.** *Бронхиальная астма.* Обильная зловонная слизис-то-гнойная мокрота. Бронхорея, в том числе старческая. Кашель при гриппе.

**Конечности.** Покалывание сменяется тупыми болями в конечностях.

**Лихорадка.** Сопровождается тупыми болями, ломотой. Озноб, затем тошнота и рвота. Продолжительные, тифоподобные лихорадки. Головокружение во всех периодах малярийной лихорадки.

**Диф. диагноз.** *Chin., Dulc, Echi.*

## EUONYMUS

**Общее.** Поражает печень и почки.

Ощущение ползания мурашек по спине. *Головокружение* ощущается во лбу: как будто пациент вытянулся вверх и качнулся вперед. Желчные мигрени: ощущается давление над бровями; сдавливает глаза. Печень переполнена кровью. Камни желчного пузыря. Боль в области пупка. Обильный стул; он бывает различного цвета или разноцветный. Альбуминурия.

**Хуже.** От еды. Вечером.

**Лучше.** От прохладного воздуха. От давления.

**Диф. диагноз.** *Rheum.*

## EURATORIUM PERFOLIATUM

**Общее.** Ведущей характеристикой этого средства является *ЖЕСТОКАЯ ТУПАЯ БОЛЬ, ЛОМОТА, КАК БУДТО КОСТИ ЛОМАЮТ. Мышцы груди, спины и конечностей как будто ушиблены, болезненные, ноют.* Эупаториум действует на печень: он показан при *поражении желчных путей.* Пациент беспокоен, у него озноб и тошнота. Простуда. *Грипп.* Лихорадка Денге. Вялость всех органов и замедление их деятельности. Это средство полезно подорвавшим свое здоровье алкоголикам. *Слабость.*

**Хуже.** *ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА. ПЕРИОДИЧЕСКИ;* с 7 до 9 ч; каждый третий или четвертый день. Лежа на больной части тела. От кашля. От запаха или вида пищи. *От движения.*

**Лучше.** *От рвоты желчью.* От потоотделения. Лежа лицом вниз. *От беседы, разговора.*

**Психика.** Стонет при ломоте, при тупых болях.

**Голова.** Головокружение: сопровождается ощущением, что падает влево; усиливается, когда пациент лежит на правом боку, уменьшается от рвоты. Болезненная пульсация; ощущается в затылке после того, как пациент ляжет, сопровождается чувством тяжести. Головные боли чередуются с суставными болями (подагра). Ощущение металлического колпака (шлема) на голове. Головные боли уменьшаются от рвоты желчью, от разговора, беседы. Мигрени каждый третий или седьмой день. Пациент поднимет голову с помощью рук при головной боли.

**Глаза.** Болезненность, ломота в глазных яблоках; в том числе при головной боли. Желтые глаза.

**Нос.** Насморк с чиханием в сочетании с тупой болью в каждой кости.

**Лицо.** Внезапное сильное сокращение мышц правой щеки. Лицо желтое.

**Рот.** Язык желтый. Горький привкус во рту. Трещины в углах рта.

**Желудок.** Жажда холодной воды; но после питья тело содрогается и возникает *рвота желчью.* Тошнота от запаха или от вида пищи. Страстное желание мороженого, кислого питья. Икота. Мучительная боль в желудке, не уменьшающаяся до тех пор, пока все его содержимое не вырвет. Тесная одежда мешает, давит. Позывы на рвоту и рвота желчью. Жажда перед рвотой.

**Живот.** Печень болезненная. Беловатый или учащенный, зеленоватый, водянистый стул.

**Мочевыделительная система.** Моча попеременно обильная и скудная.

**Мужские половые органы.** Зуд в области лобка.

**Дыхательные органы.** Охриплость сильнее утром. Кашель: сопровождается болезненностью в груди, возникает из-за щекотания в гортани; при кашле ощущается боль в голове, пациент *вынужден держать руками грудную клетку;* лучше — стоя на коленях, опираясь на кисти рук. Садне-ние; жар, *болезненность* в грудной клетке и *бронхах* усиливаются на вдохе.

**Сердце.** Давление, как будто сердце помещено в слишком тесное пространство.

**Шея и спина.** Боль в задней части шеи и между плечами. Сильная боль в спине, как будто она побита; боль распространяется вверх. Дрожь в спине во время лихорадки.

**Конечности.** Тупые боли в костях и болезненность мышц нижних конечностей. Боли, как от ушиба, в икрах. Отеки на голеньях, стопах и лодыжках. Боли в подагрических узелках (тофусах), возникающие вместе с головной болью.

**Лихорадка.** Жажда или тошнота, затем жестокий потрясающий озноб; он начинается в пояснице. Рвота горечью после озноба или во время жара. Жгучий жар. Пот облегчает все симптомы, кроме головной боли. Пациент мало потеет.

**Дополнительно.** Nat-m., Sep.

**Диф. диагноз.** Bry., Nux-v.

## **EUPATORIUM PURPUREUM**

**Общее.** Боли с ощущением, что ломают кости, и другие лихорадочные симптомы напоминают симптомы *Eup-reg.* Но в данном случае описанные выше симптомы менее выражены: Эупаториум пурпуреум имеет больше симптомов, относящихся к мочевыделительной системе и половым органам, особенно женским.

**Хуже.** От движения. Когда меняет положение тела.

**Психика.** Тоска по дому, ностальгия; даже если находится дома и в кругу семьи. Вздыхает.

**Голова.** Левосторонняя головная боль, сопровождающаяся головокружением, как будто пациент падает влево.

**Желудок.** Во время озноба хочется лимонада или холодного напитка. Спастическая боль (колика), охватывающая весь живот, после мочеиспускания.

**Мочевыделительная система.** Постоянное желание помочиться; даже после учащенного мочеиспускания мочевого пузыря кажется полным. Цистит у беременных женщин из-за езды по неровной дороге; дизурия. Раздражение мочевого пузыря у женщин. Моча имеет сладкий запах. Струя мочи становится меньше. Несахарный диабет.

**Женские половые органы.** Боль в виде быстрых дергающих ощущений в левом яичнике. Обильные бели. Наружные половые органы (вульва) кажутся мокрыми. Бесплодие вследствие пониженной функции яичников.

**Дыхательные органы.** Одышка при отеках.

**Спина.** Ощущение груза, тяжести в спине и в пояснице.

## **EUPHORBIA**

**Общее.** Растение Эуфорбия оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и кожу, вызывая повышенное образование секрета, сопровождающееся ощущением сухости.

Ощущение *внутреннего жжения*; в том числе в костях, ночью. Боли при раке. Медленно развивающееся воспаление. Пузыри. Гангрена у стариков. Кариес. Паралитическая слабость в суставах. Все кажется крупнее, чем есть на самом деле.

**Хуже.** Сидя. В покое. В начале движения. От применения ртути. От прикосновения.

**Лучше.** От масляных аппликаций. От прикладывания холода. От движения.

**Глаза.** Видит, что один и тот же человек идет впереди и позади него. Диплопия.

**Нос.** Многократные бесплодные попытки чихнуть. Насморк с опуханием носа. Озена с едкими выделениями.

**Лицо.** Желтые волдыри. Жжение в щеке. Красные, опухшие щеки.

Рот, пищеварительные органы. Зубы, как будто сдвинуты вместе, хрупкие, крошатся; кариес зубов. Кажется, что полость рта покрыта прогорклым жиром. Обильная слюна; соленая на вкус слюна. Жажда холодной воды. Жжение, как от огня, в животе и желудке.

**Дыхательные органы.** Кашель с колотьем, распространяющимся из подложечной области в боковые отделы грудной клетки и возникающим днем и ночью; при астме.

**Спина.** Боль в копчике усиливается, когда пациент встает со стула, усиливается после опорожнения кишечника.

**Кожа.** Рожистое воспаление; в том числе, буллезное; с поражением слизистых оболочек. Вялотекущие, безболезненные язвы. Буллезная форма рожистого воспаления. Пузыри заполнены желтой лимфой или серозной жидкостью. Ощущение, как будто под кожей лежит тонкий шнур.

**Лихорадка.** Высокая температура.

**Диф. диагноз.** Nit-ac, Sulph.

## **EUPHRASIA**

**Общее.** Обычное название растения «очанка, глазная трава» дает показания к применению этого средства в гомеопатии.

Эуфразия воздействует на **СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ: ГЛАЗ**, носа, органов грудной, вызывая острый катар, сопровождающийся обильными, едкими, водянистыми выделениями. Слезы едкие; выделения из носа мягкие, не раздражающие. Едкий гной.

**Хуже.** ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА. ОТ ВЕТРА. От тепла. В помещении. Вечером.

**Лучше.** На открытом воздухе. Поморгать, вытереть глаза.

**Голова.** Головная боль при катаре с обильными выделениями из носа и глаз. Боль с ощущением распираания, как будто голову разорвет или она лопнет, при боли слепит глаза.

**Глаза.** ГЛАЗА СЛЕЗЯТСЯ; как будто они залиты слезами. Ощущение, как будто волос перед глазами; возникает желание вытереть их. ОБИЛЬНЫЕ ГОРЯЧИЕ ИЛИ ЕДКИЕ СЛЕЗЫ, слезотечение сильнее на открытом воздухе, лежа или при кашле; *остаются блестящие, как лак, следы*. Клейкая слизь в глазах. Светобоязнь со спазмом век. Давящие, режущие боли в глазах. Густые, едкие, желтые выделения из глаз. Конъюнктивит, сопровождающийся сильнейшей инъекцией склер; в том числе при кори; вместо менструации. Хроническая болезненность глаз. Участки помутнения роговицы; после травмы. Краснота, *жжение* и зуд краев век. Катаракта; глаза слезятся. Боль в глазу, чередующаяся с болью в животе.

**Нос.** Обильные, *мягкие* (не раздражающие) текучие выделения из носа; сопровождаются кашлем и отхаркиванием большого количества мокроты; в меньшем количестве, когда ложится. Плоская раковая опухоль на правой стороне носа.

**Лицо.** Одеревенение левой щеки; языка. Скованность в верхней губе, как будто она из дерева.

**Желудок.** Рвота возникает при отхаркивании мокроты.

**Мужские половые органы.** Простатит. Ночное раздражение мочевого пузыря, подтекание мочи — вытекает по каплям, сочится.

**Женские половые органы.** Менструации болезненные, кровь выделяется всего один час или один день. Аменорея сопровождается воспалением глаз и язвой на правой половине носа. Колющие боли и зуд при ходьбе на открытом воздухе.

**Дыхательные органы.** Кашель сопровождается свободным отхаркиванием мокроты, но только днем; в меньшем количестве, когда ложится; ночью.

**Сон.** Пациент зевает, когда идет по улице (на открытом воздухе).

**Диф. диагноз.** All-с.

## EURION

**Общее.** Это легкая фракция, летучее масло, получаемое при возгонке древесной смолы. В его патогенезе имеются четкие симптомы, относящиеся к женской половой сфере, которые сочетаются с болью в спине. Менструации слишком ранние и обильные; женщина раздражительна и не расположена разговаривать во время менструации. Желтые бели, окрашивающие белье в желтый цвет, сопровождающиеся сильной болью в спине, возникающие после менструации; когда прекращается боль в спине, сплошным потоком изливаются бели.

Жжение в правом яичнике. Боли в крестце, как будто он разбит; боль из спины распространяется в область таза; она уменьшается, когда женщина опирается на что-нибудь или выгибается назад, прогибается. Судороги в икроножных мышцах ночью. В стопах возникает ощущение, как будто пациентка ступает по иголкам. Смещение матки. Ощущение, как будто все тело состоит из желе, студня. Обильный пот от незначительного напряжения.

**Диф. диагноз.** Graph., Kreos., Lach.

## FAGOPYRUM

**Общее.** Это растение, известное как «гречиха», действует на кожу и пищеварительные органы. Выражен зуд. Он ощущается в разных частях тела — в глазах, в задних отделах носа; в заднем проходе; глубоко в кистях; в голенях и т.д. Видимая пульсация сонных и других артерий.

Зловонные выделения. Боль в виде полос. Старческий зуд.

**Хуже.** От расчесывания кожи. От солнечного света. От движения.

**Лучше.** От холодных аппликаций. От давления. От кофе.

**Психика.** Не способен учиться или запоминать. Подавлен. Раздражителен. Чувствует себя безмерно счастливым.

**Голова.** Боль глубоко в голове сопровождается давлением, направленным вверх. Головная боль возникает, когда устает шея; лучше согнуть шею, запрокинуть голову назад.

**Глаза.** Зуд в глазах. Ощущение, как будто глазные яблоки выталкивает наружу. Боль по ходу слезного канала. Глаза опухшие, красные, горячие.

**Уши.** Зуд в ушах и вокруг них.

**Нос.** Болезненный, красный. Насморк — жидкие, текучие выделения сопровождаются чиханием. **Горло.** Зуд в задних отделах носа. Катар задних отделов носа (ринофарингит). Желудок. Обжигающие, горячие, кислые отрыжки. Постоянная тошнота; уменьшается от еды.

**Живот.** Зуд в анусе.

**Женские половые органы.** Зуд наружных половых органов (вульвы) и желтые бели, усиливающиеся в покое.

**Сердце.** Боль в области сердца, распространяющаяся в левое плечо и руку; уменьшается лежа на спине.

**Шея и спина.** Скованность и чувство разбитости, как от ушиба, в мышцах шеи сопровождается ощущением, что мышцы задней части шеи не смогут удержать голову.

**Конечности.** Боль в плечах в сочетании с болью, распространяющейся вдоль пальцев рук. Зуд рук и голеней. Зуд глубоко в кистях. Пальцы рук немеют, в них ощущается покалывание, как иголками. Боли в виде полос в руках и голенях. **Кожа.** Зуд уменьшается от купания в холодной воде, усиливается от расчесывания кожи, от прикосновения и когда пациент отдыхает. Экзема.

Эритема. Опрелости. Внутрикожные гнойники, не имеющие выхода на поверхность кожи. Кожа горячая, опухшая.

**Диф. диагноз.** Puls.

## FERRUM IODATUM

**Общее.** Это средство бывает полезно при увеличении желез; новообразованиях, смещении матки, особенно при ретроверсии. Слабость после истощения жизненных сил.

**Хуже.** От движения. Ночью. От прикосновения.

**Лучше.** На открытом воздухе.

**Глаза.** Экзофтальмический зоб; после подавления менструаций.

**Уши.** Рев в ушах.

**Нос.** Толстый.

**Желудок.** Кажется, что пища выталкивается в горло, как будто пациент ее не проглотил.

**Живот.** У женщины чувство переполнения живота, как будто она не сможет наклониться вперед. Ощущение ползающих мурашек в прямой кишке. Как будто нить протянута от пупка к заднему проходу.

**Мочевыделительная система.** Ощущение ползающих мурашек в уретре. Моча имеет сладкий запах, она темного цвета; содержит густой белый осадок.

**Женские половые органы.** Постоянное давление на низ. Ощущение, как будто во влагалище что-то давит кверху, когда женщина сидит. Ретро-версия матки. Бели: как вареный крахмал, выделяются во время стула. Менструации отсутствуют при наличии экзофтальмического зоба. Выпадение матки, трудно удерживать мочу.

## FERRUM METALLICUM

**Общее.** Железо в значительном количестве содержится в крови, а также во многих продуктах, составляющих обычный рацион.

Железо воздействует на *КРОВООБРАЩЕНИЕ*, вызывая неравномерное распределение крови: конгестию (полнокровие), *нерегулярные приливы крови и пульсацию*. Железо расслабляет кровеносные сосуды, вызывая *кровотечения, характеризующиеся выделением яркой крови* или с примесью небольших сгустков, особенно у быстро растущих юношей. Либо возникает расширение вен при невралгии, во время менструации или при лихорадке.

Феррум подходит молодым; анемичным людям; а также пациентам с ложным полнокровием (плеторой), которые, хотя и выглядят сильными, на самом деле настолько слабы, что не способны даже говорить или ходить, предпочитают лежать.

Бледность кожи и слизистых оболочек чередуется с приливами крови. *Сухость*: во рту; пища кажется сухой, сухость во влагалище и т.д. *Анемия* у молодых людей с румяными щеками и бледным губами; у нежных девушек, страдающих запором и депрессией.

Мышцы дряблые и расслабленные. *Отеки* или паралич после потери жизненных соков; после кровотечений и т.д. Старика с *красным лицом*. Быстрое истощение, исхудание. Боли, возникающие каждую ночь, *заставляющие двигаться, шевелить больной частью тела* и т.д. Давление: в области груди, желудка и т.д. Раздражительные ум и тело. Кахексия. Хруст в суставах. Размягчение костей. Обычно красные части тела становятся бледными. Катаlepsия. Зоб, в том числе экзофтальмический, из-за подавления менструаций. Отмечается также поражение селезенки, пищеварительных органов и левой дельтовидной мышцы.

**Хуже.** *НОЧЬЮ. От эмоций, переживаний; от гнева. От сильного напряжения. От еды. От питья. От потери жизненных соков, потоотделения.* От яиц. *От жары и холода.* От внезапного движения. При поднимании рук. От чая.

**Лучше.** *От осторожного, спокойного движения.* От незначительного кровотечения. Прислониться головой к чему-нибудь.

**Психика.** Всегда прав; пациент *чувствительный* и возбудимый, сильнее от малейшего возражения. Неумеренно плачет и смеется. Нервный, истеричный. Не выносит даже незначительный шум. Тревога, как будто совершил преступление. Упадок духа, уныние; в том числе после менструации.

**Голова.** Головокружение: усиливается, когда пациент внезапно встает, когда идет через мост, под которым течет вода. Нервное истощение. *Пульса-ция; стучащая головная боль* начинается в висках, распространяется в затылок; усиливается при кашле, при наклоне, когда спускается по лестнице; уменьшается, если распустить

волосы. Внезапная боль над левым глазом. Голова горячая, стопы холодные. Если пациент начинает писать, головная боль возобновляется. Головокружение при головной боли.

**Глаза.** Видит ночью в темноте, при истерии. Приступы слепоты. Буквы сливаются, когда читает или пишет. Припухшие веки. Боль над глазами (слева). Экзофтальмический зоб возникает после подавления менструаций.

**Уши.** Повышенная чувствительность к шуму. Шум в ушах уменьшается, если положить голову на стол. Звон в ушах усиливается перед менструацией.

**Нос.** *Кровотечение:* у анемичных пациентов; чередуется с кровохарканьем.

**Лицо.** Бледнеет или *возникает прилив крови, румяней, лицо краснеет* от незначительной боли, от переживаний или от напряжения. Цветущий, здоровый вид; ощущение, как будто лицо опухло, одутловатое. Губы бледные. Невралгия после умывания холодной водой и перегревания; усиливается, когда пациент ложится; уменьшается, когда поднимается, садится в постели.

**Рот.** Зубная боль уменьшается от ледяной воды. Во рту привкус крови или тухлых яиц. Сухость во рту, пища кажется слишком сухой.

**Горло.** Как будто в горле что-то перекачивается и перекрывает горло, как клапан. Экзофтальмический зоб. Ощущение, как будто комок в горле (слева); хуже только, когда делает «пустое» глотательное движение.

**Желудок.** Чередуются повышенный аппетит и отсутствие аппетита. Желудок не переносит никакую пищу: возникает вздутие и ощущение давления. Отвращение к мясу; яйцам, кислым фруктам, к своему привычному табаку, к пиву. Желание хлеба, сырых томатов. *Выплевывает пищу полным ртом.* Рвота: не сопровождается тошнотой, возникает легко; в том числе сразу после еды; после полуночи, при беременности. Жжение в желудке. Рвота после яиц.

**Живот.** Твердый, вздутый, болезненный, как будто ушибленный при ходьбе. Кишечник болезнен при прикосновении.

Понос: безболезненный; хуже во время еды (при попытке поесть возникает понос); возникает каждую ночь; при этом стул течет, как из крана — сплошным потоком, брызжет; содержит неперевавленную пищу; понос чередуется с запором; хуже, когда пациент нервничает или устал.

Стул твердый, удаляется с трудом, после него возникает боль в спине или спазмы в прямой кишке; выпадение прямой кишки. Зуд заднего прохода при аскаридозе; в том числе у детей. Стул в виде неперевавленной пищи. Летний понос.

**Мочевыделительная система.** Альбуминурия. Хронический нефрит. Непроизвольное мочеиспускание: особенно, если оно бывает только днем; кроме того, когда пациент стоит, от внезапного движения, при ходьбе; у детей. Обильное мочеиспускание возникает, когда пациент нервничает. Моча горячая; при меноррагии.

**Мужские половые органы.** Поллюции: каждую ночь; сопровождаются болью в спине; после переутомления.

**Женские половые органы.** Выраженная сухость во влагалище; боль, как будто от ссадины; либо влагалище нечувствительное во время коитуса. Менструации: кровь бледная, водянистая; возникают слишком рано, слишком обильные и продолжительные; прерывистые; сопровождаются схваткообразными болями. Бели: как молоко, едкие, водянистые в пубертатном возрасте. Склонность к выкидышу. Выпадение влагалища. Зуд наружных половых органов.

**Дыхательные органы.** Голос хриплый или изменчивый. Сухой, щекоющий кашель усиливается при движении; уменьшается, если лечь. Пациент сплевывает кровь — это наблюдается у пациентов, занимающихся мастурбацией, при чахотке (туберкулезе легких). Приливы крови к груди. Ощущение стеснения, сжатия в груди; либо летучие колющие боли. Одышка уменьшается при медленной ходьбе и при разговоре. Кашель сопровождается болью в затылке. Горячее дыхание. Запущенная плевропневмония — Феррум металликум рассосет экссудат.

**Сердце.** Сердцебиение: хуже от малейшего движения; лучше при медленной ходьбе; бывает у пациентов, занимающихся мастурбацией; после потери жизненных соков. Пульсация во всех кровеносных сосудах. Пульс хорошего наполнения, мягкий, сжимаемый.

**Шея и спина.** Шея и плечи болят. Прострел (люмбаго) беспокоит всю ночь, проходит после того, как пациент встанет.

**Конечности.** Внезапные судороги или рвущие боли в конечностях; когда пишет, кисти дрожат; лучше, когда пациент пишет быстро. При сильной боли возникает непреодолимое желание согнуть руку. Опухшие кисти и стопы. Пятки болят сильнее, когда лежит на спине. Хруст в суставах. Боль в плече (отодыния). Контрактуры конечностей.

**Кожа.** Бледная. Легко краснеет; от давления пальцем остается ямка. Черные или темно-фиолетовые пятна.

**Сон.** Пациент засыпает: от слабости; когда шьет, сидя и во время занятий. Бессонница.

**Лихорадка.** При ознобе лицо красное, беспокоит жажда. Жар: вены расширены. Конечности холодные; голова и лицо горячие. Пот липкий, желтый, холодный, едкий или изнуряющий.

**Дополнительно.** Chin.

**Диф. диагноз.** Arn., Mang.

## FERRUM PHOSPHORICUM

**Общее.** Подобно *Ferr.*, Феррум фосфорикум поражает венозное кровообращение, вызывая *местную пассивную конгестию (полнокровие)* и кровотечения вследствие гиперемии; поэтому *выделения* имеют *прожилки крови* или напоминают мясные помои.

Это средство подходит нервным, чувствительным, анемичным людям (блондинам). Это очень полезный препарат для лечения обострения туберкулеза; ревматизма и т.д.

**Исхудание.** Пациент легко простывает. *Болезненность* с ощущением разбитости — в грудной клетке; в области *плеч*; в мышцах. Воспаление мягких тканей. Жгучее саднение. Последствия *прекращения (подавления) потоотделения*; механического повреждения. Начальный период лихорадки и воспаления. Сильное изнеможение, едва может передвигаться.

**Хуже.** *Ночью.* В 4~6 ч утра. От движения. От шума. От сотрясения. От холодного воздуха. От прикосновения. *От прекращения потоотделения.* От холодного питья и кислой пищи. От мяса. От селедки. От кофе. От торта, пирожного.

**Лучше.** От прикладывания холода. От кровотечения. Лежа.

**Психика.** Очень разговорчивый, веселый и *взволнованный*. Молчит. Гневается. Преходящая мания из-за раздражения головного мозга. Безразличен к приятным вещам, событиям. Отвращение к обществу. Страшно оказаться в толпе.

**Голова.** Пульсирующая головная боль в сочетании с чувствительностью кожи волосистой части головы. Головная боль стреляющая, ноющая, распространяющаяся из темени через боковые отделы головы вниз; *при боли в ухе*; уменьшается от носового кровотечения, от прикладывания холода.

Болезненные последствия действия солнечного тепла. Часто кажется при ходьбе, что голову толкает вперед; в том числе при головокружении. Ощущение пустоты в голове во время менструации.

**Глаза.** Красные, воспаленные, при этом ощущается жжение. Ощущение крошечной соринки на верхнем веке. Кистозные опухоли на веках. Глаза налиты кровью, пациент не видит, когда наклоняется.

**Уши.** *Жесткая боль в ухе*: острый средний отит, если *Bell*, не помогла. Глухота из-за простуды, усиливается во время менструации. Шум в ушах усиливается лежа.

**Нос.** Носовое кровотечение: при этом кровь ярко-красная; в том числе у детей. Феррум фосфорикум уменьшает болезненность и кровотечение после хирургической операции.

**Лицо.** Бледнеет и краснеет поочередно. Горячие щеки при зубной боли.

**Рот.** Горячий. Зубная боль уменьшается от холода.

**Горло.** Миндалины красные и опухшие. Боль в горле (фарингит) у певцов. Боль усиливается, когда делает «пустое» глотательное движение. Болезненность после хирургической операции.

## FERRUM PICRICUM

**Желудок.** Рвота: проглоченной пищей; через разные промежутки времени; рвота непереваренной пищей; зеленой массой. Кровавая рвота. Кислые отрыжки. Отвращение к мясу и молоку. Желание кислого.

**Живот.** Вздут; пациент не переносит давления одежды. Хронический понос. *Стул*: в виде *кровянистой жидкости*; в виде желтой жидкости. Дизентерия с лихорадкой. Летний понос.

**Мочевыделительная система.** Дневной энурез; лучше лежа. Моча не удерживается при кашле, выделяется с каждым кашлевым толчком.

Мочится всякий раз после того, как попьет. Задержка мочи у детей при лихорадке.

**Женские половые органы.** Менструации: ранние; каждые три недели; сопровождаются сильной болью в темени. Сухость и жар во влагалище. Боль во время полового акта. Вагинизм.

**Дыхательные органы.** Ларингит: сопровождается охриплостью; возникает у *певцов*. Короткий, болезненный, щекочущий, отрывистый, мучительный, спастический кашель; усиливается утром и вечером. Кровохарканье: чистой кровью; при пневмонии; после сотрясения или падения. Тяжесть в грудной клетке, болезненность или *конгестия* (прилив крови). Плеврит: колющая боль усиливается при кашле и глубоком дыхании.

**Сердце.** Сердцебиение; пульс частый. *ХОРОШЕГО НАПОЛНЕНИЯ, МЯГКИЙ, РОВНЫЙ ПУЛЬС.*

**Шея и спина.** *Растяжение* мышц шеи и спины.

**Конечности.** Ревматизм поражает один сустав за другим; хуже от малейшего движения. Болезненность с ощущением разбитости *в плечах*, распространяющаяся в грудную клетку и запястье. Ноющая боль в запястьях, нет силы взять что-нибудь в руки. Ладони горячие; у детей. Резкое сокращение, подергивание конечностей. Боль в плече (*otodynia*). Растяжение связок локтевых суставов. Кисти опухшие и болезненные.

**Кожа.** Корь. Угри.

**Сон.** Сонливость, дремота. Двигательное беспокойство и бессонница.

**Лихорадка.** Озноб с желанием потянуться; днем в 13 ч. Жар сопровождается потливостью кистей. *Лихорадка*: постоянная; инфекционная; *при пневмонии*; перемежающаяся; при кори; геморрагическая.

**Дополнительно.** Kali-m.

**Диф. диагноз.** Gels.

## **FERRUM PICRICUM**

**Общее.** Это очень полезное средство для лечения старческой гипертрофии простаты. Учащенное мочеиспускание ночью, ощущение полноты и давления в прямой кишке. Жгучая боль, саднение в области шейки мочевого пузыря и в половом члене. Задержка мочи.

## **FLUORICUM ACIDUM**

**Общее.** Деструкция, разрушение — вот ключевой симптом этой кислоты. Ацидум флюорикум — это медленно прогрессирующие глубокие деструктивные процессы, кариес костей, особенно длинных; образование язв, *пролежней*; варикозное расширение вен.

Ацидум флюорикум применяется для лечения заболеваний людей пожилых или преждевременно состарившихся. Бледные, несчастные, *истощенные, с вялыми, дряблыми тканями*, подорвавшие свое здоровье люди. *Пациенту всегда слишком жарко; он хочет искупаться в холодной воде.* Отечность, уплотнение тканей, образование свищевых ходов. Выделения *жидкие; зловонные, едкие* или соленые, вызывают зуд. Отек. Панариций. Родинки (невусы). Вторичный период сифилиса. Повышенная выносливость: во время занятий физическими упражнениями утомление мышц не наступает, независимо от погоды — и в ужасную летнюю жару, и в зимние холода. Онемение: той части тела, на которой пациент не лежит; при заболеваниях головного мозга, при поражении спинного мозга. Нарушение обмена кальция (отложение извести или декальцинация, деминерализация). Невус, плоский. Пациент плохо чувствует себя, если не отреагирует сразу на позыв на стул, подавит его. Отеки, сопровождающиеся онемением или без него. Зоб.

**Хуже.** ОТ ЖАРА, в жарком помещении. Ночью. От алкоголя (красного вина). От кислой пищи.

**Лучше.** ОТ КУПАНИЯ В ПРОХЛАДНОЙ ВОДЕ. От быстрого движения. От кратковременного сна. Запрокинуть голову назад. От еды.

**Психика.** Импульс пойти быстрее; необходимо все время быть в движении. Отвращение: к своей собственной семье, к тем, кого больше всех любит; проявляет интерес и ведет приятную беседу с незнакомыми людьми. Не способен взять на себя ответственность. Депрессия, упадок духа. Стоит на улице и бросает нежные взгляды на проходящих женщин: так велико его вожделение. В приподнятом настроении, веселый, беспутный. Сидит молча, не проронив ни слова, не отвечая на вопросы.

**Голова.** Оглушающая головная боль уменьшается после мочеиспускания.

Давление в затылке. Боль вдоль швов черепа. *Область над переносицей (glabella) опухшая.* Выпадение волос; в том числе после лихорадки. Ломкие, взъерошенные волосы.

**Глаза.** Ощущение, как будто холодный ветер дует сквозь глаза. Слезная фистула. Ощущение, как будто в глазах что-то мешает: оно не удаляется, если потереть глаза; нужно поморгать. Левый глаз меньше, чем правый.

**Уши.** Глухота: слышно лучше, если наклонить голову назад, запрокинуть ее.

**Нос.** Жидкие выделения из носа; в том числе во время сна. Чихание сопровождается слюнотечением.

**Лицо.** Ощущение жара в лице, хочется умыться холодной водой. Лицо бледное.

**Рот.** Зубы рано разрушаются; особенно у корней; кажутся теплыми. Тонкая эмаль. Зубная фистула. На языке видны трещины, имеющие разное направление; боли в языке при разговоре. Позднее прорезывание зубов. Язва на языке и под ним.

**Желудок.** Желание: острой, приправленной, пряной пищи; холодной воды. От теплых напитков возникает понос. Мучительный голод: всегда что-то ест, от еды на некоторое время становится лучше. Несвежий, спертый запах у отрыжки. После незначительной погрешности в диете возникает рвота желчью. Желудочные симптомы уменьшаются, если одежда тугая, тесная. Отвращение к кофе.

**Живот.** Болезненность области печени. От теплых напитков и лосося возникает понос. Зуд и жжение в заднем проходе. Ощущение пустоты в области пупка, возникает желание сделать глубокий вздох; лучше от повязки, бандажа. Асцит: из-за болезни печени; сопровождается уплотнением, увеличением печени и полнокровием (конгестией) в системе воротной вены.

**Моче выделительная система.** Ощущение, что тянет вверх в уретре. Моча скудная, темная. Ацидум флюорикум усиливает мочевыделение при отеках.

**Мужские половые органы.** Повышенное сексуальное желание; в том числе у старых мужчин. Сильные эрекции ночью. Маслянистый, едкий запах у пота на половых органах. Отек мошонки. Варикоцеле. Мужчина стоит на улице, провожает влюбленным взглядом проходящих мимо женщин — так велика его страсть. Получает необыкновенное сексуальное наслаждение.

**Женские половые органы.** Менструации: слишком ранние, обильные, частые, слишком продолжительные. Метроррагия сопровождается затруднением дыхания. Обильные, раздражающие бели. Нимфомания. Соски болезненные, с трещинами. Женщина мучается, если менструация немного задерживается.



**Дыхательные органы.** Ощущение стеснения в груди уменьшается, если прогнуться назад. Гидроторакс. Затруднение дыхания; во время метрор-рагии или по очереди с ней.

**Конечности.** Панариций. Ощущение, как будто под ногтем заноза. Ногти деформированы, ломаются, быстро растут. Отеки конечностей у старых людей с дряблым телом. Ощущение волос на тыльной поверхности пальцев рук. Постоянно красные кисти, особенно ладони. Язвы в области большеберцовой кости. Горячие, потные ладони. Болезненность между пальцами на ногах. Болезненные мозоли.

**Кожа.** Варикозное расширение вен. Ощущение, как будто горячий пар выходит из всех пор. Сухая, шершавая кожа, она чешется или трескается. Рубцы; окружены папулами; краснеют по краям. Келоидные рубцы.

**Сон.** Ощущение, как будто спит не на том боку, на котором лежит.

**Лихорадка.** Приливы жара при болях в костях. *Едкий, образующий раздражение и ссадины пот; он вызывает зуд.* Потоотделение на кистях и стопах. Ночные приступы лихорадки, появляющиеся периодически. Потеет одна половина тела (левая). Потеет большая часть тела.

**Дополнительно.** Sil.

**Диф. диагноз.** Calc-s., Puls., Sul-ac.

## FORMICA RUFA

**Общее.** Тинктуру готовят из раздавленного живого рыжего муравья.

Формика руфа — это средство для лечения артритов: оно применяется *при внезапных суставных болях при ревматизме или подагре.* Туберкулез. Недомогание из-за поднятия слишком большой тяжести. Препятствует образованию полипов. Атрофия ран. Пациент легко простывает. Карцинома. Средство показано при поражении спинного мозга; печени; почек и при правосторонних симптомах. Подавление потоотделения на стопах приводит к возникновению хореи.

**Хуже.** *От холода;* от сырого холода. От движения. Перед снежной бурей (метелью).

**Лучше.** От растирания. От причесывания волос. От давления. От тепла. После полуночи.

**Психика.** Радостное настроение; после боли. Пациент забывчивый вечером. Мрачный; пугливый.

**Голова.** Головной мозг кажется слишком большим и тяжелым. Головная боль уменьшается после того, как пациент причешет волосы. Ощущение, как будто во лбу лопаются пузыри.

**Глаза.** Боль в глазах после пробуждения; лучше от умывания.

**Уши.** Треск в ухе при головной боли. Полип. Ощущение, как будто ткани вокруг уха опухли.

**Нос.** Насморк и ощущение заложенности. Полип.

**Горло.** Боль в шее, когда откашливается или полощет горло.

**Желудок.** Боль перемещается из желудка в темя. Вода кажется сладковатой.

**Живот.** Тянущая боль возле пупка перед стулом. Светлый пенистый стул.

**Мочевыделительная система.** Количество мочи увеличено в два раза. Моча шафранного цвета.

**Женские половые органы.** Кисты яичников, содержащие жидкость или кровь.

**Дыхательные органы.** Нервная астма. Кашель преимущественно ночью.

**Шея.** Боль в шее при жевании, в особенности при смыкании челюстей.

**Конечности.** Внезапные ревматические боли, сопровождающиеся двигательным беспокойством. Слабость в нижних конечностях. Параплегия. Мышцы как будто растянуты и оторваны от места их прикрепления. Кисти немеют. Твердые узлы в области суставов, с внешней и с внутренней стороны (снаружи и внутри).

**Кожа.** Красная, чешется и горит. Крапивница в виде плоских бляшек. Раны атрофируются.

**Лихорадка.** *Обильный пот, не приносящий облегчения.*

**Диф. диагноз.** Rhus-t., Urt-u.

## FRAXINUS

**Общее.** Фраксинус повышает тонус матки. Это средство подходит нервным женщинам. Фраксинус может быть полезен при всех типах смещения матки и при фибромах матки. Он считается первоочередным лекарственным пессарием.

**Хуже.** От травмы. От растяжения. От поднятия тяжести.

**Психика.** Депрессия: пациентка нервничает, беспокоится и тревожится. Должна разговаривать.

**Голова.** Имеется *горячий участок* или *сухость в области темени.* Пульсирующая боль в затылке.

**Живот.** Сильное давление на низ, распространяющееся в бедра; или ощущение, что внутренние органы выпадут; при фиброме матки.

**Женские половые органы.** Матка увеличена; тяжелая, выпадает. Дисменорея. Обильные менструации или бели. Субинволюция матки. Яичник чувствительный (левый).

**Конечности.** Судороги в стопах; после полуночи.

**Лихорадка.** Ощущение ползучего холода на коже или приливы жара.

**Кожа.** Младенческая экзема.

**Дозы.** От 10 до 15 капель тинктуры 3 раза в день.

## **GAMBOGIA**

**Общее.** Действие Гамбогии направлено на *желудок* и *КИШЕЧНИК*. Выраженное *жжение* в разных органах. Ощущение болезненности во всем теле.

**Хуже.** От движения на открытом воздухе. После стула.

**Лучше.** После стула.

**Психика.** Веселый и разговорчивый. Раздражительный.

**Глаза.** Жжение в глазах; зуд век; пациент трет их; веки склеиваются при чихании.

**Нос.** Жестокое хроническое чихание — только в дневное время.

**Рот.** Ощущение холода по краю зубов. Жжение, жгучая боль, саднение и сухость ощущаются на языке и в горле.

**Живот.** Жжение в области печени. *Щемит, булькает* в кишечнике, затем внезапно возникает желтый или зеленый **ЖИДКИЙ СТУЛ**, *вытекающий сплошной, долго не прерывающейся струей*; стул сопровождается *жжением в анусе*; *приносит значительное облегчение*. Рвота и жидкий стул сопровождаются обмороком.

**Мочевыделительная система.** Моча пахнет луком.

**Диф. диагноз.** *Crot-t.*

## **GELSEMIUM**

**Общее.** Действие Гельземина сосредоточено на *МЫШЦАХ И ДВИГАТЕЛЬНЫХ НЕРВАХ*. В мышцах он вызывает *подавляющее ощущение ЛОМОТЫ (ТУПОЙ БОЛИ); УСТАЛОСТИ; ТЯЖЕСТИ; СЛАБОСТИ И БОЛЕЗНЕННОСТИ*, которые особенно ощутимы в мышцах конечностей.

Поражение двигательных нервов приводит к возникновению разных *функциональных параличей*: глаз; горла, гортани, заднего прохода, мочевого пузыря и т.д. Либо это проявляется **ТРЕМОРОМ**, то есть дрожанием, или подергиванием: отдельных мышц лица, подбородка, языка и т.д. Кровообращение замедляется, становится вялым, из-за этого возникает *пассивная артериальная и венозная конгестия* (полнокровие); сопровождающаяся ощущением *переполнения* и тяжести в разных органах: в сердце, печени и т.д.

Катар **СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК** сопровождается водянистыми выделениями. Характерно общее состояние пареза — и тела, и ума. Полное расслабление и упадок сил, прострация. Пациент хочет лежать неподвижно; он полулежит; или хочет, чтобы его держали за руку. *Отупение; головокружение, сонливость; поражение глаз или расстройство зрения*; тремор; *полиурия* — в большинстве случаев, когда бывает показан Гельземин, встречается один или два симптома из перечисленных выше.

Некоординированное сокращение мышц: они не подчиняются воле пациента. Хорея при беременности. Конвульсии, в том числе истерические.

Нервные расстройства у рабочих, изготавливающих сигары. Тело кажется легким — у занимающихся мастурбацией или у истеричных личностей. Грипп. Корь. Пеллагра. Паралич после дифтерии. Дрожательный паралич (паркинсонизм).

Болезненные последствия испуга, страха, печальных переживаний, гнева, плохих известий, неприятной неожиданности, мастурбации, травматического шока.

Чередование симптомов поражения тазовых органов и симптомов со стороны головы. Слабые, усталые, нежные, робкие, возбудимые, легко гневающиеся взрослые люди, дети и подростки. «Никак не поправится после гриппа» (*never well since the flu*). Кома и апоплексия (геморрагический инсульт); в том числе с субарахноидальным кровоизлиянием.

**Хуже.** *ОТ ЭМОЦИЙ, ПЕРЕЖИВАНИЙ. ОТ СТРАХА. От потрясения, шока. От суровых испытаний.* От движения. От неожиданности. *В погоду — ВЛАЖНУЮ; туманную; ВЕСНОЙ.* *От солнечного тепла* — в летнюю жару. Периодически. От табака. В грозу. От холода, в холодную сырую погоду. При прорезывании зубов. Когда думает о своих симптомах, о болезни.

**Лучше.** *От обильного мочеиспускания; от потоотделения. Встряхнуть, потрясти* (головой, например). *От алкогольных напитков.* От нервного напряжения. Согнувшись вперед. От продолжительного движения. После полудня. Лечь, откинуться на подушки, голову держать высоко.

**Психика.** Спутанность сознания; поступает, как сумасшедший. Удивлен, ошеломлен. Апатия, равнодушие. Желание побыть в тишине, или чтобы его оставили в покое. Хочет выброситься с большой высоты. **СТРАХ:** *падения; суровых испытаний, смерти, боли.* Безразличие по отношению к своей болезни. Медленно отвечает. Каталептическая неподвижность (оцепенение) сопровождается расширением зрачков; при этом глаза закрыты, но пациент в сознании. Ребенок вздрагивает, хватается за няню (медсестру) и кричит, как будто боится упасть. Снижена способность к восприятию, пониманию. Последствия горя, не может плакать; горюет о своей потере.

**Голова.** **ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ:** распространяется из затылка; сопровождается ощущением, что пьян, сопровождается нарушением зрения. **СИЛЬНАЯ** тупая головная боль или боль, как от повязки вокруг затылка;

распространяется в область над глазами. Эта боль усиливается от давления тесной шляпы; уменьшается, если потрясти головой; лежа с высоко расположенной головой; после обильного мочеиспускания.

В голове возникает ощущение распухания. Менингит: стадия конгестии, боль в задней части головы, расширение зрачков. Давящая боль из темени распространяется в плечи. Боль в висках, распространяющаяся в ухо, крыло носа и подбородок. Болезненность кожи волосистой части головы.

Апоплексия; субарахноидальное кровоизлияние. Кровь приливает из области затылка ко лбу. Голова горячая, конечности холодные. Мигрень начинается в 2 или 3 ч ночи и уменьшается после полудня. Не может держать голову прямо. Сильная пульсация родничков.

**Глаза.** Зрачки расширены. *ТЯЖЕЛЫЕ, НАВИСАЮЩИЕ ВЕКИ.* В глазах двоится (*диплопия*), когда смотрит в сторону, во время беременности. Приступы слепоты. Зрение неясное, или все плывет перед глазами. Желание яркого света (*фотомания*). Нарушение зрения перед началом мигрени. Глаза красные, болезненные, ощущаются *тупые боли* в глазах; глаза налиты кровью. Отслойка сетчатки; из-за травмы или при близорукости. Глаукома. Глазничная невралгия с контрактурой и подергиванием мышц. Амавроз (*слепота*) из-за мастурбации. Истерическая амблиопия (*слабое зрение*). Боли из глаз распространяются *в затылок*. Ретинит. Сетка, вуаль, пелена и т.д. перед глазами. Гельземин устраняет дискомфорт, возникающий даже при правильно подобранных очках. Помутнение стекловидного тела.

**Уши.** Внезапная кратковременная потеря слуха. Боль в ушах при глотании. Нарушение слуха из-за простуды.

**Нос.** Заложен. *Насморк с жидкими, водянистыми, едкими выделениями из носа.* Ощущение, как будто горячая вода течет из ноздрей. Летняя простуда. *Чихание;* в том числе рано утром.

**Лицо.** Горячее, тяжелое, массивное, кажется *полным, темно-красное;* как будто одурманенное или ничего не выражающее. Подбородок дрожит. Нижняя челюсть отвисает. Нижняя челюсть покачивается из стороны в сторону. Паралич.

**Рот.** Язык тяжелый, *онемевший*, частично парализован; *речь неразборчивая*, как у пьяного человека — едва говорит. Слюна окрашена в желтый цвет, как будто из-за примеси крови. Язык немеет, дрожит, когда пациент высовывает его. Густой желтый налет на языке. Кажется, что мышцы вокруг рта сократились.

**Горло.** Глотание затруднено. Дисфагия при параличе: особенно усиливается от теплой пищи. При глотании возникает боль, распространяющаяся в ухо. Ощущение болезненного комка в горле, который нельзя проглотить — у истеричных женщин. Боль из горла распространяется в ухо. Тонзиллит. Паралич после дифтерии. Боли в горле — ангина — во время менструации. Нарушение глотания (дисфагия) вследствие паралича после кровоизлияния в головной мозг (апоплексии).

**Желудок.** Обычно *жажды нет;* но она появляется при потоотделении. Аппетит понижен, но пациент может что-нибудь съесть и выпить. Чувство пустоты или слабости в желудке или в кишечнике. Спазмы в желудке: усиливаются от езды или когда пациент сидит выпрямившись. Икота усиливается вечером.

**Живот.** Пассивная конгестия печени. Ощущение сжатия в желчном пузыре. Периодическая колика. Обильный желтый стул. Понос: безболезненный; у нервных людей; после внезапных переживаний, связанных с горем, испугом, из-за плохих известий, из-за ожидания или вследствие необычно тяжелых испытаний. Стул цвета сливок; зеленый, как чай. Паралич сфинктера заднего прохода. Выпадение прямой кишки или боли в ней после родов. Непроизвольный стул.

**Мочевыделительная система.** Обильная, прозрачная, водянистая моча; ее выделение сопровождается ознобом и дрожью, способствует уменьшению головной боли. Недержание мочи от волнения; в том числе из-за паралича сфинктера. Чередование дизурии и энуреза. Прерывистая струя. Задержка мочи. Постоянно возникает позыв на мочеиспускание; истерического характера.

**Мужские половые органы.** Поллюции без эрекции. Половые органы холодные, расслабленные. Тянувшая боль в яичках. Обильный теплый пот на мошонке. Истощение сексуальных возможностей: малейшая ласка, прикосновение вызывает поллюцию.

**Женские половые органы.** *Матка тяжелая, болезненная;* ощущение, что она сжата, стиснута (*перегиб кпереди, антефлексия*). Дисменорея: кровотечение скудное, боли распространяются в спину и в области крыльев таза). Темно-желтые бели; сопровождаются тупыми болями, идущими поперек нижней части спины.

Коитус затруднен из-за сокращения мышц влагалища. Эпилептиформные судороги во время менструации или из-за подавления менструаций. Родовые схватки распространяются вверх; схватки распространяются назад или вниз, вдоль бедер. Ригидность шейки матки. Ложные схватки. Угроза выкидыша из-за внезапных печальных переживаний. Как будто волна распространяется из матки к горлу, сопровождается ощущением удушья — затрудняет роды. Нервный озноб в первом периоде родов.

Подергивание мышц всего тела в сочетании с сонливостью — перед эclamптическими судорогами. Сильные послеродовые схватки.

**Дыхательные органы.** Охриплость: во время менструации; при истерии или после печальных переживаний. Утомлен, медленно дышит. Ощущение комка за грудиной. Спазм голосовой щели; длинный кукарекающий вдох;

внезапный, с силой выдох. Сухой кашель, сопровождающийся болезненностью в груди и жидкими выделениями из носа. Жжение в гортани и в грудной клетке возникает, когда пациент кашляет.

**Сердце.** Болит. Ощущение, как будто сердце перестанет биться, если пациентка не будет двигаться, шевелиться. Пульс *медленный, мягкий, слабый, хорошего наполнения* и равномерный. Слабый, медленный пульс; в том числе у стариков. Боль в сердце при вставании со стула.

**Шея и спина.** Ощущение разбитости, как от ушиба, в шее; пациент не может удерживать голову. *Тупая боль* в позвоночнике, распространяющаяся *вверх и вниз*; уменьшается при ходьбе; возникает при болях в затылке. *Боли под лопаткой.*

**Конечности.** Сильная ноющая боль в плечевой кости (правой). Кисти горячие, сухие, немеют, особенно ладони. Хочется опустить кисти в прохладную воду. Судороги в мышцах предплечья. Профессиональный невроз. Писчий спазм. Тяжесть в нижних конечностях. Сильное дрожание и слабость в конечностях. *Коленки слабые*, хуже, когда спускается по лестнице; *шатающаяся, нетвердая походка*; пациент не управляет своими ногами. Холодные запястья и кисти. Ощущение частичного вывиха коленной чашечки при ходьбе.

**Сон. СОНЛИВОСТЬ.** Пациент вздрагивает при засыпании. Тяжелый, отупляющий сон. Сонливость у учащихся, студентов. Бессонница из-за нервного возбуждения, из-за размышлений или от табака.

**Кожа.** Горячая, сухая; *влажная; желтая* кожа.

**Лихорадка.** *Озноб сопровождается тупыми болями, ломотой, вялостью*; появляется вместе с жаром или чередуется с ним; *озноб распространяется вверх и вниз по спине.* Холодные кисти и стопы. Жар сопровождается сонливостью. **ЖАЖДА ОТСУТСТВУЕТ**; при дрожи. Холодный пот.

Желчная послабляющего типа (ремиттирующая) лихорадка; малярия; тиф; менингит. *Корь.* Пациент нервничает, содрогается от холода, его знобит; этому предшествует расстройство зрения.

**Дополнительно.** *Arg-n., Ser.*

## GLONOIN

**Общее.** Нитроглицерин — это взрывчатое вещество, следовательно, он действует быстро и сильно. Его действие сопровождается взрывом и расширением, оно имеет бурный характер.

Глоноин действует на **КРОВООБРАЩЕНИЕ**, вызывая **СИЛЬНЕЙШУЮ ПУЛЬСАЦИЮ, ВОЛНЕНИЕ КРОВИ и неравномерное полнокровие (конгестию).** **КРОВЬ ПРИЛИВАЕТ К ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА.** Общая пульсация; в том числе сопровождающаяся онемением. В разных органах (в глазах, в голове, в языке и т.д.) отмечается ощущение расширения, распирающего, как будто они вот-вот лопнут; как будто этот орган *увеличился* (даже если при этом он уменьшился).

Боли, которые возникают спустя много времени после травмы. Судороги: эпилептиформные, из-за конгестии головного мозга или подавления менструаций. Жжение на небольшом участке или в отдельной части тела. Климактерические расстройства. Одежда кажется тесной.

Последствия воздействия солнечного тепла (жара); яркого снега; открытого огня (жара); страха **или** испуга. Открываются старые раны — происходит деструкция рубцовой ткани и края зарубцевавшихся ран расходятся. Последствия солнечного удара, апоплексии (геморрагического инсульта). Последствия работы при электрическом или газовом освещении. Эклампсия. Морская болезнь. Пациент ходит в тени или под зонтиком.

**Хуже.** **ОТ ЖАРЫ, ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЖАРА НА ГОЛОВУ**, в том числе **СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА.** От перегревания. **В ЖАРКУЮ ПОГОДУ. ОТ ДВИЖЕНИЯ. ОТ СОТЯСЕНИЯ. ОТ УДАРА, ТОЛЧКА.** Если запрокинет голову. *От травмы.* Из-за подавления менструаций. От фруктов. От давления шляпы. От вина. *Из-за искусственного (газового) освещения. От стрижки волос. От персиков.*

**Лучше.** *На открытом воздухе. Высоко подняв голову.* От холодных вещей; от прикладывания холода (холодных аппликаций).

**Психика.** Теряет чувства, падает без сознания. Спутанное сознание, замешательство; пациент может заблудиться в хорошо знакомой местности. При боли впадает в неистовство, теряет рассудок, пытается убежать или выпрыгнуть в окно. Содрогается и плачет в те моменты, когда боль ослабевает. Пациентка боится, что ее отравили. Шок, внезапные приступы ужаса, не решается выйти на улицу. Никого не узнает; испытывает отвращение к своему мужу и детям. Не расположен разговаривать.

**Голова.** **ВОЛНЫ УЖАСНОЙ, РАСПИРАЮЩЕЙ, СГУЧАШЕЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ**; при этом у пациента возникает ощущение, что он стоит на голове; или что голова расширяется и сжимается; или что волны крови приливают к голове, плещут вперед и назад; что они распространяются от сонных артерий к сердцу. Лучше от рвоты. Боль поочередно — то в одном виске, то в другом; хуже от солнечного света, в дни, когда влажно.

Треск, щелчки, удары, взрывы и болезненность в глубине мозга. Голова тяжелая, но пациент не может положить ее на подушку. Головная боль перед менструацией, во время, после или вместо нее. *Теменная область* немеет, болезненная, горячая. Височные вены набухшие. Головная боль уменьшается от продолжительного сна. Пациент крепко сдавливает голову. Ощущение, что череп слишком мал для мозга.

**Глаза.** Покраснение нижней части глазных яблок или век. Глаза выдаются вперед (экзофтальм), дикий взгляд. Глаза повернуты кверху или вращаются вверх и наружу при судорогах. Пациент видит все предметы наполовину светлыми, наполовину — темными. Веки прилипают к глазным яблокам. Приступы слепоты. Глаза ввалившиеся. Сухие глаза. Веки красные. Черные пятнышки, искры, вспышки перед глазами. Буквы кажутся более мелкими.

**Уши.** Биение, пульсация: каждый удар сердца слышится в ушах. Резкая стреляющая боль позади ушей. Мастоидит. Глухота; паралич слухового нерва.

**Нос.** Кровотечение возникает после пребывания на жарком солнце, на солнышке.

**Лицо.** *Синеватое.* Красное, горячее. Боль в корне носа. Подбородок кажется слишком длинным. Боль в скуловых костях, заканчивающаяся головной болью. Нижняя губа кажется распухшей; или немеет. При солнечном ударе челюсти стиснуты.

**Рот.** Пульсирующая боль в зубах; кажется, что зубы стали длиннее. Язык тяжелый; пациент не может высунуть его ровно. Беседовать трудно, мысли путаются. Количество слюны повышено; она густая в первой половине суток (с полуночи до полудня). Пена у рта.

**Горло.** Кажется, что горло распухло; воротник приходится расстегивать.

**Желудок.** Тошнота и рвота. Чувство ужасной слабости, как при обмороке, под ложечкой; сопровождается пульсацией. Урчание в нижних отделах живота (в гипогастрии), особенно сильное, когда пациент лежит на левом боку. Понос при внезапном прекращении менструаций.

**Мочевыделительная система.** Моча обильная, бледная, содержит белок; более частое мочеиспускание ночью.

**Женские половые органы.** Климактерические приливы. Головные боли после обильной менструации. Внезапное прекращение менструации при возникновении прилива крови к голове (конгестии). Эклампсия. Пульсирующая боль начинается в молочной железе (левой), внезапно стреляет в голову; хуже от движения.

**Дыхательные органы.** Тяжелое, затрудненное дыхание. Как будто груз лежит на груди. Пациент делает глубокий вдох. Вдыхает. Онемение распространяется из грудной клетки вверх и вдоль левой руки вниз. Стеснение в груди чередуется с головной болью.

**Сердце.** *Яростное сердцебиение;* пульсация сонных артерий. Кажется, что сердце переполнено, дрожит, трепещет. Пульсация во всем теле, распространяющаяся до кончиков пальцев рук. Дрожание грудной клетки — «кошачье мурлыканье» — в области сердца. Боль из сердца распространяется во все части тела, в руки; усиливается, если прислониться к чему-нибудь спиной или от вина. Наполненный, напряженный пульс. Венозный пульс. Ощущение кипения в области сердца.

**Шея и спина.** Ощущение полноты и скованности в шее; она слабая и усталая; шея не может удерживать голову. Ощущение жара, распространяющегося вдоль спины вниз; вдоль позвоночника; жжение между лопатками.

**Конечности.** Дрожание кистей. Колени подкашиваются. Бедра и колени слабые, ударяются друг о друга при головной боли. Неустойчивая походка. Пальцы на руках и на ногах растопырены во время судорог. Ишиас: боль уменьшается, когда пациент сгибает ноги в коленях и поджимает их к животу.

**Кожа.** Зуд повсюду, сильнее в области конечностей.

**Сон.** Пациент просыпается со страхом апоплексии — боится инсульта.

**Лихорадка.** Жар сопровождается выделением горячего пота. Как будто теплая вода течет вверх из задней части шеи. Приливы жара.

**Дополнительно.** *Bell.*

**Диф. диагноз.** *Aml.n., Bell.*

## GNAPHALIUM

**Общее.** Это средство применяется, в основном, при поражении седалищного нерва, хотя оно может быть полезно для лечения некоторых болезней органов брюшной полости и женских половых органов.

Зловонный понос, сопровождающийся спастической болью, коликой; хуже утром. Ощущение груза, тяжести в области тазовых органов. Дисменорея со скудными менструациями, они очень болезненны в первый день.

**Сильная боль** в седалищном нерве; чередуется с онемением или онемение возникает после боли. Боль усиливается, когда пациент ложится, двигается, ступает на ногу. Лучше — согнуть конечности и положить на живот; а также если сесть на стул. Люмбаго (прострел) сопровождается онемением больного места и ощущением тяжести, груза в тазу. Невралгия бедренного нерва. Боль в суставах, как будто им не хватает смазки.

Хуже. При ходьбе. Лежа. От сырого холода.

Лучше. Согнуть конечности. Сидя, в том числе на стуле.

**Диф. диагноз.** *Coloc.*

## GOSSIPIUM

**Общее.** В обычной практике это растение применялось в качестве средства, способствующего наступлению менструации. Но в гомеопатии оно соответствует многим *рефлекторным состояниям, обусловленным нарушением функции матки* и беременностью.

Тошнота со слюнотечением и склонностью к рвоте возникает утром; перед завтраком, сочетается с чувствительностью области матки. Желудок чувствительный, сильное газообразование. Рвота от движения или при вставании. Неукротимая рвота.

Периодическая (интермиттирующая) боль в яичниках; боль распространяется в матку. Бесплодие из-за *инертности, вялости матки*. Чувствительная матка. Менструации поздние, скудные, водянистые. Субинволюция матки. Фиброма матки. Опухоли молочной железы с увеличением подмышечных лимфатических узлов. Боль в шее. Задержка менструации с ощущением, что кровотечение вот-вот начнется, но оно не возникает.

**Хуже.** От движения.

**Диф. диагноз.** Senec, Ust.

## GRAPHITES

**Общее.** Это углеродсодержащий минерал, в котором определяется небольшое количество железа.

Графит влияет на *обмен веществ* особым образом: он подходит тем людям, которые склонны к патологическому накоплению жира и тем, у кого появились признаки дистрофии, исхудания. Графит влияет на *кровообращение*, вызывая неравномерное распределение крови, прилив крови, особенно к голове; покраснение и бледность кожи и слизистых оболочек.

Основное действие его направлено *НА КОЖУ*, особенно кожу *суставных сгибов* или в области естественных складок тела, в местах перехода слизистых оболочек в кожу, а также кожу *за ушами*. Графит показан *ПРИ УТОЛЩЕНИИ И УПЛОТНЕНИИ КОЖИ*; уплотнении желез, утолщении краев век, ногтей, *рубцов*. На коже образуются толстые *корки*. Склонность к образованию мозолей.

Склонность к появлению *ЭКСКОРИАЦИЙ (ССАДИН); ТРЕЩИН, КРУП-НЫХ И МЕЛКИХ*, в том числе в местах перехода кожи в слизистые оболочки: в области глаз, ноздрей, рта, *заднего прохода*, а также сосков, кончиков пальцев, *складок кожи*.

Пациент обычно *жирный, вялый; зябкий и страдает запором*. *Выделения жидкие, зловонные, скудные и едкие*. *Кислый* привкус во рту, *кислые* отрыжки, стул, моча, кровь возле зубов и т.д. При кровотечениях — жидкая кровь. *Исхудание*; в том числе больных частей тела. Ощущение *жжения*; онемения и омертвения. Боль перемещается в часть тела, на которой пациент в данный момент не лежит.

Общее ощущение беспокойства, дискомфорта, дрожание; у пациента вырывается тяжелый вздох. Внезапный упадок сил. Часто пациент испытывает обморочную слабость, сопровождающуюся частичной потерей чувств. Графит способствует рассасыванию рубцовой ткани. Он устраняет склонность к рожистому воспалению. Контрактуры; в том числе мышечные.

Болезненные последствия горя, страха, поднятия чрезмерной тяжести. Каталептические состояния: сознание сохранено, но у пациента нет сил двигаться или говорить. Инфильтраты. Судороги и жжение в разных частях тела. Чередование пищеварительных и кожных симптомов.

*Повышенная чувствительность к холоду*. *Ощущение холода*; от холода усиливаются боли в костях; насморк и желудочные симптомы. Раковый диатез — склонность к возникновению злокачественных опухолей, в том числе в области старого рубца. Паралич или ощущение паралича. Склонность к появлению кист; атером. Водянка; отек.

**Хуже.** *От холода, холодных сквозняков. От света. Во время и после менструации. От движения. От подавления: высыпаний, выделений. Когда делает «пустое» глотательное движение. От жирного. От горячего питья. От тепла постели. Ночью. Если промокнут ноги. От расчесывания кожи.*

**Лучше.** На открытом воздухе; после прогулки по улице. От горячего питья, особенно, от горячего молока. От еды. От отрыжки. От прикосновения.

**Психика.** *Печальный; пугливый; нерешительный*, сомневается по пустякам. Непроизвольно тяжело вздыхает. Робкий. Боится работы. Суетливый, когда занят работой. Чувствует себя жалким и несчастным. Плачет: без причины, от музыки. Забывчивый, делает ошибки в речи и письме. Ребенок дерзит, передразнивает, смеется над замечаниями взрослых. Не думает ни о чем, кроме смерти. Помнит все события времен юности, недавние события — забыты. Утомление вследствие научной деятельности.

**Голова.** Головокружение усиливается при взгляде вверх, при чтении или шитье. Прилив крови к голове сопровождается появлением румянца, покраснением лица и чувством жара. Кажется, что мозг онемел. Онемение головы, кажется, что она покрыта толстой кожей. Кожа лба как будто стянута в складки. Ощущение, как будто паутина на лбу. Ощущение большой тяжести или тупого давления в затылке; как будто голова оттянута назад. Давящая боль или участок *жжения* на темени. Головная боль с тошнотой во время менструации.

Волосы свалывшиеся, запутаны, образуют колтун, они ломкие или выпадают; сильнее на макушке и по бокам головы. Молочный струп. Экзема головы; прикосновение к коркам причиняет боль. Участки облысения.

**Глаза.** Пациент избегает дневного света. *Светобоязнь*. Воспаление глаз — офтальмия. Веки красные и опухшие. Болезненность или трещины в наружных углах глаз. Вросшие ресницы. Снижение зрения во время менструации. Веки по краям воспаленные или сухие, покрыты чешуйками или бледные. Рецидивирующий кератит. Трещины на веках; экзема век. Фликтены. Горячие слезы. Веки тяжелые, опускаются. Буквы двоются, когда пациент пишет; кажется, что буквы сливаются, когда читает. Кистозные опухоли век.

**Уши.** Сухость внутри уха. Тонкая, белая, чешуйчатая пленка покрывает барабанную перепонку. *Мокнутые и высыпания* за ушами. Выделения из уха, как рассол. Ощущение твердого тела за ухом. Глухота: лучше слышит при шуме. Шум в ушах: шипение, свист; как орудийная канонада. В полнолуние возникает ощущение заложенности ушей. Ощущение воздуха внутри уха; как будто ухо наполнено водой. Щелкает в ухе каждый раз после отрыжки.

**Нос.** Сухость в носу; в том числе с потерей обоняния. Носовое кровоотечение с приливом крови к голове; хуже перед менструацией. Простуда возникает во время менструации. Обостренное обоняние: не переносит запаха цветов. Насморк с заложенностью носа. Струпья и трещины в ноздрях. Чихание возникает, как только пациент откроет глаза. Насморк от холода. Нос болит внутри. Хронический катар. Выделения отвратительные, особенно во время менструации. Нос со ссадинами, раздражением.

**Лицо.** Как будто паутина на лице. Бледное, одутловатое, изможденное, румяное. Угри перед менструацией. Губы в трещинах, болезненные. Мокнувшая экзема вокруг рта и носа. Сикоз — лишай в области бороды и усов. Паралич мышц лица с искажением черт и затруднением речи. Ощущение ползания мурашек на губах во время менструации. Болезненные узелки на нижней челюсти. Выпадение волос на подбородке.

**Рот.** Изъязвление углов рта. Привкус во рту: соленый; тухлых яиц. Дыхание имеет запах, как у мочи. На языке *белый толстый налет в виде точек*. Жгучие пузыри на языке. Кровоточивость и опухание десен. Кислый; зловонный запах изо рта. *Кровь* из зубов имеет кислый вкус. Слюнотечение; в том числе ночью. Оскоми́на.

**Горло.** Узловатый зоб. Из-за зоба пациент *задыхается* при глотании. Ощущение, как будто комок в горле; оно усиливается, когда пациент делает «пустое» глотательное движение; из-за этого ощущения возникает желание сглотнуть; это ощущение возникает из-за постоянных спазмов. Хронический тонзиллит. Увеличение миндалин. Ощущение, как будто пища не пройдет в пищевод из-за спазмов.

**Желудок.** Отвращение к мясу, рыбе, вареной пище, соли, сладостям. Горячее питье вызывает неприятные ощущения — от него хуже. Волчий аппетит или отсутствие аппетита; хуже, когда голоден. Кислые или зловонные отрыжки. Жжение в желудке; оно вызывает ощущение голода; уменьшается от еды; от горячего питья, особенно молока; лежа.

Дурнота утром во время менструации. Рвота: кислым; пищей. Периодическая гастралгия, сопровождающаяся рвотой пищей немедленно после еды; желудочные симптомы усиливаются от холода. Рак привратника. Рвота и жидкий стул, а также холодный, как лед, пот — при головной боли.

**Живот.** *Метеоризм*. Не выносит тесной одежды в области талии. *Вздутие живота*; как будто не отходят газы. Судорожная боль в животе при недостаточном выделении мочи; ночью. Боль, как будто кишечник разорван. *Стул: объемный, узловатый; затрудненный; вязкий; покрыт слизью; или жидкий, коричневый, с непереваренной пищей и крайне зловонный. Вялость кишечника*; запор в течение нескольких дней. Трещины заднего прохода: режущая боль во время стула; после стула ноющая боль сохраняется в течение нескольких часов; трещина кровоточит и изъязвляется. Выделяется стул или слизистая масса; стул тонкий; вязкий, тестообразный. Легко возникает выпадение прямой кишки.

Геморрой: боль усиливается, когда пациент садится или широко шагает. Зуд ануса и промежности перед менструацией. Саднящая, жгучая боль в заднем проходе, болезненность — ощущаются, когда пациент вытирает его. Понос из-за малейшей погрешности в диете. Ленточные глисты.

**Мочевыделительная система.** Моча с кислым запахом; мутная; струя тонкая. Боль в крестце или в копчике во время мочеиспускания. Стриктура уретры.

**Мужские половые органы.** Импотенция в сочетании с повышенным сексуальным желанием. Импотенция из-за сексуальных излишеств или мастурбации. Отвращение к половому акту. Эякуляция преждевременная или не происходит во время коитуса. Пациент не получает сексуального удовлетворения. Судороги в икроножных мышцах во время коитуса. Водянка яичка. Приапизм.

**Женские половые органы.** Сильное отвращение к половому акту. Менструации: *запаздывают*, скудные, нерегулярные, болезненные, кровь бледная. Опухание и уплотнение яичника (левого); сильнее после менструации. Уплотнение яичников и молочных желез. Во время менструации — охриплость, насморк, кашель, утренняя дурнота и потливость, опухание стоп или головная боль.

Бели: бледные, жидкие, обильные, вызывают раздражение, в виде сплошной струи, сопровождаются слабостью в спине; хуже перед менструацией и после нее. Бели вместо менструации.

Рак молочной железы возникает на месте старых рубцов; в том числе оставшихся после абсцесса молочной железы. Соски болезненные, потрескавшиеся, покрыты пузырями.

Боль в матке возникает, когда женщина тянется вверх, пытаясь руками что-нибудь достать. Ретроверсия матки: тяжесть внизу живота — в ги-погастрии — сопровождается режущей болью, которая распространяется вниз вдоль бедер; кажется, что матка вываливается через влагалище. Влагалище сухое, горячее или холодное. Экзема наружных половых органов (вульвы).

**Дыхательные органы.** Чувство сжатия грудной клетки, как будто она слишком узкая; у пациента возникает ощущение, что он вот-вот задохнется, когда засыпает; поэтому он вскакивает с постели, держится за что-нибудь и при этом должен что-нибудь съесть. Хуже после полуночи. Спазмы в груди.

Не владеет голосом, лучше, когда больше разговаривает, пользуется голосом. Как только пациент начинает петь, появляется охриплость. Голос сиплый. Не контролирует голосовые модуляции; лучше, если продолжает разговаривать.

Астма спастическая, приступы удушья будят пациента; лучше от еды. Сухой мучительный кашель, при этом выступает пот на лице. Слезотечение усиливается, когда пациент делает глубокий вдох.

**Сердце.** Ощущение, как от электрического разряда, направленного из сердца в шею. Сильная пульсация во всем теле. Сердцебиение сопровождается тревогой; в том числе при носовом кровотечении. Чувство холода за грудиной. Пульс медленный в течение дня, частый — утром.

**Шея и спина.** Боль в задней части шеи и плечах усиливается при взгляде вверх и при наклоне головы. Боли в крестце с ощущением ползания мурашек. Онемение крестца, распространяющееся вниз, вдоль голеней. Боль в поясничной области, как будто позвонки сломаны.

**Конечности.** Жжение в конечностях; судороги, резкое подергивание. Жгучее давление ниже подмышечной впадины. Руки и голени немеют. Кисти или стопы либо горячие, либо холодные. Кажется, что конечности парализованы. Отек голеней. Ногти толстые; грубые, уродливые, крошатся, вросшие. Роговые наросты, мозоли на кистях; в том числе с трещинами.

Боль в суставе большого пальца руки, как будто растянуты его связки. Пациент не может разогнуть его полностью. Ссадины на бедрах (потертости); образуются при ходьбе. Мелкие и глубокие трещины на кончиках пальцев рук. Бурсит большого пальца стопы; хуже от открытого огня (камина и т.д.); лучше от давления.

Жжение в стопах и пятках. Стопы холодные, мокрые. Стопы становятся холодными, покрываются *зловонным едким потом*; сильнее вечером. Пальцы на ногах становятся мокрыми от пота.

**Кожа.** Ссадины в складках кожи. Высыпания с трещинами, мокнущие, легко кровоточат; сильнее в области головы; за ушами. Кожа *СУХАЯ, грубая; на ней легко возникает раздражение; она легко трескается, появляется клейкая жидкость*. Эти изменения более выражены в складках кожи, кожа медленно заживает.

**МОКНУЩИЕ, С КОРКАМИ высыпания.** Экзема: заднего прохода, бедер, ладоней. Блуждающее или рецидивирующее *рожистое воспаление*. *Зло-вонный, едкий пот на стопах; из-за него возникают ссадины, потертости* на пальцах ног. Высыпания усиливаются от жары. Старые рубцы изъязвляются. Жжение в старых рубцах. Старые рубцы имеют плотное основание и края, в них ощущается жжение.

**Сон.** Пациент чрезвычайно усталый и сонливый. Бессонница до полуночи. Сонливость днем. Очень страшные сновидения. Не чувствует себя отдохнувшим утром, сон не освежает.

**Лихорадка.** Часто потеет только передняя часть тела. Пот зловонный, кислый, оставляет желтые пятна, холодный. Пациент совершенно не способен потеть.

Рецидивирующая периодическая лихорадка. Озноб вечером: хуже от еды; лучше на открытом воздухе и от питья воды. Пациент хочет быть тепло укрытым на всех стадиях лихорадки.

**Дополнительно.** *Ars., Caust., Ferr., Hep., Lyc, SULPH.*

**Диф. диагноз.** *Calc-f., Carb-an., Carb-v., Kali-bi., Puls.*

## GRATIOLA

**Общее.** Хотя это средство действует преимущественно *на желудочно-кишечный тракт*, оно имеет в своем патогенезе также несколько психических и сексуальных симптомов.

Наиболее характерны *паралитические боли и ощущение холода*, особенно в животе. Невралгия вследствие злоупотребления кофе. Психические симптомы из-за непомерной гордыни. Нервное истощение.

**Хуже.** От еды. *От питья слишком большого количества воды*, горячей или холодной. Летом. От движения. От злоупотребления кофе. От обеда.

**Лучше.** На открытом воздухе.

**Психика.** Слабая воля. Плохое настроение; устал от жизни, не хватает упорства, настойчивости. Сильная тревога за будущее. Истерия. Нимфомания. Ипохондрия.

**Голова.** Прилив крови к голове, сопровождающийся снижением зрения. Головокружение во время или после приема пищи. Морщит лоб при головной боли. Ощущение, как будто мозг сжался, и голова стала меньше.

**Глаза.** Все предметы кажутся белыми, даже зеленые деревья.



**Желудок.** Ощущение пустоты после еды. Как будто в желудке холодная вода или *болтается тяжелый груз*. Ничего не желает так страстно, как хлеба.

**Живот.** *Обильный, желтоватый, зеленый, как из крана (сплошным по током), водянистый или пенистый, истощающий* понос. Он сопровождается ощущением холода в животе; после него возникает болезненность и жжение в заднем проходе. Летний понос из-за питья слишком большого количества воды.

**Мужские половые органы.** Болезненная ригидность полового члена после поллюции; по ночам.

**Женские половые органы.** Склонность к мастурбации; нимфомания. Менструации слишком обильные; раньше срока и слишком продолжительные. Бели постоянные. Стреляющая боль в молочной железе (правой) возникает, когда женщина наклоняется во время менструации.

**Сердце.** Сердцебиение: после стула, с ощущением стеснения в груди.

**Спина.** Боль в копчике после стула. Шею как будто сжали руками.

**Конечности.** При ишиалгии нога подкашивается.

**Диф. диагноз.** Маг-с.

## GRINDELIA

**Общее.** Это средство вызывает — и лечит — парез блуждающего нерва: это препятствует дыханию и значительно усиливает секрецию бронхиальных желез.

*Удушье при засыпании* или пробуждении. Астма и эмфизема сопровождаются расширением сердца. Клокочущее, хриплое дыхание. Бронхорея: мокрота тягучая, беловатая. Пациент не может дышать, когда ложится. Режущая боль, болезненность в области селезенки, распространяющаяся в области крыльев таза. Селезенка увеличена. Дыхание Чейна-Стокса.

**Хуже.** При засыпании. От движения. В темноте.

**Диф. диагноз.** Lach.

## GUAIACUM

**Общее.** Это средство, главным образом, действует на соединительную ткань суставов. Гваякум полезен при *артритическом диатезе*.

Мышцы и сухожилия сокращены, это вызывает болезненность, скованность, опухание суставов. **ОБИЛЬНЫЕ ЗЛОВОННЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ:** мокрота, пот и т.д. Гваякум *ускоряет нагноение, формирование абсцесса*.

Тонзиллит с ревматизмом. *Жгучий жар*; в том числе, в больном месте. Грызущие или колющие боли; в грудной клетке. *Мышцы кажутся слишком короткими* — в области век, спины, бедер и т.д. — или *болезненными*. *Контрактуры* мышц между лопатками; на ладонях и т.д.; из-за них возникает деформация; а также неподвижность. *Боли в период роста* у детей. Укорочение сухожилий. Узлы. От пациента пахнет нечистым телом. Одежда кажется влажной. Боли часто заканчиваются колющим, особенно в области головы. Кости становятся пористыми, как губка, или нагнаиваются. Прогрессирующее исхудание. Кажется, что должен зевнуть, потянуться при ощущении неловкости, дискомфорта во всем теле. Экзостозы.

**Хуже.** *ОТ ЖАРЫ. От прикосновения. От движения. От напряжения. Из-за быстрого роста. Из-за ртути.* С 18 ч до 4 ч утра. В пубертатном возрасте. В холодную, влажную погоду.

**Лучше.** От местного применения холода. От яблок. Когда зевает и потягивается.

**Психика.** *Забывчивый*, особенно забывает имена. Сильное желание критиковать и презирать всё. Бездумно смотрит в пространство. Ленивый, упрямый, беспокойный.

**Голова.** Боли распространяются на шею, часто заканчиваясь резкой колющей болью. Ощущение, что мозг болтается. Головная боль уменьшается при ходьбе, от давления; усиливается, когда пациент сидит, стоит.

**Глаза.** Кажется, что глазные яблоки слишком велики, и веки не могут их закрыть. Твердые папулы вокруг глаз. Экзофтальм.

**Лицо.** Лицевая невралгия слева, возникает ежедневно с 18 ч до 4 ч утра. Лицо как у старика.

**Горло.** *Сухость, жжение*; боль от прикосновения; острый тонзиллит. Резкое колющее в направлении уха при глотании; не может проглотить, не запивая. Рецидивирующий тонзиллит, затем — ревматизм.

**Желудок.** Толстый белый налет на языке. Отвращение к молоку; ко всей пище; не может ничего есть. Желание яблок, от которых желудочные симптомы уменьшаются. Жжение в желудке. Рвотные массы в виде водянистой слизи, после рвоты наступает истощение. Желудочное заболевание повторяется каждое лето.

**Живот.** Ощущение сжатия или заложенности в области эпигастрия; это вызывает кашель, одышку и т.д. Детская холера; лицо, как у старика, исхудание. Вздутие живота, метеоризм.

**Мочевыделительная система.** Продолжительные позывы, даже после мочеиспускания. Резкая колющая боль во время или после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Поллюции возникают без сновидений. Выделения из уретры.

**Женские половые органы.** Оофорит у женщин, страдающих ревматизмом; с нерегулярными менструациями и дисменореей, раздражением мочевого пузыря. Ощущение ползучего холода в области молочной железы. Дрожание и гусиная кожа в области молочной железы.

**Дыхательные органы.** Пациент чувствует удушье из-за заложенности в эпигастрии; возникает сухой кашель, часто повторяющийся до тех пор, пока не произойдет отхаркивание мокроты. Зловонное дыхание после кашля. Плевральные колющие боли усиливаются при глубоком дыхании. Рецидивирующий плеврит. Колющая боль в верхушке легкого (левого).

Туберкулез легких, чахотка. Боль в грудной клетке во время езды на открытом воздухе; уменьшается от давления и ходьбы; усиливается сидя и стоя.

**Шея и спина.** Скованность в шее и болезненность плеч. Односторонняя скованность в спине, от шеи до крестца. Сжимающая боль между лопатками.

**Конечности.** Напряжение, укорочение мышц бедра; лучше, когда пациент сидит. Покалывание в ягодицах, как будто сидит на иголках. Боль из голеностопных суставов поднимается вверх. Деформирующий полиартрит. Жжение в пораженной конечности. Подколенные сухожилия укорочены.

**Сон.** Зевает и потягивается, чтобы облегчить ощущение дискомфорта, нездоровья в целом. Часто просыпается из-за ощущения, что падает.

**Лихорадка.** Обильный пот на отдельных частях тела, на лице и т.д. Ночные поты. Лихорадка, сопровождающаяся ознобом, возникает вечером. Жжение в теле. Горячие ладони. Жгучая лихорадка с горячим лицом и сухим кашлем.

**Диф. диагноз.** *Ferr., Kali-bi., Kreos., Ph-ac, Phyt.*

## GYMNOCLADUS

**Общее.** Это средство показано при онемении и цианозе, в особенности языка. Хуже. От холода. От ходьбы.

**Лучше.** В покое. Облокотившись на что-нибудь. Потереть глаза.

**Психика.** Забывает всё. Медленно соображает; не может думать, не способен понимать или учиться.

**Голова.** Ощущение стягивания, как будто повязкой.

**Глаза.** Как будто глаза выталкивает вперед; хочется их потереть. Боль ниже бровей, распространяющаяся в нос.

**Лицо.** Ощущение, как будто мухи ползают по лицу. Опухание при рожистом воспалении.

**Рот.** Зубы чувствительны к холодному воздуху. *СИНЕВАТЫЙ, БЕЛЫЙ ЯЗЫК.*

**Желудок.** Горячие, кислые отрыжки. Участок жжения в желудке.

**Конечности.** Жесткая боль в предплечье (слева), в лучевой кости: как будто кости раздавлены.

**Диф. диагноз.** Ор.

## HAMAMELIS

**Общее.** Действие этого препарата, в основном, направлено на *ВЕНЫ*, особенно вены прямой кишки; половых органов, конечностей и горла. Оно заключается в появлении венозного полнокровия (конгестии), появлении варикозного расширения вен, геморроя и кровотечений. Это, кроме того, ценное средство для местного лечения открытых болезненных ран и ожогов первой степени.

Гамамелис показан, когда имеется ощущение *разбитости, ушиба, БОЛЕЗНЕННОСТИ* в пораженной части тела; в том месте, откуда течет кровь; в кровеносных сосудах; в животе и т.д.

Чувство напряжения и распирающего: в геморроидальных узлах, суставах или в нижних конечностях. Чувство переполнения, обусловленное полнокровием. *Вены* болят, они *болезненны* при прикосновении, возникают режущие боли, опухание вен; воспаление. *Вены болят*, они плотные, узловатые; *расширены*. *Кровотечения:* капиллярные, темной, жидкой кровью, они приносят облегчение или *вызывают несоразмерно сильную усталость*. Покалывающая, как иголками, жгучая боль в венах, мышцах, в коже. Гамамелис облегчает боли после хирургических операций.

**Хуже.** От травм, повреждений. От ушибов. От давления. От воздуха, на открытом воздухе; от влажного, холодного воздуха. От сотрясения. От движения. От прикосновения. В течение дня (боли).

**Психика.** Забывчивый. Не хочет учиться или работать. Желает, чтобы ему «воздавали должное», выражали признательность, уважение. Раздражительный. При кровотечениях спокоен.

**Голова.** Стучащая, как будто молотком, головная боль; сильнее в левом виске. Ощущение оцепенения в голове. Как будто в голову вставлен стержень, и он проходит через оба виска. Головная боль после поллюции.

**Глаза.** Чувство, как будто их выталкивает наружу; лучше от давления пальцем. Глаза налиты кровью. Болезненность глаз. Гамамелис способствует рассасыванию внутриглазного кровоизлияния. Последствия травмы, ирит, конъюнктивит и т.д.

**Нос.** Вонючий запах из носа. Носовое кровотечение: пассивное, кровь не свертывается, сопровождается напряжением в области спинки носа. Носовое кровотечение; в том числе при гемиплегии у стариков.

**Рот.** Пассивное кровотечение из десен после удаления зуба сопровождается болезненностью десен. Привкус крови во рту. Язык как будто обожжен. Ожоги языка и губ.

**Горло.** Болезненное при расширении вен. Жалящие, разрывающие боли в нёбном язычке при кашле.

**Желудок.** Боль и тяжесть в задней части желудка. Рвота черной кровью. Отвращение к воде; мысль о ней вызывает тошноту. Тошнота после свинины.

**Живот.** Геморрой: сопровождается обильным кровотечением, болезненный. Большое количество черной, как деготь, крови в стуле. Дизентерия с кровавым поносом. Варикозное расширение вен живота.

**Мочевыделительная система.** Гематурия, с учащенными позывами на мочеиспускание. Тупая боль в области почек.

**Мужские половые органы.** Сильная невралгическая боль в семенных канатиках и яичках, сопровождающаяся тошнотой. Орхит: хуже от прикосновения. Варикоцеле. Поллюции возникают ночью, пациент не осознает их. Гематоцеле.

**Женские половые органы.** Менструации: кровь темная, кровотечение обильные, сопровождается болезненностью живота. Метроррагия: в середине цикла, между менструациями; кровотечение только днем. Оофорит: после удара; после аборта, с болезненностью всего живота. Болезненность сосков, кровотечение из сосков.

Бели: кровянистые, сопровождаются болезненностью влагалища. Влагалище болезненное, чувствительное, вагинизм. Тряска вызывает наступление менструации.

Послеродовой флебит (белый болевой флебит). Во время беременности голени становятся болезненными, женщина не может ни стоять, ни ходить.

**Дыхательные органы.** Кровохарканье, щекочущий кашель, привкус крови при кашле.

**Шея и спина.** Болезненность распространяется вдоль шейных позвонков вниз. Боль с ощущением, как будто спина сломана. Лопатки болят. Тупая боль в области почек.

Конечности. Чувство напряжения, распирающего, разрывающего ощущение в конечностях и суставах.

**Кожа.** Флебит. Кровоподтеки (экхимозы). Варикозные язвы с кровянистым дном. Ожоги.

**Дополнительно.** Ferr., Fl-ac.

**Диф. диагноз.** Arn., Puls., Vip.

## HECLA LAVA

Общее. Гекла лава обладает выраженным действием на нижнюю челюсть. Она способна излечивать многие заболевания костей — остеосаркому, остеомиелит, кариес и некроз; чувствительные и болезненные при прикосновении экзостозы. Лицевая невралгия из-за кариозных зубов и после удаления зуба.

## HELLEBORE

Общее. Это растение широко известно под именем морозник («рождественская роза» — по-английски) или чемерица черная. Легко понять многие характерные симптомы этого средства, если иметь в виду сокращение, принятое для его обозначения, и прилагательное «черный», относящееся к названию [Helleborus niger, сокращенно *Hell.* В таком виде можно перевести как «ад» — *Н.Л.*].

Геллеборус в гомеопатии применяется для лечения состояний, характеризующихся низким уровнем жизненных сил, а также в случаях серьезных заболеваний, когда все вокруг пациенту кажется черным.

Лицо больного, его губы, кисти и т.д. темнеют, ноздри как будто покрыты сажой; поэтому Геллеборус темное, сумеречное средство. Он оказывает влияние *НА ПСИХИКУ* и на *ГОЛОВНОЙ МОЗГ*. Чувства притупляются, *ответная реакция вялая*: пациент видит, слышит, ощущает вкус — не полностью. Мышцы не подчиняются воле пациента — он пошатывается, роняет вещи и т.д. Мышечная слабость заканчивается полным *параличом*. Конвульсии и подергивание мышц; автоматизмы; автоматические (непроизвольные) действия и движения одной руки и одной ноги. Начало заболевания постепенное, сопровождается нарастающей слабостью. Пациент лежит на спине, колени подтянуты или ноги раздвинуты.

Опухание вследствие отека. Эпилепсия: пациент в сознании, после приступа возникает глубокий сон. При конвульсиях тело чрезвычайно холодное; в том числе у грудных детей. Шум прекращает судорожный приступ.

Болезненные последствия подавления экзантемы; удара, разочарования в любви. Пациент слабый и нежный. Одна половина тела парализована, другая совершает автоматические движения. Выпот в серозных полостях. Обычно красные части тела становятся белыми.

Хуже. *От холодного воздуха*. В пубертатном возрасте. При прорезывании зубов. *От подавления симптомов*. От напряжения. Вечером, с 16 до 20 ч. От прикосновения. При наклоне.

**Лучше.** Когда думает о симптомах, или когда отвлекается от этих мыслей.

**Психика.** Полная потеря сознания. Невнимательность. *Тупой, глупый*; медленно соображает, понимает или *равнодушен. Мрачный.* Унылый; *в отчаянии*; опустошен. С завистью наблюдает, что другие люди счастливы. Бездумно смотрит в пространство. Истерическая мания из-за самообвинения. Непроизвольно вздыхает. Раздражительность усиливается от утешений; не желает, чтобы его беспокоили, мешали ему. Не станет есть или говорить. Навязчивые идеи. Меланхолия; в том числе в пубертатном возрасте. Вещи кажутся новыми. Тербит губы или одежду. Пациентка убеждена, что поступает плохо; считает, что умрет в какой-то определенный день; просто сидит и ничего не говорит, ничего не делает. Идиотия после инсульта (апоплексии).

**Голова.** Отупляющая головная боль усиливается при наклоне. Стреляющие боли, из-за которых пациент внезапно вскрикивает. *Постоянно вертит головой*; стонет (при гидроцефалии, водянке мозга) или *зарывается головой в подушку*, чтобы облегчить боль (при менингите).

Как будто внутри головы плещется вода. Головная боль заканчивается рвотой. Бьется головой. Лоб наморщен, кожа собрана в складки (при поражении головного мозга). Геллеборус показан при сотрясении мозга из-за удара по голове, если *Ат.* не помогла. Перед судорогами возникает ощущение, что разряды электричества проходят через мозг.

**Глаза.** *Наполовину открыты*; ввалившиеся; повернуты вверх. Косоглазие. *Тупо смотрит перед собой или усталый взгляд.* Ночная слепота. Светобоязнь без воспаления глаз.

**Нос.** Обоняние снижено. Ноздри с черным налетом, как сажа; расширены. Нос заострен, пациент трет его.

**Лицо.** *Бледное*; отечное; горячее и красное; или холодное. Невралгия: пациент не может жевать. Постоянно двигает нижней челюстью, как при жевании; рот открыт. Холодный пот на лице.

**Рот.** Скрежещет зубами. *Ужасный запах изо рта.* Язык немеет, сухой, дрожит; или покрыт желтыми язвами. Слюнотечение с воспалением и болезненностью углов рта. Афтозный стоматит при поносе, сопровождающемся выделением непереваренной пищи. Горький привкус в горле; усиливается от еды.

**Желудок.** Отвращение к овощам, мясу, квашеной капусте. С жадностью глотает холодную воду, кусает ложку, но в бессознательном состоянии (гидроцефалия). Дети сосут грудь с жадностью. Рвота зеленовато-черной массой; в том числе при колике. Отвращение к еде — анорексия — при поражении головного мозга. Жажда отсутствует при большинстве заболеваний, либо жажда сопровождается отвращением к напиткам. Сильное жжение, распространяющееся в пищевод, во время беременности.

**Живот.** Булькает, как будто кишечник заполнен водой. Вздутие живота. Стул жидкий, водянистый, или *в виде белой желеобразной слизи*; непроизвольный. Асцит.

**Мочевыделительная система.** *Моча:* отсутствует (подавлена), скудная, с темными хлопьями или осадком; задержка мочи; мочевой пузырь перерастянут; в том числе — во время беременности. Нефрит. Уремия. Отеки. Частые позывы на мочеиспускание со скудным выделением мочи.

**Мужские половые органы.** Водянка яичка из-за подавления высываний, с любой стороны.

**Женские половые органы.** Подавление менструаций из-за простуды или разочарования в любви. Маточные отеки, сопровождающиеся пронзающей болью в конечностях. Экламптические судороги; прекращаются от внезапного шума. Боли во всем теле способствовали наступлению менструации.

**Дыхательные органы.** Дыхание с шумным выдохом, как вздохи. Сжатие грудной клетки. Ловит воздух открытым ртом; сидит в постели, поддерживаемый подушками (при гидротораксе). Кашель, сухой усиливается ночью; от курения или появляется внезапно во время курения.

**Сердце.** Медленный, *малый, мягкий пульс.*

**Шея и спина.** Скованность (ригидность); при менингите.

**Конечности.** Автоматические (непроизвольные) движения одной руки и одной ноги — все время, пока не спит. Большие пальцы на руках приведены к ладоням, зажаты в кулак. Голени подтягиваются вверх при каждой попытке изменить положение тела. Конечности вытянуты. Отеки голеней.

**Сон.** Сопор; пациент не может окончательно прийти в себя. Сопорозный — глубокий, тяжелый — сон, пациент *вскрикивает и вздрагивает.* Мышцы подергиваются во сне.

**Кожа.** Бледная кожа. Анасарка. Выпадение волос и ногтей. Ангионевротический отек.

**Лихорадка.** Озноб распространяется по телу, начинаясь на руках. Гусиная кожа. Озноб: при лихорадке; сопровождается потоотделением; нежеланием раскрыться, сбросить одеяло. Холодные кожные покровы, холодный пот.

**Дополнительно.** Zinc.

**Диф. диагноз.** Bry., Op., Zinc.

## HELODERMA

**Общее.** Яд этой ящерицы из семейства ядозубов, которая известна как «Хила монстр» [Gila Monster — «чудовище реки Хила» — Н.Л.], вызывает паралич, сопровождающийся онемением и напоминающий дрожательный паралич и локомоторную (мозжечковую) атаксию.

Наиболее выдающийся симптом этого яда — **ВЫРАЖЕННОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЛЕДЯНОГО ХОЛОДА**; ощущение, как будто заморожен; оно распространяется изнутри наружу. Дыхание, язык холодные; ощущение холода в легких и грудной клетке; холод поперек лопаток; жжение в позвоночнике. Кольцо ползучего холода вокруг тела. Кроме того, пациент пошатывается при ходьбе. Ступает, высоко поднимая ноги, опускается на пятку с силой, тяжело; ощущение, как будто идет по губчатой, пористой поверхности или как будто стопы опухли. Пациента заносит вправо при ходьбе.

**Хуже.** После сна; ночью.

**Лучше.** Потянуться. От тепла.

## HELONIAS

**Общее.** Это средство **ДЛЯ ЖЕНЩИН**, которые **КРАЙНЕ ИСТОЩЕНЫ** частыми беременностями, абортами; обессилены праздной жизнью и роскошью или чрезмерной домашней работой; они всегда жалуются на усталость и боль в спине, и чувство утомления. В мышцах — *тяжесть, болезненность, ломота, жжение*. Постоянная тупая боль и чувствительность в области почек. Диабет сахарный и несахарный. Анемия. *Рефлексы с матки*. Водянка (отеки) после маточного кровотечения.

**Хуже.** *От утомления. От наклона. Вследствие беременности. От давления одежды. От движения.*

**Лучше.** *Если занята делом. Когда отвлекается. Придерживать живот.*

**Психика.** Крайне мрачная женщина. Страдает меланхолией. *Раздражительная*; не выносит малейшего возражения. Придирается ко всем. Хочет, чтобы ее оставили в покое. Разговор, беседа неприятны. Всегда лучше, если чем-то занята; когда мысли чем-нибудь заняты.

**Голова.** Жар или направленное вверх давление в темени, как будто череп переполнен.

**Рот.** Слюнотечение у беременных женщин и у детей при прорезывании зубов. Афты; во время беременности. Горький привкус рано утром.

**Мочевыделительная система.** *Тупая боль и жар в области почек; вместо менструации. Моча обильная, прозрачная; содержит белок; сахар; фосфаты. Нефрит; у беременных; в сочетании с упорной рвотой. Часто возникает непроизвольное выделение мочи после того, как мочевого пузыря, казалось бы, опорожнился.*

**Женские половые органы.** Менструации слишком частые, слишком обильные. Кровотечение из-за атонии матки; в виде темной зловонной крови. *Матка тяжелая, болезненная, чувствительная; эрозия шейки или выпадение, либо другой вид ее смещения. Сильное тянущее на низ ощущение в тазу. Подавление менструаций, конгестия почек. Женщина ощущает свою матку. Зловонные, в виде комочков или сгустков, бели. Тянущее ощущение в области крестца, при выпадении матки. Зуд наружных половых органов (вульвы). Афты, воспаление в области наружных половых органов. Набухание молочных желез. Соски болезненные и чувствительные; хуже от давления одежды.*

**Дыхательные органы.** Грудная клетка, как будто сжата.

**Спина.** Боль и тяжесть в спине. Тупые боли между лопатками. Спина усталая и слабая. Слабость, тяжесть и тянущее книзу ощущение в крестце, в ягодицах.

**Конечности.** Болезненность, боль в наружной части бедер. Ощущение, как будто прохладный воздух струится вдоль икр вверх. Чувство онемения в стопах, когда пациентка сидит.

**Лихорадка.** Женщина чувствует жар, когда устает.

**Диф. диагноз.** Senec, Sep., Tril-p.

## HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

**Общее.** Это нечистый, с точки зрения химии, сульфат кальция. Он поражает **ПЕРВЫЕ**, делая пациента **СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ** ко всем впечатлениям; к холоду; к боли; прикосновению, шуму, запахам, сквозняку; самая незначительная боль вызывает обморок.

Это блондин, вялый, у него слабые мышцы;. Поражается **СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ**, в результате возникает выраженная **СКЛОННОСТЬ К НАГНОЕНИЮ**. Гепар сульфур имеет особое сродство со **СЛИЗИСТЫМИ ОБОЛОЧКАМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ**, где он вызывает обильную секрецию.

Все выделения обильные; зловонные; как старый сыр; кислые, также как и стул, запах, исходящий от тела, пот и т.д. Пациент **ПОТЕЕТ ЛЕГКО** и обильно; но не осмеливается раскрыться, раздеться; потоотделение не облегчает его самочувствия. Железы (лимфатические узлы) воспалены; опухшие и нагнаиваются.

Пациент **ЗЯБКИЙ**; даже в жаркую погоду ходит в пальто. Ощущение, как будто ветер дует на больное место, часть тела. Простывает в холодную сырую погоду. Боли — в виде болезненности (болит, как рана, воспаленное место), **КОЛЮЩИЕ**; как от острых заноз. Обычно поражается кожа естественных складок тела; **ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НАГНАИВАЕТСЯ**. Угрожающий абсцесс; скапливается много густого гноя.

Это средство вызывает нагноение вокруг инородного тела и способствует его удалению. Желтый цвет; мокроты, склер, пота и т.д. Мастоидит. Бок, на котором пациент лежит ночью, постепенно становится очень

болезненным; пациент должен перевернуться. Пеллагра. Твердые, с ощущением жжения узлы. Пациент ранимый психически и физически.

Последствия травмы, подавления высыпаний, применения ртути. Слабость с дрожанием после курения табака. Боли в костях, *кариес (остеомиелит)*. Спазмы после травмы, повреждения.

**Хуже.** ОТ ХОЛОДНОГО сухого ВОЗДУХА. ЗИМОЙ. ОТ ХОЛОДНОГО ВЕТРА -ОТ СКВОЗНЯКОВ. ЕСЛИ ЧАСТЬ ТЕЛА ЗАМЕРЗНЕТ. ОТ МАЛЕЙШЕГО РАСКРЫВАНИЯ. ОТ МАЛЕЙШЕГО ПРИКОСНОВЕНИЯ. От незначительного шума и напряжения. Когда лежит на больной части тела. От ртути. Ночью.

**Лучше.** ОТ ЖАРА, ТЕПЛА. ОТ ТЕПЛОГО УКУТЫВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГОЛОВЫ. ОТ ВЛАЖНОГО ТЕПЛА, ЖАРА. ПРИ ВЛАЖНОЙ ПОГОДЕ.

**Психика.** Угнетенный и печальный. Внезапно слабеет память. *Ранимый, чувствительный* — психически и физически. Вздорный, с ним трудно ладить, ничто ему не нравится, не доставляет удовольствия; не нравятся люди, места: он сердится, возражает и впадает в неистовство. *Раздражительный* или *НЕДОВОЛЬНЫЙ* — собой и другими. Свирепый — хочет убить обидчика, хочет устроить пожар. Ужасные импульсы.

*Торопливо* говорит, торопливо пьет. Слова выкатываются, натываясь друг на друга. Несговорчивый, своенравный, сердитый ребенок. Ребенок не смеется, занят сам собой. Сидит тихо в углу и молчит.

**Голова.** Головокружение усиливается при езде в экипаже или когда пациент трясет головой. Роющая боль в правом виске и в корне носа; усиливается от движения; при наклоне. Волосы выпадают; на отдельных участках, после головной боли. Кожа волосистой части головы болезненная и чувствительная. Болезненный узел («шишка») на голове. Холодный пот на голове. Постоянная давящая боль в половине головного мозга, как от пробки.

**Глаза.** Пятна или язвы на роговице. Гипопион — скопление гноя в передней камере глаза. Пациент видит предметы в красном цвете, они кажутся слишком большими. Мелкие папулы (прыщики) окружают воспаленный глаз. Светобоязнь. Поле зрения сужено наполовину. Нечувствительность сетчатки из-за наблюдения затмения солнца.

**Уши.** Стреляющая боль в ушах. Повышенное образование ушной серы. Перфорация барабанной перепонки. Вонючие выделения из уха. Мастоидит. Шелушение кожи (перхоть) на ушах и за ушами.

**Нос.** Нос закладывает или начинается чихание и появляются жидкие выделения каждый раз, когда пациент попадает на холодный сухой ветер. Носовое кровотечение; в том числе после пения. Болезненность в корне носа. Нос заложен и болит. Запах из носа, как будто старый сыр. Сенная лихорадка (поллиноз). Простуда в период разгара и старый катар. Каждый раз чихает от холодного ветра.

**Лицо.** Желтое, с синими кругами вокруг глаз. Трещина посередине нижней губы. Боль в костях при прикосновении. Стреляющая боль в нижней челюсти возникает, когда пациент открывает рот. Язвы в углу рта. Верхняя челюсть выступает, выдается вперед. Герпетические высыпания по ходу первой ветви тройничного нерва. Прыщики (папулы) на лбу, исчезающие на открытом воздухе. Плотная опухшая щека; твердый нарост на ней.

**Рот.** Зубы шатаются. Полые, кариозные зубы кажутся слишком длинными. Кровоточивость десен. Язвы на мягком нёбе, разъедающие нёбный язычок. Зловонное дыхание. Афты с нагноением, образованием пустул на внутренней поверхности губ и щек.

**Горло.** Опухание миндалин и желез на шее. Острый паратонзиллит (па-ратонзиллярный абсцесс). Колющая боль, как от застрявшей в горле рыбьей кости или щепки; распространяется в уши, когда пациент зеваает. Ощущение пробки в горле. Откашливает из горла слизь. Зоб (справа), боль из него отдает в голову. Колотье распространяется из горла в ухо при глотании. Хронический тонзиллит, сопровождающийся тугоухостью.

**Желудок.** Страстное желание кислого, *приправленной пищи* и стимулирующих веществ; уксуса. Желудок слабый; жжение и тяжесть в желудке, если чуть-чуть поест; легко возникает расстройство. Еда освежает, но вызывает тяжесть в желудке. Пьет торопливо, в спешке. Отвращение к жирной пище. Временами появляется желание что-нибудь съесть, но когда получает желаемое, аппетит пропадает. Желудок болит при ходьбе, как будто он свободно болтается.

**Живот.** Колотье в области печени усиливается при ходьбе, кашле, дыхании, от прикосновения. Стул мягкий, но удаляется с трудом. Живот вздутый, напряженный. Из ануса выделяется зловонная слизь. Кровотечение из прямой кишки при мягком стуле. Понос после питья холодной воды. Гепатит. Абсцесс печени. Стул кислый, белый. Геморрой.

**Мочевыделительная система.** Моча вытекает медленно; с трудом; падает отвесно. Должен подождать, пока моча потечет. После мочеиспускания выделяется кровь или гной. Нефрит после экзантемы. Кажется, что в мочевом пузыре всегда остается немного мочи; в том числе - после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Язвы, похожие на шанкр, на крайней плоти. Простаторея после мочеиспускания, во время стула. Зловонные кондиломы. Упорная гонорея. Кожа в складках между мошонкой и бедрами мокнет и воспаляется. Нагноение паховых лимфатических узлов.

**Женские половые органы.** Выделение крови из матки во время или после стула. Крайне зловонные, горячие, с пленками, гнойные бели; пахнут, как старый сыр. Абсцесс половых губ, сопровождающийся выраженной чувствительностью. Зуд сосков и промежности усиливается во время менструации. Рак с изъязвлением. Коитус очень болезненный из-за увеличения и антеверсии матки в сочетании с конгестией яичников.

**Дыхательные органы.** Гортань чувствительна к холодному воздуху; болезненная. Пациент теряет голос и кашляет после пребывания на холодном сухом ветру. Кашляет, если хотя бы немного раскроется в постели. Охриплость: хроническая, в том числе у певцов.

Свистящее дыхание, задыхается — вынужден запрокинуть голову. Кашель *удушливый, лающий*; усиливается от холодного питья или в первой половине суток (до полудня); отрывистый кашель; кашель как от попавшего в дыхательные пути перышка. *СЛАБОСТЬ И ОБИЛИЕ ВЛАЖНЫХ ХРИПОВ в грудной клетке; ЖИДКАЯ мокрота; но пациент не может ее откашлять*; на холодном воздухе возникает ощущение стягивания, сжатия груди. *Большое количество густой желтой мокроты.* Бронхит рецидивирует при каждой простуде. Ощущение, как будто в грудной клетке — капли горячей воды. Астма; в том числе после подавления симптомов. Пациент плачет перед кашлем. Афония. Кашель сильнее с вечера до полуночи.

**Сердце.** Сердцебиение с резкой колющей болью (колотьем).

**Спина.** Ощущение ползания мурашек в области правой лопатки.

**Конечности.** Новообразование, окруженное капсулой, в области вершушки локтя. Панариций. Боль в ногте большого пальца стопы при малейшем надавливании. Легко возникает вывих в суставах пальцев рук. Боль, заставляющая хромать, в тазобедренном суставе; хуже при ходьбе. Опухание колена, лодыжки и стопы. Тянувшие боли в конечностях. Абсцесс в подмышечной области. Опухание стоп в области голеностопных суставов, в сочетании с затруднением дыхания.

**Кожа.** Кожа чувствительна к прохладному воздуху. Зловонные мокнущие высыпания в складках кожи. Вялотекущие пульсирующие язвы, окруженные более мелкими язвами или папулами, или нарывами (фурункулами). Кожа потрескавшаяся, глубокие трещины на кистях и стопах. Очень чувствительные к прикосновению герпетические пузырьки. Хроническая и рецидивирующая крапивница. Ангioneвротический отек. От тела исходит скверный запах. Импетиго. Скудные грануляции.

**Сон.** Бессонница; видит тревожные сны — пожар, огонь. Неосвежающий сон. Просыпается ночью при возникновении эрекции и позыва на мочеиспускание.

**Лихорадка.** Тяжелая, септическая лихорадка; гектическая лихорадка. Обильное потоотделение: при незначительной нагрузке; днем и ночью. Пот кислый, липкий, зловонный. Ночные поты.

**Дополнительно.** Iod., Sil.

**Диф. диагноз.** Merc.

## HYDRASTIS

**Общее.** Гидрастис действует на *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ*, вызывая *КАТАРАЛЬНОЕ* воспаление, сопровождающееся склонностью к *кровотечениям* и изъязвлению. Катар может возникнуть где угодно — в горле, желудке, матке, мочеиспускательном канале. Он характеризуется *густыми, желтыми, едкими, тягучими* выделениями; слизь обнаруживается в стуле, в моче; пациент откашливает слизь — поэтому Гидрастис можно назвать «слизистым» средством. Гидрастис показан при атонии, истощении (кахексии), дегенеративных изменениях, поэтому он полезен старым, *быстро устающим, слабым* людям, страдающим от утомления и исхудания, истощения.

Рак и предраковые состояния. Зоб в пубертатном возрасте и при беременности. Гидрастис смягчает течение оспы, если применять внутрь и наружно. Частые приступы обморочной слабости, сопровождающиеся обильным потоотделением. Поверхностные язвы. Мелкие ранки кровоточат и нагнаиваются. Одежда мешает в паховой области.

**Хуже.** *Когда вдыхает воздух. От холодного воздуха.* От сухого ветра. На открытом воздухе. От незначительного кровотечения. От умывания. От прикосновения. *В старческом возрасте, у стариков.* От движения.

**Лучше.** От давления.

**Психика.** Депрессия: уверен в неминуемой смерти и желает ее. Забывчивый.

**Голова.** Невралгия волосистой части головы и шеи. Экзема лба вдоль линии роста волос; хуже после умывания.

**Глаза.** Воспаление глаз, густые слизистые выделения. Желтые склеры.

**Уши.** Выделения из уха: густые, слизистые. Рев в ушах. Глухота: из-за катара евстахиевой трубы.

**Нос.** Болезненный, кровоточит; кровяные корки в носу. Озена. Секрет стекает из задних отделов носа (ринофарингит). Воздух в носу кажется холодным. Сморкается все время. Синусит после насморка (ринита).

**Лицо.** Худое, желтое, осунувшееся. Рак губы.

**Рот.** Язык: белый, *желтый, грязный*, опухший, большой, *дряблый*, покрыт слизью, с отпечатками зубов; как будто ошпарен. Стоматит: у кормящих матерей или у слабеньких детей. Привкус во рту горький. Афты. Кровоточащая, болезненная раковая опухоль на твердом нёбе.

**Горло.** Фолликулярный фарингит. Пациент отхаркивает из горла желтую вязкую слизь.

**Желудок.** Слабое пищеварение. Ощущение пустоты в желудке, сопровождающееся отвращением к пище или ощущением острой глыбы в желудке. Язвы и рак. Болезненные пульсирующие опухоли в эпигастрии. Склонность вырвать всю пищу, исключая только молоко, или воду, или их смесь. Не может есть хлеб и овощи.

**Живот.** Режущая боль из печени распространяется в правую лопатку, усиливается, когда пациент лежит на спине или на правом боку. Атрофия; рак печени. Желтуха. Стул в виде комьев, покрыт слизью или смешан с ней. Геморрой: даже легкое кровотечение приводит к упадку сил. *Тяжелый запор*; при беременности; после слабительных средств. Саднящие и жгучая боль в прямой кишке во время стула, сохраняющаяся долго после него. Боль в паховых областях, как будто от растяжения связок.

**Мочевыделительная система.** Слизь в моче. Гнойные выделения при гонорее, густые, желтые. Гнилостный запах у мочи.

**Женские половые органы.** Эрозия шейки матки. Густые; едкие, желтые; тягучие бели. Зуд наружных половых органов при обильных белях; сопровождается сексуальным возбуждением. Меноррагия и метроррагия; в том числе при фиброме матки. Во время полового акта влагалище болезненное; после него возникает кровотечение. Горячие, водянистые выделения из матки.

Гидрастис устраняет склонность к привычному приращению плаценты. Боль в молочной железе (правой) при чихании. Рак молочной железы; соски втянуты; Болезненные, с трещинами соски у кормящих женщин.

**Дыхательные органы.** Бронхит у старых истощенных людей. Влажный кашель; кровавистая или густая, желтая, вязкая мокрота; пациент *откашливает много слизи*. Дыхание затруднено; хуже лежа на левом боку.

**Сердце.** Сердцебиение из-за медленно нарастающей слабости.

**Шея и спина.** Невралгия шеи. Тупая, сильная тянущая книзу боль поперек поясницы; пациент помогает себе руками, когда встает со стула.

**Кожа.** Высыпания, напоминающие оспенные. Раковые язвы. Вялые язвы после удаления опухолей.

**Лихорадка.** Жар чередуется с ознобом. Склонность к обильному потоотделению.

**Диф. диагноз.** Ars., Kali-bi., Puls.

## HYDROCOTYLE

**Общее.** Это растение известно под названием индийский водолюб, щитолистник, водяной пупок (Karivna). Оно способно вызывать гипертрофию и уплотнение соединительной ткани. Чрезмерное утолщение и выраженное шелушение, расслоение кожи.

Считается, Гидрокотиле полезен при лепре, слоновости, волчанке. Высыпания цвета меди в разных местах. Невыносимый зуд, особенно на подошвах, во влагалище. Пациент не может стоять прямо.

## HYDROCYANIC ACID

**Общее.** Синильная кислота — быстро действующий смертоносный яд, вызывающий конвульсии, паралич, коллапс, спазмы и судороги повсюду.

**Действие внезапное:** спазмы, падение давления, кровоизлияние в мозг (апоплексия). Недостаточная реакция организма. Судорожные сокращения мышц, с головы до пят, как удары молнии. Опорожнение кишечника внезапно прекращается, человек падает без сознания. Продолжительные обмороки. Цианоз. Эпилептическому припадку предшествует тошнота и рвота или кислая отрыжка. Катаlepsия. Тело очень холодное.

**Хуже.** В полнолуние. От подавления симптомов. В бурю.

**Психика.** Бессознательное состояние. Страх воображаемых неприятностей; смерти, что дом обрушится, лошадей, машин и т.д.; страшно перейти дорогу, даже если автомобиль на значительном расстоянии. Громкие произвольные крики; в том числе перед судорогами.

**Голова.** *Выраженная конгестия головного мозга*; кажется, что мозг горит. Как будто облако накрыло мозг пациента.

**Глаза.** Перекошены и наполовину открыты. Глазные яблоки неподвижны.

**Лицо.** Бледное или синеватое; выглядит старым. Спазмы жевательных мышц, челюсти спастически сжаты и ригидны. Губы бледные или синеватые. Пена изо рта. Пугающие, страшные спазмы мышц.

**Рот.** Сухой. Привкус во рту гнойный, металлический, терпкий, вяжущий. Язык холодный.

**Горло.** Пациент *глотает с шумом*: жидкость булькает, стекая по пищеводу в желудок. Спазмы или паралич пищевода.

Желудок. Выраженная слабость под ложечкой — как будто желудок провалился вниз. Отсутствие аппетита. Холера. Жжение из пупка распространяется в пищевод; хроническая диспепсия.



**Дыхательные органы.** Дыхание медленное, нерегулярное, пациент ловит ртом воздух. Удушье. Сухой щекочущий кашель ночью. Астма; с ощущением, что горло сдавлено. Судороги при коклюше.

**Сердце.** Сжимает, как когтями, в сердце, как будто от муки, страдания. Сердечная недостаточность; ощущение сжатия в сердце. Пульс: дефицитный, слабый, аритмичный, неравномерный, с отдельными сильными ударами. Кровеносные сосуды расширены; извиты. Стенокардия с сильной болью.

**Спина.** Мышцы в области спины сокращены. Кисти холодные, как лед.

**Кожа.** Синеватые высыпания.

**Сон.** Зевота с дрожью, содроганием тела. Сонливость. Coma vigil (бессознательное состояние с бредом, с открытыми глазами).

**Лихорадка.** Тело холодное, как лед; особенно кисти.

**Диф. диагноз.** Agar., Cupr., Laur.

## HYOSCYAMUS

**Общее.** Растение широко известно как белена черная. Оно основательно расстраивает *ПСИХИЧЕСКУЮ* деятельность; глубоко воздействует на *головной мозг, нервную систему*. Кажется, что дьявольская сила овладевает мозгом и препятствует его деятельности. Гиосциамус вызывает яркую картину маниакального состояния, характеризующегося вздорностью, драчливостью или повышенной сексуальностью.

*Конвульсии; дрожание; спастическое сокращение мышц*, подергивание, спазмы — очень характерны для токсического действия Гиосциамуса. *Деятельная мания* или конвульсии, чередующиеся или заканчивающиеся *глубоким сопором* (тяжелым сном).

*Хватающие, сжимающие* или угловатые движения рук; размашистые движения рук, пациент не может взять то, к чему тянется. Ходит пошатываясь, нетвердая походка. Паралич после спазмов. Эпилепсия; головокружение перед приступом. Пациент внезапно с криком падает на землю.

**КАРФОЛОГИЯ:** непроизвольно теребит, перебирает постельное белье; пальцы рук («обирается»). Лежит на спине, затем внезапно садится в постели, потом снова ложится. Ребенок всхлипывает и плачет во сне, не просыпаясь. Эклампсия. *Подергивание сухожилий* при лихорадке. Септические лихорадки. Сползает в постели вниз.

Болезненные последствия подавления лохий или лактации. Последствия испуга, разочарования в любви. Хорея: локальная, подергивание отдельных мышц; косоглазие, заикание. Гиосциамус подходит нервным, раздражительным, возбудимым людям. Ощущение, что идет по воздуху, сквозь воздух.

**Хуже.** ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ, ЭМОЦИЙ; от ревности; испуга; несчастной любви. Перед менструацией и во время нее. ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ. От холода. Когда спит. Лежа.

Лучше. Когда поднимается, садится в постели. От движения. От тепла. При наклоне.

**Психика.** Разные, вызывающие недоумение, озадачивающие психические отклонения. **МАНИЯ.** Эротическая мания: обнажает половые органы (женщина), поет любовные песни. Совершает *дурацкие* поступки, ведет, себя как сумасшедший. Смеется, поет, *разговаривает*, бормочет, ссорится, дерется. *Щупает, трогает половые органы.* Ревнивый. Подозрительный. Страхи: боится остаться один; преследования; воды; что его отравят; что его покусает и т.д. Смеется надо всем, глупо смеется. Двигательное беспокойство, пациент вскакивает с постели, *хочет убежать*. С каждым словом говорит все громче. Ярость сопровождается желанием ударить, укусить, подраться, оскорбить, поругаться, убить.

Жалобно плачет, в особенности, от малейшего прикосновения, даже в состоянии ступора. Бессознательное состояние, *почти невозможно привести пациента в чувство*. Бред, делирий с *бормотанием*. Пациент считает, что он находится не дома. От испуга перестает говорить. Спутанность сознания. Сначала не может думать, потом едва удастся его привести в чувство. Разговаривает с воображаемыми людьми, с умершими. Воображает, что предметы — это животные. Боится, что его покусает звери. Играет с пальцами на руках. *Глупый*; совершает забавные, смешные поступки. Смотрит на свои кисти, потому что они кажутся слишком большими. Боится заболеть сифилисом.

**Голова.** Пульсация в голове в виде волн. Пульсирующая головная боль. Головокружение перед спазмами, из-за запаха цветов, от газа и т.д. Пациент вертит или трясет головой из стороны в сторону; когда сгибается вперед; в состоянии ступора; после сотрясения мозга. Ощущение, что мозг болтается внутри головы. Как будто вода плещется в голове.

**Глаза.** Отвращение к свету. Глаза открыты, но пациент ни на что не обращает внимание. Спастическое смыкание век. Глаза вращаются в орбитах. Косоглазие. Постоянно пристально смотрит на окружающие предметы. Предметы видит в красном цвете; они кажутся большими или с цветными контурами (желтыми).

**Уши.** Глухота из-за паралича слухового нерва.

**Нос.** Ноздри как будто покрыты сажей, закопченные. Внезапные подергивания в корне носа. Потеря обоняния и вкуса.

**Лицо.** Бледное, румяное, темно-красное. Подергивание мышц. Гримасничает; нелепая мимика. Нижняя челюсть отвисает. Мышцы лица подергиваются, когда пациент высовывает язык. Тризм — сжатие челюстей.

**Рот.** Грязно-серый налет на зубах, зубы плотно сжаты. Пена изо рта. Язык высовывает с трудом, едва может втянуть его обратно. Речь нарушена; человек не говорит после испуга. Язык: неподвижный (как будто одеревенел), темный, красный, в трещинах, похож на обгоревшую кожу. Пациент прикусывает язык во время разговора. Язык сухой; хрипы во рту.

Ребенок скрежещет зубами во время судорог. При жевании кажется, что зубы шатаются; а также что они слишком длинные. Жестокая зубная боль, сопровождающаяся подергиванием мышц кистей, лица и т. д.

**Горло.** Удлинение нёбного язычка. Сжатие горла: пациент не может глотать жидкости; твердую и теплую пищу проглотить легче. Жидкости вытекают через нос наружу или стекают в гортань.

**Желудок.** Икота: из-за сотрясения головного мозга; у грудных детей. Рвота при конвульсиях. Спазмы в желудке уменьшаются после рвоты; усиливаются после раздражающей пищи. Отвращение к воде.

**Живот.** Колика, как будто живот лопнет. Колика сопровождается рвотой, отрыжками, икотой и криками. Красные пятна на животе. Пупок не заросший, из него сочится моча.

*Стул непроизвольный*, кровавый, желтый, водянистый или несмотря на то, что твердый возникает непроизвольно; хуже от психического возбуждения, во время сна; при лихорадке; при мочеиспускании. Гастрит или перитонит, сопровождающиеся икотой. Понос после родов.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание: учащенное, скудное, болезненное, по ночам; или *задержка мочи*: после родов; при параличе мочевого пузыря. Непроизвольное мочеиспускание.

**Мужские половые органы.** Похотливый пациент; демонстрирует свои половые органы, играет ими, при лихорадке.

**Женские половые органы.** Похоть, сладострастие; обнажает половые органы. Нимфомания. Истерические или эпилептические судороги перед менструацией. Судорожное дрожание кистей и стоп во время менструации. Энурез во время менструации. Безболезненный понос во время родов (у рожениц). Простуды, которые локализуются в матке и вызывают схваткообразные боли. Судороги (конвульсии) во время беременности. Не хочет помочиться во время родов. Подавление лохий и секреты молока.

**Дыхательные органы.** Сухой, отрывистый, *спастический кашель*; возникающий из-за сухости на небольшом участке в гортани; *ночью*; хуже лежа, от еды, питья, разговора, пения; лучше подняться, сесть в постели. Кровохарканье: кровь ярко-красная, сопровождается спазмами. Спазмы в грудной клетке сопровождаются одышкой; заставляют пациента согнуться пополам. Изнуряющий кашель с потоотделением.

**Шея.** Скована, изогнута в сторону (из-за сокращения мышц).

**Конечности.** Дрожание кистей и стоп. Пальцы на ногах спастически сгибаются во время ходьбы или при подъеме по лестнице. Руки сжаты в кулаки; большие пальцы зажаты внутрь (при конвульсиях).

**Сон.** *Нервная бессонница.* Пациент засыпает, когда отвечает на вопрос. Внезапно просыпается; напуганный. Садится в постели, затем снова ложится спать. Глубокий сон. Смеется во время сна.

**Лихорадка.** Тяжелая, септическая лихорадка — горячая, бледная кожа.

Теплый пот.

**Диф. диагноз.** Bell., Phos., Stram.

## HYOSCYAMINE HYDROBROMATE

**Общее.** Это средство уменьшает дрожание при рассеянном склерозе и дрожательном параличе (паркинсонизме). Бессонница и нервное возбуждение.

## HYPERICUM

**Общее.** Это превосходное средство, показанное при повреждении органов, богатых чувствительными нервными окончаниями, например, пальцев на руках и ногах, ногтевого ложа.

*РВАНЫЕ РАНЫ*, сопровождающиеся *невыносимыми жестокими, стреляющими, пронзающими болями*, что свидетельствует о серьезном повреждении нервов. Повреждение головного и спинного мозга, или последствия такой травмы. Спазмы после любого повреждения.

*Сильная боль в пораженной части тела* — в затылке, копчике и т.д. Боли распространяются по направлению к туловищу или вдоль боков и сопровождаются ощущением ползания мурашек и онемением, потерей чувствительности. Воспаление нерва: в области головы или грудной клетки; в эпигастрии; в области грудного отдела спинного мозга — между лопатками; в области кончиков пальцев рук и т.д. Стреляющие боли направлены вверх от места повреждения. Покалывание, пощипывание, жжение, онемение при неврите. Невралгия кульги. Пациент дрожит, содрогается всем телом.

Гиперикум предотвращает столбняк и облегчает боли после хирургических операций. Ощущение, как будто суставы ушиблены, разбиты. Конвульсии после удара тела о какой-нибудь предмет. Спастическое, резкое сокращение мышц конечностей.

Колющие или проникающие раны, очень чувствительные к прикосновению. Последствия испуга, укусов, ударов. Раны более чувствительные, чем можно предположить, судя по внешнему виду. Пациент лежит на спине, голова дергается назад. Боль в области старых рубцов.

**Хуже.** ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ТРАВМЫ. ОТ СОТРЯСЕНИЯ. От сотрясения спинного мозга, ушиба копчика. В результате шока. От ушибов. От напряжения. От прикосновения. При перемене погоды. Во время туманов. От холода, влажности. От движения. После наложения акушерских щипцов в родах, как осложнение этой манипуляции.

**Лучше.** Лежа лицом вниз. Прогнуться назад. Растереть.

**Психика.** Делает ошибки при письме; пациентка забывает, что хотела сказать. У пациента возникает ощущение, что он поднят высоко над землей, или тревога, что он может упасть с высоты. Меланхолия.

**Голова.** Тяжесть или ощущение ползания мурашек в мозгу. Ощущение, что мозг болтается. Кажется, что к голове прикасаются холодной, как лед, рукой. Ощущение, что голова увеличенная и заостренная. Пульсация в темени. Выпадение волос, в том числе после травмы.

**Лицо.** Одутловатое, горячее. Экзема лица; кажется, что сыпь расположена под кожей. Сильный зуд. Зубная боль уменьшается, если лежать неподвижно на больной стороне.

**Горло.** Ощущение, как будто в горле ползает червяк. Жар поднимается по пищеводу после испуга или при чувстве тревоги. Язык белый у корня, его кончик чистый. Страстное желание вина, когда во рту ощущается жар.

**Желудок.** Жажда с ощущением жара во рту. Тошнота. Отрыжка возникает, когда пациент пьет воду. Желание соленых, маринованных огурцов (солений), теплого питья, вина.

**Живот.** Бульканье в области пупка. Тимпанит, вздутие живота (после лапаротомии) уменьшается после стула. Ощущение сухости в прямой кишке. Летний понос в сочетании с сыпью на коже. Геморрой сопровождается болью, кровоточивостью и чувствительностью к прикосновению (применяют внутрь и наружно).

**Женские половые органы.** Послеродовые схватки жестокие, ощущаются в крестце и боковых отделах таза, сопровождаются сильной головной болью; возникают после наложения акушерских щипцов в родах.

**Дыхательные органы.** Приступы короткого, лающего кашля. Астма усиливается в туманную погоду, улучшение наступает от отхаркивания большого количества мокроты.

**Сердце.** Ощущение, как будто сердце упадет вниз.

**Шея и спина.** Боль в задней части шеи. Давление в области крестца. Последствия сотрясения спинного мозга. Копчик болезненный, боль распространяется вдоль позвоночника и вниз, вдоль конечностей. Болезненно чувствительный позвоночник. Боль в боковых отделах таза (в области крыльев подвздошных костей); в пояснице и копчике после родов.

**Конечности.** Ощущение, что конечности отделены от тела. Давление вдоль локтевой поверхности руки. Ощущение ползающих мурашек в кистях и стопах. Тупая боль в седалищном нерве (слева) после продолжительного сидения. Кажется, что кисти и стопы покрыты мхом, мехом, или ощущаются тупые боли в костях. Жестокая боль и неспособность ходить или наклоняться после падения на копчик.

**Кожа.** Болезненные рубцы в тканях, богатых нервными окончаниями. Зияющие раны. Кожа шершавая, как будто вся покрыта мелкими узелками. Боль в старых рубцах.

**Сон.** Постоянная сонливость. Сны наполнены трудом, усилиями, напряжением.

**Лихорадка.** Содрогание всего тела сопровождается желанием помочиться.

**Диф. диагноз.** Arn., Led., Rhus-t.

## IBERIS

**Общее.** Иберийка обладает выраженным действием на сердце, поэтому применяется при его заболеваниях.

Гипертрофия сердца с утолщением его стенок. Слабость сердца после гриппа. Область печени кажется переполненной и болезненной. Сердцебиение сопровождается головокружением и ощущением сжатия горла, пациент задыхается; хуже от незначительного напряжения, от смеха, от кашля. Стреляющие боли, пронизывающие сердце. Онемение и покалывание в левой кисти и руке. Хуже. Лежа; лежа на левом боку. От движения, от напряжения. В теплом помещении.

## IGNATIA

**Общее.** Семена Игнации содержат больше стрихнина, чем семена чилибухи (*Nux-v.*), однако, существует много различий между характерными признаками этих двух препаратов.

Игнация влияет на ПСИХИКУ. Глубокому воздействию этого средства подвержена ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ сфера, а также согласованность внутренних процессов. Это приводит к возникновению НЕУСТОЙЧИВЫХ; противоречивых; парадоксальных психических и физических СОСТОЯНИИ, которые быстро изменяются, бывают противоположны друг другу.

Поражается НЕРВНАЯ СИСТЕМА, в связи с чем возникают СПАЗМЫ, часто жестокие; они сопровождаются ригидностью, подергиванием мышц, и тремором.

Игнация подходит людям нервным, в особенности женщинам чувствительным, легко возбудимым, мягким, восприимчивым и расторопным.

**ОЩУЩЕНИЕ КОМКА**, инородного тела или давления острым предметом. Подергивания, резкие мышечные сокращения во всем теле. Склонность вздрагивать. Ощущение комка, гвоздя. Истерия. Хорея; после испуга, от горя; усиливается после еды; уменьшается, когда пациент лежит на спине.

Конвульсии у детей: при прорезывании зубов; после наказания; после испуга или от страха; повторяются ежедневно в один и тот же час. Спазмы сопровождаются криком или непроизвольным смехом. Тонические спазмы в отдельных частях тела, сопровождающиеся появлением пены изо рта. Спазмы чередуются с ощущением стеснения в груди, затруднением дыхания.

Боль на ограниченном участке; хуже от пристального внимания. Повышенная чувствительность к боли. Боль меняет свою локализацию; появляется постепенно, прекращается внезапно, или появляется и исчезает внезапно. Симптомы проходят после обильного мочеиспускания.

Чума: для профилактики и лечения. *Нервная дрожь, содрогание* тела при боли. Паралич: после сильных эмоций, переживаний, из-за бессонных ночей в больничной палате. Это средство подходит людям, которые голодали из-за нужды или по какой-то другой причине.

Болезненные последствия горя, испуга, забот, разочарования в любви; ревности; старых травм позвоночника. Катаlepsия и опистотонус. (*Nat-m.* показан после Игнации в хронических случаях).

**Хуже.** ОТ ЭМОЦИЙ, ПЕРЕЖИВАНИЙ. ОТ ГОРЯ. От разочарования. ОТ ЗАБОТ. От испуга; шока, после потери очень дорогого человека или вещи. От воздуха; на открытом воздухе, от холодного воздуха. От запахов. От прикосновения. От кофе. От табака. От зевоты. От наклона, ходьбы; когда стоит. В один и тот же час, в один и тот же день.

**Лучше.** Переменить положение тела. Когда лежит на больном месте. От мочеиспускания. В одиночестве. От давления. От глубокого дыхания. Сделать глотательное движение. От еды. Вблизи теплой печи. От кислого.

**Психика.** ТРЕВОЖНЫЙ; СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ И НЕРВНЫЙ. Очень эмоциональный. Подвержен переменам настроения. Грустные размышления. ГОРЕ. Молчаливый и печальный. ВЗДЫХАЕТ, плачет или смеется, попеременно; женщина смеется, когда следует быть серьезной. Изменчивое настроение. Несчастливая любовь. Плачет в душе; получает удовольствие от грусти, печали. Пациент сердится на себя. Желание побыть в одиночестве. Все надоедает, наскучивает. Пациент не выносит возражений; или замечаний. Испытывает муку; кричит о помощи. Капризный. Деликатный и добросовестный. Страх: воров; возникает по пустякам; страх приближающихся к пациенту предметов. Пациент склонен к самоанализу.

Легко падает в обморок. Девушки, падающие в обморок каждый раз, когда идут в церковь; или которые влюбляются в женатых мужчин. У пациентки ощущение, что она долгое время голодала. Торопливость во время менструации; никто не может сделать что-нибудь так быстро, как ей хочется. Осматривает постель, как будто что-то ищет. Испытывает наслаждение, провоцируя приступ болезни (припадок), вызывая панику или устраивая сцену. Считает, что пренебрегла своими обязанностями. Вздыхает и всхлипывает. Необщительный пациент. Боится воров ночью.

**Голова.** Болит, как будто гвоздь вытаскивали из головы сбоку; боль заканчивается зевотой и рвотой; чередуется с болью в спине. Головная боль усиливается или уменьшается от наклона. Пациент запрокидывает голову: из-за тяжести в затылке; или во время спазмов. Головокружение сопровождается появлением искр перед глазами. Громкий разговор усиливает головную боль. Головная боль: из-за злоупотребления нюхательной солью, табаком, кофе; из-за напряжения, пристального внимания.

**Глаза.** Астенопия сопровождается спазмами век и невралгическими болями вокруг глаз. Вспышки света в глазах из-за сильного кашля. Веки кажутся сухими. Мерцание, зигзаги перед глазами.

**Уши.** Рев в ушах уменьшается от музыки. Одно ухо красное и горячее. Глухота, за исключением звуков человеческого голоса.

**Нос.** Чувствителен к вдыхаемому воздуху. Боль над корнем носа. Приступы чихания. Нос холодный, а колени горячие.

**Лицо.** Подергивание мышц лица и губ. Одна щека красная и горячая; краснеет и бледнеет поочередно. Жевательные мышцы напряженные, ригидные и твердые. Тризм эмоционального происхождения. В покое часто изменяется цвет лица. При попытке говорить лицо искажается.

**Рот.** Спастическое сжатие челюстей; пациент прикусывает внутреннюю поверхность щеки или язык, когда говорит или жует. Углы рта подергиваются. Кислый вкус во рту. Зубная боль усиливается после питья кофе и курения. Внезапные приступы слюнотечения.

**Горло.** Воспаленные, плотные, опухшие миндалины с мелкими язвами на поверхности. Фолликулярная ангина. Ощущение, как будто комков в горле, возникает, когда пациент не глотает; или ощущение, что комков нельзя проглотить; лучше, когда ест твердую пищу. Часто задыхается — из-за ощущения истерического комка в горле. Острая колющая боль распространяется в ухо; в промежутках между глотательными движениями. В подчелюстных железах возникает боль, когда пациент поворачивает шею. Спазмы в пищеводе. Зоб.

**Желудок.** Голод сопровождается тошнотой. Страстное желание сырых продуктов или несъедобных вещей; кислого; хлеба, особенно ржаного. Хочется разных вещей, но когда предлагают желаемое, аппетит пропадает. Отвращение к теплой пище, мясу, алкоголю, табаку. *Ощущение пустоты или чувство, что желудок опустился; или продолжительная спастическая боль в желудке*, не уменьшающаяся от еды, но ослабевающая, если глубоко дышать. *Икота:* сопровождается отрывкой воздухом или горечью; возникает после еды, питья, курения. Тошнота или рвота уменьшаются от несъедобных вещей.

**Живот.** Спастическая, сжимающая боль в животе с одной или с двух сторон. Стул болезненный, затрудненный, хотя мягкий. Сжимающая боль и чувствительность в прямой кишке, как при внутреннем геморрое; сохраняется в течение одного — двух часов после стула. Запор у неврастеников. *Стреляющая вверх боль в прямой кишке.*

Геморрой: лучше сидя, хуже от кашля. *Выпадение прямой кишки* возникает, даже если пациент не очень сильно тужится во время стула. Давление, как от острого инструмента, изнутри наружу. Безболезненное сжатие заднего прохода. Кровотечение и боль усиливаются, когда стул жидкий. Запор: из-за простуды; из-за езды в экипаже; если возникает позыв на стул во время эрекции.

**Мочевыделительная система.** Учащенное мочеиспускание, моча обильная, водянистая. Возникает позыв на мочеиспускание, но помочиться пациент не может.

**Мужские половые органы.** Эрекция во время стула. Потоотделение на мошонке. Половой член сжат, уменьшен в размере.

**Женские половые органы.** Менструации: нерегулярные; кровь черного цвета, они слишком ранние, слишком обильные или скудные; подавлены (задержка) из-за горя. Хронические бели, сопровождающиеся сексуальным возбуждением. Половая холодность (фригидность).

**Сердце.** Сердцебиение во время менструации. Чувство тревоги в области сердца.

**Дыхательные органы.** *ДЕЛАЕТ ГЛУБОКИЙ ВДОХ;* от него становится лучше. Пациент *задыхается;* в том числе из-за спазма голосовой щели. Сухой, отрывистый, спастический кашель в виде быстро следующих друг за другом толчков; перехватывает дыхание; кашель, как от вдыхания пыли или паров серы. Во время кашля усиливается желание откашляться. Кашель возникает всякий раз, когда во время прогулки пациент останавливается, не двигается. Ощущение сжатия грудной клетки, кажется, что она слишком маленькая. Говорит шёпотом, не может говорить громко. Сонливость после кашля. Когда пациент делает глубокий вдох, возникает колотье в сосках.

**Шея и спина.** Скованность в задней части шеи. Судорожно прогибается, отклоняя плечи назад.

**Конечности.** Спастическое сокращение мышц конечностей. Теплый пот на ладонях. Судороги в икроножных мышцах. Тяжелые стопы. Боль, как от вывиха, в суставах. Колени произвольно поднимаются вверх при ходьбе. Кисти дрожат, когда пишет в присутствии кого-либо. Жжение в пятках, когда они расположены близко друг к другу; когда пятки соприкасаются, оказывается, что они холодные; сильнее ночью. Ишиас обостряется зимой; улучшение наступает летом. Боль в мозолях, как будто они воспалены. Колени горячие, а нос холодный. Кажется, что после удара мягкие ткани болтаются на костях.

**Кожа.** Болезненная, лучше от давления. Крапивница, сопровождающаяся жестоким зудом, на всей поверхности тела (во время лихорадки).

**Сон.** *Сильная спастическая зевота*, сопровождающаяся слезотечением. Сон легкий, поверхностный; пациент просыпается от каждого звука. Резкое сокращение, подергивание конечностей при засыпании. Снохождение (сомнамбулизм) из-за уязвленного самолюбия, когда задета честь. Одни и те же страшные сновидения повторяются снова и снова. Ребенок просыпается с пронзительным криком и весь дрожит. Икота, жевательные движения рта во сне (у детей).

**Лихорадка.** При ознобе лицо красное. Потрясающий озноб с жаждой. Потоотделение усиливается от еды; часто оно возникает на маленьком участке лица. Жар: отказывается раскрыться, причем, жажда отсутствует. Озноб при болях. Ощущение, как будто должен вспотеть, но этого не происходит.

**Дополнительно.** Aur., Nat-m., Ph-ac, Sep.

**Диф. диагноз.** Cimic, Nux-v., Sep.

## INDIGO

**Общее.** Индиго — достаточно известное средство для лечения эпилепсии в тех случаях, когда приступам предшествует неистовое возбуждение, а после них возникает меланхолия, пациент становится робким и мягким; в некоторых случаях перед приступом отмечается особенное волнообразное ощущение в мозгу, сопровождающееся неясным зрением; возможно появление перед приступом ощущения, что мозг заморожен.

Боль в конечностях усиливается после каждого приема пищи. Ишиас: боль из середины бедра распространяется к колену.

**Хуже.** Сидя. В покое.

**Лучше.** От растирания. От давления. При ходьбе.

## IODOFORMUM

**Общее.** Это средство очень полезно применять при лечении туберкулеза, особенно туберкулезного менингита; а также при снижении зрения, возникающем при ретробульбарном неврите, центральной скотоме, частичной атрофии диска зрительного нерва. Сон прерывается вздохами и плачем. Зрачки расширены; суживаются неравномерно. Хронический понос, стул зеленоватый, водянистый, содержит неперевавленную пищу; при этом у пациента отмечается раздражительность, обусловленная предполагаемым у него туберкулезом. Мезентериальные лимфатические узлы увеличены. Пациент не может стоять или ходить с закрытыми глазами.

**Хуже.** Ночью. От тепла. От прикосновения. От движения.

## IODUM

**Общее.** Иод обладает сильным *рассасывающим действием, быстрым и интенсивным*. Мышцы, жировая ткань, железы и ткани в целом истощаются, в результате пациент худеет.

*ЖЕЛЕЗЫ ВООБЩЕ, ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА*, яички, *мезентериальные* лимфатические узлы и молочные железы сначала *ОПУХАЮТ, УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, СТАНОВЯТСЯ ПЛОТНЫМИ* и тяжелыми, затем начинают уменьшаться, атрофироваться. Быстро растущие новообразования и быстро развивающаяся гиперплазия являются показаниями для назначения средства Иодум.

Дрожание конечностей или всего тела. *Пациенты слабые и быстро худеют*; даже при наличии хорошего аппетита. Пациенту *ВСЕГДА СЛИШКОМ ЖАРКО*. Выраженная слабость, малейшее усилие вызывает потоотделение; пациент не может говорить, задыхается, поднимаясь по лестнице. Обострение хронического воспаления. Деформирующий полиартрит с опуханием суставов; в том числе после острой атаки ревматизма.

*Выделения горячие*, едкие или водянистые, непрекращающиеся или соленые на вкус. *ОСТРЫЙ КАТАР СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК*, особенно *ГОРТАНИ* и легких, пневмония с быстрым распространением воспаления. Спазм сосудов, сопровождающийся отеком, появлением кровоподтеков (экхимозов), кровотечениями. Перерождение сосудов. Атрофия или уплотнение яичек, яичников, матки. Истощающие болезни у золотушных пациентов. Аденоиды. Зоб. Болезни поджелудочной железы. Заболевания суставов. Туберкулез. Болезни соединительной ткани, характеризующиеся вялым течением и образованием небольшого количества гноя. Пульсация во всем теле или локальная — в крупных, магистральных артериях. Жжение. Инфильтрат. Ощущение внутреннего щекотания.

Последствия нервного потрясения, разочарования в любви. Фибринозный экссудат — с последующим образованием спаек. Лицевой паралич или эпилепсия после подавления зоба. Исхудание, сопровождающееся увеличением желез. Пациент чувствует себя хорошо только во время еды — при любом заболевании. Вялая реакция, поэтому многие болезни становятся хроническими. Иодум подходит быстро выросшим, высоким мальчикам со слабой грудью и старикам.

**Хуже.** *ОТ ЖАРА, ТЕПЛА; в жарком помещении*; от горячего воздуха; теплого укутывания. От напряжения; от подъема по лестнице, от разговора. От голода. Ночью. В покое. От прикосновения. От давления.

**Лучше.** *ОТ ХОЛОДА; ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА; от купания в холодной воде*. От ходьбы, прогулки на открытом воздухе. От еды. Подняться, сесть в постели.

**Психика.** Тревога: за настоящее (про будущее нет речи); в том числе в спокойной обстановке. Угнетен, склонен плакать или *невыносимо СЕРДИТЫЙ, СВОЕВОЛЬНЫЙ И БЕСПОКОЙНЫЙ*. Вздволнован. Внезапно возникает импульс побежать, совершить насилие, но от движения становится хуже, возникает истощение; лучше, если занят делом. Пациент считает, что он здоров. Страх: людей, врача; остерегается, избегает всех. Склонен совершить самоубийство. Беспокоен; забывает, что нужно сказать или сделать; не знает, что нужно сказать или сделать. Не понимает, почему он совершил конкретный поступок. Склонность совершать без всякой причины некие странные поступки, может убить кого-нибудь, покончить с собой. Когда думает о реальном или воображаемом зле, несправедливости, возникает сердцебиение.

**Голова.** Звуки отдаются в голове, сопровождаются эхом. Биение, прилив крови и ощущение тугой повязки на голове. Головокружение: хроническое, обусловленное конгестией. Головные боли у старых людей; усиливаются на теплом воздухе, от утомления, от быстрой ходьбы, от езды в автомобиле. Ощущение, как будто мозг взболтали ложкой.

**Глаза.** Выпирают вперед, нависают. Судорожные движения и дрожание глаз; дрожание нижних век. Сильное слезотечение. Острый дакриоцистит. Пациент пристально смотрит широко раскрытыми глазами; кажется, что веки сократились, стянуты.

**Уши.** Хроническая глухота при наличии спаек в среднем ухе. Катар евстахиевой трубы.

**Нос.** Боль в корне носа и в лобных пазухах. Насморк усиливается на открытом воздухе. Нос красный и опухший; сильное внезапное чихание, при этом из носа капает горячая жидкость. Острая конгестия сосудов носа, связанная с повышенным кровяным давлением. Крылья носа как будто широко раздуты. Простуда спускается из носа в нижележащие отделы дыхательных путей.

**Лицо.** Увядшее, *коричневатое*, желтоватое или темное; несчастный вид. Холодное лицо у толстых детей. Паралич лицевых мышц после уменьшения зоба.

**Рот.** Обильная, как мыльная пена, вонючая слюна. Металлический привкус во рту. Зловонные язвы; афты. Отвратительный запах изо рта. Язык характеризуется гипертрофией, он болезненный, узловатый или с трещинами.

**Горло.** Сжатие горла, препятствующее глотанию. В горле жжет и царапает. *Зоб: щитовидная железа твердая*, возникает ощущение сжатия в горле. Опухание небного язычка. Подчелюстные железы опухшие.

**Желудок.** *Волчий аппетит; несмотря на это пациент худеет; изменчивый аппетит*; сопровождающийся жаждой. Человек становится тревожным или беспокоится, если не поест. Когда пьет холодное молоко, уменьшается запор. Пульсация под ложечкой. Горький привкус у твердой пищи, но не у напитков. Икота. Пустые отрывки — воздухом.

**Живот.** Печень и селезенка увеличены и болезненные. Стул: пенистый, как молочная сыворотка, жирный, творожистый, либо содержит неперевавленную пищу. Болезни поджелудочной железы. Дрожание в животе. Хронический утренний понос у худых золотушных детей. Желтуха: глаза, кожа, ногти желтые. Опухание мезентериальных лимфатических узлов.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание учащенное и обильное; моча темная, желто-зеленая, похожа на молоко, с радужной пленкой на поверхности. Осадок напоминает красный перец. Недержание мочи у старых людей, страдающих увеличением предстательной железы.

**Мужские половые органы.** Яички увеличенные и твердые. Ощущение скручивания в семенном канатике. Атрофия яичек; сопровождается импотенцией. Саркома яичка (саркоцеле). Водянка яичка (гидроцеле). Молочно-белая жидкость течет из уретры после стула.

**Женские половые органы.** Выраженная слабость во время менструации. Менструальные выделения коричневого цвета; возобновляются после каждого стула. Молочные железы истощаются, атрофируются и становятся дряблыми. Боль с ощущением, как будто вбит клин, направленная из области яичника в направлении матки. Узловатые образования с черными верхушками в коже молочных желез.

**Бели:** *едкие*, разъедающие кожу бедер и белье; хуже во время менструации. Молочные железы тяжелые; как будто они могут отвалиться. Бесплодие из-за атрофии яичников и молочных желез.

**Дыхательные органы.** *Болезненная, вызывающая удушье охриплость*; ребенок хватается за горло, когда кашляет. Ларингит. Дифтерия. *Сухой, щекочущий, крупозный кашель. Одышка*, особенно при подъеме по лестнице. Отек голосовой щели. Отхаркиваются слепки гортани; или слизь с прожилками крови. Голос грубый. Щекотание по всей грудной клетке. В бронхах саднение. Сильная конгестия (полнокровие) легких. При пневмонии гепатизация (опеченение) распространяется быстро и сопровождается высокой температурой, а боль отсутствует. Выпот в полость плевры. При астме пациент тяжело дышит в покое. Зуд ощущается глубоко, в нижних отделах легких за грудиной.

**Сердце.** Кажется, что сердце сжато; сжато, как железным обручем, после этого возникает выраженная слабость и дурнота. Сердцебиение усиливается от незначительного напряжения. Ощущение вибрации или "кошачьего мурлыканья" над областью сердца. Тахикардия. Миокардит. Пульсация в крупных артериальных стволах.

**Шея и спина.** Когда пациент говорит, опухает шея; она становится толстой.

**Конечности.** Хронический артрит; скованность и увеличение суставов. Синовит, Холодные кисти и стопы. Едкий пот на тыльной поверхности стоп. Отек стоп. Тыльная сторона кистей коричневого цвета; как будто опухшая; при повороте кисти возникает боль, а когда пациент сгибает пальцы, боли нет. Болезненные мозоли.

**Кожа.** Горячая, сухая, грязная кожа; покрыта *коричневыми пятнами*. Узловатые образования в коже. Анасарка сердечного происхождения. Зуд кожи и зудящие прыщики (папулы) в области старых рубцов. Рубцы лопаются, раскрываются.

**Сон.** "Беспокойство в крови" — пациент не может спать.

**Лихорадка.** *Гиперпирексия* (очень высокая температура); либо поверхность тела холодная, когда пациент находится в тревожном состоянии или в ступоре. Гектическая лихорадка. Приливы жара ощущаются во всем теле; волны жара распространяются в голову. Пациент легко потеет. Потоотделение, возникающее рано утром, улучшает состояние.

**Дополнительно.** Lys, Sil.

**Диф. диагноз.** Ars., Fl-ac, Phos., Spong.

## ИПЕСАСУАНА

**Общее.** Ипекакуана действует преимущественно *на блуждающий нерв*, вызывая *желудочно-кишечные расстройства; ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ*, сопровождающиеся *ПОСТОЯННОЙ ТОШНОТОЙ*.

Выделения пенистые и обильные. *КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯРКО-КРАСНОЙ КРОВЬЮ, СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ*; в том числе сопровождаются тошнотой. Тошнота и *одышка* обычно сопровождают большинство заболеваний.

Конвульсии, в том числе у младенцев (детские судороги); тело ригидное, вытянуто, после судорог возникает подергивание рук — они резко сокращаются по направлению друг к другу. Пациент неуклюжий, натывается на предметы. Тетанические судороги из-за глотания табака. Конвульсии: при коклюше; из-за подавления высыпаний (экзантемы); из-за употребления несъедобных вещей.

Ипекакуана показана толстым детям и взрослым людям со слабым здоровьем, которые простывают в теплую влажную погоду.

Последствия неприятностей, разочарования, скрываемого недовольства. Травмы, повреждения, подавленные высыпания. Употребление хинина; морфина; несъедобных вещей; кровопотеря — в анамнезе. У пациента повышенная чувствительность к жару и к холоду. Опиостотонус (запрокидывается голова, туловище прогибается) и эмпростотонус (туловище сгибается вперед).

**Хуже.** *ОТ ТЕПЛА, от влажного тепла*, в теплом помещении. *От переедания.* От мороженого, свинины, телятины, смешанной или *обильной, калорийной пищи*; от конфет, фруктов; изюма, салатов, цедры лимона. От ягод. Периодически. От жары и холода. От холода. От движения. Лежа.

**Лучше.** На открытом воздухе. В покое. От давления. Закрывать глаза. От холодного питья.

**Психика.** Презирает всё и хочет, чтобы другие поступали так же. Ребенок плачет, кричит, ревет, и ему трудно угодить. Желаний много, но не знает, чего хочет. Грустный. Внезапно падает в обморок: летом или в жарком помещении.

**Голова.** Голова болит, как будто ушиблена или раздавлена, боль распространяется в корень языка. Мигрень с тошнотой и рвотой. Боль в затылке усиливается от рвоты; возникает во время озноба. Холодный пот на лбу.

**Глаза.** Воспаленные, красные; конъюнктивит. Сильное, сплошным потоком слезотечение; в том числе в сочетании с тошнотой. Стреляющие боли проходят сквозь глазное яблоко. Тошнота возникает из-за того, что пациент смотрит на движущиеся предметы.

**Уши.** Холодное (правое); во время лихорадки. Не выносит ни малейшего шума.

**Нос.** Кровотечение — кровь ярко-красная. Насморк с заложенностью носа и тошнотой. *Чихание.*

**Лицо.** Бледное; синее вокруг глаз или вокруг рта; носогубная складка (*linea nasalis*) белая. Периодическая глазничная невралгия, сопровождающаяся слезотечением, светобоязнью и жгучей болью в веках.

**Рот.** Ребенок засовывает свой кулачок в рот и кричит. *Чистый или красный заостренный язык.* Увеличение количества слюны. Зубная боль: дергает в направлении висков; лучше во время еды. Язык чистый, желтый или белый, бледный. Вкус во рту горький, сладковатый, ощущается привкус крови.

**Желудок.** Желание деликатесов; в том числе сладостей. Пациент *чувствует себя скверно или возникает ощущение, что желудок провалился или провисает. Ужасная тошнота, не уменьшающаяся от рвоты.* Рвота кровью, желчью, пищей, слизью; усиливается при наклоне. Отвращение к пище. *Жажда отсутствует.* Рвота у грудных младенцев при кормлении.

**Живот.** Сжимающая, тянущая или *режущая боль в области пупка*; усиливается от движения; уменьшается в покое; распространяется в направлении матки. Стул: коричневый, травянисто-зеленый или желто-зеленый, пенистый, как черная патока (мелена) или с кровью; слизистый. Дизентерия: голова горячая, голени холодные. Комки слизи в стуле.

**Мочевыделительная система.** Безрезультатные *позывы на мочеиспускание.* Гематурия с тошнотой, режущей болью в животе и уретре, со стеснением в груди и одышкой. Стреляющая боль распространяется из области почек вниз, вдоль бедер, к коленям.

**Женские половые органы.** Маточное кровотечение: обильное, кровь яркая, течет непрерывно или выбрасывается большими порциями; сопровождается тошнотой или затрудненным дыханием при каждом новом выбросе крови. Режущая боль в области матки распространяется слева направо. Острая колющая боль распространяется из пупка в область матки.

Менструации слишком ранние и слишком обильные. Выпадение матки — хуже во время менструации. Выраженная слабость при скудных менструациях. Рвота беременных. Кровотечение в случае предлежания плаценты. Непрерывное выделение ярко-красной, несвертывающейся крови.

**Дыхательные органы.** Безболезненная охриплость в конце простуды. Постоянное ощущение сжатия в грудной клетке и гортани, усиливающееся от малейшего движения. Спазм голосовых связок. *Затрудненное дыхание, пациент ловит ртом воздух.* Астма. *Кашель непрекращающийся и жестокий* — возникает при каждом вдохе.

*Приступы удушливого кашля*, сопровождающиеся позывами на рвоту: ребенок *напрягается, вытягивается*, его лицо становится красным или синее, наконец, возникает тошнота; ребенок давится и его рвет; лучше выйти на открытый воздух; лучше от тепла и в покое. Коклюш сопровождается кровотечением из носа и изо рта.

**ВЛАЖНЫЕ грубые ХРИПЫ В ГРУДИ, НЕ СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ ОТХАКИВАНИЕМ МОКРОТЫ.** Бронхопневмония. Кровохарканье — хуже от незначительного напряжения. Астма, сопровождающаяся кожным заболеванием. Приступы удушья из-за инородного тела в дыхательном горле (в трахее).



**Шея и спина.** Тетанические спазмы в спине, из-за которых спина сгибается вперед или назад. Стреляющая боль из области почки распространяется в бедра. Судороги между лопатками во время движения.

**Конечности.** Одна кисть холодная, другая горячая. Когда пациент садится, возникает ощущение, что происходит вывих бедренной кости. Боли, как от ушиба, во всех костях.

**Сон.** Толчки в конечностях при засыпании. Глаза полуоткрыты во сне, пациент стонет и мычит. Из-за бессонной ночи возникает тошнота и чувство утомления.

**Кожа.** Зуд, сопровождающийся тошнотой, пациент расцарапывает кожу до тех пор, пока его не вырвет.

**Лихорадка.** Кратковременный озноб и продолжительный жар. Озноб, чередующийся с жаром. Жар без жажды. Подавленные или смешанные **перемежающиеся лихорадки; тошнота во всех периодах лихорадки.** Катаральные или желудочного происхождения лихорадки. С кистей и стоп капает холодный пот. Ремиттирующая (послабляющая) лихорадка у младенцев.

**Дополнительно.** Ars., Cupr.

**Диф. диагноз.** Ant-t., Lob.

## IRIS VERSICOLOR

**Общее.** Ирис оказывает мощное воздействие на **СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА;** на слюнные железы, **ПЕЧЕНЬ** и **поджелудочную железу;** вызывая обильную **секрецию:** все выделения **кислые, едкие и жгучие.**

**Сальная кожа на носу; жирный привкус во рту и жирный стул** — это также характеристики препарата. Ирис способствует выделению желчи. Симптомы появляются внезапно, сопровождаются усиленной работой выделительных органов и быстрым очищением организма. Холера (азиатская) и мигрени.

**Хуже.** Периодически. **Еженедельно.** В 2—3 ч ночи. Весной и осенью. После полуночи. *От нервного истощения. В жаркую погоду.*

**Лучше.** От спокойного движения.

**Психика.** Уныние. Страх приближающейся болезни. Снижение умственных способностей — отупение.

**Голова.** Головные боли начинаются с появления пелены перед глазами, с неясного зрения. Мигрени, сопровождающиеся поносом. Стреляет в висках, при этом возникает ощущение стягивания, сжатия кожи волосистой части головы. Головная боль от утомления, при нервном истощении (от учебы, от шитья); хуже от кашля, от холодного воздуха; лучше от спокойного движения.

**Глаза.** Ввалившиеся. Жестокие надглазничные боли. *Периодические расстройства зрения, слепота, гемиопия и т.д.,* сопровождающие головную боль.

**Уши.** Отогенное головокружение, сопровождающееся сильным шумом в ушах.

**Нос.** *Сальный* — кожа на нем жирная. Постоянное чихание.

**Лицо.** Невралгия усиливается после завтрака, поражая все лицо; она сопровождается обильным мочеиспусканием и позывом на стул.

**Рот.** Ощущение жира во рту, как будто рот обожжен или ошпарен кипятком. Жжение в языке или он кажется холодным. *Жирный или сладковатый привкус во рту. Обильная тягучая слюна;* слюна капает, когда человек говорит.

**Горло.** Жар и жгучая боль в горле. Жжение из глотки распространяется в желудок; уменьшается от вдыхания прохладного воздуха или питья холодной воды. Зоб.

**Желудок.** Кислые, горькие отрыжки. *Жжение вдоль всего пищеварительного тракта,* не уменьшающееся от холодного питья. Продолжительная *тошнота. РВОТА ГОРЬКОЙ,* сладковатой жидкостью; **РВОТНЫЕ МАССЫ ЕДКИЕ, ВОДЯНИСТЫЕ, КИСЛЫЕ; РВОТА СОПРОВОЖДАЕТСЯ ЖЖЕНИЕМ.** Плохой аппетит. Периодические приступы рвоты: каждый месяц, каждые 6 недель, продолжаются 2 или 3 дня.

**Живот.** Болезненная печень. Спастическая боль (колика) перед каждым приступом рвоты и поносом. **СТУЛ СОДЕРЖИТ ЖЕЛЧЬ, ОН ЕДКИЙ, ВОДЯНИСТЫЙ, ОБЖИГАЕТ, КАК ОГОНЬ.** Безболезненный стул при азиатской холере. Позыв на стул при головной боли, лицевой невралгии и зубной боли. *Стул жирный.* Болезненность заднего прохода или ощущение, как будто в него втыкаются острые иголки.

**Мочевыделительная система.** Выделение обильной прозрачной мочи при головной боли. Жжение вдоль уретры после мочеиспускания. Диабет.

**Женские половые органы.** Продолжительная тошнота и рвота при беременности; обильное слюнотечение.

**Конечности.** Кажется, что бедра вывернуты, вырваны. Стреляющие, мешающие ходить боли вдоль по ходу конечности; ишиас.

**Кожа.** Опоясывающий лишай, сопровождающийся расстройством пищеварения; с правой стороны. Псориаз: неправильной формы бляшки с блестящими чешуйками. Пот пахнет уксусом.

**Диф. диагноз.** Ars., Merc, Phos.

## JABORANDI

**Общее.** Пилокарпус яборанди — это мощное средство, стимулирующее железы. Оно вызывает повышение секреции в верхних дыхательных путях; стимулирует слюнные железы и вызывает *патологическую потливость*. Кроме того, это средство оказывает очень важное влияние на глаза.

*Склонность потеть и простывать.* Приливы жара, слюнотечение, тошнота и обильное потоотделение. Яборанди ограничивает продолжительность паротита. *Патологически повышенное выделение жидкости.* Экзофтальмический зоб.

**Хуже.** В начале менструации. От холода. От сильного утомления, истощения.

**Психика.** Очень нервный, дрожит. У женщины возникает навязчивая идея, будто она убьет всю семью топором.

**Голова.** Головная боль, сопровождающаяся головокружением и тошнотой, возникает после нагрузки на глаза.

**Глаза.** Нарушение зрения. Глаза быстро устают от малейшей зрительной нагрузки. Изображение на сетчатке сохраняется долго после того, как пациент смотрел на предмет (послеобразы). Белые пятна перед глазами. Веки подергиваются. Жгучая, саднящая боль в глазах. Близорукость. Сужение зрачков. Экзофтальм. Сходящееся косоглазие: после хирургической операции. Помутнение стекловидного тела.

**Уши.** Нервного происхождения глухота; пациент лучше слышит в шуме. Шум в ушах. Серозный выпот в барабанной полости. Свинка; особенно при наличии метастаза заболевания в яички.

**Рот.** *Слюнотечение:* слюна вязкая, как яичный белок. Ощущение распирания в слюнных железах.

**Горло.** Экзофтальмический зоб, сопровождающийся усиленной сердечной деятельностью; пульсацией в артериях, дрожанием и нервозностью.

**Желудок.** Тошнота после нагрузки на глаза или из-за того, что смотрит на движущиеся предметы. Упорная рвота при беременности. Понос с приливом крови к лицу и обильным потоотделением.

**Мужские половые органы.** Орхит: метастаз процесса из околоушных желез в яички при свинке.

**Женские половые органы.** Менструации начинаются с появления чувства холода, пульсации в голове и в тазу, а также с боли в спине.

**Сердце.** Сильные приливы крови к сердцу и органам грудной клетки. Болезни сердца нервного происхождения.

**Дыхательные органы.** Очень часто кашляет, при этом возникает затруднение дыхания. Отек легких. Пенистая или обильная, жидкая, серозная мокрота.

**Кожа.** Красная. *Потоотделение:* сопровождается сердцебиением, пульсацией в теле и дрожанием. Нервная потливость. Потоотделение на одной половине тела.

**Диф. диагноз.** Agar., Ant-t., Ip.

## JALAPA

**Общее.** Это средство обладает мощным слабительным эффектом, поскольку действует, в основном, на кишечник и желудок.

*Ребенок здоров весь день, но кричит и беспокойно мечется всю ночь; либо ребенок мучается и беспокоится и днем, и ночью; возможно при любом заболевании.*

**Колика.** Стул: *водянистый*, похож на грязь или кислый; с кровью. Понос у младенцев, сопровождающийся общим охлаждением, цианозом лица.

**Хуже.** Ночью. От отрыжек.

**Диф. диагноз.** Coloc.

## JATROPNA

**Общее.** Это также сильное слабительное, действующее на *кишечник и желудок*. Рвота возникает легко, рвотные массы похожи на яичный белок. После икоты возникает обильная рвота. *Громко булькает в животе, как будто вода вытекает через небольшое отверстие; затем возникает обильный, как из крана стул.* Неутолимая жажда. Стул, напоминающий рисовый отвар. Сильные судороги, при которых икроножные мышцы вытягиваются, становятся плоскими. Ледяной холод во всем теле; особенно в нижних конечностях.

**Хуже.** От укрывания. Утром. Летом.

**Диф. диагноз.** Crot-t.

## JUSTICIA

**Общее.** Юстиция — это очень полезное средство для лечения острых катаров дыхательных путей.

Приступы чихания, сопровождающиеся слезотечением и *потерей обоняния и вкуса*. Насморк: жидкие, едкие выделения, сопровождающиеся сильным чиханием, кашлем или приступами астмы. Кашель сопровождается ощущением тесноты в грудной клетке, как будто ее распирает и она может лопнуть; с *хрипами в бронхах; затруднением дыхания* и чиханием. Тело напрягается, деревенеет, возникает дрожь или конвульсии — при

кашле или лихорадке. Коклюш. Плотная мокрота. Опухание кистей и стоп в ранние часы (с полуночи до полудня). Зябкость. Чувствительность.

**Хуже.** В закрытом помещении. От пыли. От шума. От еды.

**Диф. диагноз.** Ip., Dros., Puls.

## **KALI ARSENICUM**

**Общее.** Это ценное средство для лечения застарелых кожных болезней, а также случаев, когда заболевание приобретает черты злокачественного процесса.

Все симптомы усиливаются ночью. Из-за внезапного шума или прикосновения пациента бросает в дрожь. Жжение, онемение языка; невралгия языка. Сердцебиение; в том числе при нефрите. *Жжение в горле.* Тупые боли в желудке. В большом количестве выделяются кишечные газы, затем возникает понос.

Разрастания в области шейки матки в виде цветной капусты, сопровождающиеся летучими болями; дурно пахнущие бели и чувство давления внизу живота (в тазу). Невыносимый зуд, усиливающийся после раздевания, от ходьбы, от тепла. Хроническая экзема. Псориаз. Многочисленные мелкие узелки под кожей. Черная язва на голени, из которой вытекает кровянистая зловонная жидкость; при этом пациент страдает от режущей, жгучей боли, зуда и одышки. Пациент зябкий, чувствителен к холоду. Не может согреться даже летом.

**Хуже.** От прикосновения. От шума. Если стопы холодные. С 1 до 3 ч ночи.

**Лучше.** В дождливые дни.

## **KALI BICHROMICUM**

**Общее.** Бихромат калия в особенности поражает *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ дыхательных путей; НОСА; глотки, желудка и двенадцатиперстной кишки: появляются выделения, ПЛОТНО ПРИЛИПАЮЩИЕ К СЛИЗИСТЫМ ОБОЛОЧКАМ; КЛЕЙКИЕ; ТЯГУЧИЕ; вязкие, в виде комочков или густые, плотные.*

Болезнь прогрессирует *медленно*, но возникающие нарушения *глубокие*; возникает *выраженная слабость*, граничащая с параличом, а лихорадка, наблюдающаяся при этом, небольшая. Фибринозный экссудат, приводящий к образованию спаек — распространяется вниз.

Кали бихромикум соответствует тучным, мясистым, светловолосым, со светлой кожей людям, подверженным *катарам*, либо тем пациентам, в анамнезе у которых имеется указание на сифилис или золотуху.

*Боли возникают на ограниченном участке или быстро перемещаются с места на место;* и наконец поражают желудок. Чередование суставных и желудочных симптомов. Боли локализуются по диагонали. Симптомы распространяются снизу вверх; боли в желудке, ознобы, жар и т.д. Образование корочек на слизистых оболочках и на коже. *Язвы:* с темными точками; глубокие; перфоративные, круглые, штампованные; с нависающими краями или покрытые толстыми корками. Язвы перегородки носа или пептические.

Ощущение тяжести в разных частях тела. Ощущение, как будто волос на языке, в ноздрях и т.д. Желтые выделения, желтые склеры, язык; пациент видит предметы в желтом цвете и т.д. Резкие колющие боли.

Ощущение зуда внутри влагалища, в ухе, в легких и т.д. *Хруст в суставах.* Вялая или недостаточная реакция при многих заболеваниях, при язвах, воспалении и т.д. Поражение корня носа, корня языка, корня полового члена и т.д. Упорное нагноение. Образование гнойных пробок; вязкого, тягучего гноя.

Болезненные последствия злоупотребления пивом и напитками, приготовленными из солода. Невралгия, возникающая ежедневно, в один и тот же час. Болезненный, зябкий и истощенный пациент. Укусы, напоминающие укусы клопов. Слизистые оболочки покрыты налетом. Боли появляются и исчезают внезапно. Эпилепсия: тягучая слюна вытекает изо рта во время судорог. Слабость и усталость; в том числе после болей.

**Хуже.** ОТ ХОЛОДА, влажности. На открытом воздухе. Весной. Когда раздевается. УТРОМ, после сна. В 2—3 ч ночи. Когда высовывает язык. В жаркую погоду. От алкоголя, от пива. От подавления катара (воспаления). При наклоне. Сидя.

**Лучше.** От жара. От движения. От давления.

**Психика.** Равнодушный. Ленивый: отвращение к умственному и физическому труду. Антропофобия: боится людей и избегает общества.

**Голова.** Головокружение с тошнотой, возникающее, когда пациент встает со стула. Жесткая головная боль, которой предшествует потеря зрения; боль локализуется *над бровями* или направлена наружу вдоль бровей; боль усиливается от холода; уменьшается от надавливания на корень носа, от теплого супа. Тупая боль и ощущение полноты над переносицей (glabella). Периодические головные боли. Мигрень: боль на ограниченном участке и вследствие подавления катара. Болезненность костей черепа; резкая колющая боль в них. Ощущение, как будто твердая глыба, чурбан во лбу.

**Глаза.** Язвы роговицы — ни боли, ни светобоязни нет. Конъюнктивит желтый; отечный; покрыт желто-коричневыми пятнами. Выделения из глаз тягучие и желтые. *Слепота* перед головной болью. Пациенту кажется, что у него косоглазие; лучше смотреть одним глазом. Веки опухшие; чешутся, зернистые, пациент моргает во

время судорог. Участки плотного помутнения роговицы. Светобоязнь возникает только при дневном свете, естественном освещении. Когда пациент открывает глаза, веки подергиваются.

**Уши.** Резкая колющая боль в ушах (слева). Густые желтые зловонные выделения из ушей. Сильное щекотание в ушах. Перфорация барабанной перепонки.

**Нос.** Боли в спинке или в корне носа. *Давление или ощущение заложенности* в корне носа. Насморк у детей: сопит носом, гнусавит, особенно если это тучный ребенок с полными щеками.

*Выделения* густые, тягучие, зеленоватые, желтые, *едкие*. Плотные, эластичные пробки, после удаления которых образуется ссадина, саднящая поверхность. Выдыхаемый воздух кажется горячим. Скверный, во нючий запах из-за скопления секрета в носу. Щекотание, как будто от волоска, в левой ноздре. Насморк с заложенностью носа. Жестокое чихание — сильнее утром.

Хроническое воспаление лобных пазух с ощущением заложенности. Изъязвление носовой перегородки. Абсцесс. Озена. *Дифтерия носа*. Когда сморкается, возникает ощущение, как будто две кости свободно трутся друг о друга. Потеря обоняния. Ощущение, что нос тяжелый; что в нем сухо. Полипы носа.

**Лицо.** Бледное, желтоватое. Покрыто прыщами, красное; цветущий вид. Свинка: поражение правой околоушной железы. Потоотделение над верхней губой.

**Рот.** Зубная боль: распространяется в стороны, сопровождается опуханием лимфатических желез. *Язык:* блестит, покрыт трещинами, гладкий или тяжелый; сухой, красный, лимонно-желтого цвета, покрыт налетом; при дизентерии. *Когда пациент высовывает язык*, возникает боль; в том числе в корне языка. *Вязко во рту*. Сладкий, металлический привкус во рту. Язык с толстым налетом, широкий, плоский; с отпечатками зубов. Афтозные язвы глубокие, разъедающие слизистую оболочку. Ощущение волоса на спинке языка, не уменьшающееся от еды или питья. Сухо во рту — лучше от питья холодной воды.

**Горло.** *Отхаркивает густую слизь*, вынужден стирать ее с лица. Небный язычок отечный, расслаблен, похож на наполненный жидкостью пузырь. Трещины в глотке. Сухость, жжение в ней. Ощущение, как будто что-то втыкается в горло; боль распространяется в шею и плечи. Когда высовывает язык, возникает боль в гортани. Афты. Дифтерия. Увеличение миндалин и снижение слуха (глухота) у детей.

**Желудок.** Страстное желание: пива, кислого питья. Не любит мясо, воду. Со рвотой жидкости выделяется больше, чем выпил, рвотные массы в виде ярко-желтой жидкости. Срыгивает жидкости. Круглая язва желудка. Желудочные симптомы уменьшаются от еды. Болезненный участок в желудке, либо пища лежит в желудке, как груз. Тошнота сопровождается ощущением жара в теле; лучше от еды и на открытом воздухе. Тошнота сопровождается жжением в заднем проходе и эрекциями.

**Живот.** Ощущение сжатия распространяется из печени в область плеча (правого). Колотье из селезенки распространяется в поясничную область. Хронические язвы в кишечнике, сопровождающиеся рвотой и исхуданием. Стул студенистый, как желе; или *выделяется в виде сплошного потока коричневой пенистой жидкости*. После такого стула возникают жжение и тенезмы; хуже утром, после вставания с постели. Периодическая дизентерия — каждый год летом. Понос или дизентерия после ревматизма. Ощущение пробки в заднем проходе. Ощущение, как будто что-то разъедает кишечник.

**Мочевыделительная система.** Тяжесть в почках. Ощущение, как будто после мочеиспускания осталась одна капля мочи, которая никак не вытекает. Нефрит с выделением скудной, содержащей белок мочи. Выделение кровянистой мочи сопровождается болью в спине. Гематохилирия.

**Мужские половые органы.** Сжимающая боль в корне полового члена, возникающая ночью, когда пациент просыпается. Шанкры, характеризующиеся глубоким изъязвлением. Хронический гонорейный уретрит с обильными тягучими, как нити, или желеобразными выделениями; закупорка уретры. Отсутствие сексуального желания у полных людей. Колотье в простате при ходьбе — пациент должен остановиться и стоять неподвижно.

**Женские половые органы.** Менструации сопровождаются задержкой мочи или выделением красной мочи. Бели едкие, желтые, тягучие; сопровождаются болью поперек крестца и тяжестью внизу живота. Выпадение матки — хуже в жаркую погоду. Зуд и жжение в наружных половых органах (вульве) сопровождается сексуальным возбуждением. Рвота безрежимная. Молоко тягучее, водянистое.

**Дыхательные органы.** Охриплость сильнее вечером. Ларингит. Щекотание в гортани при кашле; хуже от еды, в сочетании с отрыжками; уменьшается от жара, тепла; после него возникает головокружение. *Саднение* за грудиной; при кашле *боли распространяются в спину* и плечи. Мокрота желтая, тягучая, обильная, отхаркивается при глубоком кашле. Ощущение преграды поперек груди. Астма — ухудшение от коитуса. Кашель уменьшается после отхаркивания мокроты. Сухой, металлический, отрывистый кашель.

**Сердце.** Расширено при заболевании почек; при недостаточности аортального клапана. Чувство холода в области сердца. Сердце слабое. Пульсация ощущается во всех артериях.

**Шея и спина.** Скованность в шее усиливается при сгибании шеи, наклоне головы вперед. Режущая боль в пояснице (ниже ребер); пациент не может ходить. Боль в копчике усиливается при ходьбе, сидя и от прикосновения; распространяется вверх и вниз. Боли в копчике перед мочеиспусканием, уменьшаются после него. Ощущение, как будто что-то треснуло поперек крестца; сильнее при наклоне.

**Конечности.** Паралитическая слабость в кистях. Ишиас: лучше от движения и при сгибании ноги в колене; хуже стоя, сидя или лежа в постели. Боль вдоль края стопы. Блуждающие боли вдоль костей. Ревматические боли усиливаются от еды. Ахиллово сухожилие опухшее и чувствительное. Большеберцовые кости болят; периостит после удара.

**Кожа.** Пустулы с черными верхушками. Кожа горячая, сухая и красная; лучше от прохладного воздуха. Коричневые пятна на коже. Пузыри на подошвах. Вдавленные, округлые рубцы остаются после заживления элементов сыпи или язвы.

**Сон.** Неосвежающий сон; пациент чувствует усталость в конечностях.

**Лихорадка.** Приливы жара; после чего выступает *липкий пот*, затем начинается озноб. Холодный пот на кистях и стопах. Озноб с потоотделением.

**Дополнительно.** Ars., Phos., PSOR.

**Диф. диагноз.** Kali-c, Merc, Phyt., Puls.

## KALI BROMATUM

**Общее.** Бромид калия влияет на *ПСИХИКУ И НЕРВЫ*, вызывает снижение умственных способностей; *ощущение* онемения повсюду и *анестезию* слизистых оболочек, особенно глаз, горла, а также кожи.

Влияние его на сексуальную сферу очень велико: пациент чувственный, имеет эротические фантазии; наблюдается сатириаз и нимфомания. Эпилепсия возникает в связи с половыми излишествами или сексуальным насилием у мужчин; а у женщин припадки случаются во время менструации. Обычно припадки возникают в новолуние, а после них бывает головная боль.

Начало заболевания медленное; *совсем нет боли*. Паралич. Бромид калия ослабляет сердце и понижает температуру тела.

Последствия забот, проблем, потери своего дела, разорения, потери доброго имени, репутации и т.п. Кроме того, последствия сексуальных излишеств, болезни или смерти близкого друга. Хорея от испуга. Дрожательный паралич (паркинсонизм).

**Хуже.** *От нервного напряжения.* От эмоций, переживаний — гнева, испуга, беспокойства. От горя. Периодически: ночью, в 2 часа; летом; в новолуние. *Из-за сексуальных излишеств.* В пубертатном возрасте. Из-за неудовлетворенного сексуального желания.

**Лучше.** Когда заняты и мысли, и тело.

**Психика.** *Депрессия с иллюзиями, заблуждениями:* пациент считает, что его преследуют; что его собираются отравить; что совершит какое-то серьезное преступление, что убьет своих детей или мужа. Нервный пациент. Нервное истощение от горя и тревоги. Подозрительный: рассматривает дело со всех сторон; боится людей, и все же боится остаться один, боится темноты.

Суетливость, *руки все время чем-то заняты*, вертит, мнёт что-нибудь в руках. Оживленно жестикулирует. *Полная потеря памяти:* забывает, как сказать, пациенту нужно подсказать слово, прежде чем он сможет его произнести. Амнестическая афазия.

Меланхолия, сильно обеспокоен своим здоровьем, жалуется без причины. Испытывает раскаяние; *заламывает себе руки*; раздражается слезами. Медлителен, сомневается, пропускает или путает слова, когда говорит и пишет. Глубокое безразличие и отвращение к жизни. Воображает, что не может пройти мимо определенного места. Часто плачет — слезы льет.

Ночные кошмары у детей: ребенок просыпается с криком, без сознания, никого не узнает; после чего возникает косоглазие. Старческое размягчение мозга, слабоумие. Маниакальное стремление покончить жизнь самоубийством, сопровождающееся дрожанием.

**Голова.** Ощущение онемения в голове, сильнее в затылке. Головокружение: как будто земля уходит из-под ног, неустойчивая походка; хуже при наклоне. Признаки апоплексии — геморрагического инсульта. Жесткая головная боль или онемение, которое ощущается в затылке; из-за сотрясения головного мозга.

**Глаза.** Ввалившиеся глаза; глазные яблоки движутся во всех направлениях. Косоглазие у детей после ночных кошмаров.

**Уши.** Тугоухость. Звуки отдаются эхом в ушах. Рев в ушах, синхронно с пульсом, в том числе ночью.

**Нос.** Обоняние снижено. Насморк, воспаление из носа спускается в гортань.

**Лицо.** Румяное; желтое, истощенное. Ничего не выражающее. Угри на лице.

**Рот.** Затрудненная речь; заикание. Зловонное дыхание. Онемение полости рта. Язык высовывается резким движением; при хорее.

**Горло.** Онемение в гортани. Пациент не может глотать жидкости (ребенок), может проглотить только твердую пищу.

**Желудок.** Рвота: сопровождается сильной жаждой; возникает после каждого приема пищи; истерического характера; после волнения, от сильных эмоций. Постоянная икота.

**Живот.** Спазмы в животе, сопровождающиеся втягиванием брюшной стенки. Ощущение, как будто кишки вываливаются. Рези при колике. Ощущение внутреннего холода. Зеленый, водянистый стул, быстро развивается коллапс. Детская холера, сопровождающаяся подергиванием мышц и их спастическим сокращением, втягиванием живота. Полип прямой кишки: постоянный понос, выделение большого количества крови.

**Мочевыделительная система.** Сахарный диабет. Моча подтекает, когда начинает отходить стул. Онемение уретры. Энурез.

**Мужские половые органы.** Чрезмерно повышенное сексуальное желание, постоянные эрекции ночью. Сексуальное желание снижено, возможна даже импотенция. Импотенция: при меланхолии, эпилепсии, нервном истощении.

**Женские половые органы.** Нимфомания в послеродовом периоде. Бесплодие из-за сексуальных излишеств. Невралгия яичника из-за неудовлетворенного сексуального желания. Кистозные опухоли яичников. Маточные кровотечения у молодых женщин, в сочетании с сексуальным возбуждением. Меноррагия из-за сильного сексуального возбуждения. Фибромы матки. Субинволюция матки. Утрата сексуальных чувств, отвращение к половому акту.

**Дыхательные органы.** Крупозный кашель. Рефлекторный кашель во время беременности. Дыхание горячее; учащенное. Астма сопровождается сухим кашлем, пациент беспокойно мечется — иступленно машет руками.

**Конечности.** Кисти и пальцы рук в постоянном движении. Подергивания пальцев на руках. Дрожание кистей во время произвольных движений. Неустойчивая походка. Не может стоять прямо, слабость в голени.

**Кожа.** Угри. Мокнувшая экзема голеней. Псориаз. Кожа холодная; немеет. После высыпаний остаются рубцы.

**Сон.** Сонливость; она часто прерывается вздрагиванием. Бессонница вследствие беспокойства, от горя и сексуальных излишеств. Ночные кошмары. Снохождение (сомнамбулизм) у детей.

**Лихорадка.** Болезненные приливы крови к лицу во время климакса.

**Диф. диагноз.** Calc, Con., Op., Stram.

## **KALI CARBONICUM**

**Общее.** Слабость, характерная для всех солей калия, наиболее выражена у типичного их представителя — Кали карбоникум.

**ОБЩАЯ СЛАБОСТЬ; мышечная слабость; сердечная слабость; слабость спины; конечностей; слабость интеллекта.**

Фиброзная ткань, относящаяся к связкам суставов, матки, поясничной области страдает более всего — возникает ее расслабление. Суставы слабые — *податливые, не держат; ощущение разбитости в спине, как будто она сломана*; пациент испытывает потребность прилечь или опереться на что-нибудь.

*Потливость, боль в спине и слабость* — вот три характерных симптома Кали карбоникум. Это средство подходит полным, пожилым людям, *мягким, с жидкой кровью, зябким*; чувствительным к атмосферным влияниям, к любому сквозняку, всегда дрожащим от холода, имеющим склонность к отекам и к возникновению параличей. Холодный воздух кажется горячим.

Это пациенты с неясными, неопределенными симптомами или не сообщающие, скрывающие, утаивающие свои симптомы.

**РЕЗКАЯ КОЛЮЩАЯ БОЛЬ;** боли *пронзающие, как будто ножом*, или сжимающие, как будто больное место защемили, ощущаются в разных частях тела — в суставах; *грудной клетке*; мышцах, голове, когда пациент лежит на больном боку и т.д. — они возможны при любом заболевании.

**Пульсирующие боли; ощущение онемения или холода в отдельных частях тела;** в том числе в животе, в пальцах рук. Части тела, на которых пациент лежит, начинают болеть или немеют. Выделения обильные и едкие.

**Конвульсии:** кажется, что они проходят при появлении отрыжки. Внезапная потеря сознания. Подергивание мышц; ригидность и атония мышц. Все тело как будто пустое. Жировое перерождение органов. Туберкулезный диатез. Гипотиреоз. Ощущение, что постель, на которой лежит пациентка, проваливается. Больше не чувствовал себя здоровым с тех пор, как перенес пневмонию. Ощущение жжения; как от огня. Склонность вздрагивать и при этом громко вскрикивать: когда к пациенту прикасаются, даже слегка; особенно, когда дотрагиваются до подошв — дрожь пробегает по всему телу. Боли перемещаются в часть тела, не покрытую одеждой, в ту часть, на которой не лежит.

Болезненные последствия подавления высыпаний в детстве. Последствия заживления язвы и свищей (фистул); следствие простуды или перенапряжения. Слабость после выкидыша или родов. Склонность к флебиту.

**Хуже.** *От холода, ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА*, от сквозняка, от холодной воды, от охлаждения после перегревания, после физического напряжения. *Зимой.* В 2—3 ч ночи. Перед менструацией. *Лежа на больном* или на левом боку. От потери жидкостей, жизненных соков. После родов, после аборта. При наклоне. Из-за внезапного или неосторожного движения. При перемене погоды. После коитуса. От прикосновения. От движения.

**Лучше.** От тепла. Сидя, опершись локтями на колени. Днем. На открытом воздухе. От движения.

**Психика.** Сварливый, раздражительный. Пациент легко пугается; вздрагивает, когда к нему прикасаются, особенно к стопам; вздрагивает, когда засыпает. *Тревога, пациенту страшно, когда он остается один.* Тревога ощущается в желудке. Пациентка теряет, не знает, как сказать, чего она хочет. Очень раздражительный пациент. Много плачет. Повышенная чувствительность к боли, шуму, прикосновению. Никогда не бывает спокоен или доволен. Страх: будущего; призраков; смерти. Тревожится, обеспокоен своей болезнью. Ссорится с теми, кто его содержит, обеспечивает его существование, со своей семьей. Кажется, что постель под ним проваливается.

**Голова.** Тупая боль в голове отдается в глазах; хуже от движения экипажа, от чихания, кашля; при наклоне, зевании; лучше, когда поднимает голову, а также если надавить на лоб. Постоянное ощущение, что в голове что-то болтается, поворачивается, скручивается в направлении лба. Просыпается из-за головной боли. Волосы сухие; выпадают, в том числе на висках, из бровей и бороды. Болезненные опухоли на коже волосистой части головы.

**Глаза.** Слабые: после коитуса; после кори; после аборта. Пятна перед глазами — яркие искры, синие, зеленые пятна; капли перед глазами. *Опухание* внутренних углов глаз; либо наподобие мешочка опухает область между верхними веками и бровями. Когда пациент закрывает глаза, возникает болезненное ощущение, что свет проникает в мозг. Веки холодные.

**Уши.** Кошет в ушах изнутри наружу. Треск в ушах. Правое ухо горячее, левое — бледное и холодное. Шум в ухе; в том числе при головной боли.

**Нос.** Насморк, воспаление из носа спускается вниз. Нос опухший, плотный, красный. Заложенность носа уменьшается при ходьбе на открытом воздухе — на прогулке. Вонючие желто-зеленые или с образованием корок выделения. Носовое кровотечение утром, во время умывания. Изъязвление ноздрей. Нос красный, покрыт прыщиками (папулами). Хроническая простуда. Пациент дышит ртом.

**Лицо.** Одутловатое. Бледное, болезненное, желтоватое лицо, ввалившиеся глаза. Веснушки. Опухание нижней челюсти и подчелюстных желез. Спазмы в мышцах челюсти.

**Рот.** Зубная боль: чередуется с колющими болями в левой молочной железе; возникает только во время еды. Скопление слизи во рту. Язык серо-белый. Десны отстают от зубов. Зуд в деснах; гной сочится из них. Пиорея. Афты; обильное слюнотечение. Жжение, болезненность языка или болезненные папулы на его кончике.

**Горло.** Отхаркивает плотную слизь в утренние часы (с полуночи до полудня). *Глотание ЗАТРУДНЕНО*; пища медленно спускается по пищеводу; застревает на полпути, пациент давится и его рвет; в том числе при сужении — стриктуре — пищевода. Мелкие частицы пищи легко попадают в трахею. Колющая боль, как от застрявшей рыбьей кости.

**Желудок.** Пациент срыгивает соленые, кислые массы. Рвота кислой слизью. Желание сладкого, кислого. Желудок *растянут, чувствительный*. Ощущение полноты даже после небольшого количества еды и питья. От молока и теплой пищи становится хуже, они не усваиваются. Ощущение, *как будто желудок наполнен водой*. Ощущение, что в подложечной области, в глубине ее, находится комок, чувствительный к прикосновению. *Пульсация* в области задней стенки желудка. Боли из желудка распространяются в спину, грудную клетку, конечности и т.д. Часто хочется есть, но от малейшего количества пищи у пациентки возникает ощущение стеснения, тяжести. Ночная рвота пищей. Тошнота уменьшается в положении лежа. Кислые отрыжки. Сонливость и усталость во время еды, пациентка не может доест пищу. Когда голоден, пациент тревожен, нервничает, чувствует тошноту, пощипывание, покалывание, сердцебиение и т.д.

**Живот.** *Вздутие живота, он твердый, как барабан (тимпанит)*, и холодный. Пульсация в области пупка. Ощущение, как будто холодная жидкость течет по кишечнику во время менструации. Метеоризм. Колотье в печени или ее болезненность. Боль из левого подреберья проходит через живот; пациент вынужден повернуться на правый бок, чтобы подняться. Режущая боль, как будто кишечник разорван на куски.

*Стул затруднен, в виде крупных, твердых комьев*; после стула возникает жжение или ощущение, как будто задний проход разорван. Геморрой воспаленный, кровоточащий, узлы выпадают, когда пациент мочится или кашляет; лучше от езды верхом на лошади. Кошет, как будто тонкой иглой, в том числе во время беременности; либо как будто в прямой кишке — раскаленная докрасна кочерга; лучше от прохладной ванны. Легко возникает выпадение прямой кишки. Хронический понос у страдающих несварением желудка пациентов — только в дневное время. Запор после менструации или во время нее. При кашле возникает ощущение комка, катающегося в животе и поднимающегося из живота (из правой его половины) в горло и опускающегося обратно. Свищ заднего прохода. Отеки. Желтуха. Запор, чередующийся с поносом.

**Мочевыделительная система.** Жжение в левой почке. Ночное недержание мочи (энурез) у взрослых; хуже от кашля, чихания. *Моча пенистая*; с обильным красным осадком. Колющая боль в почках, распространяется из области ягодиц в бедра. Пациент долго тужится, прежде чем начнется выделение мочи; чем сильнее тужится, тем меньше мочи вытекает. Мочеиспускание замедленное, сопровождается жжением в уретре. Нефрит после переохлаждения или после травмы.

**Мужские половые органы.** Недомогания после коитуса. Обильные болезненные поллюции; с последующими болезненными эрекциями. Изнеможение после коитуса; часто сопровождается дрожью, содроганием тела. Бессонница и чувство дискомфорта в течение 2 или 3 дней после полового акта. Отвращение к коитусу. Странное

ощущение неловкости, дискомфорта в половых органах. Хроническая гонорея: скудные, сопровождающиеся болью выделения; жжение во время и после мочеиспускания.

**Женские половые органы.** Задержка наступления первой менструации (менархе); в том числе при заболеваниях органов грудной клетки и асците. Аменорея. Менструации ранние, кровотечение обильное; менструации поздние, скудные, с выделением бледной крови. Сильные спазмы в матке возникают, когда не наступает менструация, сопровождаются чувством жара и беспокойством. Менструации слишком поздние; едкие, обильные. Меноррагия: лучше принять ванну. Сильная спастическая боль перед менструацией (колика); при этом менструальная кровь имеет едкий запах, вызывает раздражение. Колет, как будто тонкими иголками, в молочных железах. Болезненность половых органов во время коитуса и во время менструации.

Опухоли матки, кисты.

*Бели сопровождаются схваткообразными болями, вызывают зуд и жжение в промежности; лучше от обмывания водой.*

Неэффективные родовые схватки: они ощущаются в спине, распространяются вниз — в области крыльев таза и бедра. Недомогание после родов и аборта. Кровотечение после выскабливания полости матки и всех прочих видов лечения. Эклампсия — лучше от отрыжки. Родильная горячка (послеродовой сепсис), сопровождающаяся режущей болью внизу живота, выделением скудной черной мочи.

**Дыхательные органы.** Афония при катаре; сопровождается жестоким чиханием. Затруднение дыхания, *астматическое* дыхание; хуже от малейшего движения или ходьбы; чередуется с поносом; с головокружением. Непрерывный, тяжелый, с ощущением удушья или с позывами на рвоту, не сопровождающийся отделением мокроты (неэффективный) кашель; после него возникает рвота. Коклюш. Кажется, что легкие приклеились к ребрам. *Пронзающие, как от ножа, боли в грудной клетке.* Гидроторакс. При кашле вся грудная клетка очень чувствительная. При кашле нёбный язычок расслаблен. Грудная клетка холодная. Мокрота отхаркивается с трудом, или маленькие круглые комочки без усилий вылетают изо рта; мокрота соленая, густая, кровянистая, желтоватая, зеленоватая, зловонная или обильная; с кислым или едким вкусом.

**Сердце.** Кажется, что оно подвешено на нити. Сердцебиение; после него ощущается слабость; оно возникает при поражении клапанов сердца; когда пациент голоден. Жжение в области сердца. Боли из области сердца распространяются в левую лопатку. *Пульс малый, мягкий, изменчивый; перемежающийся или дикротический.* Аритмия. Перерождение сердца. Яростное сердцебиение, сотрясает все тело; пульсация распространяется в кончики пальцев рук и ног. Шея и спина. Все происходящее отражается на пояснице, или боли начинаются в пояснице. Шея кажется увеличенной. Боль в спине: *сопровождается ощущением, что спина отказывает;* пациент должен лечь; разбитость; как будто спина сломана. Ощущение слабости в пояснице. Прострел (люмбаго) с внезапными, резкими болями, распространяющимися вверх и вниз вдоль бедер. Боль в спине после родов или аборта. Боли в позвоночнике во время еды. Жжение в области позвоночника справа.

**Конечности.** Слабость в руках, ощущение онемения, холод. Щемящая боль с онемением в руке (левой). Жжение, как от огня, в пальцах рук. *Голені отказывают;* чувство тяжести в них. Боль в кончиках пальцев на руках и ногах. Отек левой стопы. *Подошвы очень чувствительные.* Боль из области крыла таза распространяется в колено. Колени болят, хуже при подъеме или спуске по лестнице. Пациент судорожно дергает конечностями, особенно когда прикасаются к стопам. Ишиас: рвущая боль в бедрах, сопровождающаяся спастическим сокращением мышц.

**Кожа.** Чувствительная, сухая. Жжение, как от горчичника. Общий зуд или крапивница во время менструации. Зуд в бородавках. Ощущение напряжения, давления в рубцах, как будто они лопаются.

**Сон.** Засыпает во время еды. Разговаривает во сне. Просыпается ночью в промежутке от 2 до 4 часов почти при любом заболевании. Просыпается в 1 ч или в 2 ч ночи и не может заснуть. Пациент зевает при головной боли и других недомоганиях.

**Лихорадка.** Зябкий; а кисти горячие; зябкость сопровождается сонливостью; зябкость на открытом воздухе. Ощущение жжения внутри. Потоотделение скудное, зловонный пот на стопах. Потеет: от малейшего напряжения; болезненное место.

**Дополнительно.** Ars-i., Carb-v., Nit-ac, Nux-v., Phos.

**Диф. диагноз.** Ars., Calc-hp., Fl-ac, Lyc, Phos., Sep., Sulph.

## КАЛ CHLORICUM

**Общее.** Разрушает кровь, поражает полость рта, почки и прямую кишку. Глубокое изнеможение; ощущение холода в разных частях тела и разных органах, даже в крови. Легко возникает *кровотечение*, в том числе из носа, появляется кровь в стуле и т.д. Цинга. Перечисленные симптомы являются наиболее характерными.

Выделения *зловонные*. Серого и белого цвета фибринозный, с последующим образованием спаек, экссудат. Амилоидоз и жировое перерождение печени, селезенки и почек, а также других плотных органов. Токсикоз беременности.

**Хуже.** От холода. От ртути. От сотрясения. От кашля. От чихания.



**Лучше.** От носового кровотечения (уменьшаются психические симптомы).

**Нос.** Кровотечение: в том числе ночью; только из правой ноздри.

**Лицо.** Опухшее; пациентка едва может открыть глаза утром. Невралгические боли усиливаются от разговора; от еды или от легкого прикосновения, после них возникает онемение.

**Рот.** Скверный запах изо рта. Острая язва и фолликулярный *стоматит*; афтозный и гангренозный стоматит. Нома. Язык опухший; холодный. Цинга. Слюнотечение.

**Желудок.** Холод в желудке. Внезапная рвота, непрекращающаяся; рвота всей съеденной пищей; рвота отвратительной темно-зеленой слизью. Горло холодное.

**Живот.** Резкая сжимающая боль (колика) сопровождается движением кишечных газов и поносом; затем возникает продолжительная боль в прямой кишке. Дизентерия — много крови выделяется вместе со слизью; стул обильный, зеленоватый. Пациент плачет из-за жестокой, режущего характера боли в прямой кишке — при дизентерии и при поносе.

**Мочевыделительная система.** Нефрит. Моча содержит белок, скудная, задержка мочи. Гематурия.

**Дыхательные органы.** Ощущение сжатия грудной клетки; как от паров серы.

**Сердце.** Ощущение холода за грудиной. Пульс на правой руке хорошего наполнения, на левой — малый. Ощущение холода в крови.

**Конечности.** Лодыжки опухают к вечеру. Руки, стопы холодные.

**Кожа.** Холодная. Прыщики (папулы) между нижней губой и подбородком.

## КАЛИ CYANATUM

**Общее.** Цианистый калий — это самый сильный яд.

Гомеопатическое средство Кали цианатум следует иметь в виду в случаях мучительной невралгии, особенно в области глазницы и верхней челюсти: боль сопровождается криком и потерей сознания.

Рак языка, характеризующийся уплотнением краев. Внезапное ощущение, что опускается, проваливается. Не может говорить, но интеллект сохранен. Ишиас, неустойчивая походка.

**Хуже.** С 4 ч утра до 16 ч.

**Лучше.** От движения на открытом воздухе.

## КАЛИ IODATUM

**Общее.** Иодид калия применялся в качестве лекарства против сифилиса. Он оказывает выраженное действие на фиброзные ткани и соединительную ткань вообще, способствует возникновению инфильтратов, отека.

*Опухание желез*; или атрофия. Экзостозы, утолщение ("вздутие") костей, рахит, геморрагическая пурпура и геморрагический диатез — вот заболевания, при которых применяется Кали йодатум. Разнообразные болезни, разные варианты ухудшения, характеризующиеся многочисленными симптомами, перечисление которых бывает утомительным, причем, ни один из этих симптомов не становится ведущим — такие случаи требуют назначения Кали йодатум. Диатезы: мочекишный (подагра), ревматический, люетический (сифилис).

*Упорное хроническое течение.* Пациент чувствует себя измученным. Боли с ощущением, что часть тела раздавлена, или резкие колющие боли. Выделения *ОБИЛЬНЫЕ, водянистые, едкие, соленые*; густые; зеленые или зловонные. *Разлитая болезненность*: после болей; в пораженном месте. Боли ощущаются спустя много времени после травмы. *Слабость*, исхудание. Артериосклероз. *Сильная потребность в движении на открытом воздухе*. Кахексия. Контрактуры мышц и сухожилий, хронический артрит, сопровождающийся ложным анкилозом сустава. Актиномикоз. Холод в больной части тела, в костях. Грибковые заболевания. Отеки из-за давления, из-за опухания желез.

**Хуже.** От жара. От давления. От прикосновения. *Ночью*. От сырости. От ртути. При перемене погоды. От сотрясения. От холодной пищи, особенно от молока. От захода солнца до восхода.

**Лучше.** От движения. От прохладного воздуха. На открытом воздухе.

**Психика.** Раздражительный, вспыльчивый, особенно по отношению к своим детям; к членам своей семьи. Грубость и жестокость. Незначительные явления, мелочи жизни кажутся невыносимыми. Не может думать. Подавлен, в отчаянии. Скверный характер. Оскорбляет. Нервничает, должен ходить. Разговорчивый, склонен шутить.

**Голова.** Головокружение в темноте; хуже от путешествия поездом. Жестокие головные боли, как будто голову стискивают с боков, сжимают; хуже от тепла и давления. Твердые болезненные бугры на черепе; в том числе сопровождающиеся головной болью. Боль на волосистой части головы после расчесывания кожи, как будто на коже язвы. Крупная голова и маленькие челюсти — рахит. Мозг кажется увеличенным. Цвет волос изменяется, и они выпадают. Двухсторонние головные боли. Кожа волосистой части головы трескается и становится болезненной. Чувствительные участки на голове.

**Глаза.** Жжение в глазах, они *опухшие*, слезятся; конъюнктив красная. Сифилитический ирит. Постоянное колебание глазных яблок. Моргание болезненно. Хемоз. Отек вокруг глаз. Нижние веки подергиваются.

**Уши.** Шум в ушах. Ковыряющая боль в ушах. Глухота.

**Нос.** Красный, опухший. Насморк: воспаление распространяется вниз, выделения обильные, *едкие*, горячие, водянистые; хуже от прохладного воздуха; насморк сопровождается слюнотечением и одышкой. *Ощущение напряжения, сжатия в корне носа.* Озена с перфорацией носовой перегородки. Прохладные, зеленоватые, раздражающие выделения из носа. Жжение, пульсация в носу и придаточных пазухах. Жестокое чихание. Пациент простывает каждый раз, когда стоит влажная погода.

**Лицо.** Невралгия. Боль с ощущением напряжения в скуловых костях. Вязкая слюнь на губах в первой половине дня (с полуночи до полудня).

**Рот.** Ноющая зубная боль, как будто зуб червь точит. Горький привкус во рту, в том числе при пробуждении; соленый привкус. Слюнотечение. Кровянистая слюна, при этом во рту сладковатый или неприятный привкус. Сильная боль в корне языка ночью. Язвы во рту — они как будто облиты молоком.

**Горло.** Боли в горле у ораторов. Зоб, чувствительный к прикосновению. Сухость в горле. Миндалины увеличены.

**Желудок.** Ухудшение от холодной пищи и питья, в особенности, от холодного молока. Сильная жажда. Ощущение, как от кислой отрыжки. Пульсация, болезненное жжение в горле. Отвращение к любой пище, к бульону.

**Живот.** Вздутие живота сопровождается нехваткой воздуха. Пищит или кудахчет в животе. Понос: сопровождается болью в пояснице, ощущением, как будто она ушиблена, разбита, или как будто начнется менструация. Понос в ранние утренние часы у больных туберкулезом легких. Учащенный стул. Трещины заднего прохода; в том числе у младенцев.

**Мочевыделительная система.** Учащенное мочеиспускание с выделением обильной, прозрачной мочи; хуже перед менструацией, ночью.

**Мужские половые органы.** Атрофия яичек. Хроническая гонорея: густые, зеленые выделения. Образование эскориаций (эксориаций) от малейшего трения.

**Женские половые органы.** Матка кажется сжатой, стиснутой во время менструации. Бели едкие, вызывают раздражение, похожи на мясные помои. Атрофия молочных желез. Менструации поздние и обильные.

**Дыхательные органы.** Саднение в гортани. Ощущение *нехватки воздуха* при метеоризме; возникает в первой половине дня (с полуночи до полудня); пациент просыпается от удушья. Свистящее астматическое дыхание. *Саднение в дыхательных путях.* Сухой бронхит. Мокрота пенистая, зеленоватая, похожая на мыльную воду. Выпот в плевральной полости. Пневмония. Боли в грудной клетке распространяются назад. Боль из области грудины распространяется в спину.

**Сердце.** Сердцебиение и пронзающие боли; хуже при ходьбе. Аневризма.

**Шея и спина.** Поясница как будто в тисках. Боль, как от ушиба, в пояснице; хуже сидя согнувшись. Боль в копчике, как после падения на него.

**Конечности.** Боль в области крыльев таза, заставляющая хромать. Ишиас: ухудшение лежа; лежа на больном боку, сидя, стоя; пациент просыпается из-за боли ночью; лучше при ходьбе и при сгибании ног в коленях. Ревматическое воспаление коленного сустава с образованием выпота. Кончик большого пальца руки изъязвляется и становится желтым.

**Кожа.** Угри. Гигантская крапивница (отек Квинке). Мелкие фурункулы (нарывы) оставляют рубцы. Шершавая, узелки повсюду.

**Сон.** Громко плачет во сне, но не осознает этого.

**Лихорадка.** Ощущение холода в костях; в больных частях тела. Жар вечером. Раскрывается, потом мерзнет. Чередование жара и озноба. Жар сопровождается содроганием тела. Жар и сухость тела, затем — проливной пот. Обильные ночные поты, от которых становится лучше.

**Диф. диагноз.** Iod., Sulph., Syph.

## **KALI MURIATICUM**

**Общее.** Хлорид калия — это одно из тканевых средств доктора Шюслера. Это соединение вызывает *катаральное состояние*, сопровождающееся *МОЛОЧНО-БЕЛЫМИ*, вязкими, клейкими, *густыми*; слизистыми или в виде комочков выделениями. *Вязкий, фибринозный экссудат. Плотные налеты. Опухание желез. Болезненность, режущие или колющие, летучие (меняющие локализацию) боли.* Ощущение ползания мурашек.

Онемение. Болезненные последствия вакцинации. Растяжение связок. Ожоги. Удары, порезы. Эмболия. Симптомы локализуются в поперечном направлении. Медленная реакция. Стойкий инфильтрат.

**Хуже.** На открытом воздухе. От холодного питья. От сквозняков. От тепла постели. Лежа. Ночью. От сырости. От движения. От растяжения связок. *От жирного, от обильной пищи.* Во время менструации.

**Лучше.** От холодного питья. От растирания. Распустить волосы.

**Психика.** Недоволен, обескуражен. Боится зла. Сидит в тишине. Воображает, что должен голодать. Привычное отсутствие аппетита или отказ от еды. *Раздражается и сердится*, в том числе по пустякам.

**Голова.** Ощущение оглушительного удара в голове или свинцовой тяжести, тянущей затылок вниз; лучше - распустить волосы и от тепла. Кажется, что мозг болтается в голове. Белая перхоть в большом количестве. *Потливость головы.* Молочный струп.

**Глаза.** Пустулы на роговице. Катаракта. Трахома. Помутнение роговицы. Вспышки в глазах при кашле. Экссудат в сетчатке.

**Уши.** *Глухота: вследствие катарального воспаления и закрытия евстахиевых труб.* Когда пациент сморкается или делает глотательное движение, слышится треск в ушах. Хлопки, зуд или ощущение пробки в ухе. Опухание желез возле ушей. Болезненность евстахиевой трубы.

**Нос.** Насморк с заложенностью носа. Выделения белые, густые. Отхаркивает слизь из задних отделов носа.

**Лицо.** Синеватое; осунувшееся. Щеки опухшие, болят. Вслед за болью в лице возникает паралич. Мышцы лица подергиваются и дрожат; хуже от еды, от разговора или кашля. Свинка (паротит) без лихорадки.

**Рот.** Высыпания вокруг рта. Афты. Молочница. Белого цвета язвы во рту. Изменения десен, как при цинге. Язык географический; серый или белый у корня. Привкус соленый, горький; язык при этом холодный. Ощущение, как будто на языке растет опухоль.

**Горло.** Серовато-белое, изъязвленное; хронический тонзиллит. *Миндалины опухшие;* воспаленные; глотание крайне болезненное, пациент едва может дышать. *Отхаркивает густую белую слизь;* творожистые комочки.

**Желудок.** Жирная, питательная пища вызывает несварение желудка, пациент испытывает отвращение к ней. Тошнота: сопровождается дрожью, содроганием тела. Тяжесть в желудке; в том числе ночью. Рвота пищей. Голод исчезает после питья воды.

**Живот.** *Чувство переполнения после еды. Бледный,* жесткий или рыхлый стул. *Болезненность заднего прохода* усиливается от ходьбы или от стула. Зуд или ощущение ползающих мурашек в анусе после стула. Геморрой — кровоточащий; кровь темная, густая.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание по каплям — моча сочится. Цистит. Выделяется белая густая слизь.

**Женские половые органы.** Менструальная кровь темная, со сгустками, черная, как деготь; менструации слишком обильные. Бели: молочно-белого цвета, густые, не едкие. В молочных железах мягкие, чувствительные к прикосновению узлы. Боль в молочных железах перед менструацией или во время нее.

**Дыхательные органы.** *Затрудненное или стесненное дыхание.* Бронхит. Мокрота клейкая, как молоко, или вылетает изо рта. Ощущение саднения в груди. В грудной клетке ощущаются приливы жара.

**Сердце.** Ощущение холода в сердце.

**Шея и спина.** Тяжесть ниже правого плеча — под ним. Жужжание под правой лопаткой. Боль в спине уменьшается лежа. Стреляющие, как молния, боли распространяются из поясницы в стопы. Пациент должен подняться с постели и сесть.

**Конечности.** *Холодные кисти* и стопы. Руки деревенеют, когда пишет или вяжет. Судороги в конечностях; в голени. Подергивание в бедрах. Напряжение в голени чередуется с напряжением в руке. Холодный пот на стопах. Режущие боли в костях. Выпот и опухание в области суставов. Хруст в сухожилиях; в том числе тыла кисти.

**Кожа.** Отрубевидное шелушение. Бурсит. Высыпания, связанные с болезнью желудка или расстройством менструаций.

**Сон.** Тревожные сны.

**Дополнительно.** Calc-s.

**Диф. диагноз.** Bry., Ferr-p., Puls.

## **KALI NITRICUM**

**Общее.** Нитрат калия поражает *органы дыхания*, почки, сердце и кровеносные сосуды. Секреция повышена, выделения скапливаются в полостях. Внезапный отек всего тела.

Кали нитрикум часто бывает показан при гнойном нефрите, бронхиальной астме и сердечной астме. Боли *в виде тупого покалывания;* пульсирующие. Одеревенение, онемение. Рецидив туберкулеза легких. Пациент очень слабый. Склонность к кровотечениям.

**Хуже.** *От ходьбы.* От холода. От сырости. При простуде. Если поест телятины. Лежа с низко опущенной головой. При дыхании.

**Лучше.** От спокойного движения. Когда пьет воду маленькими глотками.

**Психика.** Ощущение усталости, утомления, если пациент не занят каким-нибудь делом или если ему не интересно. Обескуражен, растерян и боится смерти.

**Голова.** Приступы потери сознания, сопровождающиеся головокружением, возникают утром; усиливаются, когда пациент стоит; лучше — сидя. Боли в затылке; лучше - распустить волосы. Головная боль уменьшается от езды в экипаже. При боли дергает себя за волосы.

**Глаза.** Внешний угол правого глаза подергивается, сильнее при жевании.

**Уши.** Хроническая глухота вследствие паралича слухового нерва. Головокружение и шум в ушах.

**Нос.** Ощущение опухания, сильнее в области правой ноздри. Кончик носа красный и чешется. Полип носа.

**Рот.** Язык красный, со жгучими папулами.

**Желудок.** Тошнит, как будто вот-вот вырвет; хуже ночью. Боли из эпигастрия или за грудиной боли распространяются в подмышечную область.

**Живот.** Понос из-за употребления в пищу телятины. Жидкий, водянистый, темный, кровавый стул.

**Мочевыделительная система.** Учащенное и обильное выделение прозрачной мочи. Несахарный диабет. Тупые боли в почке.

**Женские половые органы.** Обильные менструации — черная, как чернила, кровь.

**Дыхательные органы.** Учащенное, затрудненное дыхание — пациент ловит ртом воздух; сидит выпрямившись. *Сильнейшая одышка*, она сопровождается жжением в груди, тупым колющим и тошнотой; пациент испытывает жажду, *но пить может только маленькими глотками*. Конгестия (полнокровие) правого легкого. Астма. Когда свободно отхаркивается кислая мокрота, наступает облегчение.

**Сердце.** Сердцебиение усиливается лежа.

**Спина.** Боли распространяются в грудь.

**Конечности.** Кисти и пальцы на руках кажутся опухшими.

**Лихорадка.** *Холод снаружи, на поверхности тела:* холодный подбородок, холодная кожа. Жжение внутри.

**Диф. диагноз.** Camph., Glon.

## **KALI PHOSPHORICUM**

**Общее.** Это великое тканевое средство доктора Шюслера для лечения заболеваний, *возникающих вследствие недостатка нервной энергии*.

Пациент *НЕРВНЫЙ; ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, СЛАБЫЙ И ЛЕГКО ИСТОЩАЕТСЯ*; это происходит в результате воздействия незначительных причин, таких как *боль, заботы, нервное утомление и т.д. Неврастения*.

Паралич; у младенцев; в том числе при прорезывании зубов. Паралитическая слабость; или боль с ощущением паралича. Кали фосфорикум полезен также при состояниях, которые характеризуются адинамией и распадом тканей; при гангрене; при подозрении на злокачественную опухоль.

Запах у выделений *ГНИЛОСТНЫЙ*, похожий на запах падали; зловонный запах от тела. Выделения золотисто-желтые. Колющие боли. Кали фосфорикум показан после хирургических операций, когда в процессе заживления раны кожа бывает туго натянута, особенно в случае рака.

Последствия механических повреждений, горя, неприятностей, разочарования. Сексуальное возбуждение, которое сопровождает сексуальные излишества или подавление желания. *Нерегулярные менструации*, аритмичный (нерегулярный) пульс и т.д. Незначительная боль. Исхудание; истощающие болезни. Септические состояния и септическая лихорадка (септицемия). Карбункулы. Кровотечения. Прогрессирующая мышечная дистрофия. Морская болезнь, не сопровождающаяся тошнотой.

**Хуже.** От незначительных причин: *от волнения, от забот; нервного* или физического утомления. От прикосновения. От боли. От холода. От сухого воздуха. В пубертатном возрасте. От еды. От коитуса.

**Лучше.** От сна. От еды. От спокойного движения. Опереться на что-нибудь.

**Психика.** Робкий, нерешительный пациент, испытывает нервный страх; легко пугается, вздрагивает. Самая незначительная работа кажется тяжелой задачей. Не желает встречаться с людьми или разговаривать с ними. Подавлен; мрачен. Сердится, гневается. Извращенное чувство привязанности, отвращение к своим близким: жестокость по отношению к мужу, к ребенку. Раздражительность; дети плачут и кричат, приходят в ярость, едва могут внятно говорить. Полон предчувствий по поводу будущего, по поводу своего здоровья. Страх толпы, смерти и т.д. Забывчивость. Ночные кошмары. Религиозная меланхолия.

**Голова.** Головокружение возникает, когда пациент стоит лицом к солнцу; усиливается при взгляде вверх, когда поднимается в постели, садится. Головная боль: у студентов; усиливается перед менструацией и во время нее; уменьшается от спокойного движения. Нервное истощение. Пониженное кровоснабжение головного мозга. Голод сопровождается головной болью.

**Глаза.** Жжение, жгучая боль; глаза залиты слезами. Желтовато-серый, как молоко секрет. *Веки нависают, опущены* (слева). Ретинит. Слабое зрение. Потеря способности к восприятию. Косоглазие; в том числе после болезни головного мозга. Черные пятна перед глазами.

**Уши.** Гудение и жужжание в ушах. Слух обострен, пациент не выносит шума. Глухота из-за атрофии слухового нерва.

**Нос.** Зуд в задних отделах носа. Жестокое чихание в сочетании с признаками свежей простуды; в 2 ч ночи. Кали фосфорикум показан при сенной лихорадке (поллинозе), в том числе для профилактики.

**Лицо.** *Печальное лицо, вид измученного заботами человека.* Коричневая полоса по краю роста волос. Лицевая невралгия уменьшается от прикладывания холода.

**Рот.** Ощущение, что нёбо покрыто жиром. Язык желтый, как жидкая горчица. Афты. Зловонное дыхание. Крайняя сухость во рту; как будто язык может прилипнуть к нёбу. Десны: рыхлые, отстают от зубов, кровоточат; в

сочетании с зубной болью. Речь медленная, становится невнятной. Прогрессирующий (ползучий) паралич языка. Пациент нервничает, стучит зубами. Нома.

**Желудок.** Страстное желание воды со льдом, уксуса, сладостей. *Голоден; в том числе, вскоре после еды.* Тошнота: уменьшается от отрыжки, усиливается от кашля. Ощущение пустоты под ложечкой нервного происхождения; лучше от еды. Отвращение к пище, к хлебу, к мясу. Не хочется ничего, кроме сладостей.

**Живот.** Понос: стул зловонный, с гнилостным запахом; горячий; золотисто-желтый; безболезненный; возникает от испуга; после него ощущается слабость. Режущая боль в животе. Дизентерия — стул представляет собой чистую кровь. Стул в виде рисового отвара при холере. Парез прямой кишки и толстого кишечника после хирургической операции по поводу геморроя. Энтероколит. Пациент чувствует холод в животе, лучше укрыться.

**Мочевыделительная система.** Моча шафранно-желтая или как молоко. Ночное недержание мочи (энурез); характеризуется упорным течением у нервных, возбудимых детей; бывает у стариков. Кровотечение из уретры. Мочеиспускание прекращается, затем возобновляется.

**Мужские половые органы.** Сексуальное возбуждение; однако возникает упадок сил и снижение зрения после коитуса; или после ночных поллюций.

**Женские половые органы.** Менструации нерегулярные; слишком поздние; слишком скудные. Сильное сексуальное желание в течение 4 или 5 дней после менструации. Задержка менструации при депрессии.

Ужасно зловонные бели. Периодически в большом количестве выделяется оранжевого цвета жидкость из влагалища и прямой кишки. Слабые и неэффективные родовые схватки.

**Дыхательные органы.** Афония; из-за паралича голосовых связок. Нервная астма — хуже от малейшего количества еды. Одышка усиливается при ходьбе вверх по лестнице. Кашель, сопровождающийся отхаркиванием желтой мокроты.

**Сердце.** Пульс аритмичный. Сердцебиение: хуже от малейшего движения или при подъеме по лестнице.

**Шея и спина.** Паралитическая слабость в спине (спина "отказывает"); пациент должен опереться о стул. Пот под мышками пахнет луком. Повышенная возбудимость (раздражение) спинного мозга. Ощущение ползания мурашек и сильная боль вдоль позвоночника облегчают головную боль.

**Конечности.** Покалывание в кистях и стопах. Онемение кончиков пальцев рук. Ощущение, что обморозил стопу. Боли в подошвах. Паралитическая слабость в конечностях. Беспокойство в стопах.

**Кожа.** Синие пятна на коже. Кожа вялая, неактивная. Холодная кожа. Желтуха.

**Сон.** Ночные кошмары; в том числе у детей. Сонливость. *Звота.* Снохождение (сомнамбулизм). Бессонница вследствие забот, проблем на работе и т.д. Эротические сновидения; двигательное беспокойство и жар во время сна.

**Лихорадка.** Пониженная температура тела.

**Диф. диагноз.** Caust., Cocc, Pic-ac, Zinc.

## KALI SULPHURICUM

**Общее.** Это тканевое средство доктора Шюсслера оказывает воздействие на слизистые оболочки органов дыхания и кожу — на коже возникает *шелушение*. **ВЫДЕЛЕНИЯ ОБИЛЬНЫЕ И ТЕМНО-ЖЕЛТЫЕ, жидкие** или клейкие. Вялотекущие процессы. *Нагноение. Боль колющая, рвущая, как при нарыве, блуждающая.* Недостаточная реакция организма. Рак, опухоль эпителиального происхождения. Болезненные последствия охлаждения после перегревания; последствия травмы. Прекращение роста ногтей.

**Хуже.** *От тепла;* в теплом помещении, от теплого воздуха. От шума. От утешения. Вечером.

**Лучше.** *От прохладного воздуха.* От ходьбы. Когда голодает.

**Психика.** *Торопливый.* Раздражительный. Хочется лечь, но лежа становится хуже, поэтому пациент ходит, чтобы облегчить состояние. Пугается по пустякам. Вещи, которые хотел получить, отвергает.

**Голова.** Желтая перхоть; мокнущая; клейкая. Парша. Гнездное облысение (после гонореи).

**Глаза.** Воспаление глаз у новорожденных. Желтые слизисто-гнойные выделения при заболеваниях глаз.

**Уши.** Глухота, связанная с поражением евстахиевых труб. Водянистые, клейкие, жидкие, желтые выделения; зловонные выделения; в том числе при полипах.

**Нос.** Прилив крови к слизистым оболочкам носа и гортани, сопровождающийся дыханием через рот, храпением и т.д. — после удаления аденоидов.

**Лицо.** Тупые боли возникают в нагретом, жарком помещении. Эпителиома.

**Рот.** *Желтый, покрытый слизью язык.* Потеря вкуса и обоняния.

**Желудок.** Ощущение, как будто тяжелый груз давит на желудок. Страх горячих напитков. Страстное желание сладостей.

**Живот.** Кажется холодным во время колики. Твердый, вздутый живот (тимпанит) при коклюше. Ощущение пустоты внизу живота уменьшается после отхождения кишечных газов.

**Мочевыделительная система.** Оксалаты в моче. Пиелит.

**Мужские половые органы.** Гонорея: хронический гонорейный уретрит, слизистые желтовато-зеленые выделения.

**Женские половые органы.** Менструации сопровождаются ощущением тяжести в животе. Бели желтоватые, водянистые.

**Дыхательные органы.** *Грубые хрипы в груди.* Охриплость при крупе. Бронхит. Астма: легко отхаркивается желтая мокрота; а также слизистая мокрота.

**Конечности.** Боли, меняющие локализацию, блуждающие. Ревматизм, хуже от жара, тепла. Узлы в области суставов вследствие артрита.

**Кожа.** Желтая кожа при желтухе. Сильное *шелушение* кожи. Язвы, сочится **ЖЕЛТАЯ ЖИДКОСТЬ**. Псориаз. Крапивница. Сухая кожа. Экзема; опрелости.

**Лихорадка.** *Легко возникает обильное потоотделение.* Перебегающая лихорадка; температура поднимается ночью.

**Диф. диагноз.** Puls., Tub.

## KALMIA LATIFOLIA

**Общее.** Кальмия поражает *НЕРВЫ, СЕРДЦЕ, кровообращение.*

Боли невралгического характера, сопровождаются пощипыванием, онемением; дрожанием или паралитической слабостью. Боли быстро меняют локализацию; *направленные наружу* стреляющие боли *по ходу нервов*; эти боли сопровождаются сильной тошнотой и медленным пульсом. *Ноющие боли, ощущение скованности, как после ушиба.* Тупая, рвущая, раздавливающая боль, *перемещающаяся вниз*; эти боли чередуются с сердечными симптомами или возникают попеременно то в верхних, то в нижних конечностях. Ревматизм, поражение суставов при сифилисе. Невралгия после исчезновения герпетических высыпаний. От движения наступает ухудшение. Альбуминурия. Выраженная слабость при невралгии.

**Хуже. ОТ ДВИЖЕНИЯ.** Лежа на левом боку. При сгибании тела вперед. Когда смотрит вниз. От жара, от солнечного тепла. Если замерзнет. В соответствии с положением солнца над горизонтом. От восхода солнца до заката. При наклоне. При белях.

**Лучше.** *От еды.* В пасмурную, облачную погоду. От продолжительного движения. Откинувшись на подушки, полулежа.

**Психика.** Память и умственные способности отличные, если полулежит, сидит откинувшись назад.

**Голова.** Головокружение: сопровождается головной болью, слепотой, болями в конечностях и усталостью; хуже при наклоне; когда смотрит вниз. Треск в голове пугает пациента, из-за него в ушах возникает звук, напоминающий гудок, звучание рога. Головная боль усиливается и уменьшается в соответствии с движением солнца над горизонтом. Стреляющая боль из задней части шеи в темя и лицо. Доводящая до безумия боль над глазницей (справа).

**Глаза.** Тянувшее ощущение, чувство скованности возникает, когда пациент двигает глазами. Когда смотрит вниз, в глазах чернеет. Ирит. Склерит. Скованность в веках ("деревенеют"). Ретинит при болезни почек (альбуминурии), особенно в время беременности.

**Уши.** Шум в ушах, напоминающий гудок, звучание рога, рожка.

**Нос.** Насморк; в том числе, сопровождающийся обостренным обонянием.

**Лицо.** Приливы крови, румянец при головокружении. Невралгия: сильнее справа, хуже от пребывания на холоде; лучше от еды. Колотье и рвущая боль в челюстях. Губы деревенеют, сухие, опухшие.

**Рот.** Колотье в языке. Покалывание, пощипывание в слюнной железе. Горький привкус во рту, сопровождается тошнотой, уменьшается от еды. Ощущение усталости в жевательных мышцах.

**Желудок.** Боль под ложечкой: хуже — при сгибании тела вперед, лучше — сидя выпрямившись. Ощущение, как будто что-то прижато, давит снизу на эпигастрий. От вина уменьшается рвота.

**Мочевыделительная система.** Альбуминурия; сопровождается болями в нижних конечностях. Учащенное мочеиспускание с выделением большого количества желтой мочи; это способствует уменьшению головной боли.

**Женские половые органы.** Подавление менструаций при сильных невралгических болях, пронизывающих все тело. Бели появляются через неделю после менструации; симптомы усиливаются во время белей.

**Сердце.** Трепетание сердца сопровождается тревогой. Боли: резкие, жгучие, стреляющие, пронзающие (как ножом), распространяющиеся в левую лопатку и руку; *сопровождаются одышкой (перехватывает дыхание), замедлением пульса.* Сердцебиение: усиливается при сгибании тела вперед; распространяется вверх, в горло, появляется после укладывания в постель, сопровождается видимым на глаз дрожанием всего тела; хуже, когда пациент лежит на левом боку; лучше — лежа на спине. Гипертрофия миокарда; недостаточность сердечных клапанов. Стеноз аорты. Сердце курильщика. *Пульс медленный, слабый, дрожащий.*

**Шея и спина.** Боль из шеи распространяется вдоль руки вниз; брахиалгия. Боль распространяется вниз вдоль спины, сопровождается ощущением, что спина ломается. Боль в пояснице нервного происхождения; сопровождается жаром и жжением.

**Конечности.** Ревматическое поражение дельтовидной мышцы справа. Боли охватывают большую часть конечности. Слабость, онемение, покалывание, как иголками, и ощущение холода в конечностях. Пощипывание и онемение левой руки (при болях в сердце). Боли распространяются вдоль локтевого нерва в мизинец или в безымянный палец. Суставы красные, горячие, опухшие.

**Кожа.** Натянута; сухая кожа.

**Сон.** Бессонница; пациент часто переворачивается в постели; просыпается утром очень рано.

**Лихорадка.** Затяжные и продолжительные лихорадки, сопровождающиеся сильным вздутием живота (тимпанитом).

**Дополнительно.** Benz-ac, Spig.

**Диф. диагноз.** Acon., Dig., Rhus-t., Spig.

## КОВАЛТУМ

**Общее.** Этот металл поражает позвоночник (поясничную область); половые органы, почки и кости; он бывает полезен при неврастении спинномозгового происхождения; в том числе сопровождающейся сексуальными расстройствами.

**Выделения пенистые.** Ощущение болезненности. Тупые боли в костях. Кислый привкус во рту, повышенная кислотность желудочного сока, кислый пот на стопах и т.д. Повышенная утомляемость.

**Хуже.** От потери спермы. Сидя. От жара постели или от солнечного тепла. Утром.

**Лучше.** Откашливать слизь. От непрерывного, продолжительного движения.

**Психика.** Чувство вины. Любое психическое возбуждение усиливает симптомы заболевания. Невысокого мнения о себе, считает себя ничтожеством.

**Голова.** Головокружение с ощущением, как будто голова увеличивается, хуже от стула. Головная боль усиливается при наклоне; от сотрясения. Ощущение, что мозг перемещается вверх и вниз, когда пациент делает шаг.

**Глаза.** Светобоязнь весной. Весенний катар. Возникает пронзающая боль в глазах, когда пациент выходит на солнечный свет.

**Лицо.** Склонность держать челюсти плотно сжатыми.

**Рот.** Зубы кажутся слишком длинными. Язык покрыт белым налетом. **Трещины поперек середины языка.**

**Кислый привкус во рту.**

**Желудок.** При боли в желудке отрыгивается кислая или горькая жидкость.

**Живот.** Стреляющая боль распространяется из области печени вниз, в бедра. Ощущение пустоты в области пупка. Позыв на стул: возникает во время ходьбы, усиливается, когда пациент стоит на месте; после этого возникает понос. Постоянно капает кровь из ануса; кровотечения в связи со стулом нет. Желтые пятна на животе. Стреляющие боли в области печени и резкие боли в области селезенки усиливаются, когда пациент делает глубокий вдох.

**Мочевыделительная система.** Альбуминурия. Жгучая боль в наружном отверстии уретры в конце мочеиспускания. У мочи сильный, едкий запах.

**Мужские половые органы.** Боль в правом яичке, уменьшающаяся после мочеиспускания. Частые ночные поллюции, при этом пациент видит сладострастные сновидения, у него возникает головная боль и боль в спине. Желто-коричневые пятна на половых органах. Выделение спермы без эрекции (сперматорея). Импотенция.

**Дыхательные органы.** Кашель с отхаркиванием большого количества пенистой, сладковатой белой слизи, содержащей комочки.

**Спина.** Ноющая боль *в поясничной области*; хуже от коитуса; сидя; лучше - встать, ходить или лежать; при боли отмечается слабость в коленях; пациент не может их выпрямить. Слабость и боль в спине после поллюций. Боль распространяется вдоль позвоночника, а также из крестца — вниз, через голени — в стопы.

**Конечности.** Стреляющая боль из области печени распространяется в конечности. Слабые колени. Приливы жара вдоль голеней. Дрожание конечностей, особенно голеней, ноющая боль — когда пациент сидит. Стопы потеют, в основном, между пальцами, запах пота кислый. Пощипывание, покалывание, как иголками, в стопах. Внезапная слабость в левом боку (в области крыла таза), хуже при ходьбе.

**Сон.** Пациент бодрствует, не спит; может довольствоваться непродолжительным сном. Сон нарушается из-за сладострастных сновидений. Сонливость, дремота, никак не может выспаться.

**Кожа.** Папулы в области ягодиц, подбородка, волосистой части головы. Когда пациент согревается в постели, ощущается зуд повсюду.

**Диф. диагноз.** Eur-per.

## КРЕОСОТУМ

**Общее.** Это вещество — смесь фенолов, получаемых при очистке древесной смолы.

Креозот воздействует на слизистые оболочки *ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА, женских половых органов*; разрушает *КРОВЬ*.

Образуются ссадины (эксориации). Ощущается *жжение, как от огня. Обильные, ЕДКИЕ, ГОРЯЧИЕ, ЗЛОВОННЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ*; а также *отрыжки*, мокрота и т.д.; в местах соприкосновения с выделениями появляется *покраснение*. Комковатые выделения: менструальная кровь и т.д. *Кровотечения*: пассивные, кровь коричневая, темная; кровотечения из маленьких ранок. Образование опухолей. Ощущение полноты. Ощущение тяжести. Цинга. Рак. Гангрена.

Выраженная слабость, при этом пациент чувствует себя несчастным. Гомеопатический Креозот соответствует худым людям, старым женщинам (заболевания постклимактерического периода); чрезмерно быстро выросшим и плохо развитым детям; Креозот соответствует истощению, ма разму.

*Черного цвета* зубы, бели, лохии и т.д. Быстрое исхудание. Недомогания, сопровождающие зевоту. Дети не засыпают, если их не приласкают, не погладят. *Пульсация* во всем теле. Тяжелые застарелые невралгии. Врожденный сифилис.

**Хуже.** ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ЗУБОВ. Во время беременности. В покое. От холода. От еды. Лежа. Летом. От плохих запахов. Во время менструации. С 18 до 6 ч. От коитуса. От прикосновения. От растяжения связок.

**Лучше.** От тепла. От горячей пищи. От движения. От давления. После сна.

**Психика.** Пациент *недоволен* всем; требует вещи, потом отбрасывает их и требует что-то другое. Кричит ночью (ребенок). Музыка вызывает плач и сердцебиение. Страх у женщин при мысли о коитусе. *Несговорчивый, сердитый; своенравный и упрямый*. Тупой, бестолковый. Страстно желает смерти, стремится к ней. При прорезывании зубов ребенок все время стонет или дремлет с полуоткрытыми глазами, или сердится и не спит.

**Голова.** Тупая боль, как от доски, прижатой ко лбу. Жужжание в голове. Кожа головы чувствительная, хуже от причесывания волос. Выпадение волос.

**Глаза.** Горячие, едкие, жгучие слезы. Веки красные и опухшие. Глазные симптомы чередуются с симптомами поражения конечностей. Постоянное дрожание век.

**Уши.** Пациентка плохо слышит перед менструацией и во время нее.

**Нос.** Отвратительный запах, в том числе от выделений. Хронический катар у стариков.

**Лицо.** Желтоватая бледность и красные пятна; возникают во время озноба или жара. Болезненное, страдальческое выражение лица; дети выглядят, как старички. Жгучие боли: хуже от разговора или от напряжения; лучше лежа на больном боку. Губы красные, кровоточат. Пациент часто смачивает губы, хотя жажды нет.

**Рот.** *ОЧЕНЬ БЫСТРО ПРОИСХОДИТ РАЗРУШЕНИЕ ЗУБОВ*; ощущается гнилостный запах изо рта. Черные пятна на зубах. *Отечные, синеватые, рыхлые, кровоточащие десны*. Невыносимая зубная боль во время беременности. Очень болезненное прорезывание зубов. Афты или слюнотечение во время беременности. Горький вкус ощущается глубоко в горле. Зловонное дыхание. Гетчинсоновские зубы.

**Горло.** Жгучее удушливое ощущение в горле. Горький привкус возникает, когда пациент глотает пищу; после питья воды.

**Желудок.** Отрыжки горячие; пенные. Тошнота. Рвота: в том числе пищей через несколько часов после еды; рвота сладковатой жидкостью утром; в том числе при беременности; рвота непереваренной пищей; в том числе при изъязвлении матки (шейки матки); при раке желудка.

Ощущение ледяного холода в желудке. Кровавая рвота. Страстное желание копченого мяса. От холодной пищи становится хуже. От голодания становится хуже — пациент не может выдержать поста, не может голодать. Отвращение к пище в период выздоровления. Болезненный твердый участок на желудке.

**Живот.** Вздутие живота. Понос: кровавый, темный, коричневый, в стуле непереваренная пища; зловонный стул. Зеленый стул при прорезывании зубов. Во время стула ребенок отбивается и кричит, как будто у сейчас начнется припадок. Болезненность, хуже от глубокого дыхания. Сжатие прямой кишки при раке матки.

**Мочевыделительная система.** Ощущение, как будто глыба (ком) давит на мочевой пузырь. *Мочеиспускание*: учащенное; происходит *непроизвольно, когда пациент лежит*, при кашле. Может помочиться только в положении лежа. Сны о мочеиспускании. Недержание мочи (энурез) в первой половине ночи. Моча зловонная. Учащенное мочеиспускание, сопровождающееся обильным выделением мочи в течение дня. Диабет. Выпивает много жидкости, но выделяет за одно мочеиспускание мало мочи.

**Мужские половые органы.** Жжение в половых органах во время коитуса из-за соприкосновения с едкими влагалищными выделениями, половой член опухает на следующий день. Крайняя плоть синевато-черная, при кровотечениях и гангрене.

**Женские половые органы.** Менструации: обильные, в виде комочков; прерывистые; хуже лежа; лучше сидя или при ходьбе. Менструации усиливаются от поднятия тяжести, от перенапряжения. Колотье во влагалище заставляет женщину вздрагивать.



**Бели:** выделяются *сплошным потоком*; напоминают воду, окрашенную кровью; они зловонные; едкие; вызывают зуд, окрашивают белье в желтый цвет; имеют сопутствующие симптомы; бели могут быть белого цвета, с запахом незрелой кукурузы.

Жесткая боль во время коитуса; жжение в половых органах с последующим выделением темной крови; в том числе на следующий день. Сильный зуд наружных половых органов и влагалища, хуже во время мочеиспускания.

Лохии комковатые, зловонные, выделяются с перерывами. Рак, эрозия шейки матки. Атрофия молочных желез с образованием мелких, твердых, болезненных узлов в них.

**Дыхательные органы.** Охриплость сопровождается болью в гортани, уменьшается от чихания. Кашель: с выделением небольшого количества мокроты или с обильной гнойной мокротой, выделяющейся каждый раз после кашля; кашель после гриппа. Кашель зимой у стариков, сопровождающийся сильным давлением в области грудины. Боль глубоко в грудной клетке. Жжение, как от горячих углей в груди. Гангрена легких. Пери одическое кровохарканье. Запущенный туберкулез легких.

**Сердце.** Колотье в области сердца. Когда пациент в покое, ощущается пульсация во всех артериях.

**Спина.** Тянущая книзу боль в спине, распространяющаяся в половые органы и ниже, в бедра; ощущение, как будто все вывалится (у женщин); при этом возникает позыв на стул и мочеиспускание, при белях. Жжение в крестце, лопатках, как будто они ушиблены.

**Конечности.** Боль в тазобедренном суставе (слева); когда пациент стоит, возникает ощущение, что голень слишком длинная. Боль в большом пальце левой руки, как при растяжении связок.

**Кожа.** Сильный зуд, мокнущая или с отрубевидным шелушением экзема век, лица, суставов, тыла кистей. Мелкие ранки сильно кровоточат. Язвы появляются и заживают; кровоточат после коитуса. Крапивница после менструации.

**Сон.** Сон нарушен из-за беспокойства во всем теле или сопровождается ощущением усталости и болями во всех конечностях. Беспокойно мечется всю ночь без видимой причины. Сновидения о мочеиспускании.

**Лихорадка.** Холодный пот.

**Дополнительно.** Sulph.

**Диф. диагноз.** Ars., Arum-t., Carb-ac, Graph., Nit-ac, Psor.

## LAC CANINUM

**Общее.** Сучье молоко воздействует на *ГОРЛО, НЕРВЫ* и *женские половые органы*.

Оно вызывает повышенную чувствительность *НЕРВОВ*, которая приводит к двигательному беспокойству, нервозности, упадку сил и появлению ненормальных ощущений: человек не выносит, когда части его тела соприкасаются друг с другом; он должен, например, держать пальцы растопыренными.

**СИМПТОМЫ ВОЗНИКАЮТ ПООЧЕРЕДНО ТО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ТО С ДРУГОЙ.** Симптомы переходят *справа налево*, затем снова направо, или *наоборот*; это относится к горлу, яичникам, кожным болезням и т. д. Больное место *блестит*; в том числе при воспалении; в области язвы и т. д.

Лак канинум прекращает лактацию у женщин, которые не могут кормить ребенка грудью. Дифтерия и дифтерийный паралич. Озена. Летучие, изменчивые боли; или непостоянство симптомов. Последствия падения.

**Хуже.** ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ. От сотрясения. Во время менструации. От холодного воздуха: от холодного ветра или сквозняков. Утром одного дня и вечером следующего дня. После сна.

**Лучше.** На открытом воздухе. От холодного питья.

**Психика.** Много фантазий; ужасные видения; видит змей; насекомых — всяких мерзких тварей и т.д. Пациент очень забывчивый; делает ошибки, когда пишет и говорит. Любой симптом кажется пациентке определенной болезнью; и эта болезнь неизлечима. Страх болезни; страх падения с лестницы. Ребенок своенравный, сердитый и раздражительный, кричит все время, особенно ночью. *Уныние, подавленность*. Приступы ярости. Истерика на пике оргазма. У пациента ощущение, как будто он идет по воздуху или что он не касается постели, когда ложится. Пациент считает себя ничтожеством. Рассеянный. Воображает, что у него нос, принадлежащий кому-то другому. Пациентка полагает, что все произносимое ею — ложь. Припадки; в том числе плача. Тело пациента кажется ему отвратительным.

**Голова.** Боли возникают попеременно то с одной, то с другой стороны. Неясное зрение. Тошнота и рвота на высоте приступа головной боли; боль усиливается от шума, разговора; уменьшается в тишине. Ощущение, как будто мозг поочередно то сжимается, то расслабляется.

**Глаза.** Пациентка видит лица перед глазами, особенно в темноте. Видит насекомых, паразитов, ползающих тварей. Веки тяжелые.

**Уши.** Шумы в ушах. Звуки голоса отдаются в ушах, как будто говорит в большом пустом помещении. Звук кажется очень удаленным. Глухота вследствие врожденного сифилиса.

**Нос.** Насморк: одна ноздря заложена, другая свободна, из нее выделяется секрет. Обильные выделения из носа ночью — гнойные, окрашивающие подушку в зеленовато-желтый цвет. Когда пьет, жидкости вытекают через нос. Трещины на крыльях носа. Кажется, что от запаха цветов по телу женщины пробегает озноб.

**Лицо.** Бледное, со следами забот, тревожное. Треск в челюстных суставах при жевании.

**Рот.** Язык покрыт белым налетом, ярко-красный по краям. Гнилостный привкус во рту, хуже от сладкого. Разговаривать трудно, говорит в нос (при заболевании горла нервного происхождения). Слюнотечение при дифтерии — слюна капает изо рта. Скованность, одеревенение языка. Трещины в углах рта. Заикается, когда говорит быстро; вынужден говорить медленнее. Повышенное слюноотделение.

**Горло.** АНГИНА; в горле блестящие, белые, как фарфор, бляшки, или красные и блестящие; тонзиллит и дифтерия; симптомы перемещаются с одной стороны на другую неоднократно; лучше от холодного питья, или от теплых напитков, но хуже, когда делает глотательное движение (пустое). Боли в горле появляются и исчезают одновременно с менструацией. Глотание затруднено — хуже, когда глотает твердую пищу; боль распространяется в уши.

**Желудок.** Страстное желание: молока — пациент пьет много молока; сильно приправленной, пряной пищи. Отвращение к жидкостям, особенно к воде, ко всему сладкому. Ощущение пустоты в эпигастрии, как будто всё провалилось, при тошноте. Естественным, нормальным кажется только вкус соленой пищи. Тошнота уменьшается от отрыжки. Вся пища, кроме рыбы, вызывает ухудшение самочувствия пациентки.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная, мочеиспускание редкое. Мочеиспускание однократное за 24 часа, затем обильное, но сопровождающееся некоторым затруднением и незначительным раздражением. Ночной энурез (Лак канинум — специфическое средство при ночном недержании мочи). После мочеиспускания кажется, что мочевого пузыря полный.

**Женские половые органы.** Половые органы крайне возбудимы, возбуждение усиливается, если положить руку на грудь; от давления на наружные половые органы в то время, когда женщина сидит, или от легкого трения, которое возникает при ходьбе.

Менструации: кровь течет сплошным потоком; кровь горячая, как огонь; менструации слишком ранние; кровь ярко-красная; менструации обильные; выделения зеленого цвета или с запахом аммиака.

Выделение газов из влагалища.

Бели: обильные, в том числе днем; отсутствуют ночью; усиливаются, когда женщина стоит и идет.

Молочные железы набухшие, болезненные, сильнее от малейшего сотрясения; пациентка вынуждена крепко придавливать грудь, когда спускается или поднимается по лестнице; хуже перед менструациями, лучше с началом менструации. Постоянная боль в сосках. Лак канинум ПРЕКРАЩАЕТ ЛАКТАЦИЮ. Галакторея. Скудная секреция молока.

**Дыхательные органы.** Охриплость во время менструации. Кашель из-за постоянного щекотания в горле. Ключицы болезненные при прикосновении.

**Сердце.** Боль в сердце возникает, когда пациент поднимается по лестнице или спускается вниз.

**Шея и спина.** Скованность в шее. Тупые боли в позвоночнике, начиная с основания мозга и заканчивая копчиком; позвоночник очень чувствителен к прикосновению или давлению. Ощущение, что холод ползет вниз вдоль спины. Судороги в стопах.

**Конечности.** Ишиас. Конечности холодные до коленей. Постоянная боль в правом боку (в области крыла таза). Ревматические боли, которые перемещаются с одной стороны тела на другую. Болезненность пяток.

**Сон.** Видит во сне змей. Спит одну ногу согнув, а другую выпрямив. Видит во сне мочеиспускание. Просыпается ночью с ощущением, что постель двигалась.

**Диф. диагноз.** Lach., Lyss., Puls.

## LAC DEFLOMATUM

**Общее.** Снятое молоко полезно при заболеваниях, сопровождающихся нарушением УСВОЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, пониженным ПИТАНИЕМ; при анемии.

Пациентка чувствует себя совершенно изнуренной, истощенной, независимо от того, работала она или нет; сильное утомление от ходьбы. Ощущение, как будто на женщину дует холодный воздух, даже если она укрыта; как будто простыни влажные. Симптомы появляются после бессонницы, лишения сна. Отеки: из-за органического поражения сердца; из-за хронического заболевания печени. Взрослые люди или дети, которым становится дурно после употребления молока. Ожирение.

**Хуже.** ОТ ХОЛОДА; от малейшего сквозняка. От сырости. Если опустить руки в холодную воду. От молока. От бессонницы. Каждую неделю. В закрытом пространстве.

**Лучше.** В покое. От давления повязки. От беседы.

**Психика.** Унылый, подавленный; лучше от беседы; не хочется жить; страха смерти нет, но уверен, что скоро умрет. Страх закрытого пространства.

**Голова.** Головокружение: усиливается, когда пациент лежит на левом боку; когда поднимает голову с подушки; когда переворачивается в постели; при этом вынужден подняться, сесть в постели. Слепота, затем пульсирующая головная боль, сопровождающаяся выделением большого количества бледной мочи; хуже от шума, света, движения, во время менструации; лучше от повязки, от беседы. Мигрень; прекращается с заходом солнца. Мучительные ощущения в голове после травмы. Обморочная слабость возникает, когда пациент вытягивает руки над головой. Кажется, что череп поднят вверх. Постоянные головные боли, в течение многих лет. При кашле появляется ощущение болезненности головы.

**Глаза.** Светобоязнь: даже свет от свечи невыносим. При головной боли возникает ощущение, что глаза наполнены мелкими камешками.

**Лицо.** Лицо бледное, болезненный вид. Безболезненное опухание лица.

**Желудок.** *Отвращение к молоку. Тошнота* и рвота, сопровождающиеся ощущением смертельной дурноты. Непрекращающаяся рвота, не связанная с едой, сначала рвет неперевааренной пищей; рвотные массы кислые; затем возникает рвота горькой жидкостью; в том числе при беременности. У детей возникает насморк после питья молока.

**Живот.** Запор с безрезультатными позывами. Стул *объемный, твердый; пациент сильно тужится, возникает повреждение (разрыв) заднего прохода.* Стойкий запор; улучшение наступает только от слабительных или от клизмы; при таком запоре возникают жестокие приступы мигрени.

**Мочевыделительная система.** Ковыряющая боль в почках, болезненность. Учащенное и обильное мочеиспускание при головной боли или при других болях. Непроизвольное мочеиспускание при ходьбе на холодном воздухе, во время езды в автомобиле, или когда торопится, чтобы не опоздать на поезд. Не чувствует, когда мочевой пузырь полон.

**Женские половые органы.** Менструации: запаздывают; у девочек, которые пьют много молока; задержка (подавление) менструации возникает из-за попадания рук в холодную воду. *Скудная секреция молока;* Лак дефлю-ратум способствует ее восстановлению.

**Конечности.** Кончики пальцев на руках холодные, как лед, остальная часть кисти теплая.

**Кожа.** Кожа очень чувствительна к холоду. Симметричные бляшки, в области которых возникает зуд, а после расчесывания — жжение. Кожа утолщена по краям стоп.

**Сон.** Двигательное беспокойство из-за бессонницы — потери сна.

**Лихорадка.** *Всегда мерзнет, зябко.*

**Диф. диагноз.** Nat-m.

## LACHESIS

**Общее.** Эта змея у индейцев Америки называется сурукуку, или бушмас-тер, а яд этой змеи впервые был испытан доктором Герингом.

Подобно другим змеиным ядам, он разрушает **КРОВЬ**, поражает **СЕРДЦЕ И КРОВООБРАЩЕНИЕ. НЕРВЫ** становятся очень чувствительными, в особенности **КОЖНЫЕ** и **СОСУДО ДВИГАТЕЛЬНЫЕ**. Чрезвычайная чувствительность поверхности тела и непереносимость прикосновения или сжатия; повышенная возбудимость нервов, пациент беспокойно мечется, двигается. Симптомы появляются **СЛЕВА; затем перемещаются направо — В ГОРЛЕ, ЯИЧНИКАХ.**

**ЛАХЕЗИС - ЭТО ВЕЛИКОЕ ЖЕНСКОЕ СРЕДСТВО.** Характерно очень быстрое начало болезни и сильное изнеможение, протрация. Злокачественные или септические процессы; дифтерия; гангрена — при диабете, травматическая, старческая; карбункул, рожистое воспаление — все эти состояния входят в сферу влияния Лахезиса.

**КРОВОТЕЧЕНИЯ:** кровь жидкая, содержит темные частицы, напоминающие обугленную солому; викарное кровотечение — из носа, кровавая моча и т.д. Мелкие ранки сильно кровоточат. **Цианоз, синюшность: больной части тела;** кистей. Выделения едкие, **ЗЛОВОННЫЕ.** Ощущение, как будто что-то **ПОДНИМАЕТСЯ СНИЗУ ВВЕРХ:** в том числе **в горле;** а также озноб, поднимающийся вверх. **ПРИЛИВЫ ЖАРА;** приливы крови. Ощущение **КОМКА:** в горле, животе, печени, прямой кишке и т.д.; комка, катающегося в мочевом пузыре. **ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ БОЛЕЗНЕННОСТЬ: горла;** язв; участков на теле. Ощущение **сжатия:** в горле; на голове — как будто череп сдавлен маленькой шапочкой (тюбетейкой, ермолкой); сжатие заднего прохода. **Тянущее ощущение:** тянет **темя по направлению к челюстям; тянет в прямой кишке** и т. д.

Выраженная физическая и умственная слабость. Дрожание: всего тела; кистей, языка и т.д. Сильная пульсация или **стучащие боли** ("стучит, как молотком"). Невралгические боли изменяют свою локализацию при сердцебиении. Эпилепсия: припадок начинается во сне; возникает из-за ревности; вследствие онанизма; потери жидкостей организма.

Левосторонний паралич: после кровоизлияния в мозг (апоплексии); или после нервного истощения. Обмороки: сопровождающиеся болью в сердце, тошнотой, бледностью, головокружением. Хorea из-за прокалывания ушей. Неуклюжая походка; слабость левой половины тела. Отеки: из-за болезни печени и

селезенки; после скарлатины. Воспаление подкожной клетчатки: сопровождающееся жжением, синюшностью кожи. Геморрагическая пурпура. Бубонная чума. Рак. Паралич при дифтерии; а также другие проявления этой болезни. Дифтерийное носительство.

Последствия травмы, колотых ран; растяжения связок (отмечается цианоз больной части тела). Последствия горя, испуга, неприятностей, разочарования; гнева, ревности; разочарования в любви; мастурбации.

"Не чувствовала себя здоровой с тех пор, как начался климакс". Симптомы появляются во время сна, и пациент просыпается из-за них; в любое время дня и ночи. Истерия. Катаlepsия. Ощущение, как будто нитка тянет какой-либо орган, или протянута над частью тела.

**Хуже.** ОТ СНА; ПОСЛЕ СНА. УТРОМ. ОТ ЖАРЫ; ОТ ЛЕТНЕЙ ЖАРЫ; ОТ ВЕСЕННЕГО ТЕПЛА; в жарком помещении; ОТ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА. ПРИ ГЛОТАНИИ; КОГДА ДЕЛАЕТ ГЛОТАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ (ПУСТОЕ), КОГДА ГЛОТАЕТ ЖИДКОСТЬ. ОТ ЛЕГКОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ ИЛИ ДАВЛЕНИЯ. ОТ ДАВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ: в том числе вокруг шеи; в области талии. ОТ ЗАДЕРЖКИ ВЫДЕЛЕНИЙ. В начале и в конце менструации. ВО ВРЕМЯ КЛИМАКСА. ОТ АЛКОЮЛЯ. В облачную, пасмурную погоду. Когда стоит или наклоняется. От движения. Когда закрывает глаза. ОТ ГОРЯЧЕГО ПИТЬЯ.

**Лучше.** НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ. КОГДА ВЫДЕЛЕНИЯМ НИЧТО НЕ ПРЕПЯТСТВУЕТ, КОГДА ОНИ ОБИЛЬНЫЕ. От отрыжки. От сильного давления. ОТ ХОЛОДНОГО ПИТЬЯ. От обмывания больного места водой. Сидя согнувшись. От еды, особенно от фруктов. От теплых аппликаций.

**Психика.** Нервный; возбудимый человек. БОЛТЛИВОСТЬ: говорит бессвязно, перескакивает с одной мысли на другую; часто меняет тему разговора, потом становится грустным; либо пациент повторяет одно и то же. Возникают непреодолимые заблуждения, иллюзии; пациентка считает, что на нее воздействуют сверхъестественные силы; она считает, что умерла, и делают приготовления к ее похоронам; считает, что ее преследуют, ненавидят или презирают. Постоянные эротические мысли с неспособностью претворить их в жизнь.

**Безумная ревность. Подозрительность.** Пациент печален утром; не желает общаться с людьми. Злобный. Озорник, проказник. Маниакальное состояние из-за чрезмерных занятий, учебы. Бред, делирий: белая горячка; возникает из-за продолжительного лишения сна, изнурения чрезмерным бодрствованием; от переутомления; из-за потери жидкостей — "жизненных соков"; из-за перегрузки, связанной с занятиями, учебой.

Пациенту кажется, что он наполнен ядом. Страхи: боится лечь спать; прилечь; что сердце остановится. Двигательное беспокойство, дискомфорт: не желает заниматься делами, бизнесом; все время хочет куда-нибудь уйти, уехать. Нарушено чувство времени. Отвращение к замужеству у женщины. Религиозное безумие. Говорит, поет, свистит; совершает странные движения. Насмехается, высмеивает. Ползает по полу; часто выплевывает слюну; прячется; смеется или гневается; в том числе при спазмах. Слабая память. Делает ошибки, когда пишет или говорит. Психическое состояние ухудшается после сна. Точно предсказывает будущее. Высокомерный, заносчивый и ленивый. Полон ненависти.

**Голова.** Головокружение: хуже при повороте головы вправо; когда закрывает глаза; когда смотрит на один и тот же предмет; от прогулки — ходьбы на открытом воздухе. Головная боль: голова тяжелая, ее распирает, как будто она может лопнуть; боль распространяется вниз к носу, половина головы (правая) кажется отрезанной. Мигрень — боль распространяется в шею и плечи. Тяжесть, давление или жжение в темени. Головные боли из-за пребывания на солнце, сопровождающиеся неясным зрением. Выпадение волос, особенно во время беременности. Опухоль, прорастающая череп. Онемение головы, ощущение ползания мурашек (слева). Пациент не хочет, чтобы прикасались к волосам.

**Глаза.** Кажутся маленькими или как будто они притянуты друг к другу нитями, которые завязаны в узел у корня носа. Слепота при заболевании легких или сердца. Глаза слезятся от боли. Слезная фистула (свищ); в сочетании с высыпаниями на лице. Внутриглазные кровотечения, кровоизлияния. При надавливании на горло возникает ощущение, как будто глаза выталкиваются наружу. Слабое, неясное зрение. Неустойчивый, нестабильный взор, бессмысленно вращает глазами.

**Уши.** Тугоухость; количество ушной серы ничтожно. Ушная сера слишком плотная, бледная, сухая. Боль в ухе при ангине. Пульсация в ушах. Ушная сера как жеваная бумага. Сужение (стриктура) евстахиевой трубы.

**Нос.** Насморк с заложенностью носа. Выделения из носа при каждом приступе кашля. Носовое кровотечение при аменорее; когда сморкается. Выделение крови и гноя из носа. Приступы чихания при сенной астме (поллинозе). Красные папулы на носу — ринофима, или розацеа — розовые угри; в том числе у пьяниц. Не выносит ничего вблизи носа.

**Лицо.** Багровое, в пятнах; темное во время жара. Венозная сеточка на лице. Невралгия (левосторонняя); жар приливает к лицу. Нижняя челюсть отвисает (при коме). Септическое течение паротита. Приливы жара к лицу. Губы чудовищно опухшие.

**Рот.** Десны: синеватые, опухшие, кровоточат. Язык: опухший; дрожит, когда пациент его высовывает; цепляется за зубы; высовывается изо рта; красный, сухой; с трещинами на кончике. Скверный запах изо рта. Афты и оголенные участки слизистой оболочки, с ощущением жжения и саднения в них. Много густой, вязкой слюны.

Нечленораздельная, с грубыми ошибками речь; пациент не может широко открыть рот. Едкий; кислый привкус во рту. Не выносит ничего вблизи рта. Зубная боль распространяется в уши. Стучит зубами. Зубы кажутся слишком длинными. Внезапно происходит энергичное высовывание и втягивание языка.

**Горло.** Ощущение, как будто комок в гортани; как будто он подкатывает к горлу и снова проглатывается. Ощущение горячего комка, или мягкого предмета, или хлебной крошки в гортани.

*Боль из горла* распространяется в ухо. Пациент *задыхается*. **ГЛОТАНИЕ:** *болезненное*; пища попадает не в то горло; возвращается через нос; хуже при "пустом" глотании, в меньшей степени это беспокоит при глотании жидкостей; лучше при глотании твердой пищи.

Чрезвычайная чувствительность горла к давлению снаружи; пациент *должен растянуть воротник*. Дифтерия гортани. Тонзиллит. Острый паратонзиллит (перитонзиллярный абсцесс). При хроническом тонзиллите из горла отхаркиваются зловонные комочки; или в гортани скапливается густая слизь, которую не удается ни откашлять, ни проглотить. Сжатие в гортани уменьшается от еды. Пациент не может проглотить сладкие или едкие продукты.

**Желудок.** Страстное желание: алкоголя, устриц, кофе, от которого пациент хорошо себя чувствует. Пациент попеременно или голоден, не может дождаться приема пищи или чувство голода отсутствует. Испытывает жажду, но боится пить. Грызущее давление в желудке уменьшается от еды, но возобновляется через несколько часов (при раке); *болезненность или спазм в эпигастрии*. Рвота во время менструации при головной боли. Отрыжки: перед приступом эпилепсии; во время менструации. Тошнота: появляется после того, как пациент ляжет в постель; после питья воды со льдом.

**Живот.** Болезненность, как при нагноении, пульсация глубоко в печени; пациент не выносит ничего вокруг талии. Воспаление и абсцесс печени. Гнойное воспаление желчного пузыря. Режущая боль в правой половине живота, из-за которой возникает обморок. Припухлость в области слепой кишки, пациент должен лечь на спину, подтянуть колени; при аппендиците. Боль из ануса распространяется в пупок. Живот горячий, чувствительный, болезненно напряжен, начиная с области поясницы и ниже, вдоль бедер. Запор при беременности. Ощущение сжатия, сужения в заднем проходе. Боли в прямой кишке, распространяющиеся вверх, возникают каждый раз, когда пациент кашляет или чихает.

Кровотечения из кишечника, при этом из кишечника выделяются как будто обугленные частицы. Геморроидальные узлы: они выпячиваются, болезненные; хуже от кашля или чихания. В прямой кишке постоянно ощущаются позывы, но не на стул. Зловонный стул. В заднем проходе стучит, как молоточками; в том числе во время менструации. Ощущение, как будто перекачивается мяч в животе, когда пациент переворачивается в постели. Понос от фруктов или из-за кислого.

**Мочевыделительная система.** Как будто в мочевом пузыре перекачивается мяч, когда пациент переворачивается. Кровянистая моча. Мочеиспускание учащенное, моча пенистая, темная. Маленькая опухоль в уретре, вызывающая задержку мочи. Задержка и мочи, и стула.

**Мужские половые органы.** Сильное сексуальное желание, не подкрепленное физическими возможностями. Во время коитуса эякуляция задерживается или не происходит вовсе. Сладострастные мысли не сопровождаются эрекцией. Утолщение крайней плоти. Семенная жидкость имеет едкий запах. Болезненные последствия мастурбации. Пациент веселый после ночной поллюции.

**Женские половые органы.** Левый яичник опухший, твердый, болезненный; пациентка должна приподнять одеяло. *Менструации: скудные, кровь черная*; в виде комков, едкая, викарное кровотечение из носа. Перед менструацией возникает желание выйти на улицу — на открытый воздух — и бегать туда-сюда, резвиться. Дисменорея в первый день. Боли в области матки и яичников уменьшаются, когда начинается кровотечение. Чем меньше кровотечение (при менструации), тем сильнее боль. Ощущение, что маточный зев раскрыт.

Бели обильные, жгучие, делают белье жестким и окрашивают его в зеленоватый цвет. Климактерические недомогания: сердцебиение, приливы жара, кровотечения и т.д. Опухоли яичников. Нимфомания.

Молочные железы воспаленные, синеватые. Соски опухшие, напряжены, болезненные при прикосновении. Молоко жидкое, синеватое.

**Дыхательные органы.** *Удушье* и ощущение сжатия, сдавления, возникающее после того, как пациент лег; *после того, как заснул*; должен вскочить с постели и нестись к открытому окну. Чувствует, что должен сделать глубокий вдох. Ощущение нехватки воздуха.

Щекоочущий, удушливый кашель; хуже от прикосновения к шее или к наружному слуховому проходу; лучше после отхаркивания небольшого количества мокроты. Кашель во сне: пациент не осознает этого, не просыпается. Ощущение, как будто кожа свисает или клапан закрывается в гортани. Как будто пробка двигается вверх и вниз при кашле. Гортань болезненна при прикосновении. Последняя стадия пневмонии. Абсцесс легких. Мокрота пенистая, гнойная, выделяется с трудом, кровянистая, ее отхаркивание сопровождается сильным потоотделением. Афония из-за паралича голосовых связок или отека. Кашель с ощущением, что жидкость попала не в то горло; возникает преимущественно днем.

**Сердце.** Сердцебиение с обморочными приступами. Беспокойство, дрожание, тревога, "предсердечная тоска". Сердце: *слабое*; как будто оно переворачивается, или слишком большое, или как будто подвешено на нитке. Пульс: слабый, перемежающийся; медленный; аритмичный. Цианоз новорожденных. Кардит; в том числе метастатический. Старческий артериосклероз.

**Шея и спина.** Шея чувствительна к малейшему давлению. Скованность в шее; с трудом двигает челюстями. Невралгия копчика; хуже, когда пациент встает со стула, кажется, что сидит на чем-то остром. Ощущение нитей, протянутых из спины к рукам, голням и глазам.

**Конечности.** Опухание подмышечных лимфатических узлов. Онемение левой руки; онемение кончиков пальцев. Дрожание рук (у пьяниц). Пот под мышками пахнет чесноком. Панариций, синеватая припухлость. Пощипывание; покалывание, как иголками, в левой кисти. Трещины на коже в углах ногтей. Колени холодные; или ощущение, как будто горячий воздух проходит сквозь них. Пот на стопах зловонный или холодный. Ишиас: пациент должен лежать неподвижно; хуже от малейшего движения. Контрактуры сухожилий. Кажется, что пальцы на ногах сломаны. Боль в большеберцовых костях, при заболевании горла. Судороги в икроножных мышцах от страха. Послеродовой тромбоз (белый болевой флебит).

**Кожа.** Пятнистая или синюшная; темные пятна; язвы; разъедающие язвы на голнях; язвы окружены синеватым, багровым ободком. Грибовидные язвы кожи. *Варикозные* язвы. Карбункулы, нарывы (фурункулы) с синеватым ободком. Пролежни с черными краями. Воспаление подкожной клетчатки. Рожистое воспаление; в том числе у стариков. Геморрагическая пурпура, сопровождающаяся сильным изнеможением. Рубцы: краснеют; болят, лопаются и кровоточат. Расширение капилляров. Мелкие ранки сильно кровоточат.

**Сон.** Ухудшение наступает во время сна. Бессонница: из-за раздражения головного мозга; у пьяниц. Страшные сны; видит во сне змей. Дети беспокойно мечутся, стонут во сне. Сонливость, но уснуть не может.

**Лихорадка.** Озноб усиливается от питья; сопровождается потоотделением. *ЖАР; в темени; В ВИДЕ ПРИЛИВОВ; при пробуждении, когда засыпает.* Потоотделение: в области шеи; во время сна; в подмышечных впадинах; кровавый пот, оставляющий черные, желтоватые пятна на белье; с запахом чеснока. Стопы холодные, как лед.

**Дополнительно.** Lyc, Phos., Zinc-i.

**Диф. диагноз.** Caust., Sep., Zinc.

## LACHNANTHES

**Общее.** Лахнантес — средство для лечения кривошеи и ревматических симптомов, относящихся к шее.

Бурление, кипение из области сердца поднимается вверх, в голову. Скованность в шее, шея изогнута в сторону при ангине. Боль в задней части шеи, как будто шея вывихнута, возникает, когда пациент поворачивает голову или наклоняет голову назад. Ощущение, что переносицу прищемили. Ощущение ледяного холода в средней части лопаток.

## LACTICUM ACIDUM

**Общее.** Ацидум лактикум обнаруживается в пахте, она является ценным средством для лечения утренней тошноты, диабета, ревматических симптомов; болезней молочной железы.

Это средство подходит анемичным бледным женщинам. Тошнота: при пробуждении, уменьшающаяся от еды; тошнота при диабете или при беременности. Жажда. Неутолимый голод, прожорливость. Ощущение полноты или комка, напоминающего гриб-дождевик, в горле. Боли в молочной железе, сопровождающиеся увеличением подмышечных лимфатических узлов. Боль, распространяющаяся в голову. Ревматические боли в суставах; боли в коленных суставах; ухудшение от движения. Летучие боли в конечностях. Дрожание всего тела при ходьбе. Учащенное мочеиспускание с выделением большого количества мочи, содержащей сахар. Горячие, едкие отрыжки, хуже от курения. Слюнотечение и кислая отрыжка. Потливость стоп.

## LACTUCA VIROSA

**Общее.** Лактука вироза, очевидно, является средством для повышения секреции молока. Моча пахнет фиалками. Когда пациент сидит, возникает ощущение, как будто вдоль уретры все время стекает капля мочи.

## LAPIS ALBUS

**Общее.** Это средство готовят из кремнефтористого кальция. Ляпис аль-бус — это средство для лечения новообразований и болезней желез.

Боли жгучие, жалящие, стреляющие. Болезни матки: рак; фибромы, сопровождающиеся интенсивными жгучими болями и обильными кровотечениями. Сильные боли во время менструации, вызывающие обморок. Увеличение желез, особенно шейных: при осмотре они скорее мягкие, эластичной консистенции, чем твердые, как камень. Саркома. Липома. Опухание желез там, где обычно железы не обнаруживают.

## LAPPA

**Общее.** Это средство преимущественно воздействует *на кожу*; а также на печень, суставы и матку.

*Тяжесть, болезненность, тупые боли (ломота);* ощущение, как будто неудобно лежать. Онемение: в поясничной области, в икроножных мышцах (в них при этом ощущается тупая боль). Ощущение сжатия.

**Хуже.** От холода; от сырого холода. От сотрясения. Лежа на правом боку. От сильного напряжения.

**Лучше.** В облачную, пасмурную погоду.

**Голова.** Головокружение с тошнотой и рвотой. Ощущение груза, тяжести в области темени.

**Глаза.** Краснота вокруг глаз. Ячмени; в том числе множественные.

**Нос.** Покраснение поперек носа.

**Лицо.** Застарелые угри; хуже от прикосновения.

**Желудок.** *ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ, ОЩУЩЕНИЕ КИСЛОТЫ:* мясо имеет кислый вкус; вся пища кажется кислой, пациент вырывает ее. Понос чередуется с симптомами ревматизма.

**Мочевыделительная система.** Обильное и учащенное мочеиспускание; моча как молоко, фосфатурия.

**Женские половые органы.** Ощущение ушиба, болезненности, чувство тяжести в матке; сопровождается выраженным расслаблением тканей влагалища. Смещение матки: хуже стоя, при ходьбе, если оступится, от внезапного сотрясения тела.

**Грудная клетка.** Дрожание в груди.

**Конечности.** Слабость передней части бедер. Старые болячки, ранки в области суставов.

**Кожа.** Высыпания на коже; высыпания с клейким отделяемым на голове, на лице и т.д. Мокнувшая зловонная экзема; в том числе у младенцев. Множество мелких болезненных нарывов — фурункулов.

*ПОТ ПОД МЫШКАМИ ХОЛОДНЫЙ; он стекает по грудной клетке; имеет отвратительный запах.*

**Дополнительно.** Mag-c.

## LATHYRUS

**Общее.** Это средство воздействует на передние и боковые столбы спинного мозга, оно способно вызывать — и лечить — многие разновидности паралича нижних конечностей.

Атетоз; детский паралич. Препарат полезен при исхудании и истощающих заболеваниях, когда имеется выраженная слабость и тяжесть в теле; когда медленно восстанавливается нервная энергия. Рефлексы повышены.

**Хуже.** В холодную влажную погоду.

**Психика.** Подавлен.

**Голова.** Головокружение возникает, когда пациент стоит закрыв глаза.

**Рот.** Жжение кончика языка. Язык как будто ошпарен. Онемение языка и губ.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание, учащенное мочеиспускание.

**Конечности.** Дрожащая, шатающаяся походка. Чрезвычайная ригидность голеней; спастическая походка. Колени ударяются друг о друга при ходьбе. Коленный рефлекс повышен. Пациент не может выпрямить ноги или положить ногу на ногу, когда сидит. При ходьбе пятки не касаются земли. Сидит согнувшись, наклонясь вперед, выпрямляется с трудом. Ягодичные мышцы и мышцы нижних конечностей слабые, атрофированы. Скованность и слабость в голеностопных и коленных суставах. Стопы волочатся или внезапно с силой опускаются на землю при ходьбе. Ощущение, как будто на талии влажная одежда. Голені холодные в течение дня, становятся горячими и в них появляется жжение ночью — лучше раскрыться. Когда лежит, пациент может двигать ногами (голенями) из стороны в сторону, но не может их поднять.

**Сон.** Постоянно зевает, сонливый.

## LATRODECTUS MASTANS

**Общее.** Яд этого паука поражает *СЕРДЦЕ*: он вызывает типичную картину *стенокардии*. Кровь становится жидкой, водянистой. Возникают тонические судороги, продолжающиеся несколько дней. *Двигательное беспокойство, в том числе при болях в сердце, и изнеможение, упадок сил.*

**Хуже.** От малейшего движения; даже от движения кистей. От напряжения.

**Психика.** Тревога. Пациентка кричит испуганно при боли; выкрикивает, что она задохнется и умрет.

**Желудок.** Тошнота, а затем — боли в животе. Рвота черной массой. Парализующая пронзающая боль или ощущение, что в эпигастрии пустота, все провалилось вниз.

**Дыхательные органы.** *Ловит ртом воздух; боится, что задохнется и умрет.* Остановка дыхания (апноэ).

**Сердце.** *Жестокие БОЛИ В СЕРДЦЕ:* резкие; распространяющиеся в плечи и в обе руки, в пальцы на руках; боли сопровождаются онемением. Пред-сердечная тоска. *Двигательное беспокойство: при болях в сердце; в сочетании с упадком сил. Частый, слабый, нитевидный пульс.*

**Конечности.** Боль в левой руке; она кажется парализованной. Сильная ломота в подмышечной области. Парестезии в нижних конечностях.

**Кожа.** Холодная, как мрамор.

**Сон.** Летает во сне.

**Диф. диагноз.** Tarent.

## LAUROCERASUS

**Общее.** Незначительное количество синильной кислоты (*Hydr-ac*), содержащейся в этом растении, вызывает симптомы, сопровождающиеся **ВНЕЗАПНОЙ СЛАБОСТЬЮ**; а также *недостаточной реакцией*, особенно характерными для болезней легких и сердца.

Поражается **ПСИХИКА И ГОЛОВНОЙ МОЗГ**, что приводит к *притуплению чувств*. Цианоз. Тело холодное, согревание не помогает. Слабость сфинктеров. Продолжительные обмороки. Ощущение падения вниз: в мозге, в животе; в сердце и т.д.

Эпилепсия: клонические судороги во всех конечностях, сопровождающиеся паралитической слабостью. Подергивание мышц. Хорея: связана с переживаниями, эмоциями; сопровождается постоянным резким сокращением мышц, пациент не может быть неподвижен; речь неразборчивая при возбуждении, пациент ловит ртом воздух. Задыхается, ловит ртом воздух — перед судорогами, во время и после них. Коллапс нервного происхождения. Геморрагический инсульт (апоплексия). Ощущение жжения внутри. Кровотечения: жидкая, яркая кровь, смешанная с желеобразными сгустками.

Последствия испуга. Синюшные младенцы, асфиксия новорожденных. Лауроцеразус является антидотом по отношению к Дигиталису (*Dig.*), примененному в материальных дозах. Лауроцеразус показан, когда хорошо подобранные средства оказываются неэффективными.

**Хуже.** Когда приподнимается, садится в постели. От напряжения. От холода. От испуга. При наклоне.

**Лучше.** Лежа с низко опущенной головой. От еды. От сна. На открытом воздухе.

**Психика.** Потеря сознания сопровождается потерей речи и неподвижностью. Страх и тревога по поводу воображаемых несчастий, зла. **ВНЕЗАПНАЯ ПОТЕРЯ ПАМЯТИ:** от испуга, от боли и т.д. Притупление чувств. Пациент сердится, когда его не понимают.

**Голова.** Головокружение с сонливостью. Головная боль усиливается с 11 до 13 ч. По ночам ощущает рвущую боль в темени. Ощущение, как будто холодный ветер дует на голову. Ощущение, как будто мозг падает. Головной мозг кажется сжатым и болезненным.

**Глаза.** Глаза навекате, взгляд неподвижный, глаза открыты. Предметы кажутся более крупными, чем на самом деле.

**Лицо.** Синее; в том числе, когда пациент задыхается. Ощущение, что мухи и пауки ползают по коже. Спастическое сжатие челюстей (тризм). Подергивание мышц лица.

**Рот.** Пена изо рта; в том числе при конвульсиях. Не может говорить из-за боли в желудке. Язык: как будто одеревенел, неподвижен; холодный, как будто обожжен или онемевший.

**Горло.** Спастическое сжатие горла и пищевода. *Проглоченная ЖИДКОСТЬ С ШУМОМ СКАТЫВАЕТСЯ по пищеводу и кишечнику.*

**Желудок.** Постоянная икота. Горькие отрыжки. Рвота пищей при кашле.. Отвращение к еде при беременности. Жесточая боль в желудке, сопровождается потерей способности говорить. Боли в желудке во время мочеиспускания. Появляется тошнота, когда пациент сидит возле горячей печи.

**Живот.** Ощущение, что в животе падает комок из области выше пупка к пояснице; хуже от разговора или перенапряжения. *Булькающие звуки при метеоризме.* Боль в печени, как будто формируется абсцесс. Печень: плотная, атрофирована; мускатная. Паралич сфинктера заднего прохода; произвольный стул. Рак прямой кишки; в том числе с кровотечением ярко-красной кровью.

**Женские половые органы.** Боль в матке при раке; сочится яркая кровь, содержащая желеобразные сгустки; лучше, когда женщина спит. Во время менструации пациентка падает в обморок, тело холодное. Ощущение жжения и зловоние в области молочных желез и под ними.

Мочевыделительные органы. Задержка мочи, подавление мочевыделения, произвольное мочеиспускание; возни, ет при сердцебиении и удущье, а также при обмороке.

**Дыхательные органы.** Саднение в гортани и в трахее. *Удушье: пациент ловит ртом воздух; в том числе, когда приподнимается и садится в постели.* Поверхностное дыхание. Одышка с ощущением, что не способен расправить грудь, раздвинуть грудную клетку; лучше, когда ложится. *Кашель: щекочущий*, спастический, каждую ночь; возникает при туберкулезе легких; короткий, сухой кашель сердечного происхождения; хуже, когда ложится. Кровянистая или с прожилками крови мокрота; желеобразная мокрота. Асфиксия новорожденных. Возникает жжение в груди, когда пациент делает вдох. Низкий голос.

**Сердце.** Пациент *прижимает руки к сердцу*; как будто там что-то болит; хуже от любой физической нагрузки. Сердцебиение. Недостаточность митрального клапана. Боли в области сердца. Пульс Слабый,



разный, медленный или аритмичный. Конечности. Булавовидная деформация пальцев — пальцы в виде барабанных палочек. Ногти на руках и ногах становятся узловатыми. Вены на кистях расширены. Холодные, липкие ноги от стоп до коленей; в том числе при хорее, при болезни сердца. Когда пациент кладет ногу на ногу, стопы немеют.

Кожа. Прохладная, цианотичная кожа.

**Сон.** Пациент полон страхов, отмечается тревога и двигательное беспокойство; он не может заснуть. Coma vigil (бессознательное состояние с бредом и с открытыми глазами).

Диф. диагноз. Am-c, Gels., Hydr-ac, Prun.

## LECITHIN

Общее. Препарат Лецитин готовят из яичного желтка и мозга животных — это сложное органическое соединение, содержащее фосфор. Лецитин улучшает снабжение питательными веществами тканей, особенно крови, поэтому он очень полезен при анемии, в период выздоровления, при неврастении и бессоннице.

Это превосходное средство для стимуляции секреции молока: Лецитин делает его и более питательным. Усталость, слабость, одышка; исхудание, симптомы общего упадка сил. Половая слабость. Недостаточность яичников.

## LEDUM PALUSTRE

Общее. Это растение — багульник — поражает фиброзную ткань: СУСТАВОВ, в особенности мелких; голеностопных суставов; действует на сухожилия; пятки, а также НА КОЖУ. Поэтому Ледум можно назвать противоревматическим средством — если заболевание начинается со стоп и распространяется вверх.

Пораженная часть тела выглядит опухшей, багровой; затем худеет, атрофируется. Пациент всегда зябнет, мерзнет, большая часть тела холодная; однако всегда имеется отвращение к внешнему теплу, согреванию.

Отмечается недостаток жизненного тепла в целом. Болезненные, холодные, отечные суставы. Меняющие локализацию, рвущие боли. Слабость и онемение в больной части тела. Вялость кожных покровов, особенно после подавления выделений из глаз, ушей и носа.

Кровотечения; в том числе яркой пенистой кровью. Отеки. Петехии. Столбняк сопровождается подергиванием мышц возле раны.

Болезненные последствия употребления алкоголя, стрижки волос; подавления выделений, колотых ран, свежих или хронических травм, укусов и ужаления насекомых, ушибов. Пьяницы.

Приливы крови. При абсцессе и гнойном воспалении улучшение на ступает от холода.

Если Ледум дать немедленно после нанесения колотой раны, можно предупредить возникновение столбняка. Нурер. — когда столбняк уже развился.

Ледум подходит полнокровным, упитанным, румяным или бледным, хрупким пациентам.

Хуже. От тепла; от теплого одеяла, от тепла печи, от теплого воздуха. От травмы. От движения (суставы). Ночью. От яиц. От вина. Когда сплевывает, отхаркивается.

**Лучше.** От холода; от купания в холодной воде; от холодного воздуха. Отдохнуть, прилечь, лежать.

**Психика.** Сердитый, гневается, не в духе. Недоволен, ненавидит своих товарищей, избегает их общества.

**Голова.** Неистовая пульсирующая боль; хуже от малейшего укрывания. Заболевает после промокания. Когда отступает, сотрясение отдается в мозге. Зуд, как будто на голове вши. Кровяные нарывы (фурункулы) на лбу.

**Глаза.** Налиты кровью или имеется кровоподтек, ушиб. Слезы едкие, из-за них возникает болезненность нижних век и щек. Кровоизлияние в переднюю камеру глаза после иридэктомии. Птоз век (справа) после травмы.

**Уши.** Тугоухость: как будто уши заткнуты ватой; хуже от стрижки волос, от намочения головы.

**Нос.** Постоянно течет кровь из носа; отмечается болезненность носа и сильное жжение в носу.

**Лицо.** Пятнистое. Красные папулы на лбу и на щеках; в них ощущается жгущая боль при прикосновении. Подподбородочные железы опухшие. Высыпания, сопровождающиеся образованием корочек, вокруг носа и рта.

Рот. Горький привкус во рту; запах плесени изо рта при кашле. Во время колики изо рта внезапно течет жидкая слюна.

Желудок. Тошнота возникает, когда пациент выплевывает (мокроту), отхаркивается.

**Прямая кишка.** Трещина заднего прохода. Внутренний геморрой, сопровождающийся жгучей болью.

**Мочевыделительная система.** Большое количество мочевой кислоты и песка в моче. Часто во время мочеиспускания струя прерывается. Выделение большого количества прозрачной, бесцветной мочи, содержащей очень мало солей.

**Мужские половые органы.** Поллюции — сперма окрашена кровью или похожа на сыворотку.

**Женские половые органы.** Фибромы сопровождаются кровотечениями. Пациентка ощущает сильный холод во время менструации, однако хочет, чтобы воздух был холодный.

**Дыхательные органы.** Кашель: мучительный; возникает из-за щекотания в гортани; сопровождается носовым кровотечением; затем возникает "всхлипывающее" дыхание; хуже после исчезновения высыпаний. Двойной вдох. Кровохарканье чередуется с симптомами ревматизма; или с болью в тазобедренном суставе. Желтая гнойная мокрота. Прикосновение к грудной клетке причиняет боль.

**Шея и спина.** Скованность в спине; *спазмы в мышцах спины*; хуже, когда встает со стула. Прострел в пояснице (люмбаго).

**Конечности.** Спазмы в области тазобедренного сустава. Опухшие, пятнистые, покрытые кровоподтеками голени и стопы. Пятки болезненные. Боль в подошвах, пациент едва может ступать на ноги. Дрожание кистей возникает, когда пациент двигает ими или берет что-нибудь в руку.

Тенденция *подворачивать стопы*. Зуд стоп (их тыльной поверхности) ночью, скованность в стопах в первой половине дня — до полудня. Опухание подошвы в области возвышения большого пальца (в области плюснефалангового сустава). Стопы притягивает к земле, как будто магнитом, когда пациент пытается двигаться. Боль в плече при поднимании руки.

**Кожа.** *Колотые раны*: подергивание в них; раны от гвоздей, после ужаления насекомых и т.д., сопровождающиеся образованием зловонного гноя. Высыпания только на участках тела, покрытых одеждой. Отечность. Красные пятна и сыпь.

**Лихорадка.** *Холод*; части тела холодные, особенно конечности; в том числе при боли; во время лихорадки; ощущение, как будто они опущены в холодную воду. Зловонный пот. Обильное потоотделение ночью.

**Диф. диагноз.** Arn., Bry., Rhus-t., Sec.

## LEPTANDRA

**Общее.** Лептандра воздействует на правую часть тела и *на печень*; она показана при кровотечениях вследствие поражения печени.

*Жжение в области печени.* Заболевания, связанные с поражением желчевыводящих путей. Слабость, пациент едва может стоять или ходить. Желтуха.

**Хуже.** От холодного питья. От движения. Периодически. В сырую погоду.

**Лучше.** Лежа на животе; на боку.

**Психика.** Чувство безнадежности; уныние и сонливость; при болезнях печени.

**Голова.** Тупая боль во лбу; сопровождающаяся ноющей болью в области пупка.

**Глаза.** Жгучая боль и ломота в глазах.

**Рот.** Язык желтый или черный посередине.

**Желудок.** Страстное желание холодного питья, от которого усиливается жжение и тупая боль в желудке. Рвота желчью. Ощущение пустоты в подложечной области, как будто все провалилось вниз. Мясо и овощи не усваиваются — от них становится хуже.

**Живот.** *Болезненность или тупая, жгучая боль в области печени или возле желчного пузыря; распространяющаяся вниз вдоль кишечника к пупку или в левую лопатку, или вдоль позвоночника* — здесь ощущается холод, позвоночник мерзнет.

Печень увеличена в поперечном направлении. Острые заболевания печени. *Камни желчного пузыря*. Постоянная тупая боль в области пупка. Стул: водянистый, мутный, как ил; хуже утром; стул, **КАК ДЕГОТЬ ИЛИ ЧЕРНОГО ЦВЕТА; ЗЛОВОННЫЙ**. Вязкий, восковидный или брызжущий стул утром; сопровождающийся болью в области пупка. Дизентерия; после поноса. Выпадение геморроидальных узлов; в том числе с *кровотечениями*. Желтуха — стул цвета глины. Ощущение, как будто что-то выделяется, выходит из прямой кишки.

**Мочевыделительная система.** Красная или оранжевая моча в сочетании с тупой болью в пояснице.

**Женские половые органы.** Подавление или задержка менструаций при заболевании печени. Бели: теплые, водянистые; стекают по ногам; в том числе возникают при изъязвлении маточного зева.

Сердце. Болезненность в области сердца. Пульс медленный и полный.

**Конечности.** Боль в седалищном нерве (слева); хуже, когда пациент садится. *Ногти очень тонкие*, мягкие и расщепляются, расслаиваются.

**Лихорадка.** Зябкость, ощущение холода, распространяющегося вдоль позвоночника, а также вниз вдоль руки.

**Дополнительно.** Phos.

**Диф. диагноз.** Bapt., Card-m., Chion.

## LILIUM TIGRINUM

**Общее.** Тигровая лилия оказывает свое действие, в основном, на **ВЕНОЗНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ**; на *вены сердца и ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ, в том числе яичников и матки*.

Средство Лилиум тигринум полезно при многих рефлекторных состояниях, связанных с патологией перечисленных органов. Этот препарат показан также при болезнях *прямой кишки и мочевого пузыря* и при левосторонних симптомах. Препарат Лилиум тигринум часто показан незамужним женщинам.

Ощущение **ПОЛНОТЫ, ТЯЖЕСТИ ИЛИ ВЫДАВЛИВАНИЯ**: в области матки, яичников, сердца и т.д. *Опущение матки и яичников*. Блуждающие, летучие, стреляющие боли или боли, сопровождающиеся ощущением открывания и закрывания; иррадиирующие боли: из яичника в сердце, в левую молочную железу; вдоль голеней и т.д. Боли, *направленные назад*: из области глаз направляются в затылок; из области сосков — сквозь грудную клетку; из области сердца — в левую лопатку. Боль на маленьких участках.

**Пульсация**; волнение крови; бульканье и жжение. **Нервная дрожь**: внизу живота (в гипогастрии), в позвоночнике, коленях и т.д. Венозный застой. Выделения едкие.

Нервная пациентка; истеричная. Падает в обморок в теплом помещении или после продолжительного стояния. Истощение у женщин в результате сексуальных излишеств. Симптомы возникают из-за сексуального возбуждения. Ревматизм. Чередование психических симптомов и симптомов со стороны матки и/или сердца.

**Хуже**. **ОТ ТЕПЛА**; в теплом помещении. От движения. *После выкидыша*. От ходьбы. Стоя. От утешения. От давления постельного белья. От сотрясения.

**Лучше**. *От прохладного, открытого, свежего воздуха. Когда занята*. Лежа на левом боку. На закате. От давления. Когда поддерживает (живот и т.д.). Сидя нога на ногу. От растирания.

**Психика**. *Торопливая. Нервная. Придирается. Подавлена. Чувственная*. Бесплодная деятельность. Уныние. Склонна проклинать, может ударить. **Страх**: безумия; боится, что она неизлечимо больна. Стремление к пышным украшениям. Дикое, безумное ощущение.

Склонность плакать; плачет много; очень робкая и равнодушна ко всему, что для нее делается. Недовольна тем, что имеет; завидует другим. Слабоумие из-за беспокойства, связанного с бизнесом, делами, и из-за сексуальных излишеств; пациентка вырывает волосы.

Торопится, быстро ходит, сама не знает почему. Женщине хочется поговорить, но боится что-либо сказать из опасения, что скажет что-нибудь не так. Вынуждена все время что-то делать, старается быть очень занятой, чтобы подавить сексуальное желание. От утешения становится хуже. Сидит в одиночестве и мрачно размышляет над воображаемыми неприятностями. Сексуальное возбуждение чередуется с восприимчивостью к религиозным идеям. Предпочитает общество.

**Голова**. Дикое ощущение в голове, как будто она может сойти с ума. Жгучая головная боль; связанная с болезнью матки; хуже перед менструацией и после нее; лучше на закате. Головная боль над левым глазом, откуда она распространяется в темя; боль сопровождается головокружением и расстройством зрения.

**Глаза**. Ощущение переутомления; щиплет и жжет в глазах, сильнее от чтения. Дикий взгляд. Миопический астигматизм, пациент вынужден поворачивать голову в стороны, чтобы ясно видеть. Боль из глаз распространяется назад, в голову. Слабость цилиарных мышц.

**Уши**. Шум биения (крови) в ушах, после того как ляжет спать.

**Нос**. Чихание; от него уменьшается головная боль и боль в глазах.

**Рот**. Язык покрыт желтоватым налетом, с белыми бляшками. Сладкий привкус во рту — в задних отделах полости рта; отвратительный привкус во рту уменьшается от еды.

**Горло**. Пациент отхаркивает слизь из горла, при этом все время испытывает тошноту.

**Желудок**. Страстное желание мяса, а также кислых или сладких деликатесов. Отвращение к кофе, к хлебу. Голод: ощущение, как будто он возникает в позвоночнике. Жажда перед возникновением серьезных симптомов. Ощущение, как будто твердый предмет катается туда-сюда в желудке - возникает только днем. Рвота из-за смещения матки.

**Живот**. Кожа живота кажется натянутой и жесткой. Живот болезненный, вздутый; пациентка не выносит давления постельного белья (одеяла) после менструации. Слабость, ощущение дрожания распространяются к заднему проходу.

**Сильное давление на низ** со стороны всего содержимого брюшной полости, распространяющееся даже на органы грудной клетки; пациентка должна поддерживать живот; это ощущение сопровождается дизурией. Давление на прямую кишку сопровождается постоянными позывами на стул; уменьшается после мочеиспускания, усиливается стоя. Острые боли уменьшаются от легкого растирания теплой рукой.

Понос рано утром, возникает после вставания, позыв на стул императивный, нельзя ждать ни секунды; стул маленького объема, учащенный, сопровождается тенезмами. Дизентерия: хуже во время климакса, у полнокровных женщин. Резкие боли уменьшаются, когда пациентка сгибается пополам. Тенезмы прямой кишки и мочевого пузыря. Геморрой; в том числе после родов.

**Мочевыделительная система**. Постоянное чувство давления на мочевой пузырь; постоянно ощущается позыв на мочеиспускание; при этом возникает ощущение шара в прямой кишке. Моча похожа на молоко, скудная, горячая. Если позыв на мочеиспускание проигнорировать (подавить), возникает ощущение прилива крови к груди.

**Женские половые органы**. *Сильно тянет, давит на низ или наружу в области таза*; при этом возникает дизурия; ощущение, как будто все органы выпадут наружу через влагалище; женщина должна поддерживать его.

Менструации ранние, скудные, кровь темная, со сгустками, зловонная. Кровь выделяется только когда женщина прохаживается, двигается. Боль *из яичника* (левого) распространяется вниз вдоль бедер; или вверх, в область под левой молочной железой.

Бели: жидкие, коричневые, едкие; оставляют на белье коричневые пятна, усиливаются после менструации. Невралгическая боль в матке, женщина не выносит давления одежды. Выпадение или антеверсия матки. Субинволюция матки. Сексуальное желание повышено; до неприличия; пациентка вынуждена все время себя занимать делами.

Ощущение, как будто заклепка или шарик под молочной железой (левой). Ощущение, как будто твердый предмет давит на прямую кишку и яичники, лучше при ходьбе.

**Дыхательные органы.** Ощущение, что стесняющий дыхание груз лежит на грудной клетке; не хватает воздуха; пациентка делает долгий глубокий вдох. Ощущение комка в середине грудной клетки, перемещающегося вверх и вниз, когда пациент делает "пустое" глотательное движение. Задыхается в теплом или людном помещении, в театре или церкви.

**Сердце.** Кажется, что сердце зажато (как будто когтистой лапой); переполнено и вот-вот разорвется; что оно холодное; слабое, подвешено за нить. Стенокардия с болью в правой руке; хуже при наклоне; лежа на правом боку; лучше от растирания и давления. Сердцебиение. Пульс аритмичный, очень частый. Пульсация во всем теле.

**Шея и спина.** Шея болит, хуже от усталости. Ощущение разбитости между лопатками. Ощущение, что тянет вверх из верхушки копчика.

**Конечности.** Боль распространяется из одного бока в другой — от одного крыла таза к другому. Пациент не может ходить по неровной почве. Голени болят, ноют, пациент не может держать их в неподвижности.

Ощущение, как будто прохладный ветер дует на голени. Жжение в ладонях и подошвах. Дрожание коленей. Покалывание в пальцах рук, как иголками. Паралитическая скованность в пальцах рук. Шатающаяся походка; пациент не может ходить прямо. Ощущение сухости в суставах.

**Кожа.** Покалывание, пощипывание, ползание мурашек, жжение в разных местах.

**Сон.** Пациент не может спать из-за дикого ощущения в голове.

**Лихорадка.** Пациент зябнет на прохладном открытом воздухе; что касается остальных симптомов, то становится лучше.

**Диф.** диагноз. Aloe, Plat., Puls., Spig.

## LITHIUM CARBONICUM

**Общее.** Это средство оказывает заметное воздействие на голову; глаза; сердце; мелкие суставы и мочевыделительную систему.

Ревматизм сопровождается поражением сердца и глаз. Во всем теле ощущается **БОЛЕЗНЕННОСТЬ и тяжесть**. Следы ушибов (синяки) после падений и ударов. Жестокие пронзающие боли, как от раскаленных докрасна игл. Давление, направленное изнутри наружу, в голове, в области пахового кольца; в промежности, в грудной клетке. Боль, как от уколов тупой иглой. Мочекислый диатез. Паралитическая скованность во всем теле. Прострация. *Повышенная кислотность желудочного сока*. Грузный, с большим весом человек. Подагра. Последствия ушибов и падений.

**Хуже.** Ночью. В связи с менструацией; после менструации, при подавлении менструаций.

**Лучше.** От еды. От мочеиспускания. От движения.

**Психика.** Склонность плакать по поводу своего одинокого существования. С трудом запоминает имена.

**Голова.** Головная боль уменьшается от еды; но возобновляется и держится до следующего приема пищи. Головокружение со звоном в ушах. Головная боль из-за внезапного подавления (задержки) менструаций. Голова кажется слишком крупной.

**Глаза.** Кажутся сухими и болят, хуже от чтения. Вертикальная гемианопсия: правая половина предмета не видна, хуже во время менструации. Солнечный свет слепит глаза.

**Нос.** Опухший; *красный*, особенно справа. Насморк; на открытом воздухе из носа капает.

**Уши.** Боль за ухом (слева), распространяющаяся в шею.

**Лицо.** Обе щеки покрыты сухими, похожими на отруби чешуйками.

**Горло.** Комочки слизи сползают в горло. Болезненность из горла распространяется в ухо.

**Желудок.** Грызущее ощущение в желудке; сопровождается с болью в левом виске; лучше от еды. Повышенная кислотность желудочного сока. Не выносит даже незначительного давления одежды; из-за ощущения переполнения в подложечной области.

**Живот.** Боль в области пахового кольца (слева), напоминающая давление изнутри наружу. Понос после фруктов или шоколада.

**Мочевыделительная система.** Боль в области мочевого пузыря, после мочеиспускания распространяющаяся в семенной канатик. Моча скудная; при этом беспокоит сильная жажда; в моче красно-коричневый осадок. Мочи мало, несмотря на потребление нормального количества жидкости.

**Мужские половые органы.** Эрекции после обильного мочеиспускания.

**Женские половые органы.** Боль в молочных железах, которая распространяется в руки и далее — в пальцы.

**Дыхательные органы.** Вдыхаемый воздух кажется холодным, даже воздух, достигший легких. Ощущение сжатия грудной клетки.

**Сердце.** Боли в сердце, болезненность в сочетании с глазными симптомами; боли распространяются в голову; сопровождаются болью в мочевом пузыре; усиливаются при сгибании туловища; перед менструацией; лучше после мочеиспускания. Дрожание и трепетание сердца — хуже от неприятностей, разочарования.

**Конечности.** Болезненность пальцев рук — лучше, когда пациент берет что-нибудь в руку, зажимает в руке. Боль в голеностопном суставе во время ходьбы. Боль в суставах уменьшается от очень горячей воды.

**Кожа.** Лишай в области бороды и усов. Сухая, грубая кожа. Экзема.

**Диф. диагноз.** Lyc, Nat-p., Sul-ac.

## LOBELIA INFLATA

**Общее.** Лобелия стимулирует *сосу до двигательные нервы, усиливает секрецию*; вызывает РАССЛАБЛЕНИЕ; а также слабость; при этом возникает потоотделение, ощущается смертельная дурнота, пациенту становится плохо; дыхание стесненное, хриплое. Пациент сидит, опершись локтями на колени. Покальвание повсюду. Не выносит запаха табака, хотя сам имеет к нему пристрастие. Тошнота и рвота почти при всех заболеваниях дыхательных путей или желудка.

**Хуже.** От купания в холодной воде. От подавления симптомов. От сна; после сна. От табака. От чая. Из-за инородного тела. От незначительного движения.

**Лучше.** От быстрой ходьбы. От небольшого количества еды.

**Психика.** Пациент унылый. Всхлипывает, как ребенок.

**Голова.** Сильная тупая боль в голове (тяжесть). Головокружение со страхом смерти.

**Уши.** Глухота вследствие подавления выделений из уха или из-за подавления экземы.

**Лицо.** Обливается холодным потом. Лицевая невралгия (слева) при задержке менструации.

**Рот.** Сильное слюнотечение: сопровождается позывами на рвоту, икотой; одышкой; при этом бывает хороший аппетит. Кислый, жгучий привкус во рту.

**Горло.** Ощущение комка в горле: он мешает глотать.

**Желудок.** Как будто в желудке — комок. Смертельная тошнота: в том числе при головокружении; лучше немного попить или поесть; хуже ночью и ранним утром. Тошнота и рвота: сопровождаются обильным потоотделением; пот выступает на лице (холодный); в том числе при заболевании дыхательных органов. Склонность к обмороку и ощущение слабости в эпигастрии.

**Мочевыделительная система.** Темно-красная моча; красного цвета осадок. Подавление мочевого выделения (задержка мочи) или редкое мочеиспускание.

**Женские половые органы.** Утренняя дурнота; внезапно проходит от небольшого количества еды и питья. Родовые схватки сопровождаются одышкой. Боль в крестце и ощущение тяжести в половых органах.

**Дыхательные органы.** Одышка: нервная; при родовых схватках; из-за ощущения, что клин вбит в гортань; сопровождается покальванием во всем теле, уменьшается от быстрой ходьбы. Астма. Спастический кашель в сочетании с чиханием, отрыжкой или болью в желудке. Хрипы в груди, но мокрота не отхаркивается. Сжатие или стеснение в груди с ощущением ее переполнения. Старческая эмфизема.

**Сердце.** Кажется, что сердце может остановиться. Пульс слабый или мягкий, ровный.

**Спина.** Боль в крестце; пациент не выносит даже легкого прикосновения; сидит наклонясь вперед.

**Кожа.** Отечные бляшки; в сочетании с экхимозами (внутрикожными кровоизлияниями). Покальвание и зуд кожи в сочетании с тошнотой.

**Диф. диагноз.** Ant-t., Ip., Tab.

## LOLIUM TEMULENTUM

**Общее.** Это средство полезно при параличах. Дрожание и конвульсии; дрожательный паралич (паркинсонизм). Упадок сил и двигательное беспокойство.

**Хуже.** От сырости; в сырую погоду.

**Психика.** Тревожный и подавленный.

**Голова.** Головокружение; пациент должен закрыть глаза. Голова тяжелая.

**Рот.** Язык дрожит. Речь затруднена; пациент не может полностью выговорить слово.

**Желудок.** Тошнота; рвота. Сильный понос.

**Конечности.** Неустойчивая походка. Дрожание всех конечностей; пациент не может писать; не может держать в руке стакан с водой. Спазмы в мышцах рук и голеней. Жесткая боль в икроножных мышцах; как будто они связаны веревкой.

**Лихорадка.** Внезапная дрожь и ощущение холода повсюду, особенно в конечностях.

**Диф. диагноз.** Lath., Sec.

## LYCOPERSICUM

**Общее.** Томат оказывает выраженное действие на дельтовидную мышцу и грудные мышцы; боль уменьшается, когда пациент поднимает руку вверх и наружу.

Боли, сохраняющиеся после гриппа.

**Голова.** Головная боль начинается в затылке, распространяется на всю голову и сосредоточивается со всей свойственной ей интенсивностью в висках; хуже от табачного дыма.

**Диф. диагноз.** Sang.

## LYCOPODIUM

**Общее.** Ликоподий называют растительной серой. Он оказывает влияние на усвоение пищи, **ОБМЕН ВЕЩЕСТВ**. Характерно **СЛАБОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ**.

Ликоподий воздействует на **МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**, при этом большинство симптомов возникает **НА ПРАВОЙ СТОРОНЕ** тела, а затем **перемещается на левую**. Кроме того, это средство лечит болезни **ГОРЛА**; **органов грудной клетки**, яичников. Болезнь развивается постепенно; приводит к снижению функциональных способностей, серьезно нарушается деятельность печени.

Глубоко укоренившиеся, прогрессирующие хронические болезни. *Повторение симптомов или их чередование*: озноб возникает вслед за ознобом, после покраснения наступает бледность; чередуются сгибание и разгибание, совершаются автоматические действия. *Рецидивирующие заболевания*. Прострация, упадок сил и душевных, и физических.

Ликоподий подходит старым или рано состарившимся людям, у которых на коже видны желтоватые пятна, а также слабым детям, характеризующимся преждевременным развитием. Пациенты типа Ликоподия обладают сильным *интеллектом*, но имеют недостаточную мышечную силу; страдают от недостатка жизненного тепла; плохого кровообращения; кажется, что кровь не течет вовсе; их конечности холодные, немеют; ощущение онемения может возникать на отдельных участках. Симптомы появляются внезапно: боли возникают и исчезают внезапно; либо симптомы провоцируют гнев, резкие сокращения мышц и т.д.

Пациент *худой*, увядший и **НАПОЛНЕН ГАЗАМИ**. **ПОВЫШЕННАЯ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДКА**; *кислый* привкус во рту, кислая отрыжка и т.д. Болезни и их симптомы распространяются сверху вниз, из вышележащих органов — в нижележащие: простуда, похудание и т.д.

*Камнеобразование*: камни желчного пузыря, песок в моче. Отеки; асцит при болезнях печени. Ощущение *холода*; холод в отдельной части тела, в голове, горле и т.д. *Сухость*: ладоней, подошв, влагалища, кожи и т.д. Образование *ссадин, саднение*: в складках кожи, в области ануса, сосков и т.д.

Ощущение ползания мурашек на больных конечностях. Паралич. Карцинома. Воспаление костей, преимущественно в области эпифизов; размягчение (остеомалация) и кариес костей (остеомиелит). Судороги: пациент вскрикивает; машет руками, появляется пена изо рта.

*Повышенная чувствительность к боли*; пациент выходит из себя от боли. Ощущение внутреннего паралича. Мочекислый диатез.

Болезненные последствия переживания страха, испуга, разочарования, гнева, тревоги; лихорадки; поднятия чрезмерной тяжести; мастурбации; езды в экипаже; жевания табака; употребления вина. Во время климакса у женщин отмечается гипертрофия одной половины тела. Исхудание (гипотрофия) у младенцев. Кровотечения; в том числе темной кровью. Эректильные опухоли. Нарывы, периодически рецидивирующие. Исхудание и слабость из-за потери жизненных соков.

**Хуже. ОТ ДАВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ. ОТ ТЕПЛА.** При пробуждении. От ветра. *От еды*; даже от небольшого количества; или когда ест досыта; от устриц. *Когда расстроено пищеварение, при несварении*. С 16 до 20 ч. В сырую погоду, в бурю. От давления. Перед менструацией или из-за ее подавления. От молока. От овощей, капусты, бобовых; от хлеба, кондитерских изделий (пирожных и т.д.).

**Лучше. ОТ ТЕПЛОГО ПИТЬЯ**; от теплой пищи. От прикладывания холода — от холодных аппликаций. *От движения. От отрыжки. От мочеиспускания*. После полуночи.

**Психика.** Спутанность сознания из-за ежедневных забот. Пациент проявляет умственную активность, но слабеет. Меланхолия; боится оставаться один, боится людей; пугается собственной тени. Чувствителен, плачет, когда его благодарят; или при встрече с другом. *Пугливый*; боится людей, пугается присутствия новых людей — всего, даже звонка в дверь. Потеря уверенности в своих силах; из-за дурных предчувствий; нежелание

предпринять что-то новое; но если все-таки берется за что-то новое, с легкостью и без проблем осуществит задуманное.

**ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ СЕРДИТЫЙ**, печальный и тревожный. Неистовый, страстный; своевольный. *Деспотичный; требовательный*; скрытный или отчаявшийся. Неправильно произносит или пишет слова или звуки. Невыносимо видеть что-нибудь новое. Не может прочесть написанное им самим. Торопливо ест. Начальная стадия паралича мозга. Плачет весь день. Становится печальным, когда слышит музыку вдалеке; либо делается веселым и бодрым. Полон ненависти. Экцентричный. Скряга, скупой. Нервное истощение; в том числе после гриппа. Тревожные мысли, кажется, что скоро умрет. Нерешительность. Робость. Смирение, отказ от притязаний. Мизантропия — избегает даже своих детей. *Влюбчивый*. Недоверчивый; придирчивый. Подозрительный.

**Голова.** Трясет головой без видимой причины; или непроизвольно, сначала медленно, затем быстро. Испытывает головокружение, когда смотрит на вращающийся предмет. Голова холодная. Боль в висках, как будто они стиснуты, сдавлены; хуже во время менструации. Боль появляется с одной стороны, потом перемещается на другую сторону, где усиливается. Головная боль усиливается, если пациент питается нерегулярно; когда ложится, когда наклоняется; лучше, когда раскрывается. Пульсирующая боль в затылке; в том числе ночью, сильнее, когда жарко.

Волосы выпадают, рано седеют. Преждевременное облысение; в том числе после заболевания органов брюшной полости; после родов. *Глубокие морщины на лбу* при болезнях органов брюшной полости, дыхательных органов и головного мозга; а также у скупых людей. Перхоть.

Гидроцефалия. Менингит; в том числе туберкулезный. Воспалительного происхождения головная боль — хуже, когда выделения из носа уменьшаются. Пульсация в голове после каждого приступа кашля; головная боль возникает, когда пациент тужится во время стула.

**Глаза.** Полуоткрыты. Гемианопсия. Дневная слепота. Искры перед глазами; в темноте. Ячмени на веках — ближе к внутреннему углу глаза. Полип у внешнего угла глаза. Катаракта; в том числе при подавлении менструаций. Глаза кажутся холодными, горячими, слишком большими.

Уши. Гудение и рев в ушах; при тугоухости; каждый звук имеет особое эхо. Густые желтые, отвратительные выделения из уха при глухоте. Экзема возле ушей, за ушами. Ощущение, как будто горячая кровь прилила к ушам.

**Нос.** Нос заложен; пациент сопит, гнусавит (насморк); дышит ртом; ребенок внезапно просыпается и трет нос. *"Игра" крыльев носа:* при заболеваниях головного мозга, легких и органов брюшной полости. Ощущение сухости в задних отделах носа. Озена; едкие выделения из носа. Хронический насморк; пациент часто сморкается. Нос беспокоит с детства. Обостренное обоняние.

**Лицо.** Лицо *желтоватое*; бледное; серое; с синими кругами вокруг глаз. Лицо увядшее, сморщенное и худое. Приливы жара к лицу. Подергивание мышц. *Рот открыт*. Болезненность губ. Искажение лица и рта. Глупое выражение лица.

**Рот.** Зубная боль сопровождается опуханием щеки; лучше, если приложить тепло. Язык: сухой; черный; потрескавшийся; тяжелый и непослушный (одеревеневший); *опухший*; двигается туда-сюда, или быстро высовывается из рта; дрожит. Болезненная язва на кончике языка или под языком.

Речь невнятная; пациент заикается на последнем слове. Слюна засыхает на нёбе и на губах. Сухость во рту без жажды. Нижняя челюсть отвисает; в том числе при лихорадке. Зубы желтые. Рот влажный — слюнотечение. Кровотечение из десен возникает, когда к деснам прикасаются или когда пациент чистит зубы. Вкус чувствует слишком остро. Во рту привкус: кислый, горький, плесени. Маленькие опухоли во рту в разных местах.

**Горло.** Ощущение, как будто в пищеводе твердый предмет. Шар подкатывается к горлу и прилипает к нему. *Ангина*; хуже от холодного питья. Опухание и нагноение миндалин. Хроническое увеличение миндалин. Дифтерия — налеты распространяются справа налево. Пища и питье вытекают через нос; в том числе, когда пациент глотает. Горло холодное. Ощущение, как будто шар поднялся к горлу. Ощущение сжатия, заставляющее постоянно делать глотательные движения.

**Желудок.** Слабое пищеварение. Потеря аппетита. *Пациент голоден, но быстро насыщается. ДАЖЕ ОТ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ПИЩИ ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ЖЕЛУДКА.* Икота. *Незавершенные жгучие отрыжки*; жжение достигает только глотки и сохраняется часами. Мучнистая и вызывающая образование газов пища, капуста, бобы, устрицы не усваиваются — от них становится хуже. Ощущение пустоты в желудке после приема пищи, но голода нет.

Желание сладкого. Отвращение к супу, хлебу. Волчий голод: чем больше ест, тем сильнее аппетит. Пациент просыпается ночью с чувством голода. Рвота пищей и желчью; свернувшейся кровью; темно-зелеными массами — после еды и питья. Рак желудка; прободная язва. Ощущение, как будто в желудке что-то взбалтывается, сбивается. Грызущее ощущение в желудке, лучше от питья горячей воды. Желание сладкого, деликатесов, пирожных и т.д. Пища кажется кислой на вкус. Предпочитает, чтобы пища и питье были горячими. Холод в желудке. Плохое самочувствие от употребления в пищу лука.

**Живот.** В эпигастрии возникает ощущение тревоги, давления. Как будто повязан пояс вокруг талии. **МЕТЕОРИЗМ: СИЛЬНЫЙ, СОПРОВОЖДАЕТСЯ УРЧАНИЕМ**, живот растягивает, распирает; *лучше, когда газы перемещаются в нижние отделы кишечника*. Чувствительная, застойная печень. Хронический гепатит; атрофия печени; мускатная печень. Ощущение, как будто в животе что-то двигается вверх и вниз; или как будто твердый предмет перекачивается, когда пациент поворачивается на правый бок. Асцит; из-за болезни печени. Болезненность живота сильнее в нижних отделах (в гипогастрии); возникает поочередно то с одной стороны, то с другой. Коричневые пятна на животе.

Колика у маленьких детей, хуже вечером. Запор: у детей; сопровождается безрезультатными позывами из-за спазма сфинктеров; ощущение после стула, что большое количество кала осталось в прямой кишке.

Стул: содержит песок, он маленького объема, затруднен; в первой порции стул твердый, отходит с трудом; затем выделяется мягкий стул или жидкий, в виде сплошного потока (как из крана); после стула возникает обморочное состояние и слабость.

Геморрой сопровождается тупыми болями; узлы болезненные при прикосновении; лучше от горячей ванны.

Чередование поноса и запора. Ощущение саднения в заднем проходе. Запор возникает, когда пациент находится вдали от дома или путешествует. Ощущение холода в прямой кишке перед стулом. Запор или понос во время беременности. Гастроэнтерит от испуга. Понос из-за холодного питья. Продолжительное жжение в прямой кишке.

**Мочевыделительная система.** Учащенные позывы на мочеиспускание, лучше от езды в автомобиле. Почечная колика, камень мочеточника (справа), боль распространяется в мочевой пузырь. Моча: скудная; *ребенок плачет перед мочеиспусканием*; особенно те дети, которые с криком просыпаются от боли, беспокойно мечутся, размахивая руками и ногами; *красный песок в моче*; моча вытекает медленно; пациент должен тужиться; подавление мочевыделения; задержка мочи.

Моча: как молоко, мутная. Полиурия ночью. Гематурия. Непроизвольное мочеиспускание, особенно при лихорадке или от испуга во время коитуса. Моча кровянистая; при параплегии или иногда — при запоре. Моча обжигающе горячая.

**Мужские половые органы.** *Сексуальное истощение*: импотенция; слабые эрекции; мужчина засыпает во время коитуса. Желтого цвета опухоль позади венчика головки полового члена. Истошающие поллюции. Увеличение предстательной железы. Преждевременная эякуляция.

**Женские половые органы.** Менструации: выделяются сгустки крови и сыворотка; кровь выделяется из половых органов во время стула. Сухость, жжение во влагалище; хуже во время коитуса и после него.

*Бели* едкие; выделяются *периодически*; напоминают молоко; хуже перед полнолунием. Физометра. Режущая боль из правого яичника перемещается в левый. Опухоли яичников, отек яичников. Отечность матки. Твердые, с ощущением жжения, узлы в молочных железах, сопровождающиеся колющими, ноющими болями и болезненностью молочных желез. Ссадины на сосках; болезненность, трещины, кровоточивость сосков. Кажется, что плод кувыркается, делает сальто в утробе матери. Дис-менорея; тяжелая, сопровождается обмороком. Подавление менструаций; они отсутствуют на протяжении месяцев. Позднее наступление менструаций в сочетании с недоразвитием молочных желез в пубертатном возрасте. Секреция молока у небеременных женщин. У младенца возникает рвота кровью после кормления грудью, на которой кровоточит сосок.

**Дыхательные органы.** Страстно желает свежего воздуха, но от него становится холодно. Короткое, хриплое дыхание — хуже, когда лежит на спине. Кашель: сухой, щекощущий? мучительный; у тщедушных хилых мальчиков; возникает днем и ночью; глубокий, гулкий, кашель; как от вдыхания паров серы; усиливается, когда пациент спускается вниз по лестнице; кашель сопровождается исхуданием; усиливается при "пустом" глотании, при вытягивании шеи; при глубоком дыхании.

Соленая зеленовато-желтая, в виде комочков или зловонная мокрота. Неразрешившаяся, затяжная пневмония. Коричнево-желтые пятна на груди. Абсцесс легкого, туберкулез легкого. Затруднение дыхания при гидротораксе и/или гидроперикарде; сопровождается раздуванием крыльев носа. Ощущение напряжения в грудной клетке в сочетании со жжением.

**Сердце.** Аневризма сердца. Заболевание аорты. Сердцебиение, сопровождающееся раздуванием крыльев носа ночью; хуже лежа на правом боку; сопровождается похолоданием лица и стоп. Пульс: частый, учащается после еды; вечером. Ощущение, что циркуляция крови прекратилась. Гипертрофия сердца.

**Шея и спина.** Скованность и опухание одной половины шеи. Жжение, как от горячих углей, между лопатками. Боль в спине и в правом боку из-за конгестии печени. Боль в пояснице; хуже, когда пациент сидит прямо; лучше после мочеиспускания. Скованность в спине. Исхудание в области шеи. Ощущение кипения, бурления. Люмбаго — хуже от малейшего движения (применяется после *Bry.*).

**Конечности.** Абсцесс в подмышечной области (справа). Кисти и стопы немеют; возникают судороги в кистях и стопах. Пальцы на руках подергиваются во сне. Липкий пот на пальцах рук. Из-за боли голени дергаются кверху. Судороги в икроножных мышцах при ходьбе; в том числе ночью. Одна стопа горячая, другая — холодная, или стопы холодные, потные. Постоянный, вызывающий беспокойство жар в кистях.



Ишиас справа с ухудшением от давления; пациент не может лежать на больном боку, становится лучше от горячих аппликаций и ходьбы. Спазмы в пальцах стоп; в том числе ночью. Боль, как от камешка, в пятках — возникает, когда пациент наступает на них. Онемение пяток. Сухие ладони. Варикозное расширение вен на голених. Отек стоп — усиливается и поднимается вверх, пока не возникнет асцит. Боль в костях ночью. Искривление костей и кариес (остеомиелит). Исхудание одной кисти или одной голени. Кисти и стопы становятся тяжелыми, вялыми, дрожат — лучше от движения. Болезненные мозоли на подошвах. Контрактуры пальцев рук и ног. При ходьбе пальцы на ногах согнуты. Обильный вонючий пот на стопах.

**Кожа.** Сухая кожа; в складках образуются ссадины. Подкожные абсцессы. Крапивница; в том числе хроническая — хуже от тепла. Эректильные опухоли, ухудшение перед менструацией. Кровяные нарывы (фурункулы). Фурункулы не созревают, а становятся синими. После нарывов и пустул остаются следы в виде участков уплотнения кожи, которые превращаются в длительно сохраняющиеся узелки. Опухание в виде волдырей. Экзема, связанная с заболеваниями мочевыделительной системы, желудка, печени. Псориаз. Язвы со свищевыми ходами. Плотно прикрепленные корки, коросты. Липкий и зловонный пот.

**Сон.** Сонливость, дремота в течение дня; при пробуждении ребенок вздрагивает, сердится, брыкается, ворчит или держится за свою мать. Просыпается в испуге. Тревожные сновидения, видит несчастья, катастрофы. Ребенок спит весь день и плачет всю ночь. Пациент смеется или плачет во сне.

**Лихорадка.** Ощущение холода; часть тела холодная, как лед; холодная голова, холод в животе, в желудке, в горле и т.д.; усиливается при кашле. Тело становится холодным при кашле. У пациента возникает ощущение, что он лежит на льду. По окончании озноба снова возникает озноб; затем — рвота; озноб возникает после первого сна. Зловонный, липкий пот; под мышками, на стопах; пахнет луком. Лихорадка продолжительная, послабляющая, перемежающаяся.

**Дополнительно.** Calc, Iod., Kali-c, Lach., PULS., SULPH.

**Диф. диагноз.** Carb-v., Sil.

## LYCOPUS VIRGINICUS

**Общее.** Ликопус — это *СЕРДЕЧНОЕ СРЕДСТВО*. Он понижает кровяное давление, урежает сердечные сокращения, увеличивает продолжительность систолы. Сердечные симптомы сопровождаются множеством других, побочных, или характеризуются *УЧАЩЕННЫМИ, БЕСПОРЯДОЧНЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ СЕРДЦА*.

Кровотечения при поражении клапанов сердца; или пассивное кровотечение из носа, из легких, из геморроидальных узлов и т.д. Боли, меняющие локализацию: из сердца перемещающиеся в глаза; из головы — в сердце; из сердца — в запястье и т.д. Токсический зоб. Болезненные последствия подавления геморроидального кровотечения.

**Хуже.** От волнения. От напряжения. От жары. После сна. Лежа на правом боку. Из-за злоупотребления сердечными лекарственными препаратами. От подавления симптомов. Когда думает о симптоме.

**Психика.** Нервничает, торопится и дрожит. Медленно соображает.

**Глаза.** Выпучены, нависают (экзофтальмический зоб); в сочетании с беспорядочной сердечной деятельностью. Боль в надглазничной области (справа) в сочетании с ноющей болью в яичках (слева).

**Лицо.** Коричневато-желтое лицо; оно ничего не выражает; в том числе во время менструации; одутловатое лицо.

Желудок. Отрыжки с привкусом чая. Понос при желтухе, связанной с сердечной недостаточностью.

Мочевыделительная система. Выпивает много воды и выделяет большое количество мочи; это сопровождается лабильностью сердечной деятельности. Мочевой пузырь кажется растянутым, когда пуст.

**Мужские половые органы.** Невралгическая боль в яичках в сочетании с болью в надглазничной области.

**Дыхательные органы.** Пациент задыхается, когда ложится. Кашель сопровождается кровохарканьем и слабой сердечной деятельностью. Кашель, обусловленный болезнью сердца. Глубокий сильный кашель вечером и ночью — пациент не просыпается. Сладковатая мокрота.

**Сердце.** Сердечная деятельность *беспорядочная, неистовая; чрезвычайно ускоренная, бурная*. Усиленная сердечная деятельность ночью. Сердцебиение и сердечные недомогания усиливаются, когда пациент думает о них.

*Стеснение в области сердца; боли, болезненность, ощущение, что сердце щемит, чувство сжатия.* Пульс: большой, полный, мягкий, медленный, слабый, аритмичный, перемежающийся; удары пульса возникают не синхронно с ударами сердца.

**Спина.** Горячая спина, ощущается тупая боль ниже лопатки (правой).

**Лихорадка.** Холодное тело.

**Диф. диагноз.** Act., Coll., Crat.

## LYSSIN

**Общее.** Этот нозод готовят из слюны бешеной собаки. Он действует на нервную систему, горло и половые органы.

**Чувства крайне обострены.** Конвульсии, спазмы возникают из-за слепящего света или при виде текущей воды. Тупые боли в костях. Болезни вследствие неестественно повышенного сексуального желания. Последствия укуса собаки. Синеватая окраска ран. Дрожание или ощущение трепета во всем теле.

**Хуже.** От шума или вида текущей воды. От солнечного тепла (жара). От блестящих предметов. От ветра, сквозняков. При мысли о жидкостях. При наклоне. От плохих новостей. От нервных переживаний, потрясений. От езды в экипаже.

**Лучше.** Наклониться назад, прогнуться. От легкого растирания. От горячей ванны или бани (с паром).

**Психика.** Страх сойти с ума. Гнев. Быстрая речь. Нетерпеливый. *Неистовый темперамент:* пациент склонен совершать безрассудные поступки; например, может выбросить ребенка из окна. Скитается, бродит. Станные намерения и предчувствия; в том числе во время беременности. Пациент грубый, оскорбляет, кусается и дерется. Пациенту кажется, что он физически больше не в состоянии переносить свои страхи.

**Голова.** Головная боль; из-за укуса собаки — бешеной или здоровой — не имеет значения. Хуже от шума текущей воды, от яркого света. Запрокидывает голову назад, когда чихает. Сухие волосы становятся жирными.

**Рот.** Слюна: плотная, тягучая, вязкая, пенная; пациент *постоянно выплевывает слюну*. Речь затруднена из-за спазмов в горле.

**Горло.** Ангина: постоянное желание глотать, хотя это трудно; когда глотает воду, давится из-за спазмов в пищеводе.

**Мочевыделительная система.** Когда видит текущую воду, возникает позыв на мочеиспускание или на стул; либо пациент не может помочиться, пока слышит, как течет вода.

**Мужские половые органы.** Неестественно повышенное сексуальное желание. Болезненные эрекции и учащенные поллюции. Во время коитуса эякуляция происходит слишком поздно или не происходит совсем.

**Женские половые органы.** Пациентка ощущает свою матку. Влагалище чувствительное, из-за чего половой акт становится болезненным. Смещение матки. Бели: обильные, стекают по ногам. Станные намерения, желания или пристрастия — во время беременности.

**Дыхательные органы.** Лающий кашель.

**Сердце.** Колотье в сердце возникает, когда пациент слышит церковные колокола. Боль, как будто иглы вонзаются в сердце.

**Шея.** Боль в шее уменьшается, если запрокинуть голову.

**Сон.** Часто зевает, хотя сонливости нет, в особенности, когда слушает других.

**Диф. диагноз.** Lac-c, Lach.

## MAGNESIA CARBONICA

**Общее.** Это средство вызывает катаральное воспаление желудка и кишечника, сопровождающееся выраженным *повышением кислотности желудочного сока*. Кислый запах от всего тела, особенно у детей; рвота кислыми массами; регургитация кислой жидкости; *кислый стул* и т.д.

Магнезия карбоника воздействует на нервы (лицевые и зубные), вызывая резкие стреляющие боли по ходу этих нервов; пациент при этом *вынужден прохаживаться*.

Онемение и ощущение распирающего, расширения в разных частях тела. Заболевания скуловых костей. Во всем теле ощущается усталость, оно болит, особенно голени и стопы.

Это средство подходит болезненным, изнуренным, нервным, страдающим метеоризмом и дряблостью тканей людям, в особенности женщинам, детям, грудным младенцам. Чувствительность к воздействию незначительных факторов. *Исхудание*. Истощение, дистрофия (маразм): дети не прибавляют в весе, несмотря на хорошее питание и лечение. Пациент не выносит, когда кисти закрыты, но если он обнажает их, кисти мерзнут.

Спазмы. Эпилептические припадки; часто внезапно пациент падает во время ходьбы или когда стоит, сознание сохранено.

Болезненные последствия потрясения (шока), ударов, душевного страдания, неприятностей, приступа ярости, беременности, чрезмерных забот и беспокойства. Болезненные последствия прорезывания зубов, нерегулярного питания; употребления молока. Сухость: слизистых оболочек, кожи. Дети, склонные к образованию нарывов (фурункулов). Увеличение желез.

**Хуже.** От холода; от холодного ветра; от холодных сквозняков. При перемене погоды. Ночью. От крахмалистой пищи; от молока. В покое. От незначительных причин, легкого прикосновения и т.д. От раскрывания тела. Каждый второй день; каждые три недели.

**Лучше.** От движения. Когда прохаживается, прогуливается на открытом воздухе. От теплого воздуха.

**Психика.** Дрожание; тоска, мука и страх, как будто что-то может случиться; это продолжается весь день; лучше, когда пациент ложится спать. Вздрагивает от легкого прикосновения. Грустный и молчаливый. Ощущение крайнего удивления, ошеломления: упаковывает и распаковывает свою одежду, не сознавая, что делает это.

**Голова.** Головокружение усиливается, когда пациент встает на колени. Боль в голове с ощущением, как будто дергали, тянули за волосы; хуже от нервного напряжения, при наклоне. Зуд кожи волосистой части головы; хуже в сырую погоду. Мозг кажется тяжелым. Затылочная кость проваливается — у истощенных детей.

**Глаза.** Черные точки перед глазами. Кажется, что глазные яблоки увеличены, они чувствительны к давлению. Помутнение роговицы. Помутнение хрусталика (катаракта).

**Уши.** Глухота возникает внезапно и подвержена изменениям. Ощущение растяжения в среднем ухе. Уши немеют. Глухота; возникает, когда пациент простывает; при прорезывании зуба мудрости.

**Нос.** Насморк и заложенность носа перед менструацией. Насморк без выделений из носа; пациент дышит через нос. Хроническое заболевание носа.

**Лицо.** Рвущая, ковыряющая, роющая боль с одной стороны; пациент вынужден двигаться, прохаживаться. Боль и припухлость в области скуловых костей. Ухудшение от холодного ветра. Опухоли скуловых костей. Восковая бледность лица. Неряшливый вид. Напряжение в лице, как будто на коже высох яичный белок.

**Рот.** Рвущая, роющая, жгучая боль в зубах; хуже во время беременности; от езды в экипаже; от холода и в покое. Болезненные состояния, связанные с прорезыванием зубов мудрости. Зубы кажутся слишком длинными. Сухость во рту ночью. Привкус во рту: горечи; кислый. Часто внезапно пациент начинает заикаться.

**Горло.** Ангина; хуже перед менструацией. Отхаркивает из горла комочки, напоминающие творог. Колющая боль в горле — хуже при разговоре и при глотании.

**Желудок.** Страстное желание мяса; фруктов, кислого; овощей. Часто перекусывает. Кислые отрыжки. Изжога. Рвота непереваренным молоком или горькой жидкостью. Сильная жажда. Отвращение к зелени. От капусты, картофеля становится плохо — не усваиваются. От молока пациент отказывается или оно вызывает боль в желудке.

**Живот.** Режущие; сжимающие; давящие боли (во время колики), после которых возникает зеленый стул, от которого состояние ухудшается.

**СТУЛ пенистый; ЗЕЛЕНОВАТЫЙ, КАК ВОДА, КАК ПЕНА НА ПОВЕРХНОСТИ ЛЯГУШАЧЬЕГО ПРУДА.** Молоко не усваивается у грудных детей и обнаруживается в стуле непереваренным. Кислый стул.

Запор после потрясения, шока или нервного перенапряжения. Стул содержит непереваренную пищу, желеобразные жирные массы; он травянисто-зеленый; или сухой, твердый, крошащийся, как белая глина, как замазка. После колики появляются бели. Рези возле пупка уменьшаются после выделения кишечных газов.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание во время ходьбы или при вставании со стула.

**Мужские половые органы.** Выделение сока простаты (простаторея) при отхождении кишечных газов.

**Женские половые органы.** Во время каждой менструации женщина падает в обморок и полностью теряет сознание. Менструальная кровь как густая черная патока; как деготь; вязкая; менструация запаздывает или скудная; кровотечение происходит только во сне; менструальное кровотечение ночью и при вставании или при укладывании в постель; оно прекращается при ходьбе или от давления на живот и при наклоне. На белье остаются трудно отстирываемые пятна.

Бели: белого цвета, едкие, они появляются регулярно после менструации, им предшествуют боли (колика).

**Дыхательные органы.** Пациент стремится на открытый воздух. Кашель приступообразный; с трудом отхаркивается жидкая, соленая, кровянистая мокрота. Болезненность грудной клетки, ощущение сжатия. Кашель из-за щекотания в гортани; в том числе ночью.

**Конечности.** Тяжелые, усталые стопы. Боль в правом плече; пациент не может поднять руку. Не выносит, когда кисти укрыты, но если открывает их, руки мерзнут. При ходьбе пациент не может поставить левую стопу на землю. Опухание под коленом.

**Сон.** Неосвежающий сон: утром чувствует себя более усталым, чем вечером, когда ложился спать. Просыпается в 2 или в 3 ч ночи и не может заснуть. Сонливость днем, бессонница ночью.

**Кожа.** Болезненная, сухая, чувствительна к холоду. Узлы под кожей. Волосы и ногти нездоровые.

**Лихорадка.** Пациентка мерзнет, зябкая; простывает; в том числе перед менструацией. Лихорадка ночью. Кислый, жирный, несмываемый пот.

**Диф. диагноз.** Rheum.

## MAGNESIA MURIATICA

**Общее.** Действие этого средства сосредоточивается вокруг ПЕЧЕНИ и ПЕРВОЙ; матки и прямой кишки. Поэтому Магнезия муриатика подходит нервным женщинам, страдающим заболеваниями матки и печени или болезнью сердца. Это средство бывает также необходимо пациентам, длительно страдающим от несварения желудка и заболевания желчево-водящих путей; мужчинам с больной печенью и сексуальными нарушениями; тщедушным детям, страдающим от рахита, во время прорезывания зубов.

Судорожные состояния, истерические симптомы. Истерический комок в горле. Это средство подходит при ухудшении после обеда: многие жалобы, например, приступы обморочной слабости, одышка, тошнота и дрожание и т.д. — возникают после обеда; улучшение же наступает от отрыжки.

Боли ковыряющие, спастические, стягивающие, *судорожные*, пронзающие. *Жжение*. Хроническое течение.

Болезненные последствия купания в море, особенно слабость. Когда пациент бодрствует, возникают удары, проходящие через все тело и напоминающие электрические разряды. Извращение вкуса и обоняния. Общая болезненность и чувствительность к шуму.

**Хуже.** *ЛЕЖА НА ПРАВОМ БОКУ. От шума. Ночью. От еды. От соленой пищи. От молока. От прикосновения.* От морского купания. От нервного напряжения.

**Лучше.** *ОТ СИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ.* Когда лежит согнувшись. *Свесить вниз;* больную часть тела. *От спокойного движения. На прохладном, открытом воздухе.*

**Психика.** Ощущение дискомфорта, неловкости; нервная возбудимость, пациентка всегда готова расплакаться. Пациентке кажется, что кто-то читает вслеп за ней, и она должна читать все быстрее и быстрее. Не хочет разговаривать.

**Голова.** Головная боль с ощущением, что голову распирает, она может лопнуть; хуже от движения, на открытом воздухе; лучше от сильного давления, теплого укутывания. Сильная потливость головы. В той части головы, на которой пациент лежит, возникает ощущение кипения воды. Ощущение, как будто дергали за волосы.

**Глаза.** Слезотечение и жжение в глазах возникает, когда пациент смотрит на что-нибудь при дневном свете — среди бела дня. Желтые склеры. *Tinea ciliaris.*

**Уши.** Чувствительность к шуму. Пульсация в ушах.

**Нос.** Красный, опухший. Озена: едкие выделения, корки. Потеря обоняния и вкуса после насморка или во время него. Ночью нос заложен, пациент вынужден дышать через рот.

**Лицо.** Бледное, желтое. Папулы на лице или на лбу, сопровождающиеся зудом; хуже ночью; в теплом помещении и перед менструацией. Волдыри на губах.

**Рот.** Зубная боль — хуже, если пища коснется зуба. Язык кажется обожженным, рот как будто ошпарен. Постоянно поднимается в рот белая пена. Пациент не воспринимает вкус. *Широкий, желтый, с фестончатым краем язык.*

**Горло.** Ощущение, как будто шар подкатывается к горлу; лучше от отрыжки.

**Желудок.** Страстное желание сладкого, деликатесов. Голоден, но не знает чего хочет. Срыгивание пищи при ходьбе. От молока; от соленой пищи становится хуже. Отрыжки с привкусом тухлых яиц; с привкусом лука. Икота во время и после обеда, способствующая возникновению рвоты.

**Живот.** *Болезненная, увеличенная печень;* при этом наблюдается вздутие живота; хуже, когда лежит на правом боку; возникает тянущее ощущение, если ложится на левый бок. Спазм желчного пузыря — лучше от еды. Метеоризм.

Стул: *СУХОЙ; узловатый;* в виде мелких шариков, как овечий помёт; он серый, крошится у заднего прохода. Позыв на стул отсутствует. Желтуха. Ленточные глисты. Колика: в том числе истерического характера, после нее появляются бели. Боль из печени распространяется в позвоночник или в эпигастрий.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание возможно только при напряжении мышц живота — то есть, если пациент тужится. Онемение уретры. В темноте пациент не может сказать с уверенностью, помочился он или нет. Стриктура после бужирования уретры. Моча выделяется по каплям, всегда кажется, что еще немного мочи осталось в пузыре.

**Мужские половые органы.** Боль в яичках и в семенных канатиках, хуже после коитуса; или из-за неудовлетворенного сексуального желания. Жжение в спине после коитуса.

**Женские половые органы.** Менструации: *обильные, кровь темная, в виде комочков,* похожа на деготь. Менструации сопровождаются спазмами, болью в спине и в бедрах; кровотечение более обильное, когда пациентка сидит, а не ходит. Дисменорея: лучше от давления на спину или лежа на твердой подушке. *Бели выделяются сплошным потоком, появляются после* спастической боли в животе (колики), после спазмов в матке; после каждого стула, в случае истерии. Метроррагия у старых дев, кровь свернувшаяся.

**Дыхательные органы.** Спастический сухой кашель — сильнее в первой половине ночи. Отхаркивание кровянистой мокроты или конгестия и болезненность органов грудной клетки; после купания в море. Стесненное дыхание, ощущение комка (*globus hystericus*).

**Сердце.** Сердцебиение и боль в сердце возникают, когда пациент сидит; лучше, когда ходит или лежит на левом боку. Функциональные сердечные расстройства при увеличении печени.

**Шея и спина.** Биение, пульсация под левой лопаткой. Ощущение ушиба или жжение в верхней части бедра (в области крыла таза); или в спине после полового акта (у мужчин). Спазмы в спине — хуже при ходьбе.

**Конечности.** Судороги в бедрах, хуже сидя. Бедра и икры напряжены; пациент вынужден шевелить конечностями. Онемение кончиков пальцев рук. Холод или беспокойство в области лодыжек, сильнее ночью. Режущая боль в пятках. Потливость стоп.

**Кожа.** Ощущение ползания мурашек по всему телу. Абсцесс: желтый, жидкий зловонный гной. Желтуха. Потливость головы и стоп.

**Сон.** Тревога и двигательное беспокойство возникают, как только пациентка закрывает глаза; это может быть связано с ощущением жара или из-за ударов, толчков в теле. Сон неосвежающий, пациент чувствует усталость утром.

**Лихорадка.** Озноб ощущается даже возле печки; лучше на открытом воздухе.

**Диф. диагноз.** Nat-m., Puls., Sep.

## **MAGNESIA PHOSPHORICA**

**Общее.** Магнезия фосфорика — это средство, которое доктор Шюсслер применял *при спазмах, конвульсиях, невралгических болях* и спастических состояниях вообще; это свидетельствует о влиянии этой соли на *НЕРВЫ* и *мышцы*.

Это средство подходит высоким, стройным, темноволосым пациентам с признаками невроза; или усталым, вялым, истощенным субъектам. *Нервные, напряженные, подверженные внезапным жестоким приступам невралгических болей пациенты*; боли резкие, *стреляющие, подобно молнии, внезапно меняющие локализацию*; иррадиирующие, ковыряющие, сжимающие; *заставляющие кричать*; вызывающие двигательное беспокойство и упадок сил и т.д.

**Подергивание мышц.** Тик. Спастические состояния: икота, зевота, хорея; писчий спазм, спазмы у пианистов и скрипачей и т.д. Сильная боль.

Болезненные последствия погружения ног в холодную воду, купания в холодной воде; работы с холодной глиной; катетеризации; прорезывания зубов; учебы. Недомогания у детей при прорезывании зубов. Хорея: лучше во время сна; хуже во время стула, от переживаний, эмоций. Паралич, дрожательный паралич (паркинсонизм).

**Хуже.** *ОТ ХОЛОДА; ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА*, от сквозняков, от раскрывания тела, от холодной воды. Лежа на правом боку. *От прикосновения. Периодически. НОЧЬЮ.* От молока. *От истощения.*

**Лучше.** *От тепла. От горячей ванны. От давления. Согнувшись пополам. От растирания.*

**Психика.** Женщина *всегда говорит о своих болях*. Пациент не расположен к учебе; к умственному труду. Сонливость возникает при каждой попытке заняться учебой. Постоянно разговаривает сам с собой, или сидит уныло в тишине, или перетаскивает вещи с места на место.

**Голова.** Голова болит после умственного труда; лучше от тепла. Ощущение, что все содержимое головы жидкое; как будто части мозга перемешались; как будто шапка на голове. Как будто в голове возникает электрический разряд, распространяющийся во все части тела.

**Глаза.** Надглазничные (супраорбитальные) боли уменьшаются от тепла. Подергивание век. Глаза горячие, болят; усталые. Нистагм; косоглазие, птоз. Светобоязнь.

**Уши.** Сильная невралгическая боль — хуже, когда пациент выходит на холодный воздух; от умывания лица и шеи холодной водой; сильнее болит за правым ухом.

**Лицо.** Невралгия усиливается, когда тело охлаждается; при умывании холодной водой или из-за того, что стоит в холодной воде, при открывании рта во время еды и питья.

**Рот.** Трещины в углах рта. Зубная боль уменьшается от тепла (от горячего), от горячих жидкостей. Язык чистый; в том числе при колике. Болезненная контрактура височно-нижнечелюстного сустава с резким подергиванием, направленным назад. Привкус бананов во рту. Пища имеет не свойственный ей вкус. Спастическое заикание.

**Горло.** Болезненная скованность в горле; ощущение опухания, отека (справа); при этом пациента знобит, он ощущает тупые боли во всем теле. Ангина нервного происхождения.

**Желудок.** Икота днем и ночью. Жгучая боль, рвота и икота уменьшаются от горячего питья; в том числе при раке желудка. Желание очень холодных напитков.

**Живот.** Боль в кишечнике; колика при метеоризме; лучше согнуться пополам; от растирания; от тепла; от давления; боль сопровождается отрыжками, от которых иногда бывает лучше. Ощущение переполнения и вздутия живота; пациент вынужден ослабить одежду; прохаживаться и постоянно выпускать кишечные газы. *Режущая боль* распространяется в бедра. Мышцы живота сокращены. Когда прекращается понос, возникают судороги или иные заболевания мозга.

**Мочевыделительная система.** Ночное недержание мочи вследствие нервной возбудимости. Невралгия мочевого пузыря после катетеризации.

**Женские половые органы.** Менструальная колика уменьшается, когда начинается кровотечение. Мембранозная дисменорея. Менструации: слишком ранние, кровь темная, вязкая, как деготь, выделяется ночью, оставляет с трудом удаляемые пятна. Невралгия яичника. Вагинизм.

**Дыхательные органы.** Спастический кашель, коклюш — лучше от прохладного воздуха. Спастическая, нервного происхождения астма.

**Сердце.** Стенокардия. Пульс лабильный. Сердцебиение нервного характера.

**Шея и спина.** Скованность в шее и спине. Спазмы, судороги. Кажется, что один позвонок отсутствует.

**Конечности.** Кожа на пальцах рук натянута. Боли в нижних конечностях; поочередно то с одной, то с другой стороны. Дрожательный паралич (паркинсонизм). Дрожание рук кистей. Писчий спазм, спазмы у музыкантов. Спазмы вследствие длительного напряжения, если долго пользуется инструментом. Судорожное сжатие, контрактура пальцев на руках. Ишиас сопровождается чувствительностью стоп.

**Кожа.** Лишай в области бороды и усов. Герпетические высыпания с образованием белых чешуек.

**Сон.** Возникает сонливость, когда пациент пытается заняться учебой. Спастическая зевота сопровождается ощущением, что произойдет вывих нижней челюсти, при этом текут слезы.

**Лихорадка.** Озноб пробегает вверх и вниз по спине, сопровождается содроганием тела, затем возникает удушье.

**Диф. диагноз.** Coloc, Dios.

## MAGNESIA SULPHURICA

**Общее.** Выражены кожные симптомы, признаки поражения мочевыделительной системы и женских половых органов.

Понос при мочеиспускании. Зеленоватая моча с красным осадком. Обильные, прерывистые менструации, кровь темная. Густые бели, такие же обильные, как и менструация.

Ощущение комка между плечами. Кажется, что спина сломана. Онемение левой руки и стопы. Ощущение ползания мурашек в кончиках пальцев на руках. Мелкие папулы по всему телу, они сопровождаются жестоким зудом. Бородавки; крупные, мягкие.

**Хуже.** Утром; когда проснется.

**Лучше.** От растирания. При ходьбе.

**Диф. диагноз.** Nat-s.

## MAGNETIS POLUS AUSTRALIS

**Общее.** Южный полюс магнита бывает полезен при врастании ногтей на стопах, когда ощущается болезненность с внутренней стороны ногтя большого пальца ноги; хуже при ходьбе или от легкого прикосновения.

## MALANDRINUM

**Общее.** Этот нозод готовят из токсина, выделяемого вирусом лошадиной оспы. Это очень эффективное средство для профилактики оспы и лечения осложнений вакцинации. Удаляет скопления раковых клеток, оставшиеся после удаления опухолей.

## MANCINELLA

**Общее.** Манцинелла показана, когда имеются яркие симптомы со стороны *кожи*, горла, а также психики. Особенно показана Манцинелла при депрессивных состояниях, возникающих в пубертатном возрасте и во время климакса и сопровождающихся повышенной сексуальностью.

**Едкость.** Жжение, жгучая боль в разных местах. Манцинелла способствует быстрому заживлению ран.

*Хуже.* От холода; от холодного питья; от охлаждения стоп. От гнева. От сырости. От еды. От прикосновения. В пубертатном возрасте, во время климакса.

**Психика.** Внезапное исчезновение мыслей; пациентка забывает то, что собиралась сделать; то, что ей было поручено.

*Страх безумия*, злых духов. Пациент подавлен и сексуально чрезвычайно возбудим. Пациент застенчивый. Меланхолия. Тоска по родине (ностальгия).

**Голова.** Кажется пустой при головокружении, когда пациент прохаживается. После острой болезни выпадают волосы. Боль в темени усиливается лежа.

**Глаза.** Веки *тяжелые*; и болезненные. Жгучая боль или *жжение в глазах при их закрывании*. Тупая боль позади глаз. Сильное воспаление; оно сопровождается потерей зрения (на несколько дней). Светобоязнь.

**Нос.** Иллюзии запахов; кажется, что пахнет порошком, навозом и т.д.

**Лицо.** *Опухшее*, покрыто пятнами. Герпес на губах.

**Рот.** *Обильная, зловонная, желтая слюна*. Жжение и покалывание во рту, как иголками, не уменьшающееся от холодной воды.

**Горло.** *Режущие боли усиливаются от холодного питья*. У пациента возникает ощущение, что он *задохнется*: что-то подкатывает к горлу, когда человек говорит; это не дает ему напиться, несмотря на жажду. Дифтерия. Увеличение миндалин.

Желудок. Страстное желание холодной воды. Опухание области эпигастрия. Рвота пищей, после которой возникает сильная спастическая боль и профузный понос. Отвращение к мясу, хлебу, вину. Ощущение, как будто пламя поднимается из желудка. Повторная рвота зеленой массой.

**Живот.** Болезненность кишечника и жжение в нем. Колики усиливаются от холодного питья.

**Дыхательные органы.** Кашель усиливается от холодного питья. Тупые боли за грудиной.

**Сердце.** Пульс слабый, очень большой и мягкий. В сердце колет, как будто иголками.

Конечности. *Щиплющая боль в пузырях, образующихся на подошвах;* шелушение и сухость стоп. Боль в большом пальце руки. Едкий, липкий пот на стопах.

**Кожа.** Пузыри на коже. Крупные волдыри, как от ожога жидкостью, кипятком. Коричневые корки и коросты. Пузырчатка (пемфигус). Дерматит: сопровождается появлением большого количества пузырей, из них сочится клейкая сыворотка, образуются корки.

**Диф. диагноз.** Arum-t., Canth., Rhus-t.

## MANGANUM

**Общее.** Марганец очень близок железу (*Ferr.*) и, подобно ему, вызывает анемию, сопровождающуюся разрушением эритроцитов. Кроме того, марганец отличается способностью воздействовать *НА ВНУТРЕННЕЕ УХО; гортань, трахею; надкостницу большеберцовой кости.*

Заболевания суставов. Болезни голеностопных суставов и нижних конечностей. Восходящий двигательный паралич. Дрожательный паралич (паркинсонизм), параплегия входят в сферу влияния Манганум.

*Кости очень чувствительны. Боли, глубоко локализованная болезненность* ощущаются во всем теле; любая часть тела болезненна при прикосновении: *уши, суставы, кожа.* Боль распространяется в ухо из других органов. *Всегда страдают уши. Боли локализуются по диагонали.* Желто-зеленые, в виде комочков или кровянистые выделения. Хронический артрит; инфильтраты, блестящая кожа в области суставов. Слабые суставы.

*Семяющая походка,* пациент ходит мелкими шажками; ходит спиной вперед. Боли у детей во время роста, слабые голеностопные суставы. Прогрессирующая мышечная дистрофия. Воспаление подкожной клетчатки; в подострой стадии. Нагноение кожи вокруг суставов.

Астматики, которые не могут спать на подушках из пуха и перьев. Жировое перерождение органов. Хочется лечь в постель: это облегчает все недомогания. Брюшной тиф, или тифоподобная лихорадка: Манганум бывает показан после болезни, если ее лечили плохо и период выздоровления затянулся. Это ценное средство для мальчиков и девочек, у которых происходит ломается голос (мутация). Некроз и кариес костей (остеомиелит). Злокачественные язвы с синими краями, возникающие после незначительного повреждения.

**Хуже.** При перемене погоды. *От прикосновения. От холода. От сырости. Ночью. Когда говорит. От пуховой постели.* От смеха. От движения. Наклонить туловище назад, прогнуться.

**Лучше.** Лежа. На открытом воздухе. *От грустной музыки.* От еды. Когда глотает. При перемене погоды.

**Психика.** Постоянно стонет или тяжело вздыхает. Слабый и нервный. Тревога и страх. Непроизвольный смех и плач. Тревога и страх когда двигается по комнате, лучше прилечь. Тревога, как будто может произойти что-то плохое. Печальный, плачет, молчит. Все психические симптомы уменьшаются при укладывании в постель. Не наслаждается веселой музыкой, но сразу же отзывается на самую грустную.

**Голова.** Ощущение тяжести; голова кажется увеличенной. Боли распространяются сверху вниз, усиливаются, когда пациент тужится во время стула, от сотрясения, при каждом шаге.

**Глаза.** Сужение поля зрения. Тупые боли в глазах от шитья, от чтения мелкого шрифта.

**Уши.** *Все воздействует на уши;* боль распространяется в ухо из других органов. Кажется, что уши заложены. Глухота в сырую погоду. Шум в ушах. Опухание околоушных желез, при лихорадке. Когда пациент сморкается, уменьшается глухота. Колющая боль в ушах возникает из-за разговора, смеха, при глотании. Треск в ушах усиливается, когда пациент сморкается и глотает.

**Нос.** Высморгаться больно. Судорожная боль в корне носа. Насморк без выделений, при этом нос совершенно заложен. Чередование заложенности носа и жидких выделений при насморке.

**Лицо.** Бледное, болезненное; бесстрастное, маскообразное. Подергивание мышц, дергающая боль из нижней челюсти распространяется в виски; усиливается от смеха.

**Рот.** Узлы на нёбе и на языке. Зубная боль: хуже от холода или сосания больного зуба, она распространяется в уши. Слюнотечение: когда пациент говорит; при колике, параличе и т.д. Маслянистый, жирный привкус во рту.

**Горло.** Хмыкает и покашливает все время; чем раздражает окружающих.

Живот. Хроническое увеличение печени. Желтуха. Ощущение, что кишечник болтается и трясется, когда пациент ходит. Боль и сжатие в области пупка. Вместе со стулом выделяется много кишечных газов. Стул неустойчивый, нерегулярный: или запор, или понос. Когда пациент сидит, возникают спазмы в заднем проходе, лучше лежа. Рези в пупочной области — хуже, когда делает глубокий вдох.

**Мочевыделительная система.** Когда отходят кишечные газы, возникает пронзающая боль в уретре.

**Женские половые органы.** Задержка наступления первой менструации (менархе). Менструации: ранние, скудные, кровь бледная у анемичных пациенток. Выделение крови между менструациями. *Приливы жара во время климакса.*

**Дыхательные органы.** Хроническая охриплость; голос грубый; хуже в первой половине дня (с полуночи до полудня); лучше от отхаркивания зеленоватых или желтых комочков слизи или от курения. Кашель уменьшается,

когда пациент ложится; усиливается от чтения, смеха; сопровождается афонией. Каждая простуда заканчивается бронхитом. Афония, в том числе при туберкулезе гортани. Сухость и болезненность гортани.

**Конечности.** Слабые, ненадежные голени. Не может идти спиной вперед: всегда падает. Наклоняется вперед при ходьбе. Шлепает стопами при ходьбе. Ходит, опираясь на плюснефаланговые суставы; ходит спиной вперед. Склонен падать вперед.

Воспаление костей и суставов сопровождается роющими болями, возникающими по ночам; в том числе в большеберцовой кости. Воспаление голеностопных суставов. Дети не могут ходить из-за заболевания голеностопных суставов. Паралич, характеризующийся тем, что пациент начинает бежать вперед, когда пытается идти. Боли и зуд в коленях. Кисти кажутся опухшими, когда пациент сжимает и выпрямляет пальцы.

**Кожа.** Шершавая, потрескавшаяся (в суставных сгибах), синеватая. Нагноение в области суставов. Красные, приподнятые на уровне кожи пятна. Хроническая экзема при аменорее; хуже во время менструации или во время климакса. Сухие, плотные язвы. Зуд при диабете. Хронические высыпания, застарелые, например, псориаз.

**Сон.** Множество ярких сновидений, которые пациент хорошо помнит. Много зевает.

**Лихорадка.** Внезапные приливы жара: к лицу, к груди и спине.

**Диф. диагноз.** Chin., Psor.

### **(TEUCRIUM) MARUM VERUM**

**Общее.** Ярко выражены симптомы со стороны *НОСА и ПРЯМОЙ КИШКИ*. *Возбудимость и повышенная чувствительность:* из-за злоупотребления лекарствами и в случаях, когда гомеопатические средства не действуют.

Нежные и чувствительные люди; это старые люди и дети. Ощущение внутренней дрожи; сильнее от волнения. Желание потягиваться. Острицы. Полипы: носа, влагалища, уха и т.д. Фиброзные опухоли.

Хуже. Из-за перемены погоды; в сырую погоду; в холодную погоду. В постели. От прикосновения. При наклоне. Сидя. С той стороны, на которой лежит. От легкого растирания.

Лучше. На открытом воздухе. От потоотделения.

**Психика.** Желание петь. Нервное возбуждение и болтливость. Пациент очень ленивый, не желает заниматься умственным и физическим трудом.

**Голова.** Боль в лобной области усиливается при наклоне.

Глаза. Жгучая боль в углах глаз. Веки красные и припухшие. Опухоли хрящей век.

**Уши.** Шипящий звук, свист слышится, когда рука двигается мимо уха, когда пациент говорит или с силой втягивает воздух через нос. Зуд уха. Полип в ухе.

**Нос.** Ощущение, как будто что-то ползает в носу; пациент вынужден ковырять в носу, тереть его, при этом наблюдается слезотечение и чихание, заложенность носа, усиливающаяся с той стороны, на которой пациент лежит, а также от чтения вслух. Хронический катар (ринит); в том числе атрофический; выделяется подсохший секрет в виде крупных кусков неправильной формы. Потеря обоняния. Полипы на слизистой оболочке. Из задних отделов носа выделяются плотные комки.

**Рот.** Зуд нёба.

**Горло.** Ощущается привкус плесени, когда пациент прочищает горло или кашляет. Фолликулярный фарингит.

**Желудок.** Постоянная икота; резкое сокращение мышц у истощенных младенцев после кормления грудью; икота сопровождается колющей болью (колотьем), распространяющейся из желудка в спину. Рвота большим количеством темно-зеленой массы.

**Живот.** Зуд в заднем проходе; мешает спать. Острицы.

**Дыхательные органы.** Сухой кашель; чем больше пациент кашляет, тем сильнее.

**Конечности.** Жжение в кончиках пальцев рук. Вросшие ногти на пальцах ног; сопровождается изъязвлением, лучше от движения. Шатающаяся походка; пациент запинаясь, ставит одну ногу поверх другой.

**Сон.** Бессонница после волнения; из-за зуда в заднем проходе или из-за кожного зуда, продолжающегося всю ночь.

**Дополнительно.** Calc.

**Диф. диагноз.** Cina, Sil.

### **MEDORRHINUM**

**Общее.** Этот нозод готовят из гонорейного токсина. Медорринум — это мощное, глубоко действующее средство, показанное при хронических болезнях, возникших вследствие подавления гонореи.

Медорринум оказывает влияние на психику; нервы; слизистые оболочки; он полезен при хронических заболеваниях органов малого таза у женщин; применяется у детей низкорослых и хилых, с кислым запахом. Обильные, едкие выделения, вызывающие зуд. Пахнет рыбой от всех выделений. Отвратительный запах у тела, особенно у детей и женщин.



Недостаточная реакция из-за *сикотической отягощенности*. Многие виды боли; ощущение скованности, ломота; болезненность, отек конечностей; выпот в серозных полостях. Исхудание. Ощущение дрожания повсюду; выраженная нервозность и глубокое истощение. *Онемение*; ощущение ползания мурашек внутри тела. *Артрит*; ревматические боли. Болезни спинного мозга, даже органические нарушения, заканчивающиеся параличом. Увеличение лимфатических желез повсюду; сопровождающееся жаром и болезненностью. Суставы слабые; кажутся разболтанными. *Жжение*. Мелкие, очень болезненные афты; волдыри. Упадок сил, коллапс, пациенту хочется, чтобы его все время обмахивали веером — чтобы на него дул воздух. Опухоли: рак, сирингомиелиоз и т.д.; при наличии признаков сикоза. Женщине неприятен запах ее тела, не может его смыть.

**Хуже.** *От сырости*; от сырого холода. *Днем*; от восхода до заката; в 3—4 часа утра. После мочеиспускания. От прикосновения, даже легкого. В закрытом помещении. Перед бурей.

**Лучше.** *ЛЕЖА НА ЖИВОТЕ*. Наклонив тело назад, прогнувшись; вытянувшись. *От свежего воздуха*. Когда обмахивают веером (у вентилятора). *От сильного растирания*. У моря. От сырости. На закате. В сырую погоду.

**Психика.** Слабая память. Не может сконцентрироваться. Забывает имена, слова, то, что поручили сделать. Не может закончить фразу. Теряет нить разговора. Дикое ощущение. *Вещи кажутся странными*. Не может не плакать, когда говорит; рассказывает одно и то же снова и снова. *Торопливый*; а также тревожный; раздражительный пациент. Время идет медленно. Страх темноты, как будто кто-то стоит за спиной у пациентки; шепчет ей.

*Чувствительный; нервный, импульсивный; резкий, грубый, подлый, жестокий*. У пациента возникают предчувствия; он предсказывает события. *Кажется, что он далеко отсюда*; как будто то, что совершилось сегодня, произошло неделю назад. У пациента обилие идей; но он не уверен в их осуществимости. Пациент *печален*; у него мрачный взгляд на вещи; лучше от плача. Навязчивые идеи; чередующиеся или изменчивые состояния. Пациент сердитый, своенравный в течение дня, веселый — ночью. Боится сказать что-нибудь неправильно. Все пугает пациентку, заставляет вздрагивать. Уклончивый. Мысли о самоубийстве. Боится сойти с ума. Пациенту кажется, что жизнь *нереальна*, всё кажется нереальным. Отчаяние, безнадежность. *Грустный*; плаксивый и пугливый.

**Голова.** Головокружение: сильнее ощущается в темени, а также при наклоне. Головные боли сопровождаются ощущением сжатия, напряжения в голове; усиливаются от резких неприятных звуков; пациентка дергает себя за волосы. Жжение в затылке; боли из затылка распространяются в область за глазами. *Волосы взъерошенные*. Жжение в глубине мозга. Голова тяжелая и запрокинута назад. Зуд кожи головы; перхоть.

**Глаза.** У пациентки ощущение, как будто она пристально все разглядывала. Как будто в веках — занозы. Птоз век. Выпадение ресниц, предметы кажутся удвоенными или маленькими. Припухлость под глазами. Пациент видит воображаемые предметы. Верхнее веко плотное, как будто состоит из хряща.

**Уши.** Частичная или полная глухота. Отверстие для серьги болезненное и нагнаивается. Пульсация в ушах. Кратковременные пронзающие боли. Пациент слышит голоса.

**Нос.** Насморк сопровождается потерей обоняния и вкуса. Насморк у детей, не облегчаемый другими средствами. Носовое кровотечение. Густые, желтые выделения из задних отделов носа. Выдыхаемый воздух *горячий*. Сенная лихорадка (поллиноз). Грязный нос у детей. Кончик носа холодный. Сильный зуд кончика носа. Насморк уменьшается от морских купаний. Выделения при катаре (рините) стекают в горло.

**Лицо.** Сероватое, сальное, зеленоватое; *желтое вдоль края роста волос*. *Красные* паучки (телеангиэктазии) на коже лица. Угри на лице, хуже после менструации. Мелкие нарывы появляются во время менструации. Губы утолщены из-за дыхания через рот.

**Рот.** Мелкие, очень болезненные афты. Волдыри на внутренней поверхности губ и щек. Кажется, что вода имеет вкус духов, парфюмерии. Зубы: пилообразные (с зазубринами), мягкие, крошатся; желтые. Налет на языке; толстый коричневатый.

**Желудок.** Страстное желание алкогольных напитков, которые пациентка прежде не любила; соли, сладостей, апельсинов; мороженого (льда); кислого, зеленых фруктов, освежающей пищи. *Рвота при беременности*; в том числе злокачественная. Утренняя тошнота. Необычайно сильная жажда, видит во сне, как пьет воду. Волчий аппетит, голод после еды. Живот. Тяжесть внизу живота. Мучительная спастическая боль (колика) уменьшается, если обхватить стопы; лечь на живот. Стул отходит только в том случае, если пациент очень сильно отклоняет туловище назад; после стула тело содрогается, как от холода. Жжение в эпигастрии. Метеоризм, сопровождающийся ощущением онемения. Из заднего прохода сочится темная, зловонная жидкость; в том числе с запахом рыбного рассола. *Задний проход огненно-красный, он мокнет и ужасно чешется*. Детская холера, сопровождающаяся опистотонусом. Мучительная боль в солнечном сплетении; пациент прикладывает правую руку к области желудка, а левую — к пояснице.

**Мочевыделительная система.** Ночное недержание мочи (энурез). Моча обжигающе горячая, с запахом аммиака. Боль в области почек, лучше от обильного мочеиспускания, сопровождается страстным желанием льда. Ощущение кипения, бурления в области почки. Моча вытекает медленно.

**Мужские половые органы.** Тяжесть в области простаты; она болезненна и увеличена, а мочеиспускание учащенное и болезненное. Импотенция. Прострация после семяизвержения. Тяжесть в промежности. Упорные желтые выделения при хроническом гонорейном уретрите.

**Женские половые органы.** Тяжелая менструальная колика; лучше, когда упирается ногами во что-нибудь. Менструации: обильные; кровь темная, со сгустками, зловонная; оставляет пятна, которые с трудом отстирываются; менструация сопровождается учащенным мочеиспусканием.

Пенистые бели; жидкие, с запахом рыбы. Маточный зев чувствительный; изъязвлен. Зуд во влагалище уменьшается от растирания и от умывания тепловатой водой. Тянущие боли в яичниках уменьшаются от давления. Бесплодие сикотического происхождения.

Молочные железы холодные; болезненные. Молочные железы болезненные между менструациями. Во время менструации соски болезненные, мокнут или холодные, как лед. Молочные железы холодные, как лед, все тело теплое.

**Дыхательные органы.** Ощущение нехватки воздуха. *Кашель уменьшается, когда пациент ложится на область желудка*, усиливается от сладостей. Одышка, пациент не может выдохнуть. Астма сикотического происхождения; в том числе у младенцев. Кажется, что легкие набиты ватой. Как будто в груди имеется полость. Ощущение холода в груди.

**Сердце.** Кажется, что там, где должно быть сердце, — пустота.

**Спина.** Позвоночник болезненный и чувствительный. Жгучий жар в позвоночнике. Режущая боль, жжение, ощущение ползания мурашек над левой лопаткой. Боль из левого плеча перемещается в правое. Прострел, люмбаго, из-за поднятия большой тяжести.

**Конечности.** Волосатые руки. Пациент грызет ногти. Жжение в кистях и стопах. Голени тяжелые; они болят, пациент всю ночь не находит им места. Судороги в мышцах голени, лучше вытянуть ноги. *Пятки, возвышения большого пальца на подошвах обеих ног и обе подошвы чувствительные, чешутся*; пациент не может ступить на них, вынужден ходить на коленях. Кончики пальцев рук трескаются и горят. Стопы легко подворачиваются при ходьбе. Отек конечностей. Ногти плоские, как будто их изогнули, вдавили. Понос возникает вслед за отеком стоп и способствует уменьшению отечности.

**Кожа.** Зуд кожи; ее болезненность. Сикотические красные узлы. Темно-красные пятна. Кондиломы. Желтая кожа. Продолжительный зуд, усиливающийся при мысли о нем. Кожа холодная, но у пациента ощущение, что кровь горячая. Пятна цвета меди; остаются после высыпаний. Медно-желтого цвета пятна на коже.

**Сон.** Кратковременный сон кажется продолжительным, от него становится лучше. *Спит в коленно-грудном положении*. Снится, что он что-то пьет.

**Лихорадка.** Холодная кожа, но кажется, будто кровь горячая. Жгучий жар с потоотделением; пациент хочет раскрыться; но от раскрывания ему становится холодно. Легко потеет; особенно под утро. Сенная лихорадка (поллиноз). Конечности становятся холодными.

**Диф. диагноз.** Bar-c, Nat-m., Psor., Thuja.

## MELILOTUS

**Общее.** Мелилотус вызывает *конгестию*, полнокровие, особенно в области *ГОЛОВЫ*; а также обильные кровотечения ярко-красной кровью, которые приносят облегчение пациенту. Судороги у младенцев (детские судороги). Эпилепсия из-за удара по голове. Боль, сопровождающаяся слабостью. Ощущение саднения.

**Хуже.** Во время климакса. От ходьбы. При перемене погоды; в бурю, в дождь.

**Лучше.** От кровотечения. От обильного мочеиспускания. От примочек с уксусом.

**Психика.** Хочет убежать и спрятаться. Страх опасности, боится, что арестуют; пациентка боится говорить громко, поэтому разговаривает шепотом. Ненадежная память. Пациентка считает, что все смотрят на нее. Пациент хочет покончить с собой; или угрожает убить того, кто приблизится. Религиозная меланхолия. Пациент плачет.

**Голова.** Приливы крови к голове. *ЖЕСТОКИЕ; ПУЛЬСИРУЮЩИЕ; КОНГЕСТИВНЫЕ*; нервного происхождения, периодические головные боли; пациенту кажется, что он потеряет рассудок; лучше от носового кровотечения; когда начинается выделение крови во время менструации; от прикладывания уксуса. Ощущение полноты во всей голове. Головная боль чередуется с болью в спине.

**Глаза.** Жар, тяжесть в глазах; хочется плотно закрыть их, чтобы почувствовать себя лучше. Ощущение, что глаза слишком большие.

**Нос.** Сухость в носу, пациент вынужден дышать ртом. Частые обильные носовые кровотечения, от которых улучшается самочувствие пациента в целом.

**Лицо.** Ярко-красное лицо; приливы крови к лицу сопровождаются пульсацией сонных артерий и головной болью. Лицо красное перед кровотечением из носа, легких, матки.

**Мочевыделительная система.** Частое обильное мочеиспускание, которое облегчает головную боль.

**Женские половые органы.** Рецидивирующая резкая, пронзающая боль во влагалище и в наружных половых органах в конце менструации.

**Дыхательные органы.** Ощущение, как будто задыхается; хуже от быстрой ходьбы. Как будто слишком тесная одежда вокруг грудной клетки.

**Кожа.** Сухая.

**Диф. диагноз.** Bell., Calc, Glon.

## MENYANTHES

**Общее.** В результате действия Мениантеса становится *холодной, как лед*, та часть тела, которая *выступает, возвышается над поверхностью; или одна-единственная часть тела; или больной орган* (нос, уши, пальцы на руках, колени, живот и т.д.). Боли, характеризующиеся ощущением напряжения и сжатия. Резкое спастическое сокращение мышц или видимое подергивание мышц; в том числе при невралгии. Непоседливые, суетливые женщины с заболеванием мочевыделительной системы.

**Хуже.** От ходьбы; даже медленной. При подъеме по лестнице. В покое. От света. От шума. От сотрясения. Лучше. *От сильного давления.* В сумерки. Подложить руку, лечь на нее. При наклоне.

**Голова.** *Распирающая головная боль, как будто голова лопнет, взорвется; боль поднимается из задней части шеи вверх*, она уменьшается при наклоне; когда пациент сидит согнувшись. *Ощущение сильного давления; в том числе в темени; лучше сильно придавить рукой.* Как будто тяжесть в задней части шеи. Голова холодная, как будто на нее дует холодный воздух.

**Глаза.** Видит, как в тумане.

**Уши.** Шум в ушах при жевании.

**Нос.** Холодный. Пациент ощущает тошнотворный запах, похожий на запах тухлых яиц.

**Лицо.** Видимое подергивание лицевых мышц, хуже в покое.

**Желудок.** Холод распространяется из желудка вверх по пищеводу. Желание мяса. Отвращение к хлебу с маслом.

**Живот.** Холодный живот; хуже от давления на живот рукой.

**Мочевыделительная система.** Учащенные позывы на мочеиспускание; со скудным выделением мочи.

**Сердце.** На сердце тревога; как будто должно случиться что-то плохое. Незначительное усилие, напряжение вызывает аритмию.

**Спина.** Ковыряющая боль в лопатке (слева). Боль, как от ушиба, в крестце усиливается при наклоне, при ходьбе.

**Конечности.** Спазмы в задней части бедер, хуже сидя. Судороги распространяются из области лодыжки в икроножную мышцу (справа). Кисти и стопы холодные, как лед. Мышцы голени спастически сокращаются, подергиваются; хуже лежа.

**Кожа.** Кожа кажется натянутой.

**Сон.** Яркие сновидения, беспокойный сон.

**Лихорадка.** Тело содрогается при зевоте. Четырехдневная малярия.

**Диф. диагноз.** Verat.

## MERNITIS

**Общее.** Гомеопатическое средство Мефитис готовят из жидкости, содержащейся в анальных железах скунса. Это вещество *вызывает спазмы* и является важным средством для лечения коклюша. Мефитис следует назначать в низких потенциях.

Нервное истощение. Слабость после тяжелой болезни. Желание купаться в ледяной воде. Дрожание и приступы удушья в сочетании с экзофтальмом. Из-за мелкой дрожи, вибрации возникает ощущение выраженного дискомфорта, беспокойства.

**Хуже.** Лежа. Ночью. После менструации.

Лучше. *От холода; холодной ванны; от ледяной воды, или в холодную погоду.*

**Психика.** Возбудимый человек; много фантазий. Разговорчивый. Не расположен к работе, все время хочется потянуться.

**Голова.** Сильное головокружение: хуже сидя, при наклоне, когда поворачивается в постели. Ощущение, как будто на затылок давят пальцем. Головная боль от езды в экипаже.

**Глаза.** Глаза горячие, красные, болят. Пациент не может читать мелкий шрифт.

**Лицо.** Одутловатое лицо.

**Рот.** Зловонное дыхание.

**Горло.** Пища попадает не в то горло. Пациент *быстро начинает задыхаться*, когда пьет и говорит.

**Желудок.** Рвота пищей через несколько часов после еды. Желание соленой пищи.

**Дыхательные органы.** Одышка; не может сделать выдох. Астма — хуже от ледяной воды. Спастический кашель или коклюш; незначительное число приступов в дневное время, много приступов ночью. Кашель жестокий, удушливый, спастический, нервный; усиливается от разговора или питья. Зловонная мокрота. Астма у больных туберкулезом легких или у пьяниц.

**Сон.** Кратковременный сон; кажется, что он освежает. Пациент просыпается ночью из-за прилива крови к голеням.

**Диф. диагноз.** Cor-r., Mosch.

## MERCURIUS

**Общее.** Потенцированный препарат готовится из растворимой черной окиси ртути, как это было впервые проделано С. Ганеманом, или из чистой металлической ртути.

Между симптомами этих средств не существует различий, но создается впечатление, что в случае, когда Меркуриус солюбилис, будучи показан, не справляется с задачей, может подействовать Меркуриус вивус.

Меркурий в большей или меньшей степени поражает каждый орган или ткань тела. *Кровь* разрушается, возникает тяжелая анемия; увеличиваются *ЛИМФАТИЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗЫ*, усиливается деятельность желез, в особенности *СЛЮННЫХ И СЛИЗИСТЫХ ЖЕЛЕЗ*.

**СЕКРЕТ ОБИЛЬНЫЙ, ВЫДЕЛЯЕТСЯ СВОБОДНО:** он жидкий; слизистый, едкий, жгучий, зловонный или густой, зеленовато-желтый. Изъязвление слизистых оболочек, особенно полости рта и горла. Проявления врожденного сифилиса; буллы; абсцессы, истощение (маразм); насморк с гнусавостью или воспаление костей, приводящее к их разрушению, воспаление *клетчатки*; суставов — все перечисленное входит в сферу влияния этого гомеопатического средства.

У пациента много разнообразных симптомов. Такой пациент изменчив психически и физически; ему свойственно *дрожание*, слабость и *потливость*. *Отечность*; продолжительные экссудативные процессы. Покраснение. Застойное полнокровие с синюшной окраской тканей. Боли сосредоточиваются в одной точке. *Нагноение*: гной кровянистый, жидкий, зеленоватый. *Отвратительный запах*: у выделений, у дыхания, у тела вообще. *Желтый цвет*: склер, зубов, выделений из носа; болезни желчевыводящей системы; желтуха. Сильное опухание частей тела сопровождается *ощущением болезненности и саднения*.

Чувствительность к жару и к холоду: человек-барометр. Все кажется слишком коротким. Пациент *слабый, измученный и готов упасть*; хуже после стула. Ревматизм. Исхудание. Солёный вкус на губах, во рту, у мокроты и т.д. Маслянистый пот. Сифилис, сикоз, золотуха. Конвульсии. Каталептическая ригидность тела (оцепенение). Дрожательный паралич (паркинсонизм); паралич. Контрактуры суставов.

Болезненные последствия испуга; подавления гонореи; потоотделения на стопах. Ощущение, как будто тело состоит из сладостей. Жгучие, жалящие боли. Дрожание, подергивание мышц, беспорядочные движения; в том числе в парализованных частях тела. Стриктуры после воспаления. Затверждение, уплотнение. Болезненные экзостозы. Размягчение костей (остеомалация).

**Хуже.** *НОЧЬЮ*; от ночного воздуха. *ОТ ПОТОТДЕЛЕНИЯ. ЛЕЖА НА ПРАВОМ БОКУ. КОГДА СОГРЕЛСЯ:* в постели или у огня. *ОТ СКВОЗНЯКОВ*, дующих на голову. *При перемене погоды*, в облачную, пасмурную погоду; от сырого холода. Когда простывает. От жары и от холода. Если промочит ноги. От света пламени, открытого огня (камина и т.д.). Перед стулом. Во время и после мочеиспускания. От прикосновения к чему-нибудь холодному.

**Лучше.** При умеренной температуре воздуха. От коитуса. В покое.

**Психика.** *Торопливый*; быстро говорит. Заикается, нервничает, при этом дрожит. Яростные, ужасные импульсы: убить кого-нибудь, совершить самоубийство. Двигательное беспокойство и потливость. Постоянно перебирается с места на место. Страх сопровождается желанием убежать. Непреодолимое желание отправиться в дальнейшее путешествие. Безразличие ко всему: пациент не беспокоится даже о еде.

Желание схватить прохожего за нос. Отвратителен телом и душой: совершает дурацкие, приносящие вред, отвратительные поступки. Медленно отвечает на вопросы. Устал от жизни. Мысли о самоубийстве во время менструации, лучше от плача. Пациент считает, что он теряет рассудок. Слабая память; все забывает. Отсутствие силы воли — безволие. Ощущение надвигающейся беды. Раннее развитие. Стонет и тяжело вздыхает. Подозрителен. Ощущение, что время идет медленно.

**Голова.** Головокружение усиливается, когда пациент лежит на спине; ощущение, как будто раскачивается. Ощущение повязки на голове. Головная боль в сочетании с болью в ухе или зубной болью. Ощущение болезненности в области экзостоза. Кожа головы напряжена, натянута, маслянистый пот на голове. Менингит. Гидроцефалия. Ребенок мотает головой из стороны в сторону и стонет. Кожные покровы головы болезненные при прикосновении. Кефалогематома. Выпадение волос сбоку и на висках.

**Глаза.** Веки красные, толстые, опухшие; края век покрыты чешуйками, опухшие. Скучные или обильные жгучие, едкие выделения из глаз. Глаза тянет друг к другу. Черные пятна, вспышки, искры перед глазами. Светобоязнь: хуже от жара и яркого света пламени, огня; в том числе у литейщиков. Помутнение по краю

роговицы (arcus senilis). Ирит сопровождается возникновением гипопиона (скоплением гноя в передней камере глаза). Кератит. Обильное слезотечение, слезы жгучие, едкие. Конъюнктивит при простуде. Веки спастически сомкнуты. Периодически пропадает зрение. Заболевания зрительного нерва и глаз у работников литейного цеха. Неясное зрение, видит как в тумане.

**Уши.** Боли распространяются в ухо: из зубов, из горла и т.д. Выделения из уха густые, желтые, зловонные и кровянистые. Глухота от перегревания; лучше от глотательных движений, лучше — высморкаться. Нарывы (фурункулы) в наружном слуховом проходе. Ощущение, как будто холодная вода течет из уха. Ощущение холода в ушах; в том числе во время беременности.

**Нос.** Сильное чихание. Чихание на солнце. Ноздри покрыты ссадинами, изъязвленные. Простуда распространяется вверх, или при простуде поражаются глаза. Насморк; с едкими гнойными выделениями, слишком густыми, чтобы свободно вытекать из носа. Тяжесть в носу. У детей нос красный, раздраженный, в ссадинах, грязный. Носовое кровотечение при кашле; во время сна — кровь свисает в виде темных свернувшихся нитей. Частое чихание без насморка. Синусит.

**Лицо.** Бледное, желтое, выглядит грязным; припухшее под глазами. Щеки опухшие, красные, горячие. Тупая боль в челюстях. Паротит. Губы: соленые, сухие, с трещинами; в том числе в углах рта (справа); при прикосновении возникает жжение. Жевательные мышцы сокращены. Паралич мышц лица от холода.

**Рот.** Отвратительный гнилостный запах изо рта. Болезненные, дряблые, опухшие, кровоточащие десны. Флюс. Зубы с дуплами, черные. Зубная боль усиливается от жара и холода, ночью. Зубы чувствительные, кажутся удлиненными.

**Афты.** ПОВЫШЕННОЕ СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ, слюноотечение во сне; слюна желтая, кровянистая, с неприятным вкусом, зловонная.

**Язык:** широкий, дряблый, желтый, С ОТПЕЧАТКАМИ ЗУБОВ; ощущение покалывания, как иголками, в кончике языка. Борозда поперек верхней части языка (у корня); покалывание в области борозды. Сладковатый, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРИВКУС во рту.

Речь затруднена из-за дрожания языка. Потеря речи, пациент объясняется с помощью знаков и жестов, гримас. Заикание. Киста подъязычной железы (ранула), сопровождающаяся слюноотечением и болезненностью десен. Зуд нёба. Язвы позади языка. Увеличение миндалин. Ощущение, как будто что-то подкатывает к горлу, хочется его проглотить. Сладковатый привкус во рту; хлеб кажется сладким. Стоматит из-за жевательных резинок.

**Горло.** АНГИНА: боль в горле саднящая, жгучая, горло горит, как будто горячий пар поднимается в нем. Ощущение, как будто чешуйка из сердцевинки яблока или что-то другое застряло в горле. Язвы на миндалинах, в глотке. Острый паратонзиллит (перитонзиллярный абсцесс), сопровождающийся затруднением глотания, после того, как сформируется гнойник. Колющая боль при глотании отдает в уши. Пациент отхаркивает крупные комки из горла. Постоянно делает глотательные движения. Питье вытекает через нос.

**Желудок.** Сильное желание холодного питья и пива. Слабое пищеварение с постоянным чувством голода. Желудок кажется переполненным и сжатым. Отвращение к мясу, кофе, сливочному маслу и жирному. От сладкого и от молока становится хуже, хотя пациент их любит. Прогорклые отрывки. Частая икота. Изжога.

**Живот.** Печень: увеличена, болезненная; плотная. Желтуха. Кишечник кажется расслабленным, пациент поддерживает его. Когда пациент лежит на правом боку, кажется, что кишки ушиблены, или как будто они перемещаются в ту сторону, на которой лежит пациент. Паховые лимфатические узлы опухшие или нагнаиваются.

**СТУЛ:** болезненный, скудный; кровянистый; зеленоватый, слизистый; пепельно-серый, едкий; после стула возникают тенезмы или озноб; ощущение, что кишечник опорожнился не полностью. Тенезмы прямой кишки сопровождаются тенезмами мочевого пузыря. Аппендицит — лучше лежать на спине. Выпадение заднего прохода после стула. Опухание паховых лимфатических узлов при простуде. Дизентерия. Брюшная стенка холодная на ощупь.

**Мочевыделительная система.** Учащенные позывы на мочеиспускание днем и ночью, сопровождающиеся обильным или скудным выделением мочи. Моча вызывает зуд. Количество выделяемой мочи больше, чем количество выпитой жидкости. Альбуминурия; моча черная, кровянистая. Жжение после мочеиспускания. Очень тонкая струя мочи. Дизурия. Безболезненная гематурия.

**Мужские половые органы.** Головка полового члена и крайняя плоть воспалены, опухшие; фимоз. Яички опухшие, плотные, мошонка лоснится, красная. Дети или взрослые дергают себя за половые органы, расчесывают их; это происходит из-за похожего на зуд ощущения в половых органах. Сперма кровянистая. Гонорея. Наружное отверстие уретры красное. Пузыри, язвы, мягкий шанкр. Герпес на крайней плоти. Набухание лимфатических сосудов, идущих вдоль полового члена.

**Женские половые органы.** Коллапс и обморок в начале менструации. Во время менструации где-нибудь на теле возникает абсцесс, который исчезает после менструации. Менструации обильные, сопровождаются болями в животе. Ощущение саднения в половых органах. Бели густые, белые, выделяются при мочеиспускании; лучше после полового акта. Бели у маленьких девочек, вызывающие упадок сил. Зуд усиливается после

мочеиспускания, уменьшается от обмывания холодной водой. Выпадение матки вместе с влагалищем, лучше после коитуса. Бесплодие при слишком обильных менструациях. Меркурий облегчает половой акт и способствует зачатию. Склонность к выкидышу из-за абсолютной слабости.

Жалящая боль в яичнике. Боль ниже молочной железы (справа), распространяющаяся сквозь грудную клетку в лопатку.

Молочные железы болезненные, и в них много молока во время менструации. Молочные железы набухшие, становятся твердыми, во время менструации в них ощущается боль, как при язве. Рак молочной железы и матки. Зуд наружных половых органов (вульвы). Грудное молоко плохое. Выделение молока из грудных желез у мальчиков; а также у девочек вместо менструации.

**Дыхательные органы.** Хриплый, грубый голос. Кашель: возникает в виде двойных приступов; сухой кашель ночью; выделение желто-зеленой мокроты днем. Дыхание затруднено; хуже лежа на левом боку; но кашель усиливается, когда пациент лежит на правом боку. Колотье распространяется из нижних отделов грудной клетки справа в спину; хуже от чихания или при кашле. Ощущение бульканья, кипения или горячего пара в груди. Носовое кровотечение во время коклюша. Кашель усиливается от курения. Желтуха; в том числе при пневмонии. Одышка при подъеме по лестнице или при быстрой ходьбе. Астма — лучше от табачного дыма и холодного воздуха.

**Сердце.** Сердцебиение от незначительного напряжения. Пациент просыпается с ощущением дрожания в сердце. Пульс аритмичный, учащенный, напряженный и перемежающийся, или мягкий и дрожащий.

**Шея и спина.** Скованность в шее; увеличение шейных лимфоузлов. Жгучая боль в спине — хуже при поллюции. Рвущая боль в копчике — хуже от давления на живот. Боль из правой лопатки распространяется вперед.

**Конечности.** Слабость и дрожание конечностей; особенно кистей. Онемение пальцев рук. Холодный пот на стопах в первой половине дня (с полуночи до полудня); в том числе в постели. Послеродовой тромбоз флебит (белый болевой флебит). Отечность стоп и голеней. После семяизвержения кисти холодные, как лед. Боли в костях, глубокие или поверхностные, усиливаются ночью; пациент вынужден встать с постели и прохаживаться. Пятки холодные. Ощущение, что колени увеличились.

**Кожа.** Характерно повышенное потоотделение, но от него самочувствие пациента не улучшается; кожа всегда влажная. Кожа желтая; чувствительная, покрыта ссадинами, как сырое мясо. Мокнувшие высыпания, сопровождающиеся образованием корок. Язвы: неправильной формы, ползучие; поверхностные, неглубокие; кровоточащие; сопровождаются резами и избыточным образованием грануляционной ткани ("дикое мясо"). Папулы окружают основной очаг высыпаний. Фурункулы и абсцессы возникают во время менструации. Желтая кожа. Желтуха, сопровождающаяся зудом кожи живота. Зуд кожи ночью в постели. Мокнувшая экзема. Нечувствительная кожа.

**Сон.** Бессонница ночью: из-за волнения крови (в области грудной клетки и головы); из-за нервного возбуждения; из-за боли или других симптомов.

**Лихорадка.** Пациент быстро замерзает или *перегревается*. Чередование озноба и жара. Ползучий холод, озноб. Ощущение холода внутри абсцесса. Лихорадки воспалительные, связанные с расстройством желудка, с заболеванием желчевыводящих путей. Корь. Лихорадки после подавления симптомов.

Пациент **ЛЕГКО И ОБИЛЬНО ПОТЕЕТ**, но пот не приносит облегчения; пациент потеет во сне, при болях. Пот маслянистый, зловонный, кислый или с сильным сладковатым, всюду проникающим запахом; пот на голове, на груди; он оставляет желтые пятна, которые не отстирываются.

**Дополнительно.** Bell., Sil.

**Диф. диагноз.** Kali-i.

## MERCURIUS CORROSIVUS

**Общее.** Сулема — это мощное дезинфицирующее средство, оно действует очень быстро, может приводить к *тяжелым повреждениям*. Она вызывает тенезмы **ПРЯМОЙ КИШКИ** и одновременно — мочевого пузыря.

Воспаление сопровождается опуханием и ощущением сжатия, жжения, в том числе *внутреннего*: в горле, желудке, *прямой кишке*, *шейке мочевого пузыря*, почках и т. д. Ощущение сжатия — в горле, прямой кишке, мочевом пузыре и т. д. *Выделения едкие* — слезы, выделения из носа и т.д. *Трещины* на ладонях, подошвах, в углах рта.

Фагедена (тяжелая разъедающая ползучая язва с деструкцией). Сифилис. Альбуминурия на ранних сроках беременности (*Rhos.* — позднее и перед родами). Гонорея. Пациент лежит на спине, подтянув колени.

**Хуже.** ПОСЛЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ И СТУЛА. При глотании. Ночью. От холода. Осенью. Когда дни жаркие, а ночи прохладные. От кислого.

**Лучше.** В покое.

**Психика.** Тревога и двигательное беспокойство; пациент *сильно раскачивается*. Пристально смотрит на людей, которые с ним говорят; и не понимает их. Мышление затруднено. Нарушение речи. Тупой, бестолковый.

**Голова.** Боль в висках; хуже при взгляде в сторону. Головокружение, сопровождающееся глухотой при наклоне.

**Глаза.** Сильная светобоязнь и слезотечение — слезы едкие. Жжение, болезненность в глазах. Ирит. Кератит. Ретинит: при заболевании почек (альбуминурический); геморрагический. Воспаление глаз у новорожденных. Веки отечные, красные, в садинах. Предметы кажутся меньше, чем на самом деле; или дwoятся (диплопия).

**Уши.** Жесткая пульсация в ушах. Зловонный гной.

**Нос.** Жидкие едкие выделения из носа. Озена с прободением носовой перегородки. Клейкие выделения из носа. Нос опухший, красный.

**Лицо.** Бледность вокруг рта. Трещины в углах рта. Лицо отечное, опухшее. Губы черные, темно-красные, опухшие. Верхняя губа опухшая и вывернута кверху. Челюсти ригидны, неподвижны.

**Рот.** Язык покрыт пятнами, опухший, воспаленный. Пациент не может высунуть язык, слюнотечение, слюна соленая. Периодонтит (пиорея). Десны багровые, опухшие при зубной боли; рыхлые. Афты; язвы. Жжение во рту, ощущение, как будто рот ошпарен. Зубы шатаются, зубная боль по ночам. *Привкус во рту: вяжущий; соленый, горький.* Некроз нижней челюсти.

**Горло.** Нёбный язычок красный, опухший, удлинён. Ангина: горло красное, болит, опухшее; хуже от жара; резкие боли из горла распространяются в уши, хуже от давления. Жгучая боль и сильное опухание — хуже от малейшего давления. Опухание всех желез в области шеи. Миндалины опухшие, покрыты язвами. **ГЛОТАНИЕ ЗАТРУДНЕНО:** спастическое сжатие горла при попытке проглотить каплю жидкости.

**Желудок.** Неутолимая жажда — желание холодного питья. Вздутие и болезненность подложечной области; спазм в эпигастрии усиливается от малейшего прикосновения. Рвота слизью и кровью. Гастрит. Срыгивание пищи, вяжущий привкус. Сильное желание холодной пищи.

**Живот.** Вздутый, болезненный при малейшем прикосновении. Режущие боли (колика); в том числе ниже пупка. Метеоризм сопровождается болями. Аппендицит. *Продолжительные позывы на стул и мочеиспускание; ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КИШЕЧНИК ОПОРОЖНИЛСЯ НЕ ПОЛНОСТЬЮ. СТУЛ КРОВЯНИСТЫЙ; С ПЛЕНКАМИ, ПОХОЖИМИ НА ОБРЫВКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ; СЛИЗИСТЫЙ; ТОРЯЧИЙ, СОПРОВОЖДАЕТСЯ МУЧИТЕЛЬНЫМИ ТЕНЕЗМАМИ.* В стуле чистая кровь или кровянистая жидкость. Дизентерия. Спазмы в прямой кишке во время коитуса. Пациент потеет перед стулом и после него.

**Мочевыделительная система.** Сильное жжение в уретре. Моча **ГОРЯЧАЯ, ОБЖИГАЮЩАЯ, ВЫТЕКАЕТ ПО КАПЛЕ, скудная;** мочеиспускание подавлено (задержка мочи), моча кровянистая; мочеиспускание учащено; моча сочится — хуже сидя. Кровотечение из уретры после мочеиспускания. *Тене-змы мочевого пузыря;* в том числе в сочетании с тенезмами прямой кишки. Нефрит. Альбуминурия; в том числе у беременных. Цистит. Гонорея. Парафимоз. Почечное кровотечение. Потоотделение после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Половой член и яички ужасно опухшие. Болезненные искривленные эрекции; хуже во время сна. Твердые шанкры. Гонорея — густые, зеленоватые выделения.

**Женские половые органы.** Менструации слишком ранние и слишком обильные.

Бели бледно-желтые, со сладковатым тошнотворным запахом. Опухание молочных желез возле сосков. Соски трескаются и кровоточат; боль усиливается при кормлении ребенка грудью.

**Дыхательные органы.** Дышит как будто через металлическую трубку. Ощущение сжатия грудной клетки, дышит благодаря участию в дыхании грудных мышц. Режущая боль в гортани. Часто возникает резкая колющая боль, пронзающая грудную клетку.

**Сердце.** Сердцебиение во сне.

**Спина.** Болезнь Потта (туберкулез позвоночника с образованием кифоза): пациент лежит на спине, подтянув колени.

**Конечности.** Дельтовидная мышца кажется расслабленной. Ощущение, как будто голени онемели, утратили чувствительность. Судороги в икроножных мышцах; в том числе при дизентерии. Паралич конечностей; дрожательный. Стопы холодные, как лед. Экзостозы: на большеберцовой кости, на груди, на ребрах.

**Кожа.** Холодная. Язвы: проникающие; фagedенические (с деструкцией, разъедающие); ползучие. Ногти серого цвета.

**Сон.** Жесткая икота во время сна.

**Лихорадка.** Зябкость; в том числе после стула. *Пациент потеет; из-за любого движения;* частичная потливость; сильнее всего выражена в области лба и нижних отделах тела; пот зловонный; возникает, в том числе, ночью. Ощущение жара при наклоне, холода — когда поднимается из наклона.

**Диф. диагноз.** Ars. Canth.

## MERCURIUS CYANATUS

**Общее.** Это ценное средство для лечения интоксикации, возникающей при острых инфекционных заболеваниях, например, при дифтерии: *рано и быстро возникает чрезвычайное изнеможение, цианоз, похолодание тела и дрожь.*

Меркуриус цианатус оказывает сильное воздействие *НА ПОЛОСТЬ РТА, ГОРЛО И ГОРТАНЬ*. Быстро возникает локальная деструкция, разложение ткани. *Процессы гниения*. Кровотечения темной жидкой кровью. Подергивание и спастическое сокращение мышц. Меркуриус цианатус — это эффективное средство для профилактики дифтерии.

**Хуже.** При глотании. Когда говорит. Во время еды.

**Психика.** Сильное возбуждение; вспышки гнева. Ярость. Разговорчивость.

**Голова.** Ужасные (зверские!) головные боли — хуже ночью.

**Глаза.** Ввалившиеся глаза; застывший взгляд.

**Нос.** Обильное кровотечение возникает несколько раз в день.

**Рот.** Полость рта покрыта язвами; образуется пленка серого цвета. Сильное слюнотечение. Зловонное дыхание.

**Горло.** *Режущая боль* при глотании. Много толстых сероватых пленок в горле. Горло на отдельных участках как будто ободрано, в ссадинах, особенно у ораторов. Увеличение миндалин. Омертвление, деструкция мягких тканей нёба и зева. Токсическая дифтерия.

**Желудок.** Рано возникает полное отвращение к еде. Непрекращающаяся икота. При мысли о пище возникает позыв на рвоту. От молока лучше.

**Живот.** Понос. Частому жидкому стулу предшествует сильная колика. Стул зловонный, зеленый, слизистый, кровянистый, черный.

**Мочевыделительная система.** Моча содержит белок, янтарно-желтая, скудная; подавление мочевыделения (задержка мочи).

**Дыхательные органы.** Режущая боль в гортани. Охриплость; говорить больно. Крупозный кашель; он вызывает удушье.

**Сердце.** *Слабое.*

**Конечности.** Варикозное расширение вен сопровождается повышенной чувствительностью голени (слева). Холодные конечности.

**Кожа.** *Влажная и холодная кожа. Потливость.*

**Диф. диагноз.** Lach.

## MERCURIUS DULCIS

**Общее.** Каломель вызывает катаральное воспаление уха, *катар евстахиевой трубы* и глухоту.

Меркуриус дульцис показан при воспалении с образованием пластичного фибринозного экссудата: при перитоните, менингите, плеврите — это средство обладает способностью рассасывать спайки.

**Слизистые оболочки бледные.** *Заболевания желчевыводящих путей:* послабляющие (ремиттирующие) желчные лихорадки. Бледность; *дряблость и одутловатость*. Бледные золотушные дети с опуханием шейных и прочих желез. Отеки при сочетанной патологии почек и сердца, особенно при наличии желтухи. Застой желчи.

**Хуже.** От кислого.

**Лучше.** От холодного питья.

**Голова.** Болезненность кожи волосистой части головы.

**Глаза.** Пациент быстро моргает. Непроходимость слезного протока. Глаза красные, сухие, веки склеиваются (образуется много слизи).

**Уши.** Непроходимость евстахиевых труб. Барабанная перепонка втянута, утолщена. Глухота: при каждой простуде; у стариков. Внезапные хлопающие звуки, напоминающие трепетание крыльев птицы.

**Нос.** Когда сморкается, из носа выделяются комочки слизи.

**Лицо.** Бледное.

**Рот.** Язык с отпечатками зубов; плотный; черный. Постоянно течет темная, с гнилостным привкусом слюна. Скверный запах изо рта.

**Горло.** *Воспаление миндалин* (справа); лучше от холодного питья. Нарушение глотания (дисфагия). Фолликулярный фарингит.

**Желудок.** Периодическая рвота у младенцев.

**Живот.** Вздутый, горячий, болезненный. Понос у младенцев — стул едкий, *травянисто-зеленого* цвета. Болезненность и жжение в заднем проходе. Цирроз печени с гипертрофией (применяйте в потенции **D1**).

**Мужские половые органы.** Острое воспаление простаты; в том числе после подавления гонореи.

**Дыхательные органы.** Слизистая, гнойная мокрота. Плеврит.

**Кожа.** Дряблая, неухоженная кожа. Высыпания медного цвета.

**Лихорадка.** *Послабляющие (ремиттирующие) желчные лихорадки.* Потливость.

**Диф. диагноз.** Kali-m.



## MERCURIUS IODATUS FLAVUS

### (Mercurius protoiodatus)

**Общее.** Меркуриус йодатус флаvus имеет сильное сродство с *железами*, в том числе *ШЕЙНЫМИ* лимфатическими узлами, а также с молочными железами. Обычно симптомы правосторонние и, подобно симптомам *Лус*, они перемещаются справа налево. Сифилис. Опухоли молочных желез. Боли глубоко в костях, в особенности ночью.

**Хуже.** От запахов. Подняться, встать. От теплого питья. Лежа на левом боку. В холодную и сырую погоду. От прикосновения.

**Лучше.** На открытом воздухе.

**Психика.** Оживленный, веселый, разговорчивый.

**Голова.** Обморок или головокружение возникает при вставании со стула или когда пациент читает. Тупая боль в лобной области, сопровождающаяся болью в корне носа; лучше когда интенсивно заняты умом, и тело. Вслед за головной болью возникает боль в сердце.

**Глаза.** Кератит: роговица выглядит поцарапанной или как будто у нее ногтем скovyрнули кусочек. Светобоязнь. Темные круги вокруг глаз. Припухлость под правым глазом.

**Уши.** Внезапная резкая боль в ушах — хуже от прикосновения.

**Нос.** Слизь стекает через задние отделы носа в горло, вызывая покашливание.

**Рот.** Желание стиснуть зубы; челюсти ригидные и в них ощущается усталость из-за боли в зубах сжимающего характера; возникает во время сна. Оскоми́на на зубах — хуже от жара, от холода и сладостей.

Зубы кажутся слишком длинными; пациент не может есть. Периодонтит (пиорея). Язык покрыт влажной пленкой или *ГУСТЫМ ЖЕЛТЫМ НАЛОТОМ У КОРНЯ*; кончик и края его красные. Зубная боль после пломбирования зуба.

**Горло.** Ангина: горло болит сначала справа, потом слева. Пациент постоянно делает глотательное движение. Миндалины опухшие; лучше от холодного питья. Лакунарная ангина. Зоб, сопровождающийся ощущением удушья. Опухание шейных желез. Лимфаденит.

**Желудок.** Ощущение слабости и пустоты в желудке. Тошнота при виде пищи или от ее запаха. Жажда кислых напитков.

**Живот.** Боль в животе в сочетании с болью в сердце. Перед стулом возникает чувство дурноты, обморочной слабости внизу живота. Черные выделения из прямой кишки во время стула или без него.

**Мочевыделительная система.** Моча: обильная; темно-красная, скудная.

**Мужские половые органы.** Твердый шанкр; безболезненный; сопровождается увеличением паховых лимфатических узлов; не склонен к нагноению. Пациент видит во сне как мочится, после этого возникает поллюция, которую пациент не осознает.

**Женские половые органы.** Желтые бели; в том числе у очень юных девушек. Опухоли молочных желез; сопровождаются образованием узлов под мышками; сопровождаются синюшностью бо́льшей части тела; а также выделением теплого пота и расстройством желудка.

Сердце. Боли в сердце предшествует головная боль. Сердцебиение с одышкой — хуже лежа на спине. Ощущение, как будто сердце выскочило со своего места.

**Конечности.** Онемение коленей. Лишающая силы боль в правой руке — хуже при письме. Боль в правом предплечье в сочетании с болью в левом боку (в области крыла подвздошной кости).

**Кожа.** Плоские бородавки.

**Диф. диагноз.** Лус, Мерс.

## MERCURIUS IODATUS RUBER

### (Mercurius bin iodatus)

**Общее.** Подобно *Мерс-и-ф.*, это соединение воздействует на *лимфатические железы*; *ГОРЛО*, но только с левой стороны. Оно также оказывает влияние на подкожную клетчатку; его характеризуют блуждающие ревматические боли с ощущением усталости, утомления.

Начальная стадия простуды, особенно у детей. Меркуриус йодатус рубер обрывает приступ астмы, если его дать в потенции D2 или D3, либо предотвращает его возникновение в течение ночи, если дать лекарство на ночь. Железы сильно увеличены и плотные. Хронически нагнаивающиеся паховые лимфатические узлы (бубоны). Склонность к опуханию.

**Хуже.** Когда делает глотательное движение (пустое) или глотает пищу. После сна. При перемене погоды. Когда моет пол. Если промокнет. От прикосновения и давления. После обеда.

**Психика.** Плохое настроение. Хочется плакать.

**Голова.** Болезненная тяжесть в затылке. Лобная область как будто повязана веревкой.

**Глаза.** Зернистые веки. Трахома.

**Уши.** Евстахиева труба закрыта; раскрывается с хлопком, щелчком. Глухота — слышит лучше после того, как согреется от ходьбы.

**Нос.** При насморке правая половина носа горячая и опухшая.

**Лицо.** *Болезненность, тупые боли в скуловой кости.* Когда пациент просыпается, его губы покрыты липкой слизью. Экзема подбородка.

**Рот.** Язык в складках, сморщенный; ригидный у корня; боли в языке при его движении.

**Горло.** *Темно-красный зев. АНГИНА:* боли переходят с левой стороны на правую. *Миндалины и железы сильно увеличены.* Пациент часто покашливает из-за ощущения комка в горл. Скованность в мышцах горла и шеи. Пациент отхаркивает большое количество слизи из задних отделов носа. Нёбный язычок удлинён. Дифтерия: подчелюстные лимфоузлы болезненные, увеличенные.

**Желудок.** Желание подсолить пищу.

**Мочевыделительная система.** Уретра уплотнена.

**Мужские половые органы.** Твердый шанкр. Упорно гноящиеся паховые лимфатические узлы (бубоны). Саркоцеле (саркома — поражается левое яичко).

**Женские половые органы.** Обильные, едкие, зеленого цвета бели. Твердые, как камень фибромы.

**Дыхательные органы.** Астма. Охриплость возникает после незначительного промокания. Боль под правой молочной железой — схватывающая, сжимающая, она вызывает стеснение дыхания. Кашель из-за удлинения нёбного язычка, при ангине.

**Шея.** Скованность в шее. Шейный лимфаденит.

**Конечности.** Блуждающие боли при ревматизме, в особенности при поражении мышц. Ощущение, как будто плечевая кость сломается посередине. Боль из области икроножной мышцы распространяется в крестец.

**Кожа.** Трещины и борозды на коже. Мокнущие трещины на ладонях.

**Лихорадка.** Сильный озноб, после которого повышается температура тела. Потоотделение ночью, пот горячий.

Диф. диагноз. Lach.

## MEZEREUM

**Общее.** Мезереум поражает *КОЖУ, кости, нервы* и слизистые оболочки полости рта и желудка.

Мезереум вызывает *сильное* жжение в мышцах, пронзающее, как огонь. Возникает *раздражение, жгучий зуд*; или ощущение жгучего саднения кожи; жгучие сверлящие боли в костях, особенно длинных; наблюдается также невралгия: в области зубов и лица; после опоясывающего лишая.

*Внезапные боли различного характера*, после которых возникает зябкость, онемение и болезненность. Слезотечение при болях. *Пораженные части тела становятся холодными* или худеют. *Односторонние симптомы:* полностью или частично.

Болезни вследствие подавления экземы головы, после вакцинации и применения ртути. Склонность к подагре и ревматизму (подагрически -ревматический диатез), люэтический диатез. Чрезвычайная чувствительность к сквозняку, даже к дуновению от веера. Ощущение, как будто прохладный ветерок дует на часть тела. Ощущение внутреннего *жжения*, сопровождающееся сильным зудом кожи на небольших участках или на отдельных частях тела. Кариес костей и экзостозы. Периостит. Кости кажутся увеличенными. Едкие выделения: гной, бели и т.д. Язвы. Подергивание: век, правой стороны лица и т.д. Конвульсии — лучше, если крепко сжать, обхватить. Кистозная остеома. Абсцессы в фиброзной части сухожилий. Тело кажется легким.

**Хуже. НОЧЬЮ.** *От подавления симптомов. От тепла постели*, от жара открытого огня — камина, костра и т.д. *От холода; от холодного воздуха;* от холодных сквозняков; от сырого холода. От движения. От прикосновения. От ртути. После вакцинации.

Лучше. Закутаться. От жара печи (лицевая невралгия). От еды. На открытом воздухе.

Психика. Пациент равнодушен ко всему, безразличны люди и вещи: он часами смотрит в окно, не осознавая, что происходит вокруг. Возникает тревожное чувство под ложечкой, когда пациент ожидает какого-то очень неприятного сообщения или ждет, что появится боль, настигнет удар, потрясение. Забывчивый человек. Меланхолия на религиозной или финансовой почве. Пациент не желает разговаривать; выговорить слово для него представляется тяжким трудом. Упрекает других людей или ссорится с ними.

**Голова.** Боли распространяются в уши, скулы, шею и т.д. и сопровождаются слезотечением; уменьшаются при наклоне; усиливаются от разговора, от гнева. Онемение кожи головы с одной стороны или онемение макушки. Молочный струп. Болезненность костей черепа. Белые струпья. Волосы выпадают прядями; белая сухая перхоть.

**Глаза.** Боль вдоль бровей, направленная наружу. Сухость глаз; они кажутся слишком большими. Цилиарная невралгия: после операции на глазах, после удаления глазного яблока. Склонность моргать; подергивание век. Ощущение холода в сочетании с болью в глазных яблоках.

**Уши.** Кажется, что они слишком открыты; ощущение, как будто холодный воздух дул на барабанную перепонку и попал в ухо. Глухота, в том числе после подавления высыпаний на голове. Желание поковырять пальцем в ухе. Утолщение барабанной перепонки.

**Нос.** Видимое на глаз подергивание у корня носа. Частое чихание, возникающее при боли в грудной клетке, как от ссадины. Аденоидные разрастания в задних отделах носа.

**Лицо.** Невралгическая боль появляется и проходит быстро, после нее остается онемение; хуже от еды; лучше у горячей печи. Высыпания вокруг рта при насморке. Трещины в углах рта. Подергивание мышц (справа).

**Рот.** Жжение на языке, распространяющееся в желудок. Запах испорченного сыра изо рта. Разрушение корня зуба. Зубная боль распространяется в виски; лучше, когда рот открыт, а также если втягивать в рот воздух. Кажется, что зубы тупые и удлиненные. Сухость во рту, слизистая темно-красная. Трещины посредине языка. Слюнотечение. Язык покрыт налетом только с одной стороны. Киста подъязычной железы: хуже, когда пациент говорит и жует, из нее выбрасывается водянистая жидкость.

**Горло.** Темно-красное, горит, болит (ангина) — хуже зимой. Тошнота ощущается в горле — лучше от еды.

**Желудок.** Постоянно хочется есть. Горький, кислый привкус во рту; пиво кажется горьким, возникает рвота пивом. Страстное желание ветчины, жирного, кофе, вина. Боль в желудке: жгучая, разъедающая; лучше от молока и от еды. Язвы в желудке. Рвота шоколадного цвета массой; в том числе с тошнотой. Изжога. Хронический гастрит. Язва желудка; уплотнение желудка.

**Живот.** Запор после вынужденной неподвижности, после того, как был прикован к постели, (после родов?). Выпадение прямой кишки; оно сопровождается сжатием ануса, из-за чего кишку трудно вправить. Понос; стул содержит блестящие частицы. Стул твердый, объемистый, кажется, что задний проход лопнет. Сокращение диафрагмы. Опухание желез у детей с большим животом.

**Мочевыделительная система.** Гематурия: моча горячая, ее выделению предшествуют спазмы в мочевом пузыре. После мочеиспускания выделяется несколько капель крови. Красная пленка на поверхности мочи.

**Мужские половые органы.** Безболезненное опухание полового члена и мошонки. Яички увеличены. Гонорея сопровождается гематурией. Зуд головки полового члена.

**Женские половые органы.** Стойкие, похожие на яичный белок, серозные, едкие бели. Все время возникает изъязвление влагалища и шейки матки. Менструации скудные, частые, обильные, продолжительные; сопровождаются лицевой болью.

**Дыхательные органы.** Сухой, щекочущий кашель; пациент кашляет до рвоты; хуже от горячего. Когда пациент наклоняется, грудная клетка кажется слишком тесной, напряженной. Храпение у детей.

**Спина.** Копчик болит после падения.

**Конечности.** Тупая боль, зуд в подколенной ямке. Боль и жжение в большеберцовой кости и других длинных костях. Одна кисть горячая. Кажется, что конечности холодные; что они укорочены. Паралич мышц-сгибателей пальцев рук, пациент ничего не может держать в руках.

**Кожа.** *Невыносимый зуд*; он усиливается от теплой ванны; при расчесывании меняет локализацию; после него возникает ощущение холода. Старческий зуд. Высыпания мокнущие, сочится едкая, клейкая жидкость; образуются толстые корки, под которыми скапливается гной; либо они белые, как мел. Глубокие, твердые, болезненные язвы — хуже от прикосновения и тепла.

**Лихорадка.** Холод в отдельных частях тела, как будто он облиты холодной водой.

**Дополнительно.** Merc.

**Диф. диагноз.** Ars., Guaj., Kali-i., MERC.

## MILLEFOLIUM

**Общее.** Тысячелистник воздействует на *КАПИЛЛЯРЫ ЛЕГКИХ, носа и матки*. Он вызывает ощущение *болезненности, как после ушиба, полнокровие (конгестию)* и является очень ценным средством для лечения *обшгьных, не сопровождающийся болью кровотечений ярко-красной жидкой кровью, носовых кровотечений, кровохарканья, случаев кровотечений из краев уже заживших ран вследствие перенапряжения и т.д.*

Обильные выделения со слизистых оболочек. Спазмы или судороги, конвульсии, особенно после подавления выделений, кровотечений — менструаций, лохий, лактации и т.д.

Последствия хирургических операций по поводу камней желчного пузыря, почек и т.д.; последствия падения с высоты, растяжений. Варикозное расширение вен при беременности. Пронзающая боль в виде ударов.

**Хуже.** От травмы. От сильного напряжения. При наклоне. От кофе.

**Лучше.** От кровотечения. От выделений. От вина.

**Психика.** Кажется, как будто что-то забыл; не знает, что он делает или что собирается сделать. Ребенок стонет. Пациент печальный. Испытывает отвращение к работе.

**Голова.** Удары пронзающей боли, пациент бьется головой о стену. Головная боль усиливается при наклоне.

**Глаза.** Пронзающая боль, направленная внутрь, давление по направлению к корню носа. Затуманенное зрение сопровождается искажением лица (спазм лицевых мышц).

**Уши.** Ощущение прохладного воздуха, дующего сквозь уши.

**Нос.** Кровотечение при полнокровии (конгестии) сосудов головы и органов грудной клетки.

**Желудок.** Кровавая рвота. Спазмы в желудке сопровождаются ощущением, что жидкость течет по кишечнику в направлении заднего прохода.

**Живот.** Колики при метеоризме. Кровотечения из кишечника после сильного напряжения. Дизентерия с кровавым стулом.

**Мочевыделительная система.** Моча кровянистая. Задержка мочи при наличии камня в мочевом пузыре. Гнойные выделения после операции по поводу мочекаменной болезни (литотомии).

**Мужские половые органы.** Во время коитуса не происходит эякуляции. Раны и повреждения полового члена.

**Женские половые органы.** Маточное кровотечение: кровь яркая, жидкая. Болезненные варикозно расширенные вены во время беременности. Мил-лефолиум полезен при длительном кровотечении в случае трудных родов. Он оказывает лечебное воздействие при послеродовом кровотечении. Бесплодие из-за обильных менструаций.

**Дыхательные органы.** Ощущение стеснения в груди, сопровождающееся отхаркиванием кровянистой мокроты или сердцебиением. Кашель с отхаркиванием кровавой мокроты, возникающий при подавлении менструаций или после подавляющей терапии геморроя.

**Сердце.** Сердцебиение сопровождается отхаркиванием кровянистой мокроты.

**Лихорадка.** Продолжительная, непрерывная лихорадка с высокой температурой.

**Диф. диагноз.** Arn., Led.

## MOSCHUS

**Общее.** Мускус — это хорошо известное ароматическое вещество, уже от запаха которого у некоторых людей возникает обморок. Поэтому склонность легко падать в обморок при любом заболевании является основным показанием для применения Мошуса.

Это средство подходит чувствительным натурам — *истеричным женщинам* и мужчинам. *Спастические, нервного происхождения состояния*, сопровождающиеся ощущением холода. Пациент легко **ПАДАЕТ В ОБМОРОК**: во время еды, во время менструации, из-за болезни сердца и т.д. *Подергивание мышц; ощущение удушья*; ощущение истерического кома в горле, заканчивающееся потерей сознания. Ощущение, как будто прохладный воздух дует на больное место. Ощущение *напряжения* в мышцах, в коже, нервное напряжение. Нервная дрожь, нервный смех, нервная икота и т.д. Ощущения жужжания, сжатия, ощущение, как от пробки.

*Слабая реакция:* заболевания протекают нетипично. Пациент жалуется, не зная, что у него болит. Эпилепсия сопровождается дрожью, как будто пациент окоченел или у него озноб. Катаlepsия. Воображаемые болезни.

Мошус соответствует девушкам эгоистичным, упрямым, своевольным и сильно избалованным; они прибегают ко всякого рода хитростям, чтобы удовлетворить свои прихоти.

**Холод:** общий или местный, в отдельной части тела. Ощущение, как будто возник вывих или растяжение в той части тела, на которой лежит пациент.

**Хуже.** *От холода. От возбуждения. От подавления симптомов*, менструаций и т.д. С той стороны, на которой пациент лежит. Во время или после приема пищи. От давления. От движения.

**Лучше.** На открытом воздухе. От растирания. От запаха мускуса.

**Психика.** Пациент торопится; дрожит и при этом *неловок, неуклюж*; бурная деятельность сопровождается слабостью; поэтому все падает из рук. Яростный гнев: пациентка возбужденно говорит, неистовствует, ругается до тех пор, пока у нее не пересохнет во рту, не посинеют губы, взгляд не станет застывшим и она не упадет без чувств.

Пациент боится *шума, смерти*; боится лечь — а вдруг умрет? *Воображаемые болезни.* Неудержимый смех. Сексуальная ипохондрия. Пациенту кажется, что он быстро возвращается. Разговаривает сам с собой и жестикулирует. Внезапная потеря памяти.

**Голова.** Головокружение, сопровождающееся обмороком; у пациента возникает ощущение, что он падает с высоты; хуже — при наклоне: лучше — выпрямиться из наклона. Головная боль сопровождается похолоданием тела, обмороками, непроизвольным стулом и обильным мочеиспусканием (полиурией). Ощущение холода, озноба на коже головы.

**Глаза.** Повернуты вверх, неподвижны и блестят.

**Уши.** Звуки в ушах, как орудийная канонада. Звуки несущегося потока, мерно текущей воды. Нервная глухота.

**Нос.** Кровотечение из носа сопровождается спастическим сокращением, подергиванием мышц.

**Лицо.** Одна щека красная и холодная, другая — бледная и горячая. Губы синие. Пациент совершает жевательные движения нижней челюстью.

**Желудок.** Желание черного кофе, пива и коньяка (бренди). Все кажется безвкусным. Жестокие отрывки. Спастическая нервная икота. Отвращение к пище. Пациент падает в обморок во время еды. Возникает тошнота, когда пациент видит пищу или думает о ней.

**Живот.** Ощущение напряжения в животе, как будто одежда слишком тесная. Кишечные газы не отходят. Стул имеет сладковатый запах. Непроизвольный стул во время сна.

**Мочевыделительная система.** Обильная, водянистая моча. Диабет. Днем моча нормальная, а ночью — темно-красная, зловонная.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание повышено; при этом отмечается нестерпимое щекотание в половых органах и боль с ощущением напряжения в половом члене. Импотенция из-за диабета. Тошнота и рвота после коитуса. Поллюции без эрекции. Эрекция сопровождается позывом на мочеиспускание.

**Женские половые органы.** Желание повышено и сопровождается невыносимым, приятно возбуждающим щекотанием в половых органах (у старых женщин). Дисменорея сопровождается обмороком.

**Дыхательные органы.** *Внезапное удушье нервного происхождения;* пациенту хочется сделать глубокий вдох; хуже от охлаждения; лучше от отрыжки. Чувство стеснения; истерические спазмы в груди. Кашель прекращается; пациент не может откашлять мокроту. Кашель сопровождается болью под левой молочной железой. Астма.

**Сердце.** *Сердцебиение с ощущением тревоги;* сопровождается страхом смерти, пациент говорит: "Я умру". Истерического происхождения симптомы. Дрожание в области сердца.

**Шея и спина.** Напряжение в спине перед менструацией.

**Конечности.** Одна кисть горячая и бледная, другая — холодная и красная. Конечности напряжены, кажутся слишком короткими. Ощущение холода в большеберцовой кости. Боли; двигательное беспокойство в конечностях.

**Сон.** Сонливость в дневное время; бессонница ночью, пациент часто просыпается.

**Лихорадка.** *Чувствительность к холодному воздуху;* пациент содрогается от него. *Кожа холодная.* Жгучий жар сопровождается двигательным беспокойством. Пот пахнет мускусом.

**Диф. диагноз.** Carb-v., Castor-eq., Ign., Nux-m., Valer.

## MUREX

**Общее.** Как и Ser., сок моллюска багрянки оказывает выраженное влияние на **ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ**.

Препарат Мурекс подходит чувствительным, нервным, оживленным, нежным женщинам, очень усталым, слабым и истощенным; они вынуждены ложиться, но от этого становится хуже.

Боли локализуются по диагонали, например, в яичнике — с одной стороны и в молочной железе — с другой стороны. Недомогания, обусловленные климаксом.

**Хуже.** *От прикосновения.* На солнце. Сидя. Когда ложится. После сна.

**Лучше.** Перед менструацией. От еды. Придавить и поддержать. Запрокинуть голову назад.

**Психика.** Выраженный упадок духа, что-то вроде тяжелой ипохондрии. Тревога; дурные предчувствия; лучше при белях. Слабая память, пациент не может подобрать нужное слово.

**Голова.** Сжатие в задней части головы; лучше положить туда руку или запрокинуть голову.

**Нос.** Нос неприятно холодный в течение всего дня.

**Желудок.** Сильный голод даже после еды. *Ощущение пустоты в области желудка, как будто он опустился вниз, провалился.*

**Живот.** Болезненная усталость в пояснице. Ощущение тяжести внизу живота (в гипогастрии).

**Мочевыделительная система.** Учащенные позывы на мочеиспускание. Моча пахнет валерианой. Выделение незначительного количества крови при мочеиспускании.

**Женские половые органы.** Колющая боль в половых органах; она распространяется вверх, через живот в молочные железы. *Болезненность матки, боли в ней;* пациентка ощущает свою матку. Ощущение, как будто что-то давит на болезненный участок в малом тазу; лучше сидя.

*Жестокое, нервного происхождения сексуальное возбуждение; нимфомания:* желание усиливается от малейшего прикосновения к половым органам. Боли с ощущением давления на низ: женщина *вынуждена сидеть ногу на ногу, плотно сжав бедра.*

Обильные менструации с выделением крупных сгустков. Бели: густые; желтые, кровянистые; бели чередуются с психическими симптомами. Боль в молочной железе во время менструации. Во время беременности тяжело ходить — слабость во всех суставах. Выпадение, увеличение матки. Выделение крови из влагалища или кровянистые бели во время стула. Ощущение, как будто кости таза не скреплены между собой, болтаются.

**Спина.** Из-за боли в пояснице вынужден ходить, но от этого становится хуже.

**Кожа.** Сухая, как будто может потрескаться. Крапивница.

**Диф. диагноз.** Lil-t., Plat., Ser.

## MURIATIC ACID

**Общее.** Соляная кислота избирательно действует на **КРОВЬ**, вызывая состояния, сходные с теми, которые наблюдаются при тяжелых септических лихорадках, сопровождающихся высокой температурой тела и выраженным *упадком сил, протрацией.*

Поражаются *МЫШЦЫ*, особенно *МИОКАРД*; мышцы мочевого пузыря, заднего прохода, языка и т.д. — возникают парезы.

*СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА и желудочно-кишечного тракта* сухие, кровоточат, с трещинами и глубокими язвами. Ощущение болезненности в теле вызывает *ДВИГАТЕЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО*: пациент часто меняет положение тела, но вскоре слабеет и сильно утомляется; часто возникает желание лечь; пациент сползает в постели вниз, к ножному концу; глаза закрываются, нижняя челюсть отвисает. *Синеватый цвет* языка, геморроидальных узлов, язв. *Ощущение жжения*.

Рвущие боли. Сильные кровотечения. Состояния, напоминающие цингу. Пульсация в отдельных частях тела. Сухость тела, *глубокие язвы*, кровоточивость или трещины. Кровь на слизистых оболочках. *Исхудавшие мышцы, слабость и бессилие мышечного происхождения*. Опухание тканей объясняется отеками.

**Хуже.** От прикосновения. В сырую погоду. От ходьбы. От холода, от холодного питья, от купания в холодной воде. Сидя. От звука человеческого голоса. От солнца.

**Лучше.** От движения. От тепла. Лежа на левом боку.

**Психика.** Интроверт. Грустный и молчаливый. Страдает безмолвно. Раздражительный. Бормочет. Постоянно громко стонет.

**Голова.** Головокружение усиливается от малейшего движения глаз; когда пациент лежит на правом боку или на спине. Боли в затылке, *ощущение свинцовой тяжести*; хуже, когда пристально смотрит на какой-либо предмет. При головной боли пациенту кажется, что мозг ушиблен; звуки голоса невыносимы. Периодическая боль над левым глазом; она сопровождается онемением, распространяющимся вниз, вдоль правой руки, и отсутствием речи (афазией). Ощущение, что волосы встали дыбом.

**Глаза.** Вертикальная гемианопсия. Когда садится, закрывает глаза; в том числе от изнеможения.

**Уши.** Глухота. Если вдалеке слышны голоса (кто-то разговаривает), возникает головная боль. Режущие боли распространяются из сосцевидного отростка в заднюю часть шеи. Боль с ощущением покалывания, пощипывания, ползания мурашек, с ощущением холода распространяется вверх, в темя.

**Нос.** Кровотечение из носа; сильное чихание.

**Лицо.** Темно-красное или огненно-красное лицо; при этом кисти холодные; жажда отсутствует. Губы болят, трескаются и покрыты корочками. Нижняя челюсть отвисает. Веснушки после пребывания на солнце.

**Рот.** Сухость. Язык синеватый, тяжелый, неподвижный (одеревенелый); пациенту трудно говорить; язык выглядит сморщенным или обожженным. Афты. Зубы чувствительны к кислому и сладкому. Грязно-серый налет на зубах. Десны опухшие, кровоточат, покрыты язвами. Плотные узлы в языке. Губы горят, тяжелые, распухшие. Все кажется сладким. Пиво имеет вкус меда. Рак языка.

**Горло.** Сухость в горле; сопровождается жжением в груди. При попытке проглотить что-нибудь возникают спазмы и удушье. Непроизвольно делает глотательные движения.

**Желудок.** Отвращение к мясу. Ахлоргидрия (анацидное состояние). Желудок не выносит пищи, не способен переварить ее.

**Живот.** Ощущение полноты и вздутие живота после приема небольшого количества пищи. Ощущение пустоты в желудке, а также в животе после стула; и в первой половине суток (с полуночи до полудня). *Непроизвольный стул* или выпадение прямой кишки; *при мочеиспускании или при испускании кишечных газов*. Очень болезненные *геморроидальные узлы*; лучше от жара; хуже во время беременности; они выпячиваются, как гроздь винограда. Болезненность заднего прохода во время менструации. Болезненная, увеличенная печень. Асцит; в том числе при циррозе печени.

**Мочевыделительная система.** Атония мочевого пузыря: приходится долго ждать, пока потечет моча; либо вынужден так сильно тужиться, что происходит выпячивание заднего прохода. Мочеиспускание возможно только с одновременным выделением стула. Моча как молоко, красная, фиолетовая, обильная ночью и днем; при отхождении кишечных газов происходит выделение мочи.

**Женские половые органы.** Покалывание во влагалище. Половые органы очень чувствительные, пациентка не выносит малейшего прикосновения. Бели сопровождаются болью в спине.

**Сердце.** Большой, хорошего наполнения, мягкий пульс. Выпадает каждый третий удар. Пульс слабый, частый и малый. Сердцебиение ощущается в лице.

**Конечности.** Красные, опухшие, с ощущением жжения пальцы на руках и ногах. Слабость в бедрах. Пациент спотыкается при ходьбе из-за слабости в бедрах и коленях. Экзема тыла кистей. Спазмы в области возвышения большого пальца руки (правой) при письме; спазм проходит, если подвигать рукой. Боль в ахилловом сухожилии. Тяжесть в предплечьях.

**Кожа.** Пульсация в язвах при ходьбе. При скарлатине кожа серовато-синюшная, с петехиями.

**Лихорадки.** Пациент чувствует холод рано утром в постели. *Интенсивный жгучий жар*; *пациент отказывается укрываться*. Адинамические лихорадки: тифоподобные, септические и т. д.

**Диф. диагноз.** Bact., Bry.

## MYGALE LASIODORA

**Общее.** Гомеопатический препарат Мигале готовят из яда паука.

Основное показание для клинического применения этого средства — хорей, в особенности при поражении верхних отделов тела. Подергивание и сокращение мышц лица и самой головы; голова дергается в правую сторону. Рот и глаза последовательно, друг за другом быстро открываются. Пациент говорит с усилием: слова выскакивают, как будто выдергиваются, изо рта. Тошнота, сопровождающаяся сердцебиением и неясным зрением. Жестокие эрекции, искривленные эрекции. Неустойчивая походка; конечности волочатся при ходьбе. Непроизвольные судорожные движения рук и ног (голеней). Все тело постоянно двигается. Ярко-красные полосы по ходу лимфатических сосудов.

**Хуже.** От еды. Сидя. Утром.

**Лучше.** Во время сна.

**Диф. диагноз.** Agar., Tarent.

## MYRICA CERIFERA

**Общее.** Это средство обладает выраженным влиянием на *печень*, а также на сердце.

Отвратительные, тягучие выделения со слизистых оболочек, они удаляются с трудом. *Сочетанное поражение печени и сердца.*

**Хуже.** От тепла постели. После сна. Утром. От движения.

**Лучше.** На открытом воздухе. От еды, от завтрака.

**Психика.** Унылый, подавленный. Раздражительный.

**Голова.** Сильная тупая боль в лобной области и висках утром при пробуждении.

**Глаза.** Желтые склеры. *Очень красные веки.*

**Лицо.** Желтое лицо; желтушное.

**Рот.** Сухость во рту; вода приносит лишь частичное облегчение. Язык толстый, желтоватый, темный. Вязкая, густая, тошнотворная слизь во рту и в горле. Горький привкус во рту. Зловонное дыхание.

**Желудок.** Пациент считает, что не может есть: такой скверный вкус. Отсутствие аппетита; отвращение к еде. Желание кислого. Ощущение пустоты в эпигастрии, как будто все опустилось, провалилось вниз; хуже от еды, лучше от быстрой ходьбы.

**Живот.** Тупая боль в печени; она сочетается с болью под лопаткой с одной или с другой стороны. *Заболевания печени; они сочетаются с болезнью сердца;* сопровождаются крапивницей; желтухой. Желтуха: у младенцев; при раке печени; при этом кожа имеет бронзово-желтую окраску. Ощущение полноты и жжения в области желчного пузыря. Липкая слизь в стуле. При ходьбе постоянно выделяются кишечные газы. Возникает позыв на стул, но выделяются только газы в большом количестве. Стул: зловонный, тестообразный, вязкий, серого цвета.

**Мочевыделительная система.** Моча цвета пива, с желтоватой пеной.

**Женские половые органы.** Бели: едкие, зловонные, густые, желтые, выделяются продолжительное время.

**Сердце.** Пульс медленный, слабый, аритмичный.

**Спина.** Боль под лопатками при болезнях печени.

**Кожа.** Зуд при желтухе.

**Сон.** Сонливость. Страшные, скверные сновидения.

**Дополнительно.** Dig., Kali-bi.

**Диф. диагноз.** Chel.

## NAJA

**Общее.** Действие яда кобры направлено на *СЕРДЦЕ*; Ная применяется при гипертрофии сердечной мышцы и поражении клапанов — при пороках сердца.

Ная воздействует на спинной мозг и мозжечок; на *дыхательные органы, горло, яичник*. Левосторонние симптомы.

Пациент *при заболевании сердца нервный, возбужденный, дрожит*; часто симптомы возникают рефлекторно. Ощущение, как будто пьяный; потеря контроля над конечностями; над сфинктерами; пациент не способен говорить. Обморочные припадки. У пациента ощущение, что он чахнет, его силы истощаются. Кажется, что части тела подтянуты друг к другу. *Ощущение сжатия* в груди; в горле и т.д. Жжение, как от раскаленного железа. Многообразные боли. Ощущение сжатия, как будто часть тела стянута винтом. Коллапс. Сепсис.

Последствия горя. Отсутствие чувствительности на правой стороне тела. При болезни сердца симптомы немногочисленные, недостаточные.

**Хуже.** Лежа на левом боку. После сна. После менструации. *От холода*, от холодного воздуха; от сквозняков. От давления одежды. От алкоголя. От прикосновения.

**Лучше.** *От прогулки или езды в открытом экипаже.* От чихания. От курения.

**Психика.** Грустно размышляет над воображаемыми проблемами; и доводит себя до жалкого, никуда не годного состояния. Склонен к самоубийству; размышляет о нем, возникает суицидальное помешательство. Подавлен, расстроен по поводу состояния своих половых органов; лучше вечером. Не желает разговаривать. Боится остаться один. Страх дождя. Ощущение, что все сделано неправильно и ничего нельзя исправить.

**Голова.** Боль в левом виске и в области левой глазницы, распространяющаяся в затылок, сопровождающаяся тошнотой и рвотой; лучше от курения. Вся голова кажется пустой, поллой. Ощущение удара в области затылка. Теменная область чувствительна к холоду. Головные боли после прекращения менструации. Боль во лбу и в висках при наличии симптомов болезни сердца.

**Глаза.** Застывший, неподвижный взгляд. Птоз век с обеих сторон. Боли с ощущением жара в задней части глазных яблок.

**Уши.** Шум в ушах сопровождается тошнотворным привкусом во рту. Черные выделения с запахом селедочного рассола.

**Нос.** Водянистые выделения из носа; затем — сильное чихание, от которого становится легче дышать. Сенная астма (поллиноз).

**Рот.** Широко раскрыт; слюнотечение. Язык холодный. Потеря речи.

**Горло.** Ощущение, как будто комок в горле. Удушье: *задыхается*, хватается за горло. Сужение (стриктура) пищевода — глотание затруднено или невозможно.

**Желудок.** Страстное желание стимулирующих веществ, от которых становится хуже. Отрыжки со вкусом ячменного отвара; или горячие, зловонные.

**Женские половые органы.** *БОЛЬ ИЗ ЛЕВОГО ЯИЧНИКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В СЕРДЦЕ*, хуже — за неделю до менструации. Неясная боль в левой паховой области; после хирургической операции.

**Дыхательные органы.** Тяжело дышит, пыхтит. Сердечная астма; или кашель сердечного происхождения. Ощущение сухости или пустоты в левом легком. Ребра как будто сломаны. Ощущение, что тяжесть лежит на груди, стесняет дыхание; как будто раскаленный чугун течет в груди. Астме предшествует насморк; хуже лежа; лучше подняться и сесть в постели.

**Сердце.** *Слабость сердца.* Жестокая боль, стреляющая в левую лопатку, *плечо* или шею; пациент держится рукой за больное место; хуже после езды в экипаже. Видимое сердцебиение; гипертрофия сердца. Септический эндокардит. Поражение сердца после инфекционного заболевания. Пульс медленный, до 45 ударов в минуту, аритмичный, слабый, дрожащий; возможны различные по силе сердечные сокращения. Хроническое нервное сердцебиение; сильнее после молитвы. Одышка. Артериальное давление низкое.

**Конечности.** Спазмы в плечах, задней части шеи или в бедрах. Онемение левой руки. Жестокая, мучительная боль как будто в костном мозге бедренной кости. Отечные или потные кисти и стопы; в том числе при кашле. Острая боль под ногтем большого пальца левой руки, поднимающаяся вверх по руке. Бессилие.

**Кожа.** Зуд в области рубцов.

**Сон.** Глубокий, коматозный, со стерторозным (хриплым) дыханием.

**Лихорадка.** Потоотделение в нижней части спины (на пояснице) и в области лодыжек.

**Диф. диагноз.** Cimic, Lach., Laur., Spig.

## НАРНТАЛИНЕ

**Общее.** Это производное угольной смолы. Нафталин имеет особое сродство с глазами. Он показан при отслойке сетчатки, образовании выпота в области сетчатки. Помутнение роговицы; катаракта; слабое зрение (амблиопия).

## NATRUM ARSENICUM

**Общее.** Это ценное средство для лечения астмы у шахтеров, возникающей из-за угольной пыли.

Мучительный кашель с обильной зеленоватой мокротой. Стеснение в груди и в области сердца. В легких ощущение, как будто в них попал дым. Ощущение усталости во всем теле. Ощущение, как будто щитовидная железа сдавлена двумя пальцами.

## NATRUM CARBONICUM

**Общее.** Карбонат натрия поражает *пищеварение и нервы*. Пациент имеет *повышенную чувствительность* к свежему воздуху; к музыке, шуму, погрешностям в диете. *Выраженная слабость* после любого напряжения; в жаркую погоду летом. *Одутловатость*. Расслабление тканей; в том числе связок — легко возникает вывих. *При болях возникает дрожание, холодный пот*, тревога и т. д. Подергивание мышц и конечностей. Контрактуры мышц, сухожилий. Исхудание. Анемия.

Последствия солнечного удара (хронические); чрезмерной учебной нагрузки; перенапряжения. Дети, которые не переносят молоко, но хорошо прибавляют в весе, питаются кашами. Сонный ребенок вскакивает, плачет, хватается за мать — пугливые, нервные дети. Опухание и затвердение желез.



**Хуже.** *От ЖАРЫ* — от солнечного жара, в жаркую погоду (телесные симптомы усиливаются). В 5 ч утра. От музыки. *От психического* или *физического напряжения*. От мастурбации. От молока. Из-за погрешностей в диете. *От сквозняков*. В грозу. Через день. В полнолуние. От растительной пищи; от крахмалистой пищи. Если перегревшись пьет холодные напитки.

**Лучше.** От еды. От растирания. От движения. От давления. Вытереть рукой. Когда ковыряет пальцем в носу или в ушах. От потоотделения.

**Психика.** Сердитый, своенравный и *раздражительный*. Отвращение к обществу; нежелание общаться даже с членами своей семьи; со своим мужем. *Мрачный*. Оживленный; разговорчивый пациент. Тревожный, полон страхов; хуже в грозу; но не от страха, а из-за изменений в состоянии атмосферного электричества. Из-за игры на фортепьяно возникает тревога и дрожание. Пациент чувствителен к присутствию определенных людей. Соображает с трудом, медленно. Прослушивание музыки бывает причиной попытки самоубийства; а также грусти, религиозного помешательства. Погружен в печальные размышления. Равнодушен.

**Голова.** Головокружение от вина; из-за нервного напряжения; от пребывания на солнце. Головная боль в жаркую погоду; от незначительного нервного напряжения; из-за работы при газовом освещении. Головная боль распространяется через глаза наружу; голова запрокинута. Голова кажется слишком большой. Выпадение волос.

**Глаза.** Ослепительные вспышки или звездочки перед глазами; в том числе при пробуждении. Пациент видит, как в тумане, постоянно приходится протирать их. Не может читать мелкий шрифт.

**Уши.** Глухота: сопровождается рецидивирующими болями в ухе; бывает при аменорее. Ощущение, как будто в ухе лопаются пузырь. Как будто что-то двигается в ухе при глотании.

**Нос.** Опухший или шелушится. Красный нос покрыт белыми прыщиками (папулами). Катар со зловонными, густыми, желтыми или зелеными выделениями из носа. Насморк усиливается от малейшего сквозняка, возникает через день. Заложенность носа ночью. Жестокое чихание. *Выделения из задних отделов носа*.

**Лицо.** Бледное, увядшее, одутловатое. Веснушки; желтые пятна; прыщики. Губы распухшие.

**Рот.** Сухость во рту. Горький привкус во рту; пища кажется горькой. Пузырьки и гладкие язвы во рту, сопровождающиеся жжением; рот открыт. Зубная боль усиливается от конфет и фруктов. Извращение вкуса; пациент слишком чувствителен к вкусовым раздражителям. Поражение нижней поверхности языка. Язык тяжелый, неуклюжий, речь затруднена.

**Горло.** Откашливается большое количество слизи из горла. Из-за ощущения, что горло шершавое, что в горле и пищеводе сухость, приходится запивать твердую пищу, чтобы проглотить. Боли в горле возникают, когда пациент зеваает и глотает.

**Желудок.** *Слабое пищеварение*; хуже от незначительной погрешности в диете. *Повышенная кислотность желудочного сока*. Отвращение к молоку: оно вызывает понос. Кислая диспепсия, сопровождающаяся отрыжками, сочетающаяся с ревматизмом; лучше от печенья на соде. Пациент прожорливый; постоянно перекусывает. Боли в желудке уменьшаются от еды. Голод в 5 ч утра. Постоянная отрыжка. Болезненные последствия употребления холодного питья после общего перегревания. Кислая отрыжка. Изжога после жирного.

**Живот.** Газы в кишечнике перемещаются из одного места в другое, живот выпячивается то тут, то там. Область эпигастрия болезненна при прикосновении и при разговоре. Понос от крахмалистой пищи, молока. Стул как мякоть апельсина; в том числе у женщин во время климакса. Внезапный позыв на стул; позыв безрезультатный или стул извергается быстро и с шумом. Стул черный, твердый, гладкий, крошится. При колике пупок втянут, брюшная стенка напряжена, твердая.

**Мочевыделительная система.** Моча ярко- или темно-желтая. Моча пахнет, как конская, если пациент употребляет растительную или молочную пищу. Жжение в уретре во время или после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Повышенное сексуальное желание сопровождается приапизмом и болезненными поллюциями. Незавершенный половой акт (не наступает эякуляция). Головка полового члена быстро становится болезненной. Поллюции по ночам. Потоотделение после коитуса. Простаторея во время стула и при мочеиспускании; в том числе при болезнях предстательной железы.

**Женские половые органы.** Уплотнение шейки матки. Бесплодие — из-за того, что сперма вытекает. Бели: зловонные, раздражающие, густые, желтые, тягучие, им предшествуют спастические боли (колика). Менструации запаздывают, скудные, как мясные помои. В матке ощущается движение, напоминающее движение плода. Натрум карбоникум способствует зачатию.

**Дыхательные органы.** Кашель: сухой, щекоцущий; усиливается, когда пациент входит в теплое помещение; возникает в промежутке с 9 до 11 ч. Влажный гулкий кашель; он сопровождается отхаркиванием соленой гнойной зеленоватой мокроты. Кашель, сопровождающийся ощущением холода в левой половине груди.

**Сердце.** Сердцебиение из-за шума, шелеста бумаги и т.д.; при подъеме по лестнице; когда внимание пациента на что-нибудь направлено; когда он лежит на левом боку.

**Шея и спина.** Хруст в шейных позвонках, возникающий когда пациент шевелит шеей. Сверлящая боль в области угла левой лопатки. Холод между лопатками. Зоб плотный, сопровождается давящей болью. Покалывание, пощипывание в спине.

**Конечности.** Тяжесть в голених и стопах, сопровождающаяся ощущением напряжения в них, когда пациент сидит или идет. *Слабые голеностопные суставы.* Неустойчивая походка. Вывих и растяжение связок голеностопного сустава. Пациент падает из-за небольшого препятствия на мостовой или без видимой причины. Жжение в запястьях и в области голеностопных суставов (лодыжек). Локомоторная атаксия, пронзающие боли, как от молнии, разряда электричества — лучше от еды. Подошвы чувствительные; ощущение иголок в них; жжение при ходьбе. Спастически дергаются кисти при засыпании. Судороги из лодыжек распространяются в пальцы ног. Контрактуры пальцев на руках. В подколенной области возникает боль при движении. Складки на коже пальцев рук и ног болезненные.

**Кожа.** Сухая, шершавая; молочно-белая, влажная. Волдыри на мелких суставах; на кончиках пальцев рук и ног. Пустулезные высыпания. Пациент *легко потеет*. Ощущение ползания мурашек.

**Сон.** Сонливость: в дневное время; после приема пищи. Пациент просыпается утром слишком рано. Эротические сновидения. Спит с открытым ртом.

**Лихорадка.** *Легко потеет.*

**Дополнительно.** Sep.

**Диф. диагноз.** Lys, Nat-m.

## NATRIUM MURIATICUM

**Общее.** Поваренная соль серьезно расстраивает *обмен веществ, нарушает усвоение питательных веществ*. Ее избыточное потребление вызывает появление симптомов, характерных для задержки соли в организме, таких как местные и распространенные отеки. Она также поражает *кровь*, вызывая анемию, и лейкоцитоз. В сфере ее влияния оказываются *ПСИХИКА, СЕРДЦЕ*, печень и селезенка.

Пациент *худой, испытывает жажду, истощенный* вследствие нарушения пищеварения. *ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ*, а также физические симптомы имеют в своей природе *безнадежность* и неловкость, нескладность. Исхудание; оно распространяется сверху вниз, выражено в области *шеи* или живота.

*СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ* и кожа могут быть *СУХИМИ* или на них обнаруживаются *густые, белые или прозрачные, водянистые, едкие выделения*. Сухость во рту, в *горле*, в прямой кишке, во влагалище и т.д. *Онемение* — одной стороны тела; частей тела, на которых лежит пациент; онемение при параличе; онемение пальцев рук; *части тела кажутся слишком короткими*.

Быстро наступает истощение. Контрактуры мышц, сухожилий. Пациент плачет при невралгических болях. *Дрожание*. Упадок сил. Истерическая слабость. Исхудание даже при благоприятных жизненных условиях. Выраженная слабость и усталость. Склонность к простуде. *Холодное тело*. Дети поздно начинают говорить; они сердитые, своенравные, раздражительные, плачут по незначительному поводу. Кахексия, в том числе при малярии. Чрезмерная чувствительность ко всякого рода воздействиям. Зоб; гипертиреоз. Болезнь Аддисона. Диабет. Подергивание мышц. Пациент часто вздрагивает верхней половиной тела. Хорея: пациент подпрыгивает; возникает после испуга.

Болезненные последствия разочарования; испуга; горя; вспышки гнева; потери жизненных соков, мастурбации; травмы головы; применения солей серебра; злоупотребления солью. Молоденькие девушки страдают от несчастной любви, влюбляются в женатых мужчин. Паралич: от эмоций, переживаний и сексуальных излишеств. Пациент любит укрыться одеялом, но от этого не становится лучше. Пациент дрожит всем телом из-за курения табака.

**Хуже.** Четкая периодичность ухудшений. С 9 до 11 ч. В соответствии с движением солнца по небосклону. Через день. После менструации. *ОТ ЖАРА*; от солнечного тепла, в летнюю жару; в жаркую и сырую погоду. *От напряжения*: глаз, от нервного напряжения, от усилий при разговоре, при чтении, при письме. От сильных переживаний, эмоций. *От сочувствия, симпатии*. В пубертатном возрасте. После применения хинина. От хлеба, от жирного, от кислой пищи. От коитуса. На морском побережье. От хронического растяжения связок. От шума; а также от музыки. От прикосновения. От давления. В полнолуние.

**Лучше.** На открытом воздухе. От купания в прохладной воде. *От потоотделения*. В покое. Если питается нерегулярно. От тесной одежды. Дышать глубоко. Перед завтраком. От растирания. Лежа на правом боку. Долго разговаривать.

**Психика.** Пациент полон ненависти, в том числе к людям, обидевшим его. Питает отвращение к утешению, не хочет привлекать к себе внимание. *Печальный*, в том числе во время менструации; без причины. *Замкнутый*. Легко гневается, хуже если его пытаются утешить. В обществе, в компании чувствует себя неуютно, мучается. Ипохондрик. Пациент горько плачет; или хочет остаться один, чтобы поплакать. Плачет произвольно, без причины или не может плакать. Чередование состояний: то веселый, смеется, поет, танцует, то грустный. Бурно переживает горе.

Постоянно возвращается в мыслях к неприятным воспоминаниям, вязнет в них. Тревога. Дурные предчувствия. Испытывает страх грабителей или видит *сновидения о грабителях*. Неуклюжий, неловкий: в разговоре; торопится, спешит; роняет предметы из-за нервной слабости. Рассеянный. Мысли бессвязные, блуждают. Мстительный. Считает, что его жалеют из-за его несчастий, и плачет. Неумеренный смех сквозь слезы. Резкий. Мысль о мести не дает покоя и лишает сна. Чередование психических состояний. Чрезвычайно забывчив. Отвращение к мужчинам (у женщин).

**Голова.** Головокружение: как будто падает; хуже, когда стоит возле окна, когда закрывает глаза; лучше лежа, с высоко лежащей головой. **ГОЛОВНЫЕ БОЛИ:** распирающие, как будто голова может лопнуть, взорваться; они возникают при кашле; это боли, сводящие с ума; *стучащие, как будто молотком*; с ощущением тяжести. Эти боли локализуются *над глазами*; в области темени, сопровождаются частичным онемением или нарушением зрения; они усиливаются *при пробуждении*; с восхода солнца до заката; во время менструации, перед ней или после нее; от движения; даже от движения глаз; когда пациент хмурится, сдвигает брови, от чтения. Улучшение возникает от сна; от давления на глаза; если пациент лежит с высоко расположенной головой; если сидит неподвижно.

Кивающие движения головы. Головные боли у школьников. Мигрень. Выпадение волос. Поврежденная часть тела чувствительна к прикосновению.

**Глаза.** Боли в глазах при взгляде вниз. Буквы сливаются при чтении. Сужение слезного протока, при надавливании на слезный мешок выделяется слизь. *Слезотечение*; оно сопровождается покраснением глаз; слезы густые; едкие; выделяются из больного глаза; возникают при чихании, при кашле, при смехе и т.д.

Кажется, что глаза притянуты друг к другу. Зуд и жжение в глазах, пациент должен их вытереть. Птоз возникает после того, как пациент ложится. Неясное зрение, все колеблется перед глазами. Сначала возникает половинное зрение (гемианопсия), затем — головная боль. При головной боли глаза закрыты; веки спастически сомкнуты. Не может читать при искусственном освещении. Искры, черные пятна, огненные зигзаги пред глазами. Начинаяющаяся катаракта. Глаза навекате, экзофтальм; в том числе когда имеется зоб. Изображение на сетчатке сохраняется долго после того, как пациент смотрел на предмет (послеобразы). Глаза сдают, "отказывают" при чтении и письме.

**Уши.** Шумы, жужжание, гудение, звон в ушах. Болезненный треск в ушах при жевании. Зуд за ушами.

**Нос.** Сильный насморк с жидкими выделениями из носа; он продолжается от одного до трех дней, затем возникает ощущение заложенности высоко в носу, затрудняющее дыхание. Чихание рано утром. При насморке выделения из носа то есть, то их нет; простуда начинается с чихания; жидкие выделения из носа текут ручьем. Маленькие язвы в носу. Онемение одной половины носа. Потеря обоняния и вкуса. Носовое кровотечение; возникает при наклоне или когда пациент кашляет ночью.

**Лицо.** Бледное, кожа нечистая или блестит, как будто смазана жиром. **ГЕРПЕС** возле губ или по краю роста волос; высыпания напоминают жемчужины. Трещина посередине нижней губы. В губах ощущается пощипывание, возникает чувство онемения. Пульсация в нижней челюсти; усиливается, когда пациент кусает, от жара и холода. При истерии возникает ощущение пушка, ворса на лице, которое исчезает, когда пациенту становится лучше. Опухшая верхняя губа. Лицевая невралгия. Выпадение волос из бороды и усов.

**Рот.** **ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК**; он напоминает бусы или испещрен полосами по краям. Афты. Потеря вкуса и обоняния. Онемение и ощущение скованности в языке с одной стороны. Покалывание, пощипывание в языке. Язык тяжелый; речь затруднена. Дети медленно учатся говорить. Зубная фистула. Эпулис или маленькая опухоль на десне. Ощущение волоса на языке. Язык кажется сухим, но на самом деле он не сухой.

Пузыри и язвы во рту и на языке; когда они соприкасаются с пищей, возникает жжение и саднение. Зубы чувствительны к воздуху или прикосновению; боль усиливается при жевании. Пациент плачет при зубной боли, или возникает слюнотечение.

**Горло.** Откашливает много горькой, соленой слизи. Нёбный язычок отклонен в сторону. Сухой болезненный участок в горле, из-за ощущения щекотания возникает кашель и т.д. Пища попадает не в то горло; паралич после дифтерии. Пациент может проглотить только жидкости. Твердая пища достигает определенного места и затем с силой извергается. Блестящее горло. Экзофтальмический зоб. Ангина; она сопровождается ощущением, что глотать мешает комок. Как будто в горле пробка. Фарингит курильщиков.

**Желудок.** **ЖЕЛАНИЕ СОЛИ**, горького, кислого, мучнистой пищи, устриц, рыбы, молока. *Жажда, выпивает много воды*. У пациента повышенный аппетит, но он все-таки худеет; в том числе при депрессии. *Отвращение к хлебу, мясу, кофе, табаку*. Голод, сильное желание чего-либо, но насладиться едой не может, не получает удовольствия от еды. Икота. Жгучие отрыжки после еды. Сладкая отрыжка во время менструации. Ощущение, что тревога из желудка поднимается в голову. Кислая отрыжка. Пациент потеет во время еды; в том числе лицо. Рвота белой вязкой слизью, приносящая облегчение. Изжога сопровождается сердцебиением. Натощак пациент чувствует себя лучше.

**Живот.** Пульсация в эпигастрии. Припухлость и боли в области эпигастрия. Внезапное вздутие живота. Живот напряжен, сильнее в паховых областях. Боль в области пахового кольца при кашле. Ригидность брюшной стенки с левой стороны. Колика сопровождается тошнотой; лучше, когда отходят кишечные газы.

Стул; сухой, *твердый, крошится*; из-за этого возникает повреждение заднего прохода или жжение. Стул покрыт прозрачной, как стекло, слизью. Запор: стул через день вследствие вялости прямой кишки. Безболезненный понос, стул водянистый; понос хронический; возникает утром, после того, как пациент походит, "разомнется"; возникает после злоупотребления опиумом. Сжатие прямой кишки. Внутренние органы как будто болтаются и давят на низ при ходьбе. Красные пятна в эпигастрии. Герпес в области ануса.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание: при кашле; смехе; чихании; ходьбе; когда пациент сидит. Полиурия, жажда — пациент пьет много воды. Приходится долго ждать, пока пойдет моча, если пациент вынужден мочиться в чьем-либо присутствии. Моча прозрачная, с красным осадком. Пациент вынужден ждать, пока появится моча. Боль сразу после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Боль в спине и слабость в голенях; в сочетании с подавленностью — после полового акта. Поллюции вскоре после коитуса. Сексуальное желание в сочетании с физической слабостью. Подавленная гонорея. Слабость и даже паралич после сексуальных излишеств. Выпадение волос на лобке.

**Женские половые органы.** Отвращение к половому акту: он болезнен из-за сухости влагалища. Жжение и саднение во влагалище во время полового акта. Позднее наступление первой менструации. Жар во время менструации. Дисменорея с судорогами. Бесплодие: при слишком ранних, слишком обильных менструациях. Бели сначала белого цвета, затем они постепенно становятся зелеными. Истошающие бели; белые густые бели вместо менструации. Выпадение матки сопровождается тупыми болями в пояснице или резами в уретре; хуже утром; лучше лежа на спине. Молочные железы атрофируются, истощаются. Выпадение волос у детей или у женщин во время лактации. Колотье ниже сосков.

**Дыхательные органы.** Кашель из-за щекотания под ложечкой; в том числе при астме или при сердцебиении; хуже зимой. Катар дыхательных путей после подавления потоотделения. Во время кашля возникает покалывание в печени. Одышка при ходьбе вверх по лестнице. Коклюш; со слезотечением. Дыхание горячее, зловонное. Когда пациент напрягает руки, дышится легче.

**Сердце.** При *сердцебиении* сотрясается все тело, или сердцебиение чередуется с биением в голове. Трепетание сердца, сопровождающееся обморочной слабостью; хуже лежа. Сердцебиение: с ощущением тревоги, оно усиливается от напряжения; от переживаний, эмоций; лежа на левом боку. Пульс полный, медленный или слабый и частый; выпадает каждый третий удар; хуже, когда пациент ложится. Ощущение холода, болезненности в области сердца.

**Шея и спина.** Болезненная скованность в шее. Боль в спине с ощущением разбитости, как от ушиба, возникает рано утром (в первой половине суток); хуже от кашля; после коитуса; лучше лежа на спине, на чем-нибудь твердом; или от давления. Пациент без труда наклоняется, но при выпрямлении возникает боль. Худые ягодицы у младенцев.

**Конечности.** Дрожание кистей при письме. Трещины на кончиках пальцев рук. Заусеницы. Ладони горячие и потные. Ощущение, что сухожилия по бокам подколенной ямки короткие, они болезненные, сокращены. Ощущение онемения и покалывания в пальцах рук и в нижних конечностях. Заклинивает колено. Воспаление сумки надколенника. Хруст в суставах при движении. Слабость голеностопных суставов, стопы часто подворачиваются. Голени холодные. Судорожное сокращение мышц конечностей при засыпании. Перхоть, отрубевидное шелушение, чешуйки на коже подмышечной области. Трудно согнуть пальцы рук в суставах. Дети не учатся ходить. Болезненность пальцев ног или между пальцами.

**Кожа.** Жирная (маслянистая), сухая, грубая, нездоровая или желтого цвета. Трещины на коже или *герпетические высыпания*, особенно в области сгибов суставов или в области межфаланговых суставов на руках. Сухие высыпания по краю роста волос. Бородавки на ладонях и кистях вообще. При крапивнице образуются беловатые пузыри — хуже от напряжения. Мозоли. Рубцы; в том числе болезненные. Краснота в области старых рубцов.

**Сон.** Пациент всхлипывает во сне. *Просыпается с чувством слабости*. Сновидения о грабителях. Снохождение (сомнамбулизм); встает с постели, пересаживается в комнате с места на место. Вздрагивает и разговаривает во сне.

**Лихорадка.** Холод ощущается во многих частях тела — в кистях, стопах, в сердце. Утренний озноб сопровождается жаждой. Пациент зябкий, но от солнца ему становится хуже. Потоотделение скудное, наблюдается у корней волос, на носу, на лице во время еды.

**Дополнительно.** Ign., Sep.

**Диф. диагноз.** Puls.

## NATRUM PHOSPHORICUM

**Общее.** Это средство полезно при заболеваниях, связанных с избыточным образованием молочной кислоты в организме, что бывает при слишком высоком уровне сахара.

Натрум фосфорикум действует на двенадцатиперстную кишку; а также на желчные протоки, мезентериальные железы и половые органы.

**КИСЛЫЙ** вкус у *отрыжки*, рвотных масс, у содержимого желудка; кислый запах у стула, у белей; а также у мокроты, пота и т.д. Болезни сопровождаются *избыточным образованием кислоты*. *Маленькие дети, которых кормили сверх меры молоком и сахаром*.

Темно-желтые, похожие на сливки *выделения*. *Утомление, слабость*. Ощущение покалывания, как иголками. Напряжение мышц и сухожилий. Желтуха (D1 в тритурации). Оксалурия. Глисты. Опухание лимфатических узлов.

Болезненные последствия нервного напряжения или сексуальных пороков, дурных наклонностей, или того и другого вместе. Истощение (дистрофия) у детей, находящихся на искусственном вскармливании. Дрожь и сердцебиение из-за грозы. Хруст в суставах. Нервозность; чувство усталости. Лейкоцитоз.

**Хуже.** От сахара. От молока. От нервного напряжения. От грозы. От газового освещения. От коитуса. При подъеме по лестнице. От горькой пищи. От жирной пищи.

**Лучше.** От холода.

**Психика.** Нервная слабость. Страх, усиливающийся ночью; пациент боится, что что-то случится. Иллюзии: пациент воображает, что мебель — это люди; он слышит шаги в соседней комнате. Нервный, забывчивый. Становится грустным от музыки. Равнодушие по отношению ко всему, к своей семье. Подолгу сидит не двигаясь. Легко пугается.

**Голова.** Чувство отупения утром. Во время учебы, занятий возникает режущая боль в висках (справа). Ощущение давления и жара в верхней части головы, как будто голова может открыться.

**Глаза.** Золотисто-желтые, как сливки, выделения из глаз. Склеры грязно-желтые. Глаза слабые, хуже от газового освещения. Косоглазие при глистах. Один зрачок расширен.

**Уши.** Одно ухо красное, горячее, чешется; пациент расчесывает его до крови; это наблюдается при болезнях желудка и повышенной кислотности желудочного сока. Ощущение, как будто в ухо течет вода с большой высоты.

**Нос.** Зуд в носу. Пациент ощущает неприятный запах. Из носа выделяется густая, желтая, зловонная слизь. *Ребенок ковыряет в носу*. Ощущение покалывания в носу, как иголками; при этом возникает слезотечение.

**Лицо.** Зуд вокруг рта. Лицо *бледное* или красное попеременно — то с одной стороны, то с другой. Красное, румяное — цветущий вид.

**Рот.** Волдыри на кончике языка. **ЖЕЛТЫЙ, КАК СЛИВКИ, НАЛЕТ У КОРНЯ ЯЗЫКА**; на миндалинах или на нёбе. Влажный жидкий налет на языке.

Ощущение волоса на языке. Пациент скрежещет зубами; в том числе ребенок. Покалывание, онемение всей полости рта.

**Горло.** Ощущение комка в горле; оно мешает говорить. Глотание затруднено. Желтый налет на миндалинах.

**Желудок.** Кислые отрыжки. Рвота кислыми творожистыми массами. Желание продуктов с острым вкусом; яиц, жареной рыбы, пива — от них становится лучше. Отвращение к хлебу с маслом.

**Живот.** Во время стула возникает ощущение, как будто кусок мрамора упал вниз в нисходящем отделе толстой кишки. Кишечные газы создают много шума. Ощущение переполнения живота; хуже стоя или от небольшого количества еды. Гастродуоденит. Желтуха. Позывы на стул и мочеиспускание после коитуса (у мужчин). Стул как будто рубленый. Зеленоватый стул при поносе. Зуд в области заднего прохода. Пациент боится выпустить кишечные газы, опасаясь выделения стула вместе с ними. Цирроз печени и печеночная форма диабета, особенно если постоянно появляются новые фурункулы на коже. Аскариды или острицы.

**Мочевыделительная система.** Позыв на мочеиспускание, а также жжение и зуд в области наружного отверстия уретры после коитуса. Должен ждать, пока потечет моча.

**Мужские половые органы.** Сперма жидкая, водянистая, имеет тяжелый, затхлый запах, как у старой мочи. После семяизвержения возникает слабость в спине и дрожание коленей. Зуд мошонки, крайней плоти.

**Женские половые органы.** Бесплодие; характерны едкие выделения из влагалища. Бели кислые, напоминают сливки, медового цвета либо кислые и водянистые. Утренняя дурнота сопровождается рвотой кислой массой. Стопы во время менструации днем холодные, как лед; ночью в постели — горят.

**Дыхательные органы.** Дыхание затруднено. Кашель усиливается сидя. Грудная клетка кажется пустой после еды. Боль в грудной клетке усиливается от глубокого дыхания и давления.

Сердце. Дрожание в области сердца усиливается при подъеме по лестнице; возникает после менструации. Ощущение, как будто пузырек воздуха проталкивается из сердца по артериям. Боли в сердце уменьшаются, когда начинает болеть большой палец на ноге. Чередование болей в сердце и в суставах (ревматических болей). Сердцебиение сопровождается тревожным чувством — после грозы.

**Шея и спина.** Слабость после коитуса. Сильное тянущее вниз ощущение в спине. Опухание желез распространяется с шеи на область грудной клетки. Зоб сопровождается ощущением давления.

**Конечности.** Тупая боль, ломота в запястьях и суставах пальцев на руках. Дрожание конечностей после коитуса. Ревматизм. Стопы холодные, как лед, днем, а ночью — горят. Крепитация, хруст в области синовиальных сумок, оболочек суставов. Судороги в кистях при письме. Ноги подкашиваются во время ходьбы.

**Кожа.** Зуд в разных местах, особенно в области лодыжек; возможны даже экзематозные высыпания. Крапивница. Кожа гладкая, красная, блестящая.

**Сон.** Сонливость перед полуднем, но бессонница перед полночью. Сновидения тревожные, эротические, а также об умерших людях. Сильная сонливость, пациент дремлет; засыпает сидя.

**Лихорадка.** Днем стопы холодные, как лед, ночью в них ощущается жжение.

**Диф. диагноз.** Cina, Kali-s., Kreos.

## NATRUM SALICYLICUM

**Общее.** Это средство оказывает выраженное воздействие на внутреннее ухо: возникает головокружение, глухота, шум в ушах, сопровождающиеся потерей костной проводимости.

Поэтому препарат Натрум салициликум может быть полезен при болезни Меньера.

При головокружении кажется, что предметы двигаются вправо; хуже когда пациент встает с постели, из горизонтального положения. Пониженная температура тела и медленный пульс. Упадок сил после гриппа.

## NATRUM SULPHURICUM

**Общее.** Гомеопатический препарат из сульфата натрия, или глауберовой соли, применяется для лечения пациентов с гидрогеноидной конституцией. Он соответствует болезням, возникающим, например, вследствие проживания в сырых домах, в подвалах и полуподвалах. Пациенты не могут даже употреблять в пищу ни растения, выросшие у воды, ни рыбу.

Сульфат натрия влияет в особенности *НА ЗАТЫЛОЧНУЮ ОБЛАСТЬ* и *ПЕЧЕНЬ*, поджелудочную железу. Внезапные сильные проявления заболевания. *Пронзающие боли* в области ложных ребер (слева); в боку — в области крыла таза (слева); хуже при вставании или когда садится. *Желтые; водянистые выделения*, а также стул, кожа, пузыри и т.д. Густой желто-зеленый гной. *Ощущение полноты, переполнения.* Характерные черты патологии, которая лечится с помощью Натрум сульфурикум — повышенная кислотность, склонность к заболеваниям желчных путей и к образованию камней. Сикоз.

Боли усиливаются, когда пациент о них думает. Эпилепсия или малые эпилептические припадки (petit mal) после травмы головы. Подавленная гонорея. Отеки. Абсцессы с образованием свищевых ходов. Психические расстройства, возникающие после падения или другой травмы головы. Дрожание.

**Хуже.** *ОТ СЫРОСТИ*; в сырую погоду; *от сырого ночного воздуха.* В подвалах. *Лежа на левом боку. После травмы; в том числе головы.* От поднятия тяжести. От прикосновения. От давления. От ветра. От света. От музыки. От неяркого, слабого света. *Поздно вечером.* От овощей, фруктов. От холодной пищи и питья. Когда долго лежит в одном положении, не меняя позы.

**Лучше.** На открытом воздухе; на теплом, сухом воздухе. Изменить положение тела. От завтрака. Лежа на спине.

**Психика.** Чувствительный и подозрительный. Грусть усиливается от музыки или при неярком, слабом освещении; когда пациент сидит возле витража. Страх толпы, зла, несчастья. Импульс совершить самоубийство; приходится контролировать себя, сдерживаться, чтобы не застрелиться. Меланхолия. Пациент весел после стула. Психические проблемы являются результатом травмы головы или следствием падения. Периодические маниакальные приступы. Пациент не хочет разговаривать, и ему кажется, что никто не станет с ним разговаривать.

**Голова.** Ощущение раздавливающей или грызущей боли в затылке. Головные боли усиливаются от шума, при наклоне; во время менструации; от света, от еды; уменьшаются в темном помещении; от рвоты. Слюнотечение при головной боли. Головокружение; оно уменьшается от пототделения на голове. Менингит спинальный. Кожа головы чувствительная, причесываться больно. Темя горячее. Когда пациент наклоняется, кажется, что мозг болтается, ничем не закреплен. Голова дергается в сторону (вправо).

**Глаза.** Веки зернистые. *Светобоязнь*; в том числе утром, когда пациент просыпается. Тяжелые веки. Конъюнктивит желтый. Ощущение ползания мурашек в глазах. Глаза как будто горячие.

**Уши.** Пронзающие, колющие боли в ушах; хуже в сырую погоду.

**Нос.** Водянистые выделения из носа ночью. Носовое кровотечение перед менструацией и во время нее, оно часто прекращается и возобновляется. Чихание при наличии жидких выделений из носа. Густые желтые выделения.

**Лицо.** Желтое; бледное; болезненное. Зуд лица.

**Рот.** Вязкая, густая, тягучая белая слизь во рту. Горький привкус во рту. *Язык грязно-коричневый или зеленовато-желтый, толстый, тестообразный, особенно у корня.* Кончик языка кажется обожженным.

Зубная боль уменьшается, если подержать во рту холодную воду. Десны горят, как от огня. Слюнотечение при головной боли. Волдыри на нёбе. Жжение во рту, как от перца.

**Горло.** Густая желтая слизь по каплям стекает из задних отделов носа. Глотание затруднено. Жжение в глотке во время менструации.

**Желудок.** Желание воды со льдом или очень холодной — как лед — воды. Жажда только в начале лихорадки. Отвращение к мясу и хлебу. Замедленное пищеварение. Тошнота с сопутствующими симптомами. Рвота зеленой *желчью*. Кислая диспепсия сопровождается изжогой и метеоризмом. От крахмалистой пищи, молока и картофеля становится хуже — они не усваиваются.

**Живот.** Область печени болезненная, чувствительная; хуже при глубоком дыхании; когда пациент ступает на ногу; от сотрясения; тяжесть в печени, *хуже когда лежит на левом боку*. Гепатит; дуоденит. Ощущение комка ниже печени. Боль в желчном пузыре, как будто его разрывают когтями. Колики уменьшаются от растирания, если живот помять, помассировать, лечь на бок.

Спазмы в области пупка. **МЕТОРИЗМ:** кишечные газы не отходят; возникают *боли*; ощущаются толчки в разных местах; возникает вздутие в правых отделах живота. *Урчание, бульканье в кишечнике, затем внезапно возникает брызжащий, с шумом выделяющийся стул*; это случается рано утром (до полудня) после вставания, или позыв на стул заставляет встать с постели. При поносе стул пенистый или желтого цвета; смешан с зеленой слизью. Непроизвольный стул во время выделения кишечных газов и т.д. Жидкий стул по утрам. Стул большого объема. Желтуха после гнева.

**Мочевыделительная система.** Учащенное мочеиспускание. Диабет; в моче осадок кирпичного цвета или белый, как песок. Полиурия.

**Мужские половые органы.** Хроническая гонорея: выделения густые, зеленоватые; боль незначительная. Кондиломы. Зуд головки полового члена, мошонки.

**Женские половые органы.** Герпетическое воспаление наружных половых органов (вульвы). Бели: желтовато-зеленые, после гонореи; сопровождаются охриплостью. Соски молочных желез втянуты.

**Дыхательные органы.** Одышка. Астма сикотического происхождения; в том числе у детей — здесь Натрум сульфурикум применяется как конституциональное средство. При астме ухудшение возникает рано утром.

Влажный, но сильный кашель; он уменьшается сидя; пациент должен придерживать грудную клетку или держаться за бока. Боль, пронизывающая нижнюю часть грудной клетки слева. Каждая свежая простуда или любое необычное усилие, напряжение вызывают приступ астмы. Одышка при ходьбе; постоянно хочется сделать долгий глубокий вдох. Астма в сочетании с поносом, возникающим рано утром. Мокрота зеленоватая, обильная.

**Спина.** Пронзающие боли между лопатками. Сильная режущая боль в спине, распространяющаяся веерообразно вверх. Жестокие боли в задней части шеи и у основания мозга. Если пациент пытается удержать мочу, возникает боль в пояснице.

**Конечности.** Воспаление у *корня ногтя*. Панариции. Заусеницы. Боль в тазобедренном суставе — хуже, когда пациент встает или садится. Ишиас: боль возникает, когда пациент встает со стула или поворачивается в постели; ни в каком положении боль не уменьшается. Пульсация, пронзающая боль в пятках. Пузыри на подошвах. Жжение ниже коленей. Отек стоп. Кисти дрожат при пробуждении, а также при письме.

**Кожа.** Когда пациент раздевается, возникает зуд кожи. Водянистые желтые волдыри, похожие на бородавки красные бугорки на всем теле.

**Сон.** Сновидения о борьбе, сражении; видит во сне текущую воду. Просыпается: от боли, из-за метеоризма.

**Лихорадка.** Пациент мерзнет, не может согреться даже в постели. Жар с нежеланием раскрыться. Зловонный пот под мышками.

**Дополнительно.** Ars., Thuj.

**Диф. диагноз.** Coloc, Glon., Med., Puls.

## NISCOLUM

**Общее.** Никель в гомеопатии применяется для лечения периодических нервных головных болей; эти боли сопровождаются слабым зрением (астенопией), слабым пищеварением, запором; возникают у ослабленных людей, занятых литературным трудом.

Пациент должен подняться и сесть в постели, и держать голову обеими руками; при кашле ему приходится упереться руками в колени; ухудшение наступает ночью. Жестокий кашель, в том числе сопровождающийся жадой. Ребенка необходимо поддерживать во время кашля, иначе его замучают спазмы.

**Хуже.** Периодически: каждые две недели; каждый год.

## NITRICUM ACIDUM

**Общее.** Азотная кислота имеет отличительную особенность — она воздействует на *КРАЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ ТЕЛА*, в особенности ануса и рта, горла. Кроме того, она поражает *ЖЕЛЕЗЫ и печень*; предстательную

железу, слюнные железы. Азотная кислота вызывает *КРОВОТЕЧЕНИЯ*; кровотечения возникают легко, кровь яркая или похожа на окрашенную кровью воду.

Пациенты, которым показано средство Ацидум нитрикум, очень ослаблены, у них отмечается дрожание, содрогание тела, повышенная чувствительность и ощущение болезненности. Боли *КОЛЮЩИЕ, КАК ОТ ЗАНОЗЫ, или грызущие, язвенные*. Незначительная боль причиняет сильное страдание. Выделения *ЕДКИЕ*, жидкие, грязного цвета или коричневые; они вызывают покраснение кожи или разрушают волосы. *ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХ* выделений: озена, зловонный пот на стопах или ночные поты. Слизистые оболочки темные, гладкие. Отверстия тела красные, опухшие, с трещинами.

Ощущение в больной части тела, *как будто вокруг неё повязка* или что к ней подвешена гиря. *Болезненность, скованность* при болях. Плотный, зернистый экссудат. Хруст в суставах. Боль возникает и проходит быстро.

Ацидум нитрикум подходит худощавым *брюнетам* с желтой кожей; или людям, страдающим от хронических болезней, склонным к простуде или к поносу. Кахексия. Кровотечение после выскабливания полости матки. Злокачественные опухоли. Фагедена (ползучая язва с деструкцией, разъедающая). Свищи. Сифилис. Сикоз. Рак. Упорное нагноение. *Кости болят, болезненные при прикосновении*. Эпилептиформные судороги ночью и при засыпании; частое головокружение в течение дня — лучше при езде в экипаже.

Болезненные последствия бессонных ночей, проведенных в заботе о больном человеке. Боли такие, как будто мясо отрывают от костей.

Кариес костей и экзостозы. Пациенты чувствительны к препаратам в высоких потенциях. Ощущение, как будто мышь бегает по левому боку вверх и вниз.

**Хуже.** От незначительных воздействий — *ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ; ОТ СОТРЯСЕНИЯ; от шума*, от грохота, треска, от движения. От молока. От жирной пищи. После еды. *ОТ ХОЛОДА, от холодного воздуха. От сырости. Ночью. Вечером. При перемене погоды. От жара постели. От нервного напряжения или потрясения. От применения ртути*. Из-за бессонницы, лишения сна.

**Лучше.** *От плавного, скользящего движения. От езды в экипаже. В мягкую погоду. При постоянном давлении.*

**Психика.** Раздражителен, полон ненависти, мстителен. Так разгневан, что дрожит. Богохульствует, ругается, используя грубые выражения. Бред (делирий) — пациент ссорится в бреду; разговаривает с духами на другом языке. Спутанность сознания. Мысли отсутствуют после нервного напряжения. Грусть. Уныние, подавленность. Молчаливый. Отказывает в сочувствии другому человеку в его несчастье.

Тревога по поводу своей болезни; страх холеры; страх смерти. Постоянно думает о своих прошлых неприятностях. Нет желания работать, заниматься каким-либо серьезным делом. Безнадежность, отчаянье. Плачет из-за недовольства собой. Легко пугается.

**Голова.** Головные боли *раздавливающие* — усиливаются от давления шляпы; от уличного шума. Ощущение повязки вокруг головы. Болезненность черепа. Припухлость, участок отека на коже волосистой части головы. Выпадение волос на темени.

**Глаза.** Ощущение, что теплая вода течет на глаза; лучше от холодной воды; или ощущение воды, текущей из глаз (слезотечение). Выпячивание конъюнктивы в отдельных местах. Двоение в глазах (диплопия). Ресницы: жесткие, все направлены в одну сторону, к носу (справа). Паралич верхних век. Слезная фистула.

**Уши.** Глухота: уменьшается от шума, во время езды в поезде, в экипаже; возникает из-за увеличения и уплотнения миндалин; после кори. Треск в ушах при жевании. Собственная речь отдается эхом в ушах. Кариес сосцевидного отростка. Кистозные опухоли на мочках ушей.

**Нос.** Кровотечение: кровь темная, со сгустками; возникает при заболеваниях органов грудной клетки — хуже, когда пациент плачет. Капает из носа; в том числе при дифтерии. Чихание: частое, без насморка; в том числе во время сна. Насморк, сопровождающийся одышкой. Кончик носа красный, покрыт мелкими чешуйками. Режущая боль в носу; кариес костей носа. Зловонные желтые выделения. Озена. Каждое утро из носа выделяются зеленые комочки.

**Лицо.** *Желтое*, болезненное. Шелушение губ. В углах рта ссадины, трещины или струпья. Хруст в челюстях при жевании.

**Рот.** Зубы шатаются. Десны опухшие, болезненные, дряблые, кровоточащие; в том числе с внутренней стороны. Язык влажный, с трещинами или географический. Язык чистый, красный, с глубокой бороздой посредине. Болезненное нёбо. Язвы на мягком нёбе, сопровождающиеся резкой, как от занозы, болью. Слюнотечение: слюна кровянистая; язык покрыт зеленым налетом. Скверный запах изо рта. Киста подъязычной железы. Пациент прикусывает язык и щеку. Зубы желтые, кариес зубов. Зубы как будто мягкие и рыхлые, губчатые.

**Горло.** Коллющая боль, как от занозы; распространяется в уши; усиливается при глотании. Миндалины красные, опухшие, с неровной поверхностью; с мелкими язвами. Пациент не может проглотить даже чайную ложку пищи: трудно глотать. Откашливает слизь из задних отделов носа.

**Желудок.** Желание жирного, соленого, несъедобных вещей, мела, земли и т.д. Когда пациент голоден, то ощущает сладковатый привкус во рту. Молоко не усваивается, от него — хуже. Тошнота; изредка возникает рвота



— лучше от езды в экипаже. Пациент не любит мясо, продукты с добавлением сахара, хлеб. Тошнота; она сопровождается отрыжками; пациент не может принимать пищу.

**Живот.** Во время стула возникает повреждение заднего прохода, даже если кал мягкий. Продолжительная боль после стула; ходит, страдая от боли. Прямая кишка кажется разорванной; трещины в ней. *Болезненные, часто кровоточащие геморроидальные узлы.* Колика: боль уменьшается, если затянуть потуже одежду. В области заднего прохода зуд, экзема или сочится жидкость. Изъязвление кишечника после плохого лечения дизентерии. Ощущение сухой, горячей ткани, лежащей на животе. Паховая грыжа; в том числе у детей. Жжение в прямой кишке; после мочеиспускания. Кровотечения из прямой кишки после удаления геморроидальных узлов.

**Мочевыделительная система.** Моча с *резким запахом, как у конской мочи*; либо зловонная; она кажется холодной во время мочеиспускания; поочередно то обильная, то скудная. Моча содержит соли щавелевой кислоты (оксалаты), мочевой кислоты (ураты) или фосфаты. Гематурия: пациент ощущает озноб вдоль позвоночника, содрогается от холода. Ощущение, *как от горячей проволоки* в уретре. Спазмы из области почки распространяются в мочевой пузырь. Пиелонефрит. Струя мочи тонкая, как будто сужен просвет (стриктура). Не сопровождающаяся болями задержка или недержание мочи. Сморщенная почка.

**Мужские половые органы.** Зуд, жжение в области крайней плоти. Красные, покрытые мелкими чешуйками, пятна на крайней плоти или венечной борозде полового члена. Шанкры; в том числе фagedенический (гангренозный). Отечность крайней плоти. Фимоз. Стриктуры уретры вследствие гонореи или сифилиса.

**Женские половые органы.** Сладострастный зуд влагалища после коитуса. Выделение кровянистой жидкости из влагалища; или кровотечение вследствие перенапряжения. Менструации: нерегулярные; ранние, обильные, как мутная вода. Боль в спине, ягодицах и бедрах во время менструации. Метроррагия: после родов, после выскабливания полости матки. Бели: коричневые; цвета мяса, водянистые или вязкие; оставляют пятна желтого цвета или с черными краями. Плотные узлы в молочных железах или атрофия молочных желез.

**Дыхательные органы.** *Кашель с ощущением, что грудная клетка разлетится на кусочки, разобьется вдребезги*; возникает из-за сухости на небольшом участке в гортани; сопровождается колющей болью в поясничной области; хуже от холода, зимой. Одышка при подъеме по лестнице. Пациент кашляет во сне, не просыпаясь.

Мокрота: слизисто-гнойная, желтая, горькая, отвратительная; вязкая; ее отхаркивание сопровождается потоотделением. Эмпиема плевры. Кровохарканье. Кавернозный туберкулез легких. Одышка из-за смещения матки. Конгестия (полнокровие) органов грудной клетки сопровождается сердцебиением и страхом. Рези в гортани. Пациент задыхается, пытит, когда читает или наклоняется.

**Сердце.** Сердцебиение и мучительное, тоскливое чувство при подъеме по лестнице. Пульс: аритмичный; прерывается на каждом четвертом ударе. Нервное сердцебиение, возникающее в результате незначительного волнения.

**Спина.** Колющая боль в поясничной области возникает, когда пациент кашляет. Колотье в лопатках и между ними; скованность в шее. Боль в спине ночью уменьшается, когда пациент лежит на животе.

**Конечности.** Опухание суставов на пальцах рук. *Бородавки* на тыльной поверхности кистей. Герпес на руках между пальцами. Из-за вонючего пота на стопах пальцы ног болезненные. Белые пятна на ногтях. В области большеберцовой кости отмечается боль и болезненность при прикосновении. Боль в коленной чашечке, мешающая ходить. Обморожение, ознобление пальцев на ногах. Холодный пот на ладонях, кистях. Синие ногти. Слабость связок голеностопного сустава; при ходьбе слышен хруст в суставах. При вращении ногтей происходит изъязвление, возникает ощущение занозы — хуже от прикосновения. Деформация, изменение цвета ногтей, они желтые, изогнуты.

**Кожа.** Сухая кожа; с *эрозиями*; трещины во всех складках, углах. Медного цвета пятна на коже, в том числе в области большеберцовых костей. Когда пациент раздевается, возникает кожный зуд. Корки образуются, затем отпадают. Быстро возникают *язвы*, они сопровождаются саднением; края язвы неровные, характерно избыточное образование грануляций ("дикое мясо") или возникновение гнойных пробок. Упорное нагноение. Образование гнойных затеков и свищей. Бородавки крупные, зазубренные, кровоточат от прикосновения и мытья. Кондиломы. Старые рубцы становятся болезненными в холодную погоду.

**Сон.** Сотрясение тела, ощущение толчков при засыпании. Боли возникают во время сна. Тревожный, неосвежающий сон, со страшными сновидениями.

**Лихорадка.** *Холодные*, как лед, части тела; в том числе подошвы. Постоянная зябкость. Пациент *легко потеет*; потом простывает. Истошающее обильное потоотделение (с запахом мочи) утром; наблюдается в подмышечных областях, на стопах, на кистях (при повреждениях спинного мозга). Ночью потоотделение возникает в той части тела, на которой лежит пациент.

**Дополнительно.** Calc, Thuj.

**Диф. диагноз.** Ars., Kali-c, Kreos., Merc.

## NITRO-MURIATIC ACID

**Общее.** Это средство готовят, смешивая 18 частей азотной кислоты и 82 части соляной кислоты. Полученное гомеопатическое средство считается почти специфичным при оксалурии.

## NUX MOSCHATA

**Общее.** Мускатный орех — популярное домашнее лекарство. Оно применяется для того, чтобы отложить или, наоборот, вызвать наступление менструации, а также для лечения поноса.

Мускатный орех глубоко расстраивает деятельность *ОРГАНОВ ЧУВСТВ, психику и НЕРВЫ*: он обостряет чувства и повышает нервную чувствительность. Нарушается *пищеварение*. Поражаются *ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ*.

Если болезнь вызывает *СОНЛИВОСТЬ, ДРЕМОТУ* или сопровождается ею, если при этом отмечается *зябкость* или *похолодание тела*, а *ЖАЖДА ОТСУТСТВУЕТ*, следует иметь в виду Нукс мошата и назначить его. *Сухость* — действительная или кажущаяся — еще один характерный симптом. Это может быть сухость полости рта, языка, глаз и т.д., но при этом *ЖАЖДА ОТСУТСТВУЕТ*. Ощущение *тяжести* в глазах, в языке и т.д.

Выраженная *склонность к обморокам*; в том числе при сердечной недостаточности; хуже во время стула, во время менструации, при незначительной боли, от вида крови, когда пациент стоит (например, когда одевается). *Кровотечения темной кровью. Летучие боли.*

Нукс мошата полезен худощавым, нежным, истеричным женщинам с маленькими молочными железами; таким женщинам, которые *плачут и смеются попеременно*. Ощущение плотного комка в желудке, печени, горле. Истерия. Мания. Автоматизмы. Болезненность частей тела, на которых пациент лежит. Пациент чувствует себя так, как будто он пьян; спотыкается, когда пытается идти. Катаlepsия. Спазмы у детей при поносе. При эпилептическом припадке сознание сохранено. Незначительные болевые ощущения. Отечность, одутловатость. Ясновидение. Паралич сопровождается спазмами; а также дрожанием — языка, век, пищевода.

Подавленность, депрессия от горя. Болезненные последствия испуга, нервного напряжения, а также подавления высыпаний. Гудение, жужжание, странное забавное ощущение в теле. Истощение, дистрофия у маленьких детей. Твердые части тела кажутся мягкими.

**Хуже.** *От холода и от холодной ванны: от сырого холода: от холодного ветра*; от сквозняков. В туман. Когда ноги холодные. *При беременности*. При смене времени года. *ОТ ЭМОЦИЙ, ПЕРЕЖИВАНИЙ*; от возбуждения. От напряжения. *ИЗ-ЗА МЕНСТРУАЦИИ*. От сотрясения. От ушибов. Из-за незначительных причин. От нервного напряжения или *шока, потрясения*. Летом, в жаркую погоду. От движения. Лежа на болезненном боку. От перегревания. От молока. Если потрясти головой.

**Лучше.** От влажного жара. В теплом помещении. В сухую погоду.

**Психика.** *Мечтательный*. Состояния, сопровождающиеся ясновидением. Изменчивое настроение: смеется и плачет. В замешательстве, недоумевает: предметы кажутся измененными или увеличивающимися. Пациент внезапно теряет мысль — при разговоре, чтении или письме. Неправильно употребляет слова (при головной боли). Замедленное восприятие, мышление.

Пациентка громко разговаривает сама с собой. Ощущение удвоения, двойственности: женщина считает, что у нее две головы; ей кажется, что она состоит из двух людей. Пациент ненадежен, переменчив, колеблется при выполнении своих обязательств. Полная потеря памяти о своей прошлой жизни. Ощущение неминуемого конца. Мания сопровождается странными речами и нелепыми жестами. Пациент насмехается. Смеется. Шутит. Окружающее кажется изменившимся, пациент не узнает хорошо знакомые улицы. Апатия; равнодушие. Отвечает невпопад. Короткий промежуток времени кажется очень продолжительным. Ощущение левитации (перемещается, парит в пространстве, выходит из тела). Свои домашние обязанности пациентка выполняет автоматически, не может вспомнить, что уже сделала.

**Голова.** Головные боли сопровождаются ощущением, что голову распирает в висках, как будто она лопнет; лучше от сильного давления. Головокружение с ощущением, что пьян, пациент пошатывается, когда идет по улице, на открытом воздухе. Голова кажется переполненной, как будто она расширяется. Конгестия головного мозга. Кажется, что мозг болтается; как будто он ударяется о боковые стенки черепа при движении. Безболезненная пульсация в голове на небольшом участке. Конвульсивные движения головы, пациент не может говорить или глотать. Когда поднимает голову с подушки, возникает смертельная тошнота. Голова падает вперед, когда пациент сидит.

**Глаза.** Предметы кажутся крупнее, чем на самом деле, или слишком маленькими, сильно удаленными, наклонившимися; слишком близко друг к другу расположенными; исчезающими, красного цвета. Слепота, затем обморок. Кажется, что глаза сухие, поэтому трудно двигать веками. Птеригий (крыловидная плева) на роговице.

**Уши.** Обостренный слух; обостренное восприятие удаленных звуков.

**Нос.** Обостренное обоняние. Носовое кровотечение темной кровью. Сухость в носу; заложенность носа; пациент вынужден дышать носом.

**Лицо.** Бледное лицо. Поджатые губы. Глупое, ребяческое выражение лица, дьявольская усмешка. Челюсти как будто парализованы, пациент не может их сжать. Губы опухшие; слипаются.

**Рот.** Кажется, что зубы дергают, тянут. *Сухость* во рту; она исчезает при входе в помещение; *жажда отсутствует*; хуже во сне; язык прилипает к нёбу. Густая, как вата, слюна. Язык немеет, парализован, речь затруднена. Привкус мела во рту. Зубная боль у беременных женщин уменьшается от тепла, усиливается, если прикоснуться к зубу или пососать его. Кажется, что зубы шатаются. Количество слюны уменьшено, она как вата, попавшая в рот.

**Горло.** *Сухость* в горле. Трудно глотать; из-за паралича мышц.

**Желудок.** Страстное желание приправленной пищи — только она хорошо усваивается. При мысли о еде или во время еды возникает отвращение к пище. Слабое пищеварение; вся пища превращается в газы. Тошнота и рвота из-за раздражения маточным кольцом (пессарием). Диспепсия, сопровождающаяся метеоризмом. Пациент съедает немного пищи, если съест больше, возникнет головная боль. Икота.

**Живот.** Чрезвычайно сильное вздутие живота. *Колика при метеоризме.* Ощущение, как будто доска поперек нижней части живота. Болезненность пупка; даже его изъязвление, нагноение. *Стул мягкий, но пациент не может его изгнать*; стул гнилостный, ярко-желтый, с непереваренной пищей; хуже ночью. Обморочное состояние во время стула или после него. Летний понос: из-за холодного питья; из-за кипяченого молока. Атоничная прямая кишка.

**Мочевыделительная система.** Дизурия: из-за пива или вина; при истерии; при дисменорее; после еды; из-за болезни матки. Моча пахнет фиалками.

**Женские половые органы.** *Менструации: нерегулярные, несвоевременные, разные по объему кровопотери; менструальная кровь густая, темная.* Боль в матке из-за маточного кольца (пессария). Подавление (задержка) менструаций. Бели грязного цвета, кровянистые; возникают вместо менструации. Выделение газов из влагалища. Слабость родовой деятельности. Продолжительное и упорное, обильное маточное кровотечение. Молочные железы слишком маленькие. Соски втянуты.

**Дыхательные органы.** *Когда идет против ветра, возникает охриплость; истерическая охриплость.* Кашель усиливается, как только пациент согревается в постели. Одышка с ощущением тяжести в груди; истерическая астма, затруднен вдох. Когда пациент стоит в воде, у него перехватывает дыхание.

**Сердце.** Дрожание, трепетание сердца; как будто от испуга, от страха или от печали. Сердцебиение уменьшается, когда пациент прохаживается, от питья теплой воды. Ощущение, как будто оно бьется в пустоте. Ощущение, как будто сердце схватили, зажали. Пульс перемежающийся — прерывается с большими промежутками; из-за этого возникает страх смерти. Пульс слабый, аритмичный.

**Шея и спина.** Шея настолько слабая, что голова падает вперед, на грудь. Боль в спине: то в крестце, то в поясничной области. Боль вдоль позвоночника. Боль в спине и невралгия крестца и копчика — хуже при езде в экипаже. Ощущение, как будто кусок дерева расположен поперек крестца; хуже перед менструацией.

**Конечности.** Утомление от незначительного напряжения. Ощущение, как будто конечности парят в воздухе. Ревматизм: тянущие, блуждающие боли усиливаются от холодного сырого воздуха, от холодной мокрой одежды, уменьшаются от тепла. Сухие ладони. Истерический паралич. Подошвы всегда влажные. При ходьбе кажется, что ступает по твердому гороху. При появлении менструации стопы становятся холодными.

**Кожа.** Сухая, холодная кожа. Синие пятна.

**Сон.** *Приступы сонливости:* внезапные, с головокружением. Выраженная сонливость при всех заболеваниях. Пациент видит сны о том, что он падает с высоты; что его преследуют.

**Лихорадка.** Чередование озноба и жара. Озноб сопровождается ступором (оцепенение). Пот: красный, или кровянистый, или отсутствует.

**Дополнительно.** Calc, Lyc.

**Диф. диагноз.** Cann-L, Croc, Gels., Moch., Op., Rhus-t.

## NUX VOMICA

**Общее.** Нукс вомика — это средство на каждый день. Оно соответствует многим болезненным состояниям, которым подвержен современный человек.

Нукс вомика полезен людям, которые ведут *сидячий образ жизни*, интенсивно занимаются умственным трудом; или тем, кто работает в условиях стресса, напряженно и подолгу трудится в офисе, перегружен делами, заботами. Такие люди, чтобы забыть о своих делах, злоупотребляют вином, сексом, обильной возбуждающей едой и успокоительными препаратами, а в результате — страдают от болезненных последствий такого образа жизни.

Типичный пациент, которому показан Нукс вомика, довольно худой, бережливый, экономный, проворный, деятельный, нервный и раздражительный.

Рвотный орех воздействует на *нервы*, вызывая чрезмерную впечатлительность и повышенную чувствительность — умственную и физическую. Он вызывает **НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ**, неравномерное полнокровие и ипохондрию. Поэтому пациенты, которым показан Нукс вомика, страдают несварением и всегда выбирают пищу на свой страх и риск, то есть плохо усваивающуюся. Такой пациент подвержен спазмам, судоро-

гам, склонен падать в обморок. Кажется, что этот человек всегда не в духе. *ДЕЙСТВИЯ НЕИСТОВЫЕ, НАСИЛЬСТВЕННЫЕ*, часто беспорядочные, в виде припадков или безрезультатные. *Скручивание и резкие мышечные сокращения*. Спазмы, тонические судороги, при которых сознание сохранено; хуже от малейшего прикосновения; лучше, если сжать крепко или выпрямить руку в локте.

Ощущение напряжения, сжатия. Боли, как удар молнии, как разряд электричества. Невралгия; в том числе предшествующая началу заболевания. Ощущение грубого, шершавого тела внутри. Ощущение тяжести и легкости попеременно. Ощущение *болезненности, как от ушиба*, возникает *В ЖИВОТЕ*, в головном мозге и т.д. Ощущение, как будто внутри поцарапано или образовалась *ССАДИНА*: в горле, гортани.

*Склонность к простуде. Обмороки* после стула, рвоты; после родовых схваток и т.д. Заболевания желчевыводящих путей. *Кровотечения*. Пациенты — распутники, дебоширы; они напичканы лекарствами (или злоупотребляют наркотиками). *Дрожание*. Приступ эпилепсии возникает во время стула. Паралич после апоплексии (кровоизлияния в мозг), у людей, живущих на широкую ногу, в роскоши; частичный паралич, сопровождающийся головокружением и тошнотой; в том числе с колющими болями. Рефлексы повышены. Обратная перистальтика. Пациент — решительный, с твердым характером брюнет.

Болезненные последствия мастурбации, сексуальных излишеств. Варикозное расширение вен, но вены не извиты, они как плотные жгуты; расширение вен возникает, если пациент долго стоит или ведет сидячий образ жизни.

**Хуже.** *РАНО УТРОМ. ОТ ХОЛОДА; НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ* (если сухо); *от сквозняков*; от сидения на холодном; от холодного ветра. *КОГДА РАСКРЫВАЕТСЯ, СБРАСЫВАЕТ ОДЕЯЛО. ЕСЛИ ЖИВЕТ В РОСКОШИ*: употребляет кофе, приправы, *алкоголь, наркотики, слабительные средства*, переедает. *Вследствие сидячего образа жизни. Из-за распушенности, от излишеств. От нервного напряжения*; от переутомления; неприятностей. Если нарушен сон. *ИЗ-ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН; от гнева; шума; запахов; прикосновения; ОТ ДАВЛЕНИЯ*, в том числе *от давления одежды* в области талии. От зевоты. От табака. От музыки. Из-за разочарования, когда обмануты ожидания. Когда задета честь, самолюбие. От нервного потрясения.

Лучше. *ОТ ВЫДЕЛЕНИЙ*. Если вздремнуть. *Укутать голову*. Отдохнуть. От горячего питья. *От молока*. От жирного. *Когда воздух влажный. Лежа на боку*.

**Психика.** *Деятельный. ГНЕВНЫЙ И НЕТЕРПЕЛИВЫЙ*; не переносит боли: из-за нее теряет рассудок, плачет, кричит. *Рьяный; пылкого нрава. Нервный и возбудимый*. Испытывает отвращение к работе. Боится бедности. Угрюмый. Злобный, язвительный. Придирается к мелочам. *Яростный, жестокий*. Вызывает страх, опасен: у пациента возникает импульс совершить самоубийство, убить кого-либо. Страх ножей — женщина боится, что убьет себя или другого человека.

Придирается. Упрекает других. Ужасно боится выйти замуж (девушка). Время идет слишком медленно. Пациент рассказывает о своем самочувствии. Даже незначительное недомогание вызывает у пациентки сильные переживания. Ипохондрия. Меланхолия. Белая горячка (алкогольный делирий). Пациент не переносит шум, свет, запахи, прикосновение, музыку и т.д. Не выносит разговоры или чтение. Гневается, когда его утешают. Упрямый, своенравный.

**Голова.** Головокружение: головной мозг и окружающие предметы вращаются по кругу; головокружение сопровождается кратковременной потерей сознания; сопровождается потемнением в глазах; случается натошак. Ощущение, как будто головной мозг ушиблен. Кружится голова и возникает обморочная слабость в толпе или там, где много света, при ярком освещении. Головная боль на солнце. Чувствительность кожи волосистой части головы. Опухание лобной области. Голова кажется крупнее, чем тело. Пациент простывает — лучше тепло укутать голову. Мигрень. Боль в лобной области — хочется прислониться к чему-нибудь лбом.

**Глаза.** Налиты кровью. Слезотечение из больного глаза. Атрофия зрительного нерва. Светобоязнь. Парез глазных мышц. Нижняя часть глазного яблока желтая. Потеря зрения вследствие употребления алкоголя и табака. Кровянистые выделения из глаз. Весенний конъюнктивит.

**Уши.** Зуд в ушах — в евстахиевых трубах. Наружный слуховой проход сухой и чувствительный. Боль в ухе; колющая боль при глотании. Громкие звуки причиняют боль.

**Нос.** Повышенная чувствительность к сильным запахам; вплоть до обморока. Нос заложен, но имеются жидкие выделения; в том числе с одной стороны. Насморк, в том числе у новорожденных детей, ребенок сопит носом. Носовое кровотечение во время сна; из-за подавления геморроидального кровотечения, из-за кашля. *Чихание*: жестокое, *безрезультатное*; возникает из-за сильного ощущения, что в носу что-то ползает (слева). *Насморк*: жидкие выделения днем, а также на открытом воздухе, отсутствие выделений ночью. В носу ощущается запах старого сыра, горящей серы. Обостренное обоняние. Нос выглядит очень тонким, заостренным.

**Лицо.** *Красное, опухшее* или желтоватое, особенно возле носа и рта. Опухлен левый угол рта. Подглазничная (инфраорбитальная) невралгия: сопровождается опуханием щеки, имеет перемежающийся характер; лучше лежать в постели. *Челюсти* моментально сжимаются ("защелкиваются"); ригидны. Угри после употребления сыра. Прыщики (папулы) при злоупотреблении алкоголем. Ребенок все время проводит рукой по лицу (при заболевании головного мозга).

**Рот.** Зубы стучат. Зубная боль уменьшается от теплого питья. Неприятный запах изо рта; кислый запах. Мелкие афтозные язвы во рту. *ПРИВКУС ВО РТУ: ГОРЬКИЙ*; кислый, *скверный* в первой половине суток (до полудня), ощущается глубоко в горле. Зуд нёба; зуд в евстахиевой трубе. Десны опухшие, белые, кровоточат. Ощущение, как от иголок, по краям языка; усиливается после еды; а также от умывания лица холодной водой.

**Горло.** *Шершавое, ощущение саднения; как будто оно поцарапано.* Гнилостный привкус в горле, в том числе при кашле. Мелкие язвы в горле; боль усиливается, когда пациент делает "пустое" глотательное движение. Колющая боль распространяется в уши.

**Желудок.** Страстное желание пикантной, острой пищи; пива; жирной пищи, мела; стимулирующих продуктов. *ИКОТА* от переедания, от холодных или горячих напитков. Сильные позывы на рвоту, хуже когда пациент откашливается, прочищает горло. *Отрыжка* кислая на вкус, *изжога*. *Тошнота; лучше было бы вызвать рвоту.* **ЖЕСТОКАЯ РВОТА:** желчью, кислыми массами, пациент хочет вызвать рвоту, но не может.

*Пища лежит, как тяжелый узел, в желудке.* Гастралгия: боль распространяется в спину и грудную клетку; уменьшается от рвоты и горячего питья, усиливается от еды. Несварение желудка. Пациент ощущает голод, но испытывает отвращение к пище. Отрыжки: происходят с трудом, они кислые, горькие. Сильная боль в желудке вследствие травмы; хуже от малейшего количества пищи.

**Живот.** Ощущение повязки вокруг талии, *одежда давит на живот, стесняет. Болезненность брюшной стенки*, как от ушиба. Печень болезненная, увеличенная; колющая боль в печени. Желчная колика. *Желтуха*, в том числе от гнева. Сжимающая боль в кишечнике то там, то здесь. **БОЛЕЗНЕННОСТЬ КИШЕЧНИКА — ХУЖЕ ПРИ КАШЛЕ. КОГДА СТУПАЕТ НА НОГУ, ДЕЛАЕТ ШАГ.** Грыжа: у маленьких детей; из-за запора или от плача; пупочная грыжа. Колика при метеоризме.

**НЕПРИЯТНЫЕ, ПРИСТУПООБРАЗНЫЕ И БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ ПОЗЫВЫ НА СТУЛ; ЛУЧШЕ ПОСЛЕ СТУЛА.** Тяжелый запор. Вялая перистальтика. Приходится сильно тужиться во время стула; ощущение, что кишечник не полностью опорожнился; при каждой попытке выделяется незначительное количество стула. Спазмы прямой кишки; задержка газов в прямой кишке; постоянное ощущение дискомфорта в ней. *Зудящий геморрой*; внутренний, кровоточащий геморрой; лучше от обмывания прохладной водой. Дизентерия: после стула на некоторое время уменьшается боль. Понос: при желтухе; после кутежа; при лихорадке.

Колика у грудных младенцев из-за возбуждающих веществ (стимуляторов), которые оказались в съеденной матерью пище. Колика из-за подавления геморроидального кровотечения. В первой порции кал мягкий, в последней — твердый. Выпадение прямой кишки из-за поноса. В прямой кишке тянущее книзу ощущение, не связанное с опорожнением кишечника. Ощущение слабости, бессилия в паховых областях.

**Мочевыделительная система.** Почечная колика (справа), боль распространяется в половые органы и в голени; сопровождается подтеканием мочи; уменьшается, когда пациент лежит на спине. Болезненные безрезультатные позывы на мочеиспускание. Спастическая странгурия. Гематурия из-за подавления геморроидального кровотечения или менструации. Сужение уретры, связанное со спазмом. Паралич мочевого пузыря; моча вытекает по каплям, сочится; в том числе у стариков при увеличении простаты или при гонорее. Непроизвольное мочеиспускание при смехе, кашле, чихании.

**Мужские половые органы.** Легко возникает сексуальное возбуждение. Половой член становится вялым во время полового акта (во время ласк). Болезненные последствия мастурбации; сексуальных излишеств. Преждевременная эякуляция. Пребывание в женском обществе не обходится без семяизвержения. Повышенное образование смегмы.

**Женские половые органы.** Слишком сильное сексуальное желание; оно сопровождается жжением в наружных половых органах. *Менструации обильные, ранние и продолжительные*; прерывистые; кровь темная, в виде сгустков; нерегулярные менструации; они сопровождаются обморочными приступами. Дисменорея: спазмы распространяются на все тело; при этом отмечаются постоянные позывы на стул. Бели зловонные; оставляют желтые пятна на белье.

Слабость родовой деятельности — неэффективные схватки; женщина теряет сознание при каждой схватке. Обильное кровотечение после аборта. Выпадение матки: от натуги или от поднятия тяжести. Все прежние симптомы усиливаются (возобновляются) после менструации. Лохии скудные, зловонные. Соски болезненные; белый участок посредине. Боль в молочной железе, сопровождающаяся ощущением напряжения, возникает при кормлении ребенка грудью. Молоко накапливается в молочной железе, не вызывая боли, потому что ребенка не прикладывают к груди.

**Дыхательные органы.** *Кашель: жестокий*; заставляющий пациента лечь; приступообразный; при коклюше; сопровождается сильной головной болью ("голова раскалывается"); пациент вынужден придерживать голову. Поверхностное дыхание. Стесненное дыхание. Астма: из-за неправильной работы желудка; сопровождается ощущением полноты в желудке. Охриплость с ощущением, что внутренняя поверхность гортани шершавая и болезненная, такое же ощущение в грудной клетке. Кашель с ощущением, как будто что-то отрывается в груди. Межреберная невралгия — хуже лежа на больной стороне. Астма: сопровождается ощущением, будто одежда слишком тесная; лучше от отрыжки. При кашле возникает желание поест.

**Сердце.** Сердцебиение возникает, когда пациент ложится. Кажется, что сердце устало. Стенокардия: пациент лежит на коленях, отклонив тело назад.

**Шея и спина.** Невралгия в области шеи и плеча; болезненная скованность шеи; боль распространяется вдоль плеча (правого) вниз; хуже от прикосновения. Кривошея от холода или от нервного потрясения. Боль в пояснице, как будто она сломана: пациент *должен сесть в постели, чтобы повернуться на другой бок*. Ощущение ползания мурашек вдоль позвоночника. Острый прострел (люмбаго). Слабость в крестцовой области, как будто она отказывает, парализована; в том числе после родов.

**Конечности.** Руки немеют, становятся нечувствительными, в них возникает ощущение скованности. Сильная судорога в икроножных мышцах и подошвах, пациент должен вытянуть стопы; а если идет — остановиться, стоять неподвижно. Стопы кажутся косолапыми и в них ощущается саднение. Стреляющая боль из пальцев ног — в бедра; хуже после стула.

Пациент волочит ноги при ходьбе (при хорее); голени дрожат; неустойчивая походка. Ощущение сухости в коленных суставах; они хрустят во время движения. Паралич нижних конечностей от перенапряжения, а также если пациент промокнет насквозь. Автоматические движения кисти (правой) по направлению ко рту (при апоплексии). Ригидность голени.

**Кожа.** Гусиная кожа. Кожа красная и пятнистая. Крапивница при расстройстве желудка. Синеватые пятна.

**Сон. Зевота.** Сонливость вечером или бессонница от наплыва идей. Пациент *просыпается слишком рано и больше не может заснуть*; наконец, засыпает, но утром, когда встает, чувствует себя скверно. Лучше от кратковременного сна — пока не разбудят. Кошмары. Сновидения: тревожные; видит во сне, что его преследуют животные — собаки, кошки; эротические. Плачет и разговаривает во сне.

**Лихорадка.** Озноб сопровождается жаждой, во время жара жажды нет. Пациент *МЕРЗНЕТ, ЗЯБКИЙ, НЕ МОЖЕТ РАСКРЫТЬСЯ, РАЗДЕТЬСЯ*; хуже *от движения*; а также от питья, даже во время жара. Жгучий жар, особенно в лице, но как только пациент пошевелится или раскроется, чувствует холод, мерзнет. Необычайно холодное тело ("как будто ооченел"), пальцы на руках синие. Пот: кислый; появляется на одной стороне тела; теплый, появляется на самых верхних частях тела после того, как ляжет в постель.

**Дополнительно.** Kali-c, PHOS., Sulph.

**Диф. диагноз.** Ign., Lyc.

## OSIMUM CANUM

**Общее.** Это средство показано при болезнях почек, матки, мочевого пузыря и уретры. Ярко выражены симптомы почечной колики, особенно правосторонней.

*Ощущение болезненности, как будто ранка в мочеточнике.* Почечная колика сопровождается гематурией и сильной рвотой; пациент заламывает руки, стонет и кричит все время. Красный песок в моче; песок может быть шафранного цвета и иметь запах, напоминающий мускус. Опухание паховых лимфатических узлов и молочных желез. Соски болезненные при самом легком прикосновении. Выпадение влагалища. Моча скудная; при этом самочувствие ухудшается.

## OENANTHE CROCATА

**Общее.** Это ценное противосудорожное средство; оно полезно в случаях эпилептиформных, экламптических и уремических судорог.

*Эпилепсия:* в сочетании с приапизмом; а также если ухудшение наступает во время менструации или вместо нее; во время беременности. Пациент падает назад, но перед падением у него вырывается громкий крик. Эпилептический статус. Ощущение, как будто букашка ползает под кожей в области талии; хуже от прикосновения одежды. Безумие; галлюцинации. Лицо опухшее; судорожное подергивание мышц лица; пена изо рта, тризм (спастическое сжатие челюстей). Склонность плакать по пустякам. Розово-красные пятна на лице и груди, на руках, животе. Жгучий жар — сильнее в области головы и горла. Обильный зловонный пот. Упорная рвота по несколько дней, не успокаивающаяся ни от чего.

**Хуже.** *От травмы.* Из-за сексуальных расстройств или нарушения менструального цикла. От воды.

**Диф. диагноз.** Bell., Cic.

## OLEANDER

**Общее.** Олеандр оказывает выраженное действие на нервную систему, сердце, кожу и пищеварительный тракт.

*Параличи,* сопровождающиеся похожими на спазмы контрактурами верхних конечностей. Парез после детского паралича. Генерализованные судороги. *Ощущение онемения.* Слабость, сопровождающаяся дрожанием, у кормящих матерей. Ощущение вибрации. Чувство пустоты в желудке и в грудной клетке после еды; лучше от коньяка. Гемиплегия. Паралитическая ригидность. Сопор. Пациент не может говорить или говорит с трудом. Непроизвольное отхождение стула, мочи.

Хуже. От растирания. Когда раздевается. После кормления ребенка грудью. Когда смотрит в сторону. От трения одежды.

**Лучше.** Смотреть в сторону. От коньяка (бренди).

**Психика.** Грустный, не хватает уверенности в себе и силы. Мрачный, угрюмый. Ворчит, брюзжит; мучается. Медленно соображает.

**Голова.** Головокружение: хуже, когда пациент пристально смотрит на предмет или вниз, когда поворачивается на другой бок в постели; при этом у него двоится в глазах (диплопия). Головная боль уменьшается, когда водит глазами в поперечном направлении, смотрит в сторону или скашивает глаза. Головокружение возникает задолго до паралича. Щиплет кожу волосистой части головы, она чешется. Мокнувший молочный струп, сильнее на затылке. Едкий зуд в области лба и по краю роста волос; хуже от жары.

**Глаза.** Ощущение, как будто глаза оттянуты назад, втянуты в голову. Видит предметы, только когда смотрит на них боковым зрением (центральная скотома). Двоение в глазах (диплопия). Слезотечение; в том числе при чтении.

**Лицо.** Бледное. Осунувшееся. Онемение верхней губы. Когда зевает, нижняя челюсть дрожит.

**Рот.** Зубная боль возникает только при жевании. Онемение языка. Потеря речи.

**Горло.** Ощущение, как будто прохладный воздух дует на горло (слева).

**Желудок.** Чувство пустоты в желудке даже после еды; от кормления ребенка грудью; лучше от коньяка (бренди). Волчий аппетит — ест торопливо, быстро. Пульсация под ложечкой. Желание холодной воды. Отвращение к сыру. Крайне слабое пищеварение.

**Живот.** Пища выходит непереваренной на следующее утро. Стул: жидкий, с непереваренной пищей; произвольный; выходит вместе с газами; в том числе у детей.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание.

**Женские половые органы.** Дрожание после кормления ребенка грудью; женщина настолько слаба, что едва может пройти по комнате.

**Сердце.** Сердцебиение сопровождается слабостью и ощущением пустоты в грудной клетке, лучше от коньяка. Боли в сердце при наклоне.

**Конечности.** Спастическое сокращение, контрактуры верхних конечностей; в том числе при параличе. Онемение конечностей. Слабость нижних конечностей. Безболезненный паралич. Набухшие вены на кистях. Кисти дрожат при письме. Колени дрожат, когда пациент стоит. Постоянно холодные стопы. Скованность (ригидность) пальцев рук, большой палец прижат к ладони. Конечности скованные и холодные.

**Кожа.** Чувствительная, на ней образуются ссадины (потертости), из них сочится жидкость или кровь. Высыпания сопровождаются едким зудом, как будто от вшей. Онемение кожи.

**Сон.** Сопор. Зевота сопровождается дрожанием нижней челюсти.

**Лихорадка.** Жар из-за нервного напряжения.

**Диф. диагноз.** Anas, Chin.

## OLEUM ANIMALE

**Общее.** Это летучее масло было впервые получено Диппелем путем дистилляции воловьего рога. Олеум анимале воздействует *НА НЕРВЫ*, в особенности на блуждающий нерв, а также на органы пищеварения.

Симптомы возникают в разных местах или в отдельных частях тела. Ощущение *болезненности* в пораженном органе. Слабость сопровождается дрожанием кистей, коленей, стоп и т.д. Боль на ограниченных участках. Колотье; жгучие боли, как от раскаленных докрасна иголок. *Боли тянущие, дергающие вверх, а также направленные кпереди (из задней части органа — в переднюю):* в скуловых костях, яичках; в молочных железах и т.д. Ощущение *ледяного холода* распространяется от края зубов в горло, желудок и т.д. Шаркающая походка. Отрыжки, бели и т.д. *имеют запах мочи.* Мышцы, мясо как будто оторваны от костей.

Болезненные последствия подавления симптомов, особенно потоотделения на стопах. Неврастения.

**Хуже.** От холода. *От еды.* От подавления симптомов. Из-за менструации. От горячего питья. От шума. С 14 до 21 ч.

**Лучше.** От растирания. От давления. Когда потягивается. На открытом воздухе. При изменении положения тела. От отрыжки.

**Психика.** Вялость, лень; хочется сидеть. Нервничает, раздражается. Грустный; сосредоточен на самом себе, своих внутренних переживаниях (интроверт); говорит шепотом. Теряет мысль. Дурнота, слабость; в том числе желудочного происхождения.

**Голова.** Боль на ограниченных участках. Мигрень сопровождается полиурией. Головокружение желудочного происхождения, лучше запрокинуть голову назад.

**Глаза.** Пациент видит блестящие предметы перед глазами. Слезотечение во время еды. Кажется, что кожа нависает над глазами. Подергивание век.

**Лицо.** Кажется, что скуловые кости тянет, дергает вверх. Подергивание губ. Кажется, что на губах подсох яичный белок. Припухлость под нижней челюстью справа.

**Рот.** Зубная боль уменьшается при стискивании зубов, при этом кажется, что из края зубов поднимается холод. Ощущение, что полость рта смазана жиром. Белоснежная, похожая на вату, слюна. Болезненность языка, как будто он ошпарен. Пациент прикусывает щеку во время еды.

**Горло.** Болезненное, сухое; ощущение сжатия в горле; трудно сделать глотательное движение ("пустое"), хотя пища и питье проглатываются легко. Ощущение, как будто холодный воздух пронизывает горло. Пациент откашливает клейкие, коричневые комочки. Ощущение, что в горле — едкие испарения или имеется участок саднения в виде полосы; хуже при кашле.

**Желудок.** Изжога; лучше пожевать табак. Пульсация в желудке или ощущение, что в нем вода. Ощущение холода (как от глыбы льда), жжения, сжатия; лучше от отрыжки. Отрыжки с запахом мочи.

**Живот.** Метеоризм и урчание в животе.

**Мочевыделительная система.** Обильная, бледная моча; моча с запахом рыбного рассола; хуже при истерии; при мигрени. Учащенное скудное мочеиспускание, затем — головная боль. Зеленоватая моча. Слабая струя мочи.

**Мужские половые органы.** Сперматорея; в том числе когда пациент тужится во время стула. *Яички опухают по очереди; кажется, что они с силой подтянуты вверх* и сжаты. Невралгия семенного канатика. Ощущение давления в промежности. Гипертрофия простаты.

**Женские половые органы.** Менструации ранние, скудные; менструальные выделения черного цвета. Бели с запахом мочи. Болезненность молочных желез перед менструацией; колющая боль в сосках, направленная наружу; в том числе при скирре. Колотье в молочных железах, направленное из задних отделов — вперед.

**Дыхательные органы.** Астма после подавления потоотделения на стопах. Колотье в ключице.

**Сердце.** Беспокойное сердцебиение. Медленный пульс.

**Спина.** Тупая боль в лопатке (правой) уменьшается от давления. Ощущение в крестце, как при растяжении. Неустойчивая походка. Когда пациент поднимает голову, возникает хруст в шейных позвонках.

**Кожа.** Образование ссадин в сгибах суставов.

**Лихорадка.** Чередование озноба и жара. Холодный, вонючий пот на стопах; с запахом рыбы — на пятках.

**Диф. диагноз.** Sulph., Tell.

## OLEUM JECORIS

**Общее.** Тресковый жир — это питательный продукт, он оказывает влияние на органы грудной клетки, печень, поджелудочную железу и сухожилия.

Туберкулез легких и золотуха (скрофулезный диатез). Ощущение болезненности. Жжение на ограниченных участках. Нарушение усвоения питательных веществ. *Дистрофия у младенцев:* это дети, которые не переносят молоко. Исхудание; горячие кисти и голова. Вялость, повышенная утомляемость. Выделения желтого цвета. Пациент все время простывает.

**Хуже.** От молока. *От сырого холода;* на сыром холодном воздухе; в сыром, холодном месте. От движения.

**Лицо.** У женщин на подбородке и над верхней губой растут короткие грубые волосы.

**Рот.** Язык желтый. Зловонное дыхание.

**Живот.** Болезненность и тяжесть в области печени; хуже от физических упражнений.

**Женские половые органы.** Способствует установлению менструаций. Бели желтые, сопровождаются слабостью в спине.

**Дыхательные органы.** Охриплость. Сухой, щекоцущий, отрывистый кашель; уменьшается, как только поднимается температура, при лихорадке. Ранние стадии туберкулеза легких. *Болезненность или колотье в груди.* Кровохарканье. Желтая мокрота. Кашель в сочетании с сердцебиением.

**Спина.** Мерзнет, или возникает ощущение трепетания, распространяющегося из крестца вверх по спине — к затылку.

**Конечности.** Хронический ревматизм с ригидностью мышц и сухожилий. Ладони горячие; ближе к вечеру.

**Кожа.** Желтая кожа. Молочный струп. Стригущий лишай (дерматомикоз) — для наружного применения. Холодные абсцессы, натечники (при болезни Потта — туберкулезе позвоночника).

**Лихорадка.** Гектическая лихорадка. Ночные поты.

**Диф. диагноз.** Phos.

## ONOSMODIUM

**Общее.** Это средство действует *на нервы и мышцы*. Оно показано, когда утрачивается способность к сосредоточению и координированным движениям; когда нарушается чувство соразмерности, пропорциональности.



**Тупые боли, после боли возникают болезненность и скованность** в мышцах. Упадок сил, пациент утомлен и устал, пресытился: он ведет себя так, будто родился усталым.

Ступает как будто по вате. Пошатывается при ходьбе, теряет равновесие. Невралгические боли. Неврастения; в том числе сексуальная; из-за утраты сексуального желания и у мужчин и у женщин.

**Хуже.** От растяжений. ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ГЛАЗ. Из-за сексуальных излишеств. В темноте. От тесной одежды. От тепла. От влажного воздуха. От сотрясения.

**Лучше.** В покое. От сна. От еды. От холодного питья. Когда пациент раздевается.

**Психика.** Нерешительный человек. Спутанность сознания. Забывчивый. Медленно думает. Афазия. Боится, что упадет, когда поднимается или спускается по лестнице.

**Голова.** Мигрень. Головная боль вследствие перенапряжения глаз и половой слабости — хуже в темноте. Головокружение при головной боли; хуже, когда лежит на левом боку, когда поднимает руки над головой. Боль в затылке, как будто он сжат, стянут винтами; хуже от напряжения глаз и лежа. Боль распространяется из затылка (слева) вверх и вниз — в плечо, хуже от напряжения. Сильное тупое давление в затылке, направленное кверху.

**Глаза.** Ломота, тяжесть, усталость и ощущение скованности, одеревенения. Глазные симптомы сочетаются с симптомами со стороны яичников. Пациент ошибается при определении расстояния. Неясное зрение. Цветовая слепота: не различает цвета — красный и зеленый.

**Горло.** Сухость и напряжение, ощущение скованности; все симптомы уменьшаются от холодного питья и от еды.

**Живот.** Ощущение вздутия уменьшается, если ослабить давление одежды. Стул желтый, мягкий, заставляет пациента вскочить утром с постели. Страстное желание воды со льдом и холодных напитков.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание учащенное, скудное. Ароматический запах у мочи.

**Мужские половые органы.** Утрата сексуального желания. Психического происхождения импотенция. Преждевременная эякуляция, недостаточные эрекции. Сексуальное возбуждение. Постоянные сильные эрекции.

**Женские половые органы.** Сексуальное желание совершенно отсутствует. Боли возникают поочередно то в одном яичнике, то в другом. Боли в матке уменьшаются, если женщина разденется и ляжет на спину. Болезненность яичников и прямой кишки. Ощущение, как будто должна начаться менструация. Бели: раздражающие (из-за них образуются ссадины), желтоватые, зловонные, обильные, стекают по ногам. Опухание и тупые боли в молочных железах. Зуд сосков.

**Дыхательные органы.** Отрывистый кашель — отхаркивается клейкая, белая мокрота, лучше от питья холодной воды.

**Спина.** Чувство усталости в нижней части спины.

**Конечности.** Чувство усталости и онемения в голених и в подколенных ямках.

**Диф. диагноз.** Cemic, Hyper., Lil-t., Rhus-t.

## ОПИУМ

**Общее.** Опиум содержит примерно восемнадцать алкалоидов, наиболее известные из них — папаверин, морфин и кодеин.

Опиум поражает **НЕРВЫ, ПСИХИКУ И ОРГАНЫ ЧУВСТВ**: нервы утрачивают чувствительность; НЕ ОЩУЩАЕТСЯ БОЛЬ; возникает депрессия; сонливость и ступор; заторможенность и расслабление, вялость всех функций и недостаточная общая реакция (пониженная реактивность); своего рода "негативное состояние".

**Выделения,** исключая кожные, прекращаются. Произвольные движения ограничены. Отсутствует способность к концентрации; самоконтролю; способность здраво рассуждать, трезво мыслить.

**Паралич:** безболезненный; паралич головного мозга, языка, кишечника и т.д. Дрожание; подергивание мышц; спастическое сокращение мышц во сне. Конвульсии: хуже от жары; в жарком помещении или от горячей ванны. Постель кажется горячей; пациент ищет холодное место. Горячий пот, горячие кисти. Остудяющий сон: он сопровождает все болезни; возникает при спазмах; при сильном ознобе и т.д.

Эпилепсия: приступ возникает во сне; а также из-за приближения постороннего, незнакомого человека (у ребенка); от испуга. При этом ухудшение наступает от яркого, слепящего света; от гнева; из-за оскорбления. Пациент размахивает конечностями или вытягивает руки под прямым углом к телу; возникает ступор (оцепенение) между приступами судорог, между спазмами.

Отсутствие чувствительности к лекарствам, даже индивидуально подобранным. Теряет сознание каждые 15 минут. Ощущение, что тело в полном порядке, здоровое; ощущение большого счастья. Безболезненные язвы. Нагноение. Отечность с опуханием всего тела. Ощущение сухости внутри тела.

Болезненные последствия страха, испуга, гнева, позора, внезапной радости; отравления угарным газом; солнечного удара. Болезнь начинается с потоотделения. Из-за мастурбации пациент превращается в совершенного идиота.

**Хуже.** ОТ ЭМОЦИЙ, ПЕРЕЖИВАНИЙ: ОТ СТРАХА, от испуга; позора; радости. От запахов. ОТ АЛКОГОЛЯ. От сна. ОТ ПОДАВЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИЙ. После исчезновения высыпаний. От перегревания. От солнечного удара.

**Лучше.** От холода. Раскрыться. От постоянной ходьбы.

**Психика.** Полная потеря сознания. Апоплексия (кровоизлияние в мозг, геморрагический инсульт). Пациент СПОКОЕН, БЕЗМЯТЕЖЕН. Он ничего не требует; говорит, что у него ничто не болит. Приподнятое настроение — восторг, экзальтация; живое воображение. *Веселый, беспутный.* Разговорчивый. Стремительный, неосторожный. Наглый, самоуверенный; очень смелый. *Мечтательный.* Вялый. Тупой. Глупый. Отсутствие силы воли. Склонность ко лжи.

**Страхи:** возникают после испуга; испуг, который не проходит. Бред (делирий): белая горячка; видения внушают ужас, страх. Пациент считает, что он находится не дома, собирается пойти домой. Карфология ("обирание"): непроизвольно ощупывает одежду, белье и т.д. Безразличие к боли и удовольствиям. У пациента страшные видения: он видит мышей, скорпионов и т.д. Обман чувств, иллюзии: зрительные, вкусовые, тактильные; извращение всех чувств. Пациенту кажется, что части его тела очень большие. Нервный, раздражительный; часто вздрагивает.

**Голова.** Головокружение: после испуга; у стариков; при этом кажется, что голова легкая; возникает из-за травмы головы. Тяжесть в затылке. Паралич мозга. Голова горячая, покрыта горячим потом.

**Глаза.** Глаза как будто стеклянные, взгляд застывший; неподвижный. Зрачки сужены, расширены, нечувствительны к свету. Полузакрытые глаза. Глаза повернуты вверх. Птоз. Галлюцинации. Глаза красные, нависают (выпучены). Эмболия центральной артерии сетчатки.

**Уши.** Острый слух. Где-то очень далеко бьют часы, поэтому пациентка не может уснуть.

**Нос.** Потеря обоняния.

**Лицо.** Темное, опухшее лицо, оно *покрыто потом* или горячее, красное, или бледное и красное по очереди. Лицо одурманенного человека. Углы рта подергиваются. Дрожание, подергивание мышц лица, *лицо, как у старика*; наблюдается после детской холеры; у грудного младенца в возрасте 3 или 4 недель. Нижняя челюсть отвисает. Тризм (спастическое сжатие челюстей). Губы опухшие, выпячиваются.

**Рот.** Язык парализован; высовывается изо рта и отклоняется вправо; он черный, сухой, речь затруднена. Кровянистая пена. Сухость во рту.

**Горло.** Сухость в горле. Пациент не может глотать. При глотании пища либо попадает не в то горло, либо возвращается через нос.

**Желудок.** Пациент голоден; но есть не хочется. Рвота: при перитоните; каловыми массами, мочой. Сильная жажда. От переживаний, эмоций возникает позыв на рвоту.

**Живот.** Живот твердый, сильно вздут (тимпанит). Ощущение, как будто в животе лежит груз, что-то тяжелое. Кажется, что кишечник полностью непроходим. *Паралич, атония кишечника*, в том числе после хирургической операции (лапаротомии). Свинцовая колика. Ущемленная пупочная или паховая грыжа.

**Тяжелый запор.** Стул в виде *твердых черных шариков*. Кровянистая слизь сочится из раскрытого ануса. Задержка стула из-за непроходимости кишечника. Непроизвольный стул; в том числе после испуга. Сильная боль в прямой кишке, как будто ее раздавливает на куски. Кишечные газы отходят с трудом. Спазмы кишечника, ребенок плачет и днем, и ночью.

**Мочевыделительная система.** *Паралич и атония мочевого пузыря*; в том числе после хирургической операции (лапаротомии). Задержка мочи: у детей из-за того, что за ними ухаживает сердитая, разгневанная няня; из-за спазмов шейки мочевого пузыря; от испуга. Моча начинает выделяться не сразу; слабая струя мочи. Непроизвольное мочеиспускание от испуга. Почечная колика: боль распространяется в мочевой пузырь и яички.

**Мужские половые органы.** Дисменорея: женщина вынуждена согнуться пополам; при дисменорее возникает позыв на стул. Выпадение матки от испуга. Аменорея от испуга. Матка мягкая. Икота во время беременности. Оживленные или очень сильные движения плода. Экламптические судороги. Угроза выкидыша, подавление (задержка) лохий из-за испуга. Конвульсии возникают из-за прекращения схваток в родах.

**Дыхательные органы.** Клопочущее, *неравномерное дыхание*. Дыхание с шумным продолжительным выдохом (как вздохи), храпящее, тяжелое, хриплое (стерторозное). Кашель: щекочущий, сопровождается одышкой и цианозом лица; либо при кашле возникает обильное потоотделение на всем теле; лучше от питья воды. Ощущение жара в груди. Дыхание прекращается, когда пациент засыпает и не возобновляется до тех пор, пока пациента не пошевелят. Кровохарканье. Потеря голоса (афония) из-за испуга. Зевота после кашля.

**Сердце.** Жжение в области сердца. Слабое сердце. *Пульс хорошего наполнения, медленный.* Сердцебиение после тревожных событий, после испуга, от горя, скорби и т.д.

**Спина.** Опистотонус. Пульсация артерий и набухание вен на шее.

**Конечности.** Дрожание конечностей после испуга. Безболезненный паралич. Подергивания и спастические движения конечностей. Вены на кистях расширены. Пациенту кажется, что его нижние конечности отделены от тела, отрезаны и принадлежат кому-то другому. Онемение; слабость конечностей. Шаркающая и дрожащая походка. Одна или другая рука судорожно двигается из стороны в сторону.

**Кожа.** Ощущение ползания мурашек возникает в разных местах. *Генерализованный зуд*. Кожа шершавая и грязная. Сухая кожа. Безболезненные, вяло текущие язвы. Все тело красного цвета. Синие пятна на коже.

**Сон.** *Сонливость, дремота*. Тяжелый, отупляющий сон; в том числе у стариков. Пациент чувствует усталость, но не может уснуть; бывает, в том числе, у пьяниц. Бессонница из-за обостренного слуха. *Coma vigil* (бессознательное состояние с бредом, с открытыми глазами). Пациент сонный, но уснуть не может. Видит во сне кошек, собак, черные силуэты, фигуры.

**Лихорадка.** Пониженная температура тела и склонность впасть в оцепенение (ступор). Пациент *горячий, потный и сонный*; с холодными конечностями. Горячий пот на поверхности всего тела, исключая нижние конечности. Пот не приносит облегчения.

**Дополнительно.** Alum., Bar-c, Bry., Phos., Plb.

**Диф. диагноз.** Arn., Nux-m.

## ORIGANUM

**Общее.** Сладкий майоран оказывает сильное воздействие на женские половые органы.

Повышенное сексуальное желание, стремление к физической близости. Эротомания; в том числе со склонностью к самоубийству. Сильное сексуальное возбуждение вынуждает женщину заниматься мастурбацией. Сладострастные мысли; порывы, сновидения. Опухание и зуд сосков, а также боли в молочных железах. Мысли о замужестве; они рассеивают грусть. Стремление к активным физическим упражнениям: пациентка начинает бегать.

**Диф. диагноз.** Canth., Hyos., Plat.

## OSMIUM

**Общее.** Этот металл в природе находят вместе с платиной.

Осмий поражает *дыхательные пути*, в особенности *трахею*. Хотя выделения имеют неприятный запах, моча пахнет фиалками; у отрыжки привкус редиса, а пот под мышками пахнет чесноком.

Ощущение ползания мурашек на спине и на плечах. Боли перемещаются вверх и вниз. Осмий вызывает прирастание ногтевого валика к ногтю.

**Хуже.** От кашля. От разговора.

**Психика.** Плаксивость, пациент кричит при кашле.

**Глаза.** Зеленоватый или радужный ореол вокруг источника света. Глаукома: все вокруг переливается всеми цветами радуги.

**Нос.** Жидкие выделения с ощущением заложенности носа при насморке. Пациент гнусавит, сопит.

**Желудок.** Кажется, что желудок наполнен щебнем или комьями. Отрыжки с запахом редиски.

**Мочевыделительная система.** Моча содержит белок; пахнет фиалками.

**Мужские половые органы.** Упорная ноющая боль в головке полового члена. Боль в яичках и в семенном канатике.

**Дыхательные органы.** Спастический кашель; как будто пациент кашляет в пустую трубу; при этом возникает ощущение, что органы грудной клетки оторвались; отхаркивается вязкая мокрота. При разговоре возникает боль в гортани. Чувствительность дыхательных путей.

**Спина.** Ощущение ползания мурашек в области спины и на плечах. Конечности. Пот под мышками пахнет чесноком. Подергивание пальцев на руках при спастическом кашле. Кожная складка тянется вслед за растущим ногтем (приросший ногтевой валик).

**Кожа.** Экзема. Зудящие папулы (прыщики).

**Диф. диагноз.** Ars., Iod., Phos.

## OXALICUM ACIDUM

**Общее.** Хотя оксалаты — соли щавелевой кислоты — содержатся в некоторых кислых овощах, употребляемых в пищу, собственно щавелевая кислота является очень сильным ядом. Она вызывает не только *гастроэнтерит*, но также поражает *нервы и спинной мозг*: она может явиться причиной двигательного паралича.

Пациент становится слабым, его тело — холодным, цианотичным, немеет, хуже — в области нижних конечностей.

**Мучительные боли:** как разряды электричества (как молния); в виде полос; на *ограниченных участках*; жгучие и т.д. Симптомы усиливаются от движения и при мысли о них. Но не только это: при мысли о симптоме возникает ощущение, соответствующее симптому или болезни, которых у пациента на самом деле нет.

Ревматизм: симптомы с левой стороны тела. Неврастения. Невралгия. Левосторонний паралич; вследствие воспаления мягкой оболочки спинного мозга. Периодичность симптомов.

**Хуже.** *Подумать о чем-нибудь* — о симптоме и т.д. *От холода. От прикосновения. От бритья.* От нервного напряжения. От движения. От земляники, кислых фруктов, винограда.

**Лучше.** После стула.

**Психика.** Пациент нервный, не спит. В радостном настроении, оживлен; быстро соображает и действует. Все недомогания усиливаются, когда пациент думает о себе.

**Голова.** Головокружение сопровождается ощущением, что плывет, оно возникает, когда пациент ложится, когда выглядывает из окна. Ощущение повязки на голове; сжимает, как будто за каждым ухом — винт, лучше после стула. Онемение и покалывание в затылке. Болезненный, чувствительный участок на волосистой части головы.

**Глаза.** Мелкие, особенно линейные объекты кажутся более крупными и более удаленными, чем на самом деле. Снижение зрения при носовом кровотечении. Повышенная чувствительность сетчатки.

**Лицо.** Бледное, холодное, серовато-синюшное. Чувство жара в лице.

**Рот.** *Кислый привкус* во рту; кислые отрыжки; глотание затруднено.

**Желудок.** Ощущение пустоты и грызущая боль заставляют пациента поесть. Жгучая боль распространяется вверх, усиливается от малейшего прикосновения; а также от сахара. Пациент не может есть землянику. От сахара, кофе и вина становится хуже.

**Живот.** Спастическая боль возле пупка (колика); или произвольный, похожий на грязь, коричневый стул; лучше лежа. Кишечные газы отходят с трудом. Колющие боли в печени; лучше от глубокого дыхания. Обморочное состояние и рвота во время стула. Понос от кофе. Хроническое воспаление кишечника.

**Мочевыделительная система.** Если подумает о мочеиспускании, возникает позыв на мочеиспускание. Боли в головке полового члена при мочеиспускании. Оксалаты в моче.

**Мужские половые органы.** Невралгические боли в семенном канатике; хуже от малейшего движения. Пульсация в яичках или ощущение, что они раздавлены.

**Дыхательные органы.** Низкий, грубый голос. Охриплость при нарушении работы сердца. Потеря голоса (афония) из-за паралича голосовых связок. Одышка; в том числе по ночам. Короткий, как рывок, вдох и внезапный, с усилием выдох. Боль из нижних отделов грудной клетки (слева) распространяется в эпигастрий. Грудная клетка неподвижна, фиксирована. Боль в левом легком. Голос изменен.

**Сердце.** Резкая пронзающая боль в сердце и в области левого легкого, распространяющаяся в эпигастрий, не позволяющая дышать; пациент сидит выпрямившись, скрестив руки на груди. Сердцебиение усиливается лежа. Стенокардия. Сердечные симптомы чередуются с потерей голоса (с афонией). Перебои в сердце возникают, когда пациент думает о них. Трепетание сердца.

**Спина.** Онемение и покалывание в спине. *Спина кажется слишком слабой для того, чтобы поддерживать тело.* Холод ползет вверх вдоль позвоночника.

**Конечности.** *Слабые, дрожащие кисти и стопы.* Тянущие, пронзающие боли стреляют вниз вдоль конечностей. Ноги синие, холодные, нечувствительные; неподвижные. Онемение распространяется из плеч в кончики пальцев рук. Руки холодные, как у покойника. Запястье (справа) постоянно болит, как от растяжения связок, хочется расправить, вытянуть руку; пациент не может ничего держать в руке. Боль в мякоти большого пальца руки (справа).

**Кожа.** Кожа чувствительная, болезненная, жгучая боль в коже; хуже от бритья. Легко потеет. Множество пятен округлой формы.

**Диф. диагноз.** Ars., Pic-ac.

## ОХУТРОПИС

**Общее.** Растение широко известно под именем локо, или "бешеный сорняк". Он оказывает выраженное влияние на нервную систему: появляется неуверенная, шатающаяся походка или человек ходит спиной вперед, пятится. Сильная депрессия. Позыв на мочеиспускание возникает, когда пациент подумает об этом. Характерно дрожание и ощущение пустоты.

**Хуже.** При мысли о симптоме. Через день.

**Лучше.** После сна.

## РАЕОНИА

**Общее.** Выражены симптомы, относящиеся к заднему проходу и коже. Кожа очень *чувствительная*: возникают изъязвления, в том числе от давления; например, язвы из-за тесной обуви, пролежни и т.д. Боли стреляющие или как от занозы. Варикозное расширение вен. Пациент катается по полу от боли.

**Хуже.** *От прикосновения* или давления. Ночью. От движения. **ОТ СТУЛА.**

**Психика.** Тяжело переживает плохие новости.

**Прямая кишка.** *Мучительная боль в заднем проходе*; она сохраняется продолжительное время после стула; пациент вынужден встать и ходить; в том числе ночью. Трещины или свищ заднего прохода. Геморрой — крупные, изъязвленные узлы. Болезненная язва в промежности, из нее сочится отвратительная жидкость. Анус покрыт корками, струпьями.

**Сон.** Ужасные, пугающие сновидения — кошмары.

**Кожа.** Чувствительная кожа. Язвы от давления, пролежни. Бурсит большого пальца стопы.

**Диф. диагноз.** Rat.

## PALLADIUM

**Общее.** Этот металл очень близок платине (*Plat.*) и золоту (*Aur.*). Он воздействует на *яичники*, особенно на правый; на матку и психику.

**Боли летучие;** непостоянные. Слабость, отвращение к физическим упражнениям. Болезненность, как от ушиба. Последствия получения плохих известий.

**Хуже.** *От ярких переживаний, от эмоций;* от разочарования. *От общественных обязанностей.* Стоя. От напряжения.

**Лучше.** От прикосновения. От давления. Когда отвлекается. От растирания. После сна, после стула.

**Психика.** Пациент любит одобрение; добивается признания у других людей, придает большое значение их мнению. Легко становится жертвой неуважительного отношения, истинного или мнимого; не дает покоя уязвленное самолюбие и воображаемое пренебрежение; иногда отводит душу в крепких выражениях. От печальных известий усиливаются все симптомы. Время идет слишком медленно. Блестяще держится в обществе, но впоследствии чувствует сильное истощение.

**Голова.** Кажется, что голова раскачивается назад и вперед. Головная боль распространяется от одного уха к другому через темя; лучше, если сосредоточиться на ней.

**Лицо.** Синее, желтоватое.

**Горло.** Ощущение, как будто хлебная крошка застряла в горле; как будто что-то свисает возле подъязычной кости. Из горла выделяется слизь, *похожая на яичный белок.*

**Живот.** Стреляющая боль из пупка распространяется в молочные железы или в область таза; лучше после стула. Ощущение пустоты, полости в паховых областях. Ощущение, как будто кишечник откушен. От кашля, чихания усиливается боль в животе. Стул белого цвета, запоры.

**Мочевыделительная система.** Режущая боль в мочевом пузыре уменьшается от стула. Кажется, что мочевой пузырь полный, но мочи выделяется мало.

**Женские половые органы.** Выпадение или ретроверсия матки. Подострый пельвиоперитонит. Боли с ощущением давления на низ уменьшаются от растирания. Рези в матке уменьшаются после стула. Менструальные кровотечения во время кормления ребенка грудью. Бели напоминают яичный белок, желтые, они появляются перед менструацией и после нее. Ощущение свинцовой тяжести в области таза, хуже стоя. Боль в яичниках уменьшается от давления. Ощущение болезненности в животе после менструации и от предчувствия, что должно случиться что-то ужасное.

**Спина.** Чувство усталости в пояснице.

**Конечности.** Летучие невралгические боли в разных частях тела. Пронзающие боли из пальцев ног распространяются в область крыла таза.

**Кожа.** Зуд всего тела возникает после того, как пациент разденется.

**Диф. диагноз.** Asaf., Plat.

## PAREIRA BRAVA

**Общее.** Поражаются мочеполовые органы и левая половина тела. Постоянно ощущается позыв на мочеиспускание; когда пациент пытается помочиться, возникает жестокая боль в головке полового члена, она распространяется вниз, вдоль бедер. А для того, чтобы помочиться, пациент *вынужден встать на колени, опереться на руки*, а голову с силой упереть в пол.

Участки хрящевидного уплотнения в слизистых оболочках уретры и мочевого пузыря. Почечная колика; увеличение простаты — сопровождаются задержкой мочи и катаром мочевого пузыря (циститом). Дизурия. Моча содержит густую, вязкую, белую слизь или *красный песок*. Отек нижних конечностей.

**Диф. диагноз.** Verb., Med.

## PARIS QUADRIFOLIA

**Общее.** Это средство воздействует на голову, позвоночник, глаза и на одну половину тела. Ощущение *тяжести*; онемения; *части тела кажутся слишком большими* или подтянутыми друг к другу. Нарушение тактильной чувствительности; предметы кажутся шершавыми. Правая половина тела холодная, тогда как левая — горячая. Все тело болит, особенно больно, когда к нему прикасаются. Секрет слизистых оболочек зеленый, вязкий. Чувствительность к неприятным запахам. Чувство разбитости; в том числе в суставах. Последствия травмы, подавления симптомов.

**Хуже.** Когда думает. От напряжения зрения. От прикосновения.

**Лучше.** От давления. От отрыжки.

**Психика.** Болтливый, словоохотливый — журчит, как ручеек. Глупое поведение. Болтливая мания. Склонен обращаться с людьми грубо, с презрением.

**Голова.** Головокружение при чтении вслух. Головная боль усиливается, когда пациент думает. Голова кажется большой, как будто она увеличилась. Боль в затылке сопровождается ощущением тяжести. Головные боли с ощущением, как будто тянут, дергают за нитку, протянутую от глаз к затылку. Кожа волосистой части головы чувствительная, пациент не может причесывать волосы. Онемение левой половины головы. Хронические головные боли.

**Глаза.** Кажется, что глазные яблоки тянет назад или они слишком большие и тяжелые.

**Уши.** Боль сопровождается ощущением, что уши выдавливают наружу, или как будто уши расталкивает вбитый между ними клин; хуже при глотании.

**Нос.** У пациента возникает иллюзия неприятных запахов — несуществующих, воображаемых. Хлеб, рыба, молоко пахнут гнилью.

**Лицо.** Кажется, что лицо втянуто в корень носа. Невралгия: пациент ощущает горячие уколы в скуловых костях.

**Рот.** Сухость в полости рта и на языке; при пробуждении. Язык кажется слишком большим.

**Горло.** Пациент откашливает из горла *плотную зеленую слизь*. Ощущение шара в горле. Жжение в горле во время еды и питья.

**Желудок.** Тяжесть в желудке, как от камня, уменьшается от отрыжки. Слабое пищеварение. Красная изогнутая полоса над пупком.

**Дыхательные органы.** Периодическая безболезненная охриплость.

**Шея.** Тяжесть и усталость в задней части шеи. Колотье в копчике возникает, когда пациент сидит. Сильная боль в шее с обеих сторон — распространяется в пальцы рук, усиливается от умственного напряжения.

**Конечности.** Ощущение, что пальцы на руках немеют. Все предметы кажутся шершавыми. При каждом движении кажется, что суставы разбиты, опухли или вывихнуты.

**Кожа.** Болезненно чувствительная.

**Лихорадка.** Холод или жар с одной стороны тела. Жар спускается из шеи вниз, вдоль спины.

**Диф. диагноз.** Bell., Nux-v.

## PASSIFLORA INCARNATA

**Общее.** Пассифлора обладает успокаивающим действием на нервную систему, поэтому она является эффективным антиспастическим средством. Судороги у детей, в том числе во время прорезывания зубов.

Пассифлора быстро избавляет от наркомании — пристрастия к морфину. Бессонница у младенцев и стариков, у обеспокоенных и переутомленных людей. Столбняк. Истерия. Экламптические судороги. Астма (от 10 до 30 капель). Состояние пониженного тонуса (по 30—60 капель повторять несколько раз).

## PETROLEUM

**Общее.** Нефть действует преимущественно на кожу, особенно на кожные складки, кожу волосистой части головы, а также на лицо и половые органы. Она вызывает катар слизистых оболочек желудка и кишечника.

Петролеум соответствует продолжительным, укоренившимся истощающим заболеваниям; симптомам, возникшим после нервного расстройства, испуга, неприятностей и т.д., а также затяжным желудочным и кишечным болезням.

Слабость с дрожанием. Чувство внутреннего дискомфорта, тошноты. Ощущение внутреннего зуда. Пациент боится открытого воздуха; когда попадает на улицу, дрожит, ежится. Сухость, в том числе в ухе, в носу и т.д. Выделения густые, гнойные, желтовато-зеленые. Кровотечения: кровь светло-красная; хуже от поднятия тяжести или от езды. Ощущение жжения. Подергивание мышц, каталепсия. Отеки.

Петролеум — это одно из главных средств для лечения болезненных состояний, связанных с движением в автомобиле, поезде, для лечения морской болезни (укачивания).

Болезненные последствия растяжений, подавления высыпаний. Ощущение одеревенения. Исхудание, особенно в области грудной клетки. Ощущение холода, в том числе на ограниченных участках; а также в животе, в сердце, после расчесывания кожи. Болезненность, как от ушиба, сильнее в суставах. Железы увеличены. Трещины. Нездоровые грануляции и тяжелые ожоги. СТРАХ, продолжительный.

**Хуже.** ОТ ДВИЖЕНИЯ, в том числе АВТОМОБИЛЯ, ЭКИПАЖА, ЛОДКИ. В холодную погоду; зимой; при перемене погоды; в грозу. От еды. От неприятностей, разочарования. От капусты. От коитуса. От прикосновения, даже от прикосновения одежды.

**Лучше.** От теплого воздуха. В сухую погоду. Лежа с высоко расположенной головой.

**Психика.** Возбужден, раздражителен после коитуса; при этом впадает в гнев и ругается. Нерешительный. Ощущение удвоения: пациент считает, что он двойной или кто-то еще лежит около него, или что его конечность двойная. Пациенту кажется, что смерть близка, и он должен спешить, чтобы уладить свои дела. Беспокоится, но не знает почему. Может заблудиться, теряет дорогу на улице; потеря памяти. Пугливый.

**Голова.** ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ: как будто пациент раскачивается; оно *ощущается в затылке. Тупая боль, тяжесть в затылке.* Головная боль усиливается от сотрясения тела при кашле, должен держать виски руками, чтобы уменьшить боль. Выпадение волос. Мокнувшие высыпания на коже волосистой части головы, сильнее на затылке и в области ушей. Голова немеет, словно она сделана из дерева. Как будто холодный ветер дует на голову.

**Глаза.** Воспаленные края век. Выпадение ресниц. Слезная фистула (свищ) — свежая, возникшая недавно. Трещины в углах глаз.

**Уши.** Глухота; в сочетании с шумом в ушах — у стариков. Шум голосов, возникающий когда разговаривают нескольких человек, невыносим. Сухость в ушах. Выделение гноя и крови из ушей. Мокнувшие участки за ушами. Зуд глубоко в ушах, в евстахиевых трубах. Ухо снаружи болезненное.

**Нос.** Сухость в носу. Изъязвление, трещины ноздрей, жжение в них. Озена: гнойные выделения. Зуд кончика носа.

**Лицо.** Сухое лицо; ощущение, что оно покрыто яичным белком. Бледное или желтое, горячее после еды. Легко возникает вывих нижней челюсти.

**Рот.** Сухой. Неприятный запах изо рта, как от чеснока. Язвы на внутренней поверхности щеки, боль возникает, когда пациент сжимает зубы. Болезненность при жевании. Язык белый посредине, темная полоса по краям.

**Горло.** Зловонная слизь в горле. Отхаркивается утром. Сухость в горле.

**Желудок.** Голод: он вызывает тошноту; будит пациента ночью; возникает после стула. Едкие, с острым привкусом отрывки. Жажда пива. Желание деликатесов. Отвращение к мясу, к жирному, к вареной или горячей пище. Рвота горькой зеленой массой. *Тошнота, в том числе в поезде, на море* — морская болезнь; тошнота во время беременности, женщина вынуждена наклониться.

**Живот.** Вздутие живота; ощущение холода внутри него. *Понос* или симптомы дизентерии возникают *только в дневное время*; хуже от капусты; после поноса возникает ощущение ужасной пустоты. Зуд ануса после стула. Шемящая боль при колике — лучше согнуться пополам. Изъязвление пупка у младенцев. Геморрой и трещины заднего прохода; они сопровождаются сильным зудом. Герпес в промежности.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное выделение мочи при вставании. *Сужение (стриктура) уретры из-за хронического уретрита.* Ночное недержание мочи (ночной энурез). Резкий внезапный позыв на мочеиспускание — если его перетерпеть и не помочиться сразу, возникнет сильная боль. Цистит, уретрит. Моча сочится, подтекает после мочеиспускания.

**Мужские половые органы.** Герпес, сопровождающийся зудом и жжением; он появляется в области мошонки; между мошонкой и бедрами; в промежности. Потливость половых органов (и у мужчин, и у женщин).

**Женские половые органы.** Отвращение к половому акту. Менструальные выделения вызывают зуд. Болезненность и мокнутие половых органов, сопровождающиеся сильным зудом. Бели: напоминают яичный белок; обильные; сопровождаются сладострастными сновидениями. Выпадение матки из-за постоянного поноса.

Зуд и мучнистый налет на сосках молочных желез. Упорные сухие высыпания.

**Дыхательные органы.** Кашель, возникающий глубоко в груди; он будит пациента ночью (у молодых людей — девочек и мальчиков). Кашель возникает только ночью или усиливается в ночное время; от кашля раскалывается голова, лучше сдавить ее. Стеснение в груди от холодного воздуха.

**Сердце.** Ощущение холода в области сердца. Обморок, сопровождающийся кипением крови, жаром и сердцебиением.

**Шея и спина.** Скованность в шее; хруст в шее при движении. Боль в позвоночнике и во всем теле при ишиалгии. Боль в копчике возникает, когда пациент сидит. Боль в крестце усиливается, когда человек стоит прямо. Резкие боли, стреляющие вдоль грудного отдела позвоночника в направлении затылка; появляются в том числе во время родов, при соблюдении постельного режима.

**Конечности.** Хруст в суставах. Скованность в суставах. Конечности не меют, становятся нечувствительными. Шершавые, *потрескавшиеся кисти и пальцы на руках*, кровоточащие трещины; наблюдаются у горничных, занимающихся уборкой помещений. Псориаз ладоней. Колотье в пятках, волдыри на пятках.

**Кожа.** ГРЯЗНАЯ, ЖЕСТКАЯ, ШЕРШАВАЯ, УТОЛЩЕННАЯ; кожа как пергамент; *на коже возникают ссадины, она гноится или не заживает*; хуже в кожных складках. *Глубокие трещины:* в углах (рта, глаз и т.д.), на сосках, на кончиках пальцев рук. Коричневые пятна. При появлении высыпаний образуются толстые, плотные, мокнувшие или желто-зеленые корки; в том числе на затылке, на половых органах; хуже от холода. Экзема. Герпес. Пузыри. Зуд кожи; в том числе в области естественных отверстий тела, он сопровождается жжением. Холодные участки на коже. Все высыпания сопровождаются сильным зудом, пациент вынужден расчесывать кожу до крови; после расчесывания кожи это место становится холодным. Участки обморожения, ознобления чешутся, горят и становятся багровыми.

**Сон.** Беспокойный сон, страшные сновидения.

**Лихорадка.** Пациент мерзнет, при этом отмечается сухость во рту. Ладони и подошвы горячие. Потоотделение на ограниченных участках; зловонный пот на стопах или под мышками. В течение дня в виде частых приступов возникают приливы жара, которые ощущаются во всем теле.

**Дополнительно.** Sep.

**Диф. диагноз.** Graph., Sep.

## PETROSELINUM

**Общее.** Это растение оказывает влияние на мочеполовую сферу. Внезапные императивные позывы на мочеиспускание, сопровождающиеся тянущей болью, покалыванием, пощипыванием, ощущением ползания мурашек, зудом, который из промежности распространяется вдоль всей уретры.

Гонорея: выделения, похожие на молоко или желтые. Дизурия, в том числе при увеличении простаты. Затруднение мочеиспускания у маленьких детей. Крайне болезненное мочеиспускание, заставляющее содрогаться, ежиться от боли, кружить, пританцовывая, по комнате из-за мучительных ощущений.

## RHELLANDRIUM

**Общее.** Это растение вызывает *катаршеские явления* в дыхательных путях. Туберкулез легких.

Фелландриум воздействует на *молочные железы* и нервы. Чувство усталости при ходьбе. Ощущение, как будто все кровеносные сосуды вибрируют. Хуже. От воздуха, от холодного воздуха, на открытом воздухе. От зрительной нагрузки. Лучше. Во время кормления ребенка грудью.

**Психика.** Сварливое высокомерие.

**Голова.** *Звон, лязг в головном мозгу, как будто ударили по металлу*, будит пациента. Ощущение тяжести в области темени; ломота и жжение в висках и над глазами.

**Глаза.** Цилиарная невралгия — хуже когда пытается посмотреть на что-то. Пациент не переносит свет. Глаза открыты только наполовину и выглядят так, как будто человек проплакал неделю.

**Лицо.** Синевато-красное лицо вечером.

**Желудок.** Отрыжки с запахом клопов. Всё кажется сладким на вкус. Желание кислого; молока или пива. Отвращение к воде.

**Женские половые органы.** Боль в сосках во время каждого прикладывания ребенка к груди; она распространяется в живот. Невыносимая боль в млечных протоках; между кормлениями.

**Дыхательные органы.** *Мокрота: ужасно зловонная* (пахнет клопами); жидкая, обильная, вязкая, вызывающая одышку. Из-за кашля приходится сесть в постели. Колющая боль, проходящая сквозь грудную клетку, возникает у левого (внутреннего) края правой молочной железы и распространяется в область между плечами. Боли, распространяющиеся сквозь грудную клетку назад.

**Сон.** Сильная сонливость: пациент мог бы уснуть стоя, за работой.

**Диф. диагноз.** Asaf.

## RHOSPHORICUM ACIDUM

**Общее.** Фосфорная кислота воздействует *НА ПСИХИКУ*, особенно на *ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ*; кроме того, она оказывает влияние на чувствительные нервы, половые органы и *кости*.

*СЛАБОСТЬ* и *БЕССИЛИЕ*, характерные для всех кислот, очень выражены у Ацидум фосфорикум. Это *сопровождается обильной секрецией*; обильным мочеиспусканием; потерей жизненных соков; потоотделением и т.д., за исключением поноса. Нервное истощение, бессилие появляется в первую очередь, затем возникает упадок физических сил. *Замедлены* психические процессы и деятельность органов чувств. Боли перемещаются в часть тела, на которой пациент лежит. Характерна чувствительность к свету, звукам и запахам, из-за которых у пациентки перехватывает дыхание. Чувство давления; оно сопровождается ощущением тяжести и возникает во лбу, в груди, на темени; в глазах, в области пупка, в молочных железах и т.д. Ощущение ползания мурашек: у корней волос; вдоль *позвочника*; на конечностях.

Это средство полезно тем молодым людям, которые быстро растут и испытывают нервные и физические перегрузки. Ацидум фосфорикум показан, когда организм истощен острыми заболеваниями, сексуальными излишествами; горем, потерей жизненных соков. Болезненность, как от ушиба: напоминает боли у быстро растущих детей. Кровотечения темной кровью. Болезни костей. Остит. Периостит. Кариес. Рахит. Диабет. Невроз культи после ампутации (фантомные боли) с улучшением от глубокого дыхания. Ацидум фосфорикум облегчает боли при раке. Холодные части тела.

Болезненные последствия получения плохих известий; разочарования в любви, горя; огорчения, досады; травмы, шока. Это хилый, исхудавший человек. Неврастения. Образование абсцесса после лихорадки. Грызущая боль в костях. Болтающиеся суставы. Части тела чернеют; в том числе при старческой гангрене.

**Хуже.** ОТ ПОТЕРИ ЖИДКОСТЕЙ. От сексуальных излишеств. От утомления. Во время выздоровления после лихорадки. ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ, ЭМОЦИЙ; от горя; разочарования. От нервного потрясения, шока. Из-за тоски по



родине, ностальгии. Из-за несчастной любви. *От сквозняков, в том числе холодных.* От музыки. От разговора. Сидя. Стоя. От поднятия чрезмерной тяжести. После хирургической операции. От испуга (в хронических случаях).

**Лучше.** *От тепла.* От кратковременного сна. От дефекации, стула.

**Психика.** *Пациент тихий,* не желает разговаривать или у него торопливая речь. *Безразличен* — ко всему. АПАТИЯ: из-за неравной борьбы с враждебными обстоятельствами, вялость и умственная, и физическая; пациент тупой или оцепеневший; со склонностью к поносам или потливости. *Медленно соображает.* Не может собраться с мыслями; с трудом подбирает слова. Плохая память. Постоянное чувство отчаяния. Не желает разговаривать. Отвечает неохотно или медленно, коротко, неправильно.

Истерия во время климакса. Тоска по дому, ностальгия со склонностью плакать. Бред в мягкой форме: можно легко привести в чувство. Нервное истощение. Безнадежность. Страх будущего; с грустью размышляет о своем здоровье.

**Голова.** Ощущение, что тяжелый, раздавливающий груз лежит на темени; боль в висках, как будто они раздавлены; хуже, если потрясти головой или от шума. Головокружение: с ощущением, как будто человек парит, плывет по воздуху; возникает, когда пациент лежит в постели; сопровождается звоном в ушах, а глаза при этом становятся как стеклянные; хуже стоя, при ходьбе. Волосы истончаются, рано седеют. Выпадение волос. Головные боли у девочек-школьниц: из-за чрезмерной нагрузки на глаза. Головная боль, в том числе после коитуса.

**Глаза.** Без блеска, как стеклянные; взгляд застывший; *свалившиеся глаза; синие круги вокруг них.* Боль в глазах с ощущением, как будто глазные яблоки прижимают друг к другу и при этом вдавливают в голову. Глазные яблоки кажутся большими. Желтые пятна на конъюнктиве. Потеря зрения из-за мастурбации. Радуги перед глазами. Светобоязнь.

**Уши.** Пациент не выносит шум, особенно музыку, из-за которой появляется колющая боль в ушах, даже когда поет сам. Нервного происхождения глухота после тифоподобных лихорадок. Каждый звук отдается громким эхом в ушах. Когда сморкается, слышен пронзительный звук в ушах. Иллюзии слуховые: слышит перезвон колоколов. Когда сморкается, возникает боль в ухе.

**Нос.** Кровотечение из носа. Зуд: пациент ковыряет в носу пальцем. Нос опухший, с красными пятнами или прыщиками на кончике.

**Лицо.** Бледное, болезненное лицо. Кожа напряжена, натянута, как будто на лице подсох яичный белок. Одна половина лица холодная. Угри вследствие мастурбации. Выпадение волос из бороды.

**Рот.** Кровоточащие, опухшие десны отстают от зубов. Зубы желтеют и кажутся тупыми. Язык покрыт слизью. Красная полоса посередине языка. Непроизвольно прикусывает края языка, в том числе во сне. Сухость во рту. Губы сухие, потрескавшиеся. Болезненные узлы на деснах. Привкус тухлых яиц во рту.

**Горло.** Отхаркивает плотную слизь из горла. Сухое небо.

**Желудок.** Страстное желание освежающих и сочных продуктов; холодного молока. Повышенная кислотность. От кислой пищи и кислых напитков становится хуже. Давление в желудке, как будто в нем лежит груз. Отсутствие аппетита.

**Живот.** Тупая боль в области пупка. Вздутие живота и брожение. Громкое урчание. Холодный живот. *ОБИЛЬНЫЙ, БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЙ; ГРЯЗНО-БЕЛЫЙ ВОДЯНИСТЫЙ ИЛИ СОДЕРЖАЩИЙ НЕПЕРЕВАРЕННУЮ ПИЩУ СТУЛ, КОТОРЫЙ ВЫЗЫВАЕТ ЛИШЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНУЮ СЛАБОСТЬ.* Непроизвольный стул: выделяется вместе с кишечными газами; если пошевелить пациента, от движения — у детей. Стул без запаха. Кажется, что печень слишком тяжелая; болезненная; в том числе во время менструации. Кишечные газы с запахом чеснока.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание: учащенное, обильное, моча водянистая, *КАК МОЛОКО.* Диабет. Фосфатурия. Жжение в области почки. Непроизвольное мочеиспускание во время первого сна. Моча, как сыворотка, незадолго до менструации.

**Мужские половые органы.** Вялые расслабленные половые органы: это может случиться внезапно во время полового акта, поэтому не происходит семяизвержение. Слабость и поллюции после коитуса. Ночные поллюции; в том числе в сочетании со сладострастными сновидениями. Яички чувствительные, опухшие. Простаторея при выделении мягкого стула. Герпес на крайней плоти. Экзема мошонки. Сикотические разрастания.

**Женские половые органы.** Матка раздута, как будто наполнена газами. Менструации слишком ранние и слишком обильные; сопровождаются болью в печени. Желтые бели с зудом появляются после менструации. Дизурия во время беременности. Здоровье подорвано кормлением ребенка грудью. Ощущение резкого давления в левой молочной железе. Младенцев постоянно рвет молоком.

**Дыхательные органы.** Чувство слабости в груди: хуже от разговора, кашля или когда пациент сидит; лучше от ходьбы. Простывает; лучше, когда сквозняком охватывает грудь. Спастический щекочущий кашель. Ощущение давления или скручивания за грудиной; из-за этого дыхание затрудняется. Соленая мокрота.

**Сердце.** Сердцебиение: у детей и юношей, растущих слишком быстро; а также после горя; после мастурбации. Пульс аритмичный, перемежающийся.

**Шея и спина.** Паралитическая *слабость вдоль позвоночника*. Ползание мурашек вдоль позвоночника. Спондилит шейных позвонков. Тяжесть в поясничной области, от которой усиливается боль в голени. Жжение вдоль позвоночника. Ощущение, как будто колет тонкими иголками в копчике и груди. Нарывы (фурункулы) на ягодицах.

**Конечности.** Тяжесть в предплечьях. Жировики на кистях — между пястными костями. Ощущение ползания мурашек в конечностях. Боли ночью в костях с ощущением, что их скребут. Пациент часто запинаясь и оступается. Жжение ниже талии. Похожее на спазмы ощущение давления в руках, кистях и пальцах рук. Онемение по ходу лучевого нерва.

**Кожа.** Липкая, в морщинах. Прыщи, угри, кровяные нарывы. Склонность к абсцедированию после лихорадки. Безболезненные язвы с выделением вонючего гноя. Ползание мурашек в разных частях тела.

**Сон.** *СОНЛИВОСТЬ ДНЕМ*; жар и бессонница ночью. Сон глубокий, но если разбудить, просыпается быстро, в полном сознании, в том числе при лихорадке. От кратковременного сна уменьшается слабость.

**Лихорадка.** Части тела холодные, половина лица холодная, холодный живот и т.д. Стадия жара сопровождается потоотделением. *Обильный пот*; сильнее ночью; как остаточное явление после болезни. *Вялые, не сопровождающиеся болями лихорадки.*

**Дополнительно.** Chin.

**Диф. диагноз.** Gels.

## PHOSPHORUS

**Общее.** Фосфор вызывает воспаление и перерождение *СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК*, в том числе *ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА*; а также воспаление спинного мозга и *НЕРВОВ*; он приводит к параличу; разрушает *кровь*. Кроме того, фосфор вызывает жировое перерождение стенок *КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ* и всех тканей и органов тела, то есть он запускает *процессы разрушения*.

Фосфор показан молодым людям, которые быстро растут и имеют привычку сутулиться. Хorea у детей, которые слишком быстро растут. *Высокие, стройные* люди сангвинического темперамента; *нервные, слабые, нежные* личности, которым приятно находиться под чьим-либо обаянием, быть загипнотизированными.

Незаметно, исподволь появляется и *нарастает слабость*, это завершается тяжелой или скоротечной болезнью. *КРОВОТЕЧЕНИЯ*: рецидивирующие, викарные; мелкие ранки сильно кровоточат. Выделения с прожилками крови. Геморрагическая пурпура.

Рецидивирующие состояния — простуда, круп и т. д. Сильная восприимчивость, повышенная чувствительность к внешним впечатлениям, к свету, звуку, запахам, прикосновению; изменениям в состоянии атмосферного электричества и т.д. Внезапное появление симптомов: внезапный упадок сил, обморок; внезапные приступы слабости, потоотделение, стреляющие боли. Непонятные, произвольные поступки. Ощущение пустоты в груди, в желудке. *ОЩУЩЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, СТЕСНЕНИЯ* в грудной клетке при кашле и т.д. Боль или болезненность *на ограниченных участках*.

Паралич: псевдогипертрофический (Дюшенна); прогрессивный паралич. Паралич внутренних органов: горла, прямой кишки. Ощущение внутреннего зуда; щекоотания; пульсация в разных местах. Онемение. *Ощущение жжения*.

Спастическое сокращение, подергивание мышц, в том числе локальное; подергивание сухожилий. Болезни суставов: скованность в суставах, сопровождающаяся незначительной болью; растяжение связок; частые вывихи; приступообразная слабость в суставах — хуже от напряжения.

Симптомы, связанные с заболеванием сердца и легких. Кариез: *костей*, позвоночника, верхней челюсти. Твердые опухоли в разных местах. Остеомиелит. Экзостозы. Хрупкость костей. Полипы, в том числе кровоточащие. Желтуха — как сопутствующее заболевание; гемолитическая. Гемофилия. Полицитемия. Эректильные опухоли. Сепсис (пиемия). Ацидоз.

Внешность как у больного туберкулезом легких ("чахоточный"). Исхудание тела. Спазмы в мышцах на парализованной стороне тела. Эпилепсия — во время приступа сознание сохранено. Малые эпилептические припадки (petit mal). Пациент неустойчив при ходьбе, пошатывается. *Человек-барометр*. Дряблые мышцы.

Болезненные последствия гнева: страха, горя; забот, беспокойства; промокания под проливным дождем; стирки белья; употребления табака; стрижки волос. В анамнезе — применение йода, чрезмерное употребление соли. Зажившие раны раскрываются снова и кровоточат. Липома. Рак.

**Хуже.** *ЛЕЖА*: на больном боку; *НА ЛЕВОМ БОКУ*; *НА СПИНЕ*. *ИЗ-ЗА НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЧИН: ОТ ПЕРЕЖИВАНИЙ, ЭМОЦИЙ*; от разговора; прикосновения; запахов; света. *ОТ ХОЛОДА*: на холодном воздухе на улице. Если опустить *КИСТИ* в холодную воду. *ОТ ТЕПЛОЙ ПИЩИ И ПИТЬЯ*. В пубертатном возрасте. От соли. *От сексуальных излишеств*. От потери жизненных соков. *При внезапной перемене погоды*; при ветре; в холодную погоду; в грозу; при вспышке молнии. *Утром и вечером*. *От нервного утомления*. В сумерках. От бритья.

**Лучше.** *От еды*. *От сна*. От холода; от холодной пищи, воды, если умыть лицо холодной водой. От растирания; от магнетизма, гипноза. Сидя. В темноте.

**Психика.** *Влюбчивый*; станет обнажать свое тело и половые органы. Возбудимый, легко гневается и впадает в неистовство, от чего впоследствии страдает. *Тревожный*; пациент боится остаться один в сумерках, боится призраков; боится за будущее; боится грозы; возникает ощущение, как будто что-то выползает из каждого угла.

Пациент быстро впадает в прострацию, лишается сил из-за неприятных впечатлений. Робкий и нерешительный. Меланхолия: не расположен к работе, учебе, беседе. Устал от жизни. Пациент льет слезы, или у него возникают приступы непроизвольного смеха. Пациентка ломает всё вокруг, плюется в няню (медицинскую сестру), целует тех, кто походит к ней. Апатия, безразличие: даже по отношению к собственным детям. Безумие: преувеличенное представление о собственной значимости; идея о знатном происхождении.

*Любое яркое впечатление вызывает ощущение жара*, как будто пациента опустили в горячую воду. Ясновидение. Женщина плачет перед менструацией. Потребность в сочувствии, симпатии. Пациент смеется над серьезными вещами. Тревога, двигательное беспокойство, пациент ни секунды не может сидеть или стоять неподвижно, особенно в темноте или в сумерках.

**Голова.** **ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ:** оно сопровождается многими симптомами; головокружение у стариков; оно сопровождается ощущением парения, как будто человек плавает; возникает при пробуждении; вращательное головокружение; лучше от стула. Голова тяжелая; *болит; тупая боль над глазом*; боль сопровождается чувством голода; сильнее у детей; хуже, когда пациент лежит на правом боку; лучше, если умыть лицо холодной водой.

Нервное истощение; сопровождается ощущением холода в затылке. Жжение в висках. После горя в темени ощущается пульсация, жар. Размягчение головного мозга сопровождается ощущением ползания мурашек, онемением конечностей, при этом стопы волочатся по земле. Полнокровие сосудов головы (конгестия). Перхоть; в большом количестве. Зуд кожи головы. Выпадение волос большими прядями; в том числе на ограниченных участках. Затылок холодный; пациент ощущает удары в затылке; в том числе при эпилепсии. Кажется, как будто тянут, дергают за волосы.

**Глаза.** Слезотечение, в том числе на ветру. Светобоязнь. *Видит перед глазами вспышки*; видит ореол вокруг источника света (гало) — *красного* цвета, зеленого, черного; лучше руками заслонить глаза от света.

Сужение поля зрения. Глазные яблоки кажутся большими; ощущение, что они одеревенели, неподвижны. Цветные видения или пятна перед глазами, потом — мигрень. Глаукома. Дистрофические изменения в сетчатке. Ретинит при альбуминурии.

Частичная потеря зрения после злоупотребления табаком, вследствие сексуальных излишеств, из-за молнии. Атрофия зрительного нерва. Воспаление сосудистой оболочки глаза (хориоидит).

Длинные, изогнутые ресницы. Желтые склеры. Катаракта. Глаза ввалившиеся, вокруг них — синие круги. Помутнение стекловидного тела. При чтении буквы кажутся красными. Ощущение, как будто всё скрыто в дымке; как будто в пыли или покрыто вуалью, или как будто что-то плотно надвинуто на глаза. Глаза повернуты наружу.

**Уши.** Снижен слух; с трудом различает звуки человеческого голоса. Эхо и отзвуки в ушах; особенно когда слышит музыку. Полипы в ухе. Воспаление уха; средний отит. Мастоидит. Снижение слуха после тифа. Как будто в ухе застряло инородное тело. Кажется, что возле ушей постоянно что-то находится.

**Нос.** *Нервные веерообразные движения крыльев носа.* Насморк: то выделения из носа есть, то их нет; выделения появляются то с одной стороны, то с другой, по очереди. Носовое кровотечение: вместо менструации; у юношей, перед пневмонией; при кашле, во время стула.

Нос опухший. Карии костей носа. Язвы в носу. Кровоточающие полипы носа. Хронический катар, пациент сморкается кровью. *Чихание*: хуже от запахов, от дыма и т.д.; чихание сопровождается одышкой, вызывает боль в горле. *Простуда из носа спускается ниже.* Чрезмерная чувствительность к запахам. Чихание и насморк после погружения рук в холодную воду. Нос опухший, красный, блестящий. Ощущается неприятный запах в носу.

**Лицо.** *Бледное возле носа и рта*; болезненное; цвет лица меняется. Некроз (кариес) нижней челюсти. Жгучий жар в щеках и покраснение щек. Губы синие, сухие, потрескавшиеся, как будто покрыты копотью, черноватые, покрыты корочками. Кожа словно слишком туго натянута.

**Рот.** Онемение зубов. Зубная боль из-за стирки белья; из-за погружения кистей в холодную или в теплую воду. Десны кровоточат; *болезненные с внутренней стороны у резцов.* Язык сухой, гладкий, красный. Прекращающееся кровотечение после удаления зуба. Зуд нёба. Абсцесс твердого нёба. Привкус во рту кислый, в том числе после молока; горький привкус; сладковатый при кашле. Рот перекошен влево. Речь затруднена, пациент заикается. Слюнотечение: слюна солоноватая или сладковатая. Стomatит у грудных детей при мастите у матери.

**Горло.** Сухость в горле; оно блестит. Ощущение, что кусочек ваты или что-то другое свисает в горле. Жжение в пищеводе. Сужение пищевода. Опухание миндалин и нёбного язычка; нёбный язычок удлинён.

**Желудок.** **СТРАСТНОЕ ЖЕЛАНИЕ ХОЛОДНОГО ПИТЬЯ; ОТ НЕГО СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ, НО ВСКОРЕ ВОЗНИКАЕТ РВОТА ВЫПИТЫМ**, после того как напиток согреется в желудке. Рвота после хирургической операции с применением хлороформа для наркоза. Пациент *срыгивает проглоченную пищу и питье* полным ртом. Боль в желудке уменьшается от холодного питья. *Волчий голод*, в том числе по ночам; перед приступом болезни. Кислая отрыжка. Пища, едва проглоченная, возвращается обратно в ротовую полость; спазмы пищевода вблизи

кардиального отдела желудка. Рвота: желчью, кровью, кофейной гущей. Язва желудка. Жжение в желудке усиливается от еды.

*Страстное желание соли*, кислых и острых блюд; пациент отказывается от них, когда предлагают. *Ощущение совершенной ПУСТОТЫ в желудке*; как будто желудок свешивается вниз; хуже от переживаний. Ощущение дрожания; трепетания или как будто что-то катается в желудке. Изжога, кислая отрыжка. Пациентка не может пить воду; в том числе во время беременности — вид воды вызывает рвоту, вынуждена закрыть глаза, когда принимает ванну. Когда опускает руки в теплую воду, возникает тошнота. Холод в желудке, как будто он заморожен.

**Живот.** Давление в области эпигастрия. Болезненный участок под ложечкой. Живот кажется холодным. Пациент растирает живот, чтобы облегчить состояние. *Стул*, как вареное саго; зернистый; *тонкий*, плотный. Крайне зловонные стул и кишечные газы. Безболезненный; обильный; серый; синеватый; *водянистый*; *изливающийся потоком*; возникающий, когда пациент нервничает; непроизвольный — после испуга; *изнуряющий* понос. Чередование поноса и запора у стариков. Дизентерия.

Анус раскрыт, зияет; выпадение заднего прохода. Сужение (стриктура) прямой кишки; стул уплощенный. Жжение в прямой кишке. Желтуха: при пневмонии или заболевании головного мозга; при беременности; из-за нервного возбуждения; злокачественная; гемолитическая. Острая желтая атрофия печени. Острый гепатит. Большие желтые пятна на животе. Рвущая боль в заднем проходе уменьшается, если тепло укрыться, одеться. Выделение крови из прямой кишки во время стула. Колики при метеоризме — хуже от горячего питья. Позывы на стул возникают, когда пациент ложится на левый бок.

**Мочевыделительная система.** Выделение обильной, бледной, водянистой мочи; затем возникает слабость. Пленка на поверхности мочи. Гематурия: при остром нефрите; в сочетании с желтухой. Альбуминурия; периодическая. Мочевой пузырь полный, а позывов на мочеиспускание нет.

**Мужские половые органы.** *Непреодолимое сексуальное желание*; в том числе при импотенции. Сладострастный, чувственный человек; срывает с себя одежду; сексуальная мания. Эрекции слабые или отсутствуют. Постоянные жидкие, слизистые, бесцветные выделения из уретры.

**Женские половые органы.** Менструации слишком ранние, скудные, не обильные, но продолжительные. Бели: обильные, жгучие, едкие, появляются вместо менструации. Нимфомания. Бесплодие: из-за чрезмерной чувственности; либо из-за обильных или слишком поздних, запаздывающих менструаций. Частые и обильные; либо кратковременные маточные кровотечения между менструациями, в том числе у кормящих женщин. Рак матки. Аменорея: при кровохаркании; кровотечении из заднего прохода или при гематурии, или при наличии молока в груди. Гнойный мастит: сопровождается образованием свищей и с изъязвлением. Рак молочной железы. Полипы матки. Боли в нижних отделах левой молочной железы. Вместо сексуального возбуждения во время коитуса возникает онемение влагалища. Сильное сексуальное желание во время беременности и лактации. Сосок горячий и болезненный.

**Дыхательные органы.** Стесненное дыхание; хуже от малейшего движения. Напряженное, сопровождающееся удушьем дыхание; хуже от кашля. В гортани ощущение саднения, болезненности, как будто она покрыта налетом, мехом; больно говорить. *Голос*: низкий; *хриплый*; хуже утром и вечером; крупозный, после него развивается бронхит.

*Кашель*: жесткий, свистящий; сухой, очень сильный, болезненный, *щекочущий*, отрывистый (покашливание), изнуряющий. Этот кашель сопровождается позывами на рвоту; вызывает боль в животе; жжение в дыхательных путях и дрожание; хуже от чтения вслух; при перемене погоды; в присутствии незнакомых людей; от смеха, от напряжения, от пения.

Мокрота отхаркивается без труда, она пенная, ржавая, синеватая, соленая, кислая, сладковатая или холодная.

Пневмония: *нижнедолевая слева*; вторичная, когда пациент находится в сопорозном состоянии. *В грудной клетке* — ощущение полноты; тяжести; *боли распространяются из груди* в горло или правую руку; или возникают поочередно то с одной, то с другой стороны; ощущается колотье в верхних отделах грудной клетки слева; хрипы, клокотанье, усиливающиеся от холодного питья. Ощущение сухого жара в груди, в том числе при кашле; сначала кашель сухой, затем — с мокротой.

Астма (удушье) после кашля. Повторное кровохарканье. Туберкулез у высоких, тонких, быстро растущих молодых людей. Полнокровие легких (конгестия). Ощущение кожицы в гортани.

**Сердце.** Сильное сердцебиение, сопровождающееся тревогой: возникает из-за незначительных причин, а также при зобе. Боли распространяются в правую руку. Расширение сердца вследствие жирового перерождения миокарда или эндокардита. Слабое сердце. Пульс частый, малый, мягкий. Ощущение тепла в сердце. Желтые пятна на груди.

**Шея и спина.** Боли в спине, как будто она сломана, не позволяющие пошевелиться. Спазм мышц; *жжение* — между лопатками. Раздражение спинного мозга усиливается от жара. Боль из левой *лопатки* распространяется вперед. Участок жжения в поясничной области — лучше от растирания. Боль в крестце после родов, соблюдения

постельного режима и т.д. Колющая боль из копчика распространяется вверх вдоль позвоночника в затылок, хуже во время стула.

**Конечности.** Восходящий чувствительный и двигательный паралич, начинающийся с кончиков пальцев на руках и ногах. Пациент едва ли может что-нибудь держать в руках. Рвущая боль в левом плече ночью. *Онемение рук; кистей; пальцев на руках* и ногах. Жжение в ладонях. При поносе кисти и руки холодные.

Парализующие колющие боли в боках — в области крыльев таза; потом эти боли распространяются вверх по спине. Боли в большеберцовых костях; периостит. Голеностопные суставы как будто вот-вот сломаются; пациент часто подворачивает стопы. *Неустойчив, пошатывается* при ходьбе; часто спотыкается. Подавление потоотделения на стопах. Стопы холодные, как лед. Судороги в пальцах ног.

Суставы внезапно слабеют, "отказывают". Периодическое сокращение пальцев на руках, похожее на судорогу. Слабость и дрожание конечностей при любом напряжении. Паралич после дифтерии — сопровождается ощущением ползания мурашек на кистях и стопах. Колени холодные, в том числе, когда пациент лежит в постели. Ноги (голени) тяжелые, стопы как будто приклеены к полу. Ходит, расставляя ноги (утиная походка); стоит, широко расставив ноги.

**Кожа.** Мелкие ранки сильно кровоточат; они заживают и снова открываются и кровоточат. Коричневатые или красные, как кровь, пятна на коже в разных местах. Экхимозы (кровоподтеки). Геморрагическая пурпура. Гемангиомы (*fungus haematodes*). Кожа горит после бритья. Кисты сальных желез. Жидкий, зловонный, кровянистый гной. Язвы кровоточат во время менструации.

**Сон.** Сонливость, дремота; *soma vigil* (бессознательное состояние с бредом; глаза открыты). Пациент сонный днем; не может спать — бессонница — перед полночью. Бессонница: не может закрыть глаза, в том числе из-за ощущения внутреннего жара. Засыпает ненадолго и часто просыпается. Снохождение (сомнамбулизм). Видит во сне огонь; непристойные сновидения; кровотечение. Утром чувствует, что не выспался.

**Лихорадка.** Мерзнет в теплом помещении, озноб распространяется вниз по спине. Страстное желание мороженого при ознобе. *Жгучий жар: ощущается в каком-то отдельном месте; распространяется вверх по спине.* Гектическая лихорадка. Потоотделение: возникает рано утром; пот липкий; не приносит облегчения. Лихорадки, не сопровождающиеся болями.

**Дополнительно.** Lys, Sang., Sep.

**Диф. диагност.** Bry., Caust., Con., Puls., Rhus-t., Sil.

## PHYSOSTIGMA

**Общее.** Физостигма, действуя на спинной мозг, поражает двигательные нервы. Возникает дрожание мышц, напоминающее трепетание; мышцы не подчиняются воле пациента и (или) стягиваются в узлы. Можно даже наблюдать образование подобных узлов в кишечнике.

Раздражение спинного мозга; чувствительность позвонков; слабость нижних конечностей, исходящая из места, расположенного между крыльями таза. Потеря болевой чувствительности. *Слабость*; после нее возникает полный паралич, хотя способность мышц к сокращению сохраняется. Ригидность мышц.

Пациент *ужасно боится холодной воды*: холодных напитков и купания в холодной воде; холодная вода кажется чересчур холодной. Отвращение к купанию. Пациент дрожит, ежится от холода — хуже от любого сквозняка.

Ощущение парения, как будто плывет. Пронзающие боли в разных местах. Приливы жара, сильнее ощущаются в ладонях. Атаксическая походка, стреляющие боли вдоль конечностей. Столбняк. Тризм. *Тремор, дрожание.*

Болезненные последствия переживаний, горя. Травмы, удары в анамнезе. Прогрессивный паралич.

**Хуже.** При перемене температуры. *От напряжения глаз.* От купания.

От жары и от холода. Когда спускается по лестнице. От движения.

Когда ступает на ногу, делает шаг. От сотрясения, когда оступился.

**Лучше.** Лежа на животе или с низко опущенной головой. Когда делает над собой усилие — от усилия воли. Закрывает глаза. От сна.

**Психика.** Ум активен даже во время сна. Все было сделано неправильно; слишком много вещей в комнате; пациент постоянно их пересчитывает. Паралич ума и тела от горя.

**Голова.** Ощущение, что головной мозг падает в ту сторону, на которой лежит пациент; ощущение колебания в мозге. Головокружение: пациент запинается, когда поднимается или спускается по лестнице. Боль из области лба распространяется вниз, вдоль носа. Ощущение, как будто вокруг головы повязка, как будто тесная шапка одета на голову. Когда ложится, удары сердца ощущаются в голове. Дрожание в голове.

**Глаза.** *Подергивание глазных мышц.* Боль над глазами; пациент не в состоянии поднять веки. Нарушение аккомодации; астигматизм. Глаукома, особенно после травмы. Зрачки сужены. Паралич глазных мышц после дифтерии. Напряжение в веках: пациент не может закрыть или открыть глаза. Глаза налиты кровью, при этом в

них ощущается жжение. Ночная слепота. Черные пятна (мушки); вспышки света перед глазами. Прогрессирующая близорукость (миопия). Предметы дрожат.

**Уши.** Внезапная боль из горла распространяется в полость среднего уха — хуже от отрыжки. Боль в ухе (справа) возникает, когда пациент пишет.

**Нос.** *Подергивание мышцы, носа.*

**Лицо.** Губы немеют; пациент облизывает их. Тризм жевательных мышц.

**Рот.** Зубы кажутся шершавыми. Кажется, что язык покрыт маслом, ошпарен, опухший; при хорее. Кажется, что с нёба свисает кожица. Густая, как будто кожаная, слюна.

**Горло.** Ощущение, как будто шар подкатывает к горлу. Пациент ощущает в горле сильные удары сердца. Пациенту кажется, что он проглотил большой кусок еды; этот кусок ощущается в эпигастрии.

**Желудок.** Икота: сопровождается одышкой, уменьшается во сне.

**Живот.** Пупок болезненный, раздутый, красный. Болезненность и вздутие внизу живота, хуже стоя. Сжимающая боль в правом подреберье. Боль в паховых областях: то с одной стороны, то с другой, по очереди. Спастическая боль (колика) усиливается при поносе; уменьшается, когда боль распространяется в голени.

**Женские половые органы.** Онемение матки, в том числе в сочетании с болью в спине. Бели усиливаются в дневное время, когда пациентка занимается физическими упражнениями. Женщина вздыхает, когда усиливаются бели. Менструации нерегулярные, сопровождаются сердцебиением.

**Сердце.** Кажется, что сердце бьется, трепещет в горле или во всем теле, или в голове.

**Шея и спина.** Онемение как будто ползет из затылка вниз, вдоль позвоночника. *Позвоночник чувствительный.*

**Конечности.** Спастическое сокращение, подергивание конечностей. Отвратительный запах от рук. Боль в дельтовидной мышце (справа) уменьшается от резкого, интенсивного движения. Боль в правой подколенной ямке. Приливы жара к ладоням.

**Сон.** *Приступы непреодолимой сонливости;* у пациента возникает ощущение, что он теряет сознание.

**Лихорадка.** Каждое движение и сквозняк вызывает содрогание тела. Пациент легко потеет, в том числе при возбуждении.

**Диф. диагноз.** Agar., Gels., Nux-v.

## РНУТОЛАССА

**Общее.** Фитолякка — это глубоко и длительно действующее средство. Оно известно своим выдающимся влиянием на железы, в особенности на *МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ*, на миндалины. Кроме того, Фитолякка оказывает мощное воздействие на мышцы *ШЕИ и спины; на фиброзную ткань*, в том числе сухожилий и суставов; на костную ткань, надкостницу; на *ГОРЛО; пищеварительный тракт* и вообще на *правую сторону тела. БОЛЕЗНЕННОСТЬ; СИЛЬНАЯ ЛОМОТА*; двигательное беспокойство и изнеможение — это ведущие симптомы Фитолякки. *Ноющие боли, ломота* во всем теле; они появляются внезапно; ощущаются в глазных яблоках, почках, шее; плечах; спине; предплечьях; ниже коленей.

*Пораженные части тела синевато-красные*, в том числе горло, железы и т.д. Боли склонны распространяться. Они появляются и исчезают внезапно, меняют локализацию; типично возникновение *ревматизма, в том числе после тонзиллита.*

Выделения в виде *клочков, пленок*. Выделения — стул; менструальная кровь и т.д. — тягучие. Твердые и болезненные узлы. Боли в костях при сифилисе. Столбняк; ригидность всех мышц; чередование спазма и расслабления мышц.

Фитолякка способствует нагноению. Гной водянистый, зловонный, гнилостный (ихорозный). Ожирение. Позднее прорезывание зубов. Все влияет на молочные железы, сказывается на них.

**Хуже.** От воздействия сырой холодной погоды или при перемене погоды. *При подъеме вверх. От движения. Когда проглатывает горячее питье;* от жары (от жара). В холодную ночь. Во время менструации. От дождя. Когда опускает, ставит на пол высоко поднятую ногу.

**Лучше.** Лежа на животе; или лежа на левом боку. В покое. В сухую погоду.

**Психика.** Отсутствие у пациентки такта и деликатности; совершенное бесстыдство и безразличие к тому, что ее расспрашивают и осматривают. Равнодушие к жизни. Когда встает, чувствует внезапную слабость. Отказывается от еды, несмотря на продолжительные настойчивые требования. Сильный страх: пациентка уверена, что она умрет. Отвращение к своей работе, бизнесу.

**Голова.** Головокружение при вставании. Боль распространяется из области лба назад. Мозг кажется болезненным; как будто били по голове. Боли возобновляются каждый раз, когда идет дождь. Тошнота и головная боль уменьшаются от еды, но боль возобновляется вскоре в сопровождении рвоты: от рвоты усиливается головная боль, но уменьшается тошнота.

**Глаза.** Слезотечение — слезы горячие, обильные. Жгучая боль в глазах. Видит в зеленом цвете. Слезная фистула (свищ). Тупые боли в глазных яблоках при чтении и письме. Двигается только один глаз, независимо от другого. Воспаление ретробульбарной клетчатки. Ощущение, что веки горят, пылают.

**Уши.** Боль в *обоих ушах* — сильнее при глотании.

**Нос.** Нос кажется тяжелым. Выделения из одной ноздри, тогда как с другой стороны нос заложен; поочередно. Едкие выделения из носа при насморке. Заложенность носа во время езды.

**Лицо.** Желтоватое, болезненное. Тупые боли в скуловых костях. Железы возле угла нижней челюсти опухшие. Челюсти болят, как при свинке (паротите). Губы вывернуты и плотные. Подбородок прижат плотно к груди. Свинка.

**Рот.** *Склонность стискивать зубы, сжимать челюсти.* Прорезывание зубов затруднено, лучше, когда ребенок зажимает в зубах что-нибудь твердое. *Язык:* с огненно-красным кончиком; кажется обожженным или *болит у корня*; язык высовывается из рта. Обильная тягучая слюна. Очень болезненные мелкие язвы на внутренней поверхности щеки; пациент не может жевать на этой стороне. Ощущение сухости во рту при кашле.

**Горло.** Темно-красное или синевато-красное. Бело-серые пятна в зеве. Ангина: *сильная боль в горле при глотании; горло темное*, опухшее; жжение в горле, ощущение занозы, щепки. Ощущение *горячего шара* или комка в горле. Опухание миндалин; они как будто покрыты темной замшей. Сильная пульсация в правой миндалине. Острый паратонзиллит (перитонзиллярный абсцесс). Дифтерия. Пациент совсем не может глотать горячее. Фолликулярный фарингит. Охриплость и боли в горле после дифтерии.

**Желудок.** Жесткая рвота: она сопровождается позывами на рвоту; пациенту хочется умереть, чтобы не мучиться из-за рвоты; рвота возникает каждые несколько минут. Голод вскоре после еды. Легко возникает рвота, а тошнота отсутствует. Боль в желудке усиливается при глубоком дыхании.

**Живот.** Сильная тупая боль в подреберье — усиливается, когда пациент лежит на больном боку; уменьшается при белях. Хронический гепатит. Непрекращающиеся позывы на аул; гаже во сне. Дизентерия: в стуле только слизь и кровь, либо пленки, похожие на обрывки слизистой оболочки кишечника. Кровянистые выделения, сопровождающиеся жаром в прямой кишке. Рак прямой кишки. Запор у стариков, а также у пациентов со слабым сердцем. Понос после лимонада.

**Мочевыделительная система.** Сильная тупая, ноющая боль в почке; при этом моча скудная, мочевыделение подавлено — задержка мочи. Моча темно-красная; с осадком, похожим на мел. Альбуминурия: после дифтерии, скарлатины. От мочи на белье остаются желтые пятна.

**Мужские половые органы.** Болезненность семенного канатика. Стреляющая боль вдоль промежности к половому члену. Болезненное уплотнение яичек.

**Женские половые органы.** Менструации сопровождаются слюнотечением и обильными слезами. Дисменорея: у бесплодных женщин; при эрозии шейки матки; мембранозная.

**ТЯЖЕЛЫЕ, ТВЕРДЫЕ, КАК КАМЕНЬ, ОПУХШИЕ ИЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К ПРИКОСНОВЕНИЮ МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ;** боли при кормлении ребенка грудью; они отдаются во всем теле. *Плотные узлы в молочных железах;* при этом увеличены подмышечные лимфатические узлы. Соски: потрескавшиеся, очень чувствительные; втянуты. Раздражение молочных желез перед менструацией и во время нее. Галакторея. Кровянистые, водянистые выделения из молочных желез. Изменения в старых рубцах в области молочных желез.

**Дыхательные органы.** Пыхтящее дыхание. Охриплость. Кашель, сопровождающийся жжением в трахее.

**Сердце.** В области сердца ощущается боль в виде ударов. Боль покидает сердце и перемещается в правую руку. Ощущение, как будто сердце выскочило в горло. Ожирение сердца.

**Шея и спина.** *Скованность в шее.* Тупая боль в поясничной и крестцовой областях. Боль быстро перемещается вверх и вниз вдоль позвоночника.

**Конечности.** *Правая рука немеет* и как будто покрыва пухом. Боль и скованность в (правом) плече; при этом поднять руку невозможно. Боли проносятся, как разряды электричества. При перемене погоды возникает боль в области крыльев таза и бедрах. Тупая боль (ломота) и слабость в области плечевой кости (справа) — хуже от движения и вытягивания руки. Тупые боли в большеберцовых костях. Тупые боли в пятках, уменьшающиеся, когда поднимает стопы. Невралгия в области пальцев ног. Острые режущие, тянущие боли в боках — в области крыльев таза; ноги поджаты, пациент не может прикоснуться к полу. Болезненная, плотная, блестящая припухлость в области суставов пальцев рук.

**Кожа.** Сухая, грубая, сморщенная. Склонность к возникновению нарывов — фурункулов. Бубоны — увеличение паховых желез при венерических болезнях. Бородавки. Липомы. Мозоли. Сикоз, лишай области бороды и усов. Стригуций лишай.

**Дополнительно.** Sil.

**Диф. диагност.** Bry., Kali-bi., KALI-I., Merc, Rhus-t.,

## PICRIC ACID

**Общее.** Эта кислота воздействует на *головной мозг, спинной мозг, поясничную область, затылок, почки и половые органы.*

**Слабость, чувство тяжести, усталости:** физической и умственной. Разрушительные процессы, протекающие в спинном мозге, сопровождаются параличом. Спазмы; в том числе при миелите. Быстро наступает упадок сил, изнеможение. Прогрессирующая пернициозная анемия. Ощущение покалывания, как иголками. **Жжение** во многих местах: вдоль *позвоночника*; в голених. Кахексия. Люди, изнуренные и умственно, и физически. Онемение. Ползание мурашек. Неврастения. Острый восходящий паралич. Уремия: моча не выделяется (анурия). Паралич у работающих на пишущей машинке.

**Хуже.** От напряжения умственного, а также физического. Вследствие потери спермы, при сперматорее. От жара; в летнюю жару. От усталости. От учебы, умственного труда. От нервного потрясения, шока.

**Лучше.** В покое. От холода. От повязки, если повязать. На солнце.

**Психика.** Не хватает силы воли, чтобы что-нибудь предпринять. Страх неудачи, провала на экзамене; возникает после длительного нервного напряжения и тревог. У пациента возникает ощущение, как будто ступени или почва поднимаются ему навстречу. У мужчины возникают похотливые мысли в присутствии любой женщины. Хотя женщине мужское общество приятно, мысль о замужестве невыносима. Пациент сидит неподвижно, вялый, не интересуется окружающим.

**Голова.** Тяжесть в затылке; она распространяется вниз вдоль позвоночника и в нижние конечности. Головная боль усиливается от умственного (нервного) напряжения, уменьшается от носового кровотечения; если повязать голову. Эта боль сопровождается сексуальным возбуждением и жестокими эрекциями. Нервное истощение. Головная боль беспокоит в дневное время, проходит во время сна. Головная боль: у бизнесменов, предпринимателей, учителей и студентов; она возникает от горя и других удручающих переживаний.

**Глаза.** Желтые. Хронический конъюнктивит с густыми желтыми выделениями.

**Уши.** Болезненные нарывы в наружном слуховом проходе.

**Желудок.** Горький привкус во рту; в том числе в сочетании с жаждой. Отвращение к пище. Рвота возникает внезапно, без предвестников; рвотные массы ярко-желтые, горькие.

**Живот.** Маслянистый жгучий стул. Понос вследствие нервного напряжения. Жжение в прямой кишке во время стула. Стул жидкий, желтый. Желтуха, сопровождающаяся кожным зудом.

**Мочевыделительная система.** Моча с запахом аммиака; вытекает по капле, сочится. Уремия: мочи нет совсем (анурия). Диабет, альбуминурия. Увеличение предстательной железы.

**Мужские половые органы.** Похотливые мысли в присутствии любой женщины. Приапизм, половой член набухший. Сильные эрекции сопровождаются болью в яичках, распространяющейся вверх вдоль семенных канатиков. Чрезвычайный упадок сил, прострация из-за частых поллюций. Импотенция сопровождается возникновением фурункулов и карбункулов.

**Женские половые органы.** Чрезвычайное истощение во время менструаций.

**Шея и спина.** Болезненные фурункулы на задней части шеи. Боль в спине сопровождается вялостью — пациент не способен сидеть прямо — и жжением вдоль позвоночника; хуже от занятий, учебы.

Когда стоит, то широко расставляет ноги. Тупые боли, усталость в голених. Писчий спазм или паралич. Кажется, как будто повязка на спине, а также на конечностях. Анестезия, потеря чувствительности в области голених, как будто одеты эластичные чулки. Слабость голених, свинцовая тяжесть в них: пациент с трудом поднимает ноги.

**Кожа.** Желтуха. Мелкие, болезненные нарывы, особенно на шее.

**Сон.** Сонливость. Сон глубокий, но не освежающий. Сонливость днем и бессонница ночью.

**Диф. диагноз.** Gels., Ox-ac, Phos., Ph-ac.

## PILOCARPUS - см. JABORANDI

## PIPER METHISTICUM

**Общее.** Кава-кава вызывает интоксикацию, характеризующуюся живостью, веселостью и способностью сделать большую работу, не ощущая усталости.

*Все симптомы, особенно боли, на время уменьшаются, если отвлечь от них внимание, изменить положение тела, сменить тему разговора.*

## PLANTAGO MAJOR

**Общее.** Подорожник воздействует на *нервы*, способствуя появлению невралгических болей в *ушах, зубах, лице*; а также при опоясывающем лишае. Боли *резкие, меняющие локализацию; перемещающиеся из уха в зубы и обратно.* Болезненность. Платана вызывает отвращение к табаку — у тех, кто его жует и у тех, кто курит.



Пиорея. Последствия ушибов, ожогов, порезов, колотых ран, змеиных укусов. Плантаго можно применять наружно при невралгии. Ощущение инородного тела между ушами; в паху и т.д.

**Хуже.** Ночью. В теплом помещении.

**Лучше.** От сна. От еды.

**Голова.** Как будто мозг перевернут. Головная боль в сочетании с зубной болью. Ощущение, как будто в голове что-то лежит между ушами — проходит через голову и оба уха.

**Глаза.** Резкие боли в глазах, возникающие рефлекторно из-за гнилых зубов. Ощущение волоса перед глазом (левым).

**Уши.** Невралгическая боль в ухе — распространяется из одного уха в другое сквозь голову. Боль в ухе сочетается с зубной болью. Слух обострен; громкие звуки проходят через одно ухо(?). Ощущение инородного тела между ушами (внутри головы).

**Лицо.** Периодическая лицевая невралгия — ухудшение наступает с 7 ч утра до 14 ч; она сопровождается слезотечением, светобоязнью; боль распространяется в виски и нижнюю челюсть.

**Рот.** При болях возникает слюнотечение. Зубы кажутся слишком длинными. Зубная боль уменьшается от еды. Гадкий привкус во рту.

**Живот.** Кишки кажутся холодными. Колика уменьшается от еды. Понос: стул коричневый, пенистый, водянистый. Болезненный геморрой, пациент едва может стоять.

**Мочевыделительная система.** Часто, в большом количестве выделяется бледная моча; хуже ночью; полиурия сопровождается жаждой (при диабете). Энурез.

**Женские половые органы.** Невралгическая боль в области сосков.

**Спина.** Пульсация между лопатками. Холодный пот в области крестца.

**Конечности.** Онемение, дрожание голеней.

**Кожа.** Зуд и жжение. Чувствительная кожа.

**Сон.** Мрачные сновидения, вызывающие плач.

**Диф. диагноз.** Arn., Ferr-p., Puls.

## PLATINUM

**Общее.** Этот благородный металл может быть лекарством *ДЛЯ ЖЕНЩИН*, в особенности для чопорных старых дев.

Много разных симптомов, рефлекторно связанных с яичниками, маткой или наружными половыми органами. Платина оказывает влияние на смешанные нервы — блуждающий и тройничный, а также на чувствительные нервы: возникают *жесткие, судорожные, сжимающие, пронзающие, тычущие или сопровождающиеся онемением боли*, а затем — спазмы. Спазмы чередуются с одышкой. *Психика* и нервы характеризуются повышенной чувствительностью.

Локальное похолодание (отдельных частей тела, глаз, ушей и т.д.) или *онемение* (кожи головы, лица, копчика, области икроножных мышц и т.д.). Кровотечения: кровь с черными сгустками, жидкая. Дрожание, тремор, в том числе сопровождающийся болью. *Беспорядочные* спазмы, неравномерное полнокровие (конгестия). *Чередование симптомов психических и физических или связанных с сексуальной сферой.* Боли усиливаются и уменьшаются постепенно. *Ощущение повязки. Клейкие, липкие выделения:* слезы, стул, менструальная кровь и т.д.

Истерические спазмы. Катаlepsия (оцепенение) во время менструации. Тонические и клонические судороги при смехе.

Болезненные последствия испуга; неприятностей; разочарования; тяжелой утраты; вспышки гнева; сексуальных излишеств; продолжительных кровотечений; мастурбации (у детей, не достигших половой зрелости). Ощущение покалывания, как иголками. Сильные толчки, сотрясение тела, как будто от боли. Искривление конечностей. Эпилепсия; катаlepsия. Извращенное сексуальное желание.

**Хуже.** ОТ ЭМОЦИЙ, ПЕРЕЖИВАНИЙ: сексуальных, связанных с коитусом, с разочарованием. ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ. От нервного истощения. Когда голодает. Во время менструации. Сидя. Стоя. Когда прогибается назад.

**Лучше.** При ходьбе на открытом воздухе. От солнечного света. Потянуться.

**Психика.** Смеется не вовремя, невпопад. Человек злой, недобрый; характер резкий и вздорный. *Неправильно оценивает и соотносит размеры вещей и т.д.: предметы* кажутся уменьшенными; странными, вызывают страх. Пациент испытывает страх и ужас: боится смерти, кажется, что она очень близка. Вывает о помощи. Изменчивое настроение: плачет и смеется попеременно.

**ПРЕЗРЕНИЕ.** *Высокомерие:* пренебрежительно, свысока смотрит на всех и на всё вокруг. Пациент кажется себе высоким и исполненным достоинства. *Самодовольный и чувственный.* У женщины возникает импульс убить собственного ребенка; своего мужа (при виде ножа), к которому она втайне испытывает неприязнь или которого страстно любит. Насвистывает, поет, танцует.

Уязвленное самолюбие или сексуальное возбуждение способствуют возникновению психических симптомов. Пациентка плачет при болях. Женщине кажется, что она не принадлежит к своей семье; что все изменилось. Чувство одиночества, кажется, что ее покинули. Плохое настроение, не в духе; при этом плачет. Думает, что ее муж никогда не вернется: с ним может что-нибудь случиться.

Придирается. Говорит непристойности, сквернословит. Психические недомогания уменьшаются в сумерки и при подавлении менструации. Серьезно относится к делам, которые не имеют большого значения; раздражается по пустякам. Сидит в углу, о чем-то размышляет и ничего не говорит.

**Голова.** Ощущение напряжения, давящая боль. Онемение головы при головной боли. Ощущение гвоздя, вбитого в голову. Кожа волосистой части головы напряжена. Головная боль при белых. Ощущение, как будто во лбу вода.

**Глаза.** Кажутся холодными. Подергивание век. Предметы кажутся меньших размеров, чем на самом деле.

**Уши.** Ощущение холода в ушах; онемения, распространяющегося на щеки и губы.

**Нос.** Судорожная боль в корне носа; она сопровождается покраснением лица. Онемение носа.

**Лицо.** Холод, ощущение ползания мурашек и онемение всей половины лица (правой). Grimасы. Сверлящая боль в челюстях. Судороги жевательных мышц, сводит челюсти. Тризм. Онемение скуловых костей.

**Рот.** Пульсирующие боли в зубах. Ощущение, как будто язык ошпарен. Ощущение холода во рту. Сладкий вкус на кончике языка.

**Желудок.** Отвращение к еде из-за печали. Волчий голод. Ест торопливо, съедает все, что видит, или все пробует. Аппетит пропадает после первого глотка пищи.

**Живот.** Свинцовая колика. Боль из области пупка распространяется сквозь живот в спину; пациент при этом вертится, корчится как только возможно. *Стул твердый, черный; выделяется маленькими порциями;* приходится сильно тужиться; стул прилипает к прямой кишке, *как мягкая глина.* Запор: у путешественников; при беременности. Ползание мурашек, зуд в заднем проходе вечером. При этом возникает сладострастное ощущение.

**Мужские половые органы.** Сладострастное ощущение ползания мурашек, щекотание, зуд и чрезвычайно сильное сексуальное желание. Последствия мастурбации у детей, не достигших пубертатного возраста. Извращенное сексуальное желание.

**Женские половые органы.** *Болезненно чувствительные наружные половые органы;* зуд, щекотание или ощущение ползания мурашек в них. Чрезвычайно сильное сексуальное желание, в особенности у девственниц; желание доводит их до мастурбации. Нимфомания усиливается в послеродовом периоде. Менструации с выделением темной, густой крови, обильные, со сгустками, слишком ранние; слишком короткие; сопровождаются ощущением, как будто тянет на низ; в том числе после аборта.

Оофорит: сопровождается жгучими болями; с бесплодием. Дисменорея: пациентка вскрикивает, возникают подергивания. Вагинизм из-за крайне повышенной чувствительности половых органов, коитус невозможен. Зуд наружных половых органов; он сопровождается сладострастным пощипыванием. Выпадение матки. Уплотнение; рак матки. Фиброма. Бели похожи на яичный белок, выделяются только днем, их выделение усиливается после мочеиспускания; при вставании со стула. Бесплодие из-за чрезмерного сексуального возбуждения. Эротомания. Часто возникает ощущение, что должна начаться менструация. Аменорея у эмигранток.

**Спина.** Боль в спине, как от ушиба, усиливается от давления, когда пациент прогибается назад. Онемение в крестце и копчике; как от удара.

**Конечности.** Судороги в икроножных мышцах. Ощущение напряжения, сжатия в бедрах, как будто они перевязаны. Искривление пальцев на руках. Онемение мизинца на руке или всех пальцев на руках. Чувство усталости в конечностях и их онемение. Паралитическая слабость.

**Кожа.** Пощипывание, покалывание, зуд.

**Сон.** Спастическая зевота. Спит на спине, согнув колени и разведя их в стороны; стремится раскрыться полностью.

**Диф. диагноз.** Cupr., Ign., Plb., Stann.

## PLUMBUM METALLICUM

**Общее.** Свинец вызывает склеротические изменения во всех тканях и органах. Он действует на *МЫШЦЫ; НЕРВЫ; СПИННОЙ МОЗГ; органы брюшной полости;* область пупка, почки; кровеносные сосуды и кровь.

Симптомы развиваются *медленно; исподволь; постепенно усиливаются;* часто сопровождаются выраженными побочными явлениями — крайне изменчивыми и непоследовательными; они возникают в *отдельных частях тела или органах* и т.д.

Паралич: истерический; детский; в отдельных частях тела (свисает кисть), вялый паралич; паралич сопровождается гиперестезией; хуже от прикосновения. Судорожное дрожание и спастическое сокращение (подергивание) конечностей. Исхудание конечностей в сочетании с пухлым телом; или похудение парализованной части тела, одной части тела; в том числе после невралгии.

Потребность выпрямиться, потянуться при болях в животе. *Втянуты: живот; задний проход; яички; пупок и т.д.* Анестезия так же резко выражена, как и чрезвычайная гиперестезия. **ЖЕСТОКИЕ СОКРАЩЕНИЯ, КОНТРАКТУРЫ МЫШЦ.** *Втягивание:* ощущение, как будто за нитку тянут или дергают назад или внутрь.

Пациентка преувеличивает свои страдания. Боли, как удары молнии, пациент кричит. *Судороги, конвульсии:* хроническая эпилепсия с выраженной аурой; судороги сопровождаются кровотечениями. Сверлящие боли; спазмы. Прогрессирующая мышечная дистрофия. Рассеянный склероз; склероз спинного мозга. Сжатие, спазмы во внутренних органах. Анемия; желтуха; артериосклероз; артериальная гипертензия. Мелкие аневризмы сосудов в разных местах — повсюду. Отеки и опухание. Подагра.

Последствия подавления высыпаний; сексуальных излишеств. Маразм (дистрофия) у младенцев в явно безнадежных случаях: живот большой и твердый, крайне тяжелый запор. Замедленное восприятие, понимание затруднено. Дрожание, тремор с последующим параличом. Боль в суставах.

**Хуже.** При ясной погоде. На открытом воздухе. *От напряжения.* От движения. В обществе: в помещении, полном людей. Когда берет в руку гладкие предметы. От прикосновения.

**Лучше.** От сильного давления. От растирания. Когда выпрямляет конечности, потягивается.

**Психика.** *Молчаливый.* Робкий, беспокойный и тревожный. Неистовый: кусается, дерется. Спокойный и меланхоличный. Страх: предательского убийства; отравления; пациентка считает, что все, кто рядом с ней, — убийцы. Тупость; слабоумие. Бред, делирий: ночной; чередующийся с коликой или с болью в конечностях. Амнестическая афазия. От физического труда наступает нервное истощение. Замедленное восприятие. Слабая память или потеря памяти. Пациент становится все более медлительным и равнодушным. Склонен к мошенничеству и обману. Пациентка симулирует заболевание или преувеличивает свои страдания. Истерия: пациент демонстрирует симптомы только когда на него смотрят. Время от времени кричит. Испуг без причины. Бред (делирий) от музыки.

**Голова.** Головная боль с ощущением, как будто шар подкатывается к голове из горла. Волосы сухие, наблюдается выпадение волос из бороды. Падает в обморок в помещении, полном людей, или когда идет из одной комнаты в другую.

**Глаза.** Желтые или насыщенного синевато-красного цвета склеры. Воспаление зрительного нерва; центральная скотома. Паралич верхнего века. Внезапная потеря зрения после обморока. Зрачки сужены. Глаукома; из-за поражения спинного мозга. Слезотечение — обильные горячие слезы.

**Уши.** Шум в ушах. Изредка внезапно возникает глухота. Слышит музыку при устрашающем бреде.

**Нос.** Потеря обоняния при эпилепсии. Нос холодный.

**Лицо.** Бледное и истощенное. Подергивание одной половины лица (правой). Ввалившиеся щеки. Кожа: сальная, лоснящаяся. Опухание лица с одной стороны.

**Рот.** Желтизна полости рта. Отчетливо видна синяя линия вдоль края десен. Десны бледные, опухшие. Язык: дрожит; кажется парализованным. Плотные бугорки на деснах. Клейкая слюна. Сладкий привкус во рту. Афты; зловонные язвы. Громкие движения нижней челюсти и страшный скрежет зубов. Слюна синяя.

**Горло.** Нарушение глотания (дисфагия): жидкости пациент проглотить может, а твердая пища возвращается в полость рта. Сужение пищевода из-за спазмов. Паралич пищевода — пациент не может глотать. Истерический ком в горле.

**Желудок.** Зловонные или каловые отрыжки. Рвота каловыми массами при колике и запоре. Гастралгия — лучше от сильного давления, прогнуться, выгнуться назад. Периодическая или постоянная рвота пищей. Рвота коричнево-черной жидкостью или зеленой слизью.

**Живот.** **ПУПОК КАЖЕТСЯ ВТЯНУТЫМ.** *Колика* сопровождает многие симптомы. Боли из живота *распространяются* в другие части тела. Боль сверлящая, или как будто что-то протискивается через узкое место. Пупочная грыжа. Живот напряжен или втянут. *Кажется, что задний проход втянут или болезненно сжат.*

Стул: в виде гранул; *в виде твердых черных шариков; как овечий помет;* его выделение сопровождается судорожными болями в заднем проходе, тенезмами. *Упорный (тяжелый) запор или колики у младенцев.* Живот стянут, кажется, что в нем — неправильной формы глыбы. Инвагинация кишечника. Невралгия прямой кишки. Выпадение заднего прохода при параличе.

**Мочевыделительная система.** Мочи много, но вытекает она медленно; капля за каплей. Хронический интерстициальный нефрит. Сморщенная почка. Паралич мочевого пузыря, затруднение мочеиспускания или задержка мочи; подавление мочевыделения. Уремия. Альбуминурия. Сахарный диабет.

**Мужские половые органы.** Яички втянуты; кажутся сжатыми. Импотенция. Частые поллюции.

**Женские половые органы.** Вагинизм. Уплотнение молочных желез. Склонность к выкидышу; в том числе из-за недоразвития матки. Ощущение, как будто в матке не хватает места для плода. При колике молочные железы в одно мгновение становятся более плотными или уменьшаются. Меноррагия сопровождается ощущением, как будто дергают нитку, натянутую от живота к спине. Боль в яичнике уменьшается, когда пациентка вытягивает

ноги. Повышенная чувствительность наружных половых органов и влагалища. Женщина не может помочиться при беременности из-за пониженной чувствительности или паралича мочевого пузыря.

**Сердце.** Слабое. Пульс нитевидный, замедляется даже до 40 ударов в минуту. Болезненный спазм, сокращение периферических артерий.

**Конечности.** Кисть вяло свисает. Руки и кисти слабые, ненадежные, "отказывают" и при этом болят. Боль в атрофированных конечностях, чередующаяся с коликой. Боль в большом пальце стопы справа. Паралич нижних конечностей, в том числе после родов. Боли, как от удара молнией, лучше от давления. Ишиас; он сопровождается атрофией мышц. Ощущение, как будто стопы деревянные. Руки трясутся, когда пациент пытается что-нибудь сделать руками.

**Кожа.** Синеватая кожа; красные пятна на ней. *Желтая.* Сухая кожа. *Повышенная чувствительность* кожи к открытому воздуху. Пролежни. Сухие язвы с ощущением жжения. Гангрена. Мелкие ранки быстро воспаляются и нагнаиваются. Кожа в морщинках, сморщенная, как будто обтягивает кости. Волдыри; мозоли, бурсит большого пальца стопы.

**Сон.** Во сне пациент принимает странное, причудливое положение. Засыпает, когда говорит.

**Лихорадка.** Холодное тело из-за напряжения. Все тело покрывается холодным потом во время стула. Стопы холодные только при ходьбе.

**Дополнительно.** Rhus-t., Thal.

**Диф. диагноз.** Ор.

## PODOPHYLLUM

**Общее.** Это средство называют "растительным Меркурием" (*Merc*), оно назначается *при заболеваниях желчевыводящих путей*. Оно, главным образом, оказывает влияние на *двенадцатиперстную кишку*; печень; кишечник; **ПРЯМУЮ КИШКУ**; на правую сторону тела; яичник, лопатку, горло.

Чередование симптомов; понос чередуется с запором; головная боль чередуется с поносом. Многие недомогания возникают во время беременности. Внезапные толчки в теле из-за дергающих болей. Сильная сонливость, дремота с желанием потянуться. Расслабление сфинктеров.

**Хуже.** **РАНО УТРОМ.** *От еды. В жаркую погоду.* При прорезывании зубов. От питья. От кислых фруктов. От молока. Перед стулом, во время и после него. От движения. От ртути.

**Лучше.** *От растирания или поглаживания рукой области печени.* Лежа на животе.

**Психика.** Хнычет. Болтливость во время озноба и при лихорадке; впоследствии пациент не помнит, о чем говорил. Воображает, что он скоро умрет или тяжело заболит. Суетливость и беспокойство, не может сидеть неподвижно.

**Голова.** Катает голову по подушке из стороны в сторону и стонет: ребенок — при прорезывании зубов; взрослый — от забот, связанных с его бизнесом, работой. Головная боль чередуется с поносом или уменьшается от него. Пронзающая боль в лобной области, вынужден закрыть глаза.

**Глаза.** Веки наполовину опущены. Желтизна склер.

**Лицо.** Горячее лицо, румяные щеки; в том числе при поносе. Желтоватое лицо.

**Рот.** Отвратительный запах изо рта. Жжение языка, язык шершавый или дряблый, с отпечатками зубов. Сильное желание стискивать десны; пациент скрежещет зубами ночью. Горький привкус во рту. Язык широкий, большой, влажный; налет на языке похож на слой горчицы. Пациент не различает вкус, не может отличить сладкое от кислого. Все кажется кислым или гнилым.

**Горло.** Ощущение комка в пищеводе.

**Желудок.** Страстное желание кислых продуктов, от которых становится хуже. Рвота: горячей, пенистой массой, молоком (у младенцев). Горячие кислые отрыжки; с запахом тухлых яиц. *Постоянно давится.* Жажда холодной воды в большом количестве. Маленький ребенок давится при поносе.

**Живот.** Болезненность *печени* и всех органов брюшной полости; хуже во время рвоты; при поносе; перед менструацией и во время нее. *Болезненность печени и боли в ней* — лучше от растирания. *Ощущение слабости, пустоты, как будто все внезапно провалилось вниз или ощущение дурноты в животе*, в том числе после стула. Пациент растирает живот, чтобы облегчить самочувствие.

**БУЛЬКАНЬЕ В КИШЕЧНИКЕ, ЗАТЕМ СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ БЕЗБОЛЕЗНЕННО ИЗЛИВАЕТСЯ ОБИЛЬНЫЙ, ГНИЛОСТНЫЙ СТУЛ.** Стул: *белый, как вода; пенистый; с похожим на муку осадком*; он сразу протекает сквозь пеленку; после стула возникает слабость. Летний понос. Стул непроизвольный — во время сна, при выделении кишечных газов. Понос чередуется с другими симптомами; в том числе с запором. Светлый, плотный, похожий на мел стул.

Желтуха при желчнокаменной болезни. Саднение *в прямой кишке*, болезненность и слабость. *Выпадение прямой кишки*: перед стулом; после родов; во время беременности, при рвоте, при чихании; от нервного возбуждения. Мокнувшие, зловонные геморроидальные узлы. Утренний понос. Понос уменьшается, когда пациент

лежит на животе; усиливается, во время купания или умывания (у детей), от употребления консервированных фруктов, от кислых фруктов, от молока.

**Мочевыделительная система.** Учащенное мочеиспускание: ночью, во время беременности. Непроизвольное мочеиспускание (энурез). Диабет сахарный и несахарный.

**Мужские половые органы.** Болезни предстательной железы сопровождаются симптомами со стороны прямой кишки.

**Женские половые органы.** Боль их области яичника (правого), распространяется вниз вдоль бедренного нерва; хуже, когда женщина вытягивает ноги. Опухоль яичника сопровождается болью, которая распространяется в плечо. Выпадение матки возникает, если пациентка тужится или поднимает что-то очень тяжелое; после родов. Ощущение, как будто половые органы выпадут наружу во время стула. В первые месяцы беременности женщине удобно лежать только на животе. Меноррагия из-за перенапряжения. Опухание половых губ во время беременности.

**Сердце.** Сердцебиение: сопровождается ощущением кудахтанья; оно подкатывает к горлу, возникает из-за переживаний.

**Конечности.** Боль в правой паховой области, откуда она "стреляет" вниз — по внутренней поверхности бедра к колену. Паралитическая слабость конечностей с левой стороны. Судороги в икроножных мышцах во время стула. Боль по ходу локтевого нерва на обеих руках.

**Кожа.** Мокнет, теплая; желтушная.

**Сон.** Пациент стонет и хнычет во сне. Сонливость после приступа малярии.

**Лихорадка.** Озноб в 7 ч утра. Болтливость при лихорадке. Потоотделение: обильное во сне; зловонное.

**Дополнительно.** Nat-m.

**Диф. диагноз.** Aloe, Chin., Merc.

## POLYGONUM

**Общее.** Это средство оказывает влияние на мочеполовые органы и на *кишечник*. Оно показано при *РЕЖУЩИХ БОЛЯХ*, распространяющихся по ходу мочеточника; вдоль маточных труб; вверх вдоль позвоночника; эти боли сопровождаются ощущением давления на низ в животе.

**Пульсация,** приливы жара, блуждающие боли, в том числе в предстательной железе. Ощущение холода чередуется или соседствует с ощущением жара в одном и том же или в другом месте, например: жжение в груди и ощущение холода в под ложечкой и т.д. Жгучие выделения.

**Хуже.** От холода, от сырого холода. От давления одежды.

**Голова.** Острые пульсирующие боли в висках.

**Глаза.** Припухлость под глазами (справа). Веки подергиваются, когда глаза закрыты и когда пациент ложится.

**Уши.** Острая боль в ухе, возникающая, когда пациент наклоняет голову вперед; лучше запрокинуть голову.

**Лицо.** Правая половина лица холодная в то время, когда в левой ощущается наиболее сильная боль.

**Рот.** Зуд нёба, жжение в нем: хочется его почесать. Язык кажется опухшим.

**Живот.** Чувство холода в желудке сочетается с ощущением жжения в груди. Тошнота ощущается в желудке. Режущие боли и сильное урчание: как будто все содержимое кишечника представляет собой жидкость. Внутренняя поверхность заднего прохода усыпана зудящими бугорками. Геморрой, сопровождающийся зудом.

**Мочевыделительная система.** Сильная боль при воспалении почек, нефрите; *грызущая, сжимающая, режущая БОЛЬ В ЖИВОТЕ*. Режущая боль по ходу мочеточника. Моча скудная; сочится, подтекает; в моче темный или известковый осадок, налипающий на стенки сосуда. Нефрит; гнойное воспаление в почке. Цистит.

**Мужские половые органы.** Ссадины на мошонке. Пульсирующая, жгучая боль в предстательной железе при мочеиспускании. Боль в яичках, семенном канатике при мочеиспускании.

**Женские половые органы.** Режущая боль по ходу фаллопиевых труб, сопровождающаяся давлением на низ. Ощущение, как будто боковые отделы таза притянуты друг к другу. Метроррагия; аменорея у юных девушек. Стреляющие боли, проходящие сквозь молочные железы.

**Конечности.** Тупые боли, ломота в нижних конечностях. Болезненность и боли в пятках. Стопы попеременно то горячие, то холодные.

**Кожа.** Крапивница. Поверхностные язвы и болячки на нижних конечностях; в том числе во время климакса.

**Диф. диагноз.** Calc.

## ROTHOS FOETIDUS

**Общее.** Это средство для лечения астмы, связанной с вдыханием пыли; астмы, для которой характерно улучшение после стула.

Рассеянность. Головная боль на маленьких участках, сопровождающаяся пульсацией височных артерий. Красная припухлость поперек носа. Боль в горле во время чихания. Онемение языка. Вздутие живота. Летучие спастические боли.

**Лучше.** На открытом воздухе.

## **PRUNUS SPINOSA**

**Общее.** Прунус спиноза воздействует, главным образом, на *нервы; дыхательные органы; глазницы и органы мочевого выделения.*

*Боли* стреляющие; давящие в направлении изнутри наружу; похожие на удары молнии; блуждающие; они **ВЫЗЫВАЮТ ОДЫШКУ**. Невралгия. Судороги. Отек. Боли после опоясывающего лишая. Паралич нерва. Компенсаторные приспособительные реакции.

Болезненные последствия пребывания на солнце; растяжения связок; поднятия чрезмерной тяжести. Отеки, возникающие при сердечной недостаточности.

**Хуже.** От прикосновения, от давления. От движения. От сотрясения. При наклоне. При подъеме по лестнице.

**Лучше.** Согнуться пополам.

**Психика.** Двигательное беспокойство: пациент постоянно ходит туда-сюда, прохаживается; не может усидеть на месте.

**Голова.** Стреляющая боль из лобной кости (справа) направляется сквозь мозг в затылок. Головная боль возникает от солнечного тепла.

**Глаза.** Цилиарная невралгия; *распирающая боль в глазных яблоках, как будто они лопнут*; или как будто глаза расталкивают, отодвигают друг от друга; лучше при слезотечении.

**Рот.** Кажется, что зубы выдергивают. Зубная боль уменьшается при сжатии зубов.

**Мочевыделительная система.** Судорога, спазм в мочевом пузыре: из-за давления газов; пациент вынужден согнуться пополам, чтобы помочиться. Императивный позыв на мочеиспускание; моча достигает головки полового члена и возвращается; при этом ощущается жестокая боль и спазмы в мочевом пузыре, а также тенезмы прямой кишки. Невралгическая дизурия. Боль в головке полового члена при мочеиспускании. Вынужден долго тужиться, прежде чем потечет моча. Пульсация в промежности. Струя мочи тонкая, как нитка, или раздвоенная.

**Мужские половые органы.** Пульсация в головке полового члена из-за сотрясения при ходьбе.

**Женские половые органы.** Бели едкие, водянисто-гнойные, оставляющие желтые пятна на белье. Менструации с выделением жидкой, водянистой крови, слишком ранние, слишком обильные; сопровождаются болью в крестце.

**Дыхательные органы.** *Одышка*, в том числе при болях. Возникает ощущение, что вдыхаемый воздух не достигает подложечной области; и поэтому приходится зевать или делать глубокий вдох, чтобы протолкнуть туда воздух. Не хватает воздуха.

Сердце. Гипертрофия сердца. Сердце усиленно бьется, дыхание затруднено — хуже от малейшего движения. Сердечные *отеки*. Пульсация сонных артерий. Стенокардия.

**Спина.** Ощущение, как будто комок под левой лопаткой.

**Конечности.** Отеки стоп. Зуд кончиков пальцев на руках, как будто они обморожены. Ощущение, что в области большого пальца на руке возникло растяжение связок, это мешает писать.

**Кожа.** Опоясывающий лишай. Отеки.

**Лихорадка.** Ночные поты.

**Диф. диагноз.** Laur.

## **PSORINUM**

**Общее.** Доктор Ганеман приготовил нозод Псоринум из серозно-гнойного содержимого чесоточных пузырьков.

Область терапевтического применения этого средства — проявления так называемой псоры, когда *в случае хронического заболевания наблюдается недостаточная реакция*; когда правильно подобранные средства не приводят к облегчению состояния или стойкому улучшению; а также в случаях, когда создается впечатление, что показан *Sulph*, но он не дает желаемого результата. Псоринум проясняет запутанные случаи.

Он воздействует преимущественно **НА КОЖУ, КОЖНЫЕ СКЛАДКИ, сальные железы, УШИ, КИШЕЧНИК, дыхательные органы** и правую сторону тела. Это средство подходит грязным субъектам, с телом, скверно пахнущим даже после ванны; бледным, болезненным, хрупким, болезненного вида детям, от которых исходит неприятный запах; эти нервные, беспокойные пациенты легко пугаются, вздрагивают.

Изнеможение, упадок сил. Всё болит. **РЕЦИДИВИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЗЛОВОННЫЕ: выделения; зловонный запах у тела, стула, высыпаний, пота, в том числе на стопах при их упорной потливости.** Выделения густые. Пациент *слабый, нежный и худой. Легко простывает, быстро замерзает, зябкий.*

Одежда кажется большой, либо пациенту кажется, что его прижимает к земле, когда он идет по улице в солнечную погоду. **ЧУВСТВО ГОЛОДА или НЕОБЫЧАЙНО ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ ПЕРЕД ПРИСТУПОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ.** Желание вымыть больное место. **Слабость:** сохраняется после острых болезней или ощущается

независимо от наличия органического заболевания; возникает после потери жидкостей организма — "жизненных соков". Пациент чувствует себя то хорошо, то плохо — по очереди.

Последствия инфекционного заболевания сохраняются в течение нескольких лет после него. Болезненные последствия переживаний, поднятия чрезмерной тяжести; травм, ударов, растяжения связок, вывихов.

Ненормально подвижные суставы, шатающиеся зубы и т.д. Высыпания исчезают летом, возобновляются зимой. Пациент носит теплую одежду даже летом. Постоянно моет руки и ноги. Во время болезни маленький ребенок не спит ни днем, ни ночью; вместо этого беспокоится, капризничает и плачет. Либо этот ребенок чувствует себя хорошо и играет весь день, потом беспокоится и кричит всю ночь. Дышит с трудом, когда стоит на открытом воздухе — на улице, хочет пойти домой и лечь.

**Хуже.** *ОТ ХОЛОДА;* на холодном воздухе — на улице; *от умывания холодной водой.* При перемене погоды; в ветреную погоду. *От жара;* от тепла постели; *от шерстяных вещей;* когда разогреется при физическом напряжении. **ОТ ПОДАВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ.** От соприкосновения его собственных конечностей. Периодически; каждый год. В полнолуние.

**Лучше.** Лежа с низко опущенной головой, или лежа спокойно. От еды. От умывания. От носового кровотечения. От сильного давления. От обильного потоотделения.

**Психика.** **ТРЕВОГА.** Дурные предчувствия. *Не верит в выздоровление; крайне подавлен; испытывает чувство безнадежности.* Радостный, довольный. Меланхолия религиозного характера; *мрачный.* Ужасные мысли; склонность к самоубийству.

Пациенту кажется, что он беден; он полагает, что его дело потерпит крах; хотя на самом деле оно процветает. Страхи: боится огня; боится остаться один, сойти с ума и т.д. Отвращение к работе. Дети очень капризничают и днем, и ночью. Привередничает, раздражается, шумит; легко пугается, вздрагивает. Тяжелые недомогания вследствие даже незначительных переживаний. Отупение, помутнение рассудка. С трудом думает. Перед грозой несколько дней ощущает беспокойство.

**Голова.** *Головная боль;* как после сильного удара, при подавлении менструации; она *возникает после нарушения зрения;* чередуется с другими недомоганиями, уменьшается от носового кровотечения. Кажется, что голова отделена от тела. Пациент *чувствителен к сквознякам, которые охватывают голову;* поэтому он *стремится ее прикрыть* в жаркую погоду. Подергивание в области висков. Тусклые, сухие, спутанные волосы. Влажные высыпания на коже волосистой части головы. Мигрень. Участки белой кожи с растущими на них пучками белых волос.

**Глаза.** Склеиваются. Веки вывернуты. Ощущение, как будто что-то двигается перед глазами или кто-то размахивает пальцами перед глазами пациента. Рецидивирующее хроническое воспаление. Кажется, что предметы дрожат, затем темнеет в глазах. Темно в глазах.

**Уши.** Саднение, краснота, мокнутие; чешуйки вокруг ушей. Мокнувшие ранки, в том числе за ушами. *Гнилостные выделения из ушей.* Ушная сера красного цвета. Невыносимый зуд. Выделения из уха в сочетании с головной болью; в сочетании со зловонным водянистым стулом (понос). Кажущиеся, иллюзорные звуки в ушах; ощущение, как будто слышит не своими ушами.

**Нос.** Сенная лихорадка (поллиноз). Мелкие красные прыщики (папулы) на носу. Повторяющийся насморк.

**Лицо.** Бледное, болезненное, грязное, покрытое пушком или одутловатое лицо. Мелкие красные прыщики на лице. Розовые угри. Опухание верхней губы. Пушок на лице.

**Рот.** Ощущение, что зубы шатаются, потом возникает боль; хуже от прикосновения. Кончик языка кажется ошпаренным. *Отвратительный привкус во рту.* Десны кровоточат, рыхлые, отстают от зубов. Пиорея.

Длительно не заживающие трещины в углах рта. Горький привкус во рту — лучше от еды или питья.

**Горло.** Откашливает зловонную творожистую массу. Рецидивирующий паратонзиллит (перитонзиллярный абсцесс). Ощущение пробки в горле, не позволяющей откашляться.

**Желудок.** Отсутствие аппетита после болезни, в сочетании с сильной жаждой. Всегда очень голоден; сильный голод при головной боли, должен что-нибудь съесть; голод среди ночи. Отрыжки: кислые, прогорклые, со вкусом и запахом тухлых яиц. Несмотря на волчий аппетит, худеет. Желание пива, кислой пищи. Отвращение к свинине. Рвота беременных: когда другие средства не помогают. Изжога возникает, когда пациент ложится.

**Живот.** Метеоризм при нарушении работы печени. Колика уменьшается от еды и выделения вонючих кишечных газов. Кишечные газы с запахом тухлых яиц. Боль в печени усиливается от чихания. **СТУЛ: ТЕМНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ; СТРАШНО ГНИЛОСТНЫЙ; ВЫДЕЛЯЕТСЯ СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ;** ему свойствен *проникающий повсюду запах*, распространяющийся по всему дому.

Детская холера. Запор у младенцев. Стул мягкий, но выделяется с трудом. Непроизвольный стул во время сна. Кровотечения из прямой кишки у старых женщин. Пациенту приходится сходить в туалет несколько раз, чтобы опорожнить кишечник, чтобы получился нормальный стул. Хронический понос: возникает рано утром, сопровождается императивным позывом. Жжение в прямой кишке.

**Мочевыделительная система.** Ночное недержание мочи — хуже в полнолуние; трудноизлечимый энурез. Пациент вынужден мочиться по несколько раз; из-за слабости мочевого пузыря.

**Мужские половые органы.** Отвратительный запах от половых органов. Сжимающая боль в яичках. Хроническая гонорея; безболезненные выделения из уретры, оставляющие желтые пятна на белье. Отвращение к коитусу. Отсутствие наслаждения; не происходит семяизвержение во время коитуса.

**Женские половые органы.** Бели выделяются сплошным потоком, в виде сгустков, вонючие; сопровождаются сильной болью в крестце и слабостью. Дисменорея, в том числе перед климаксом. Менструации ранние и обильные. Неукротимая рвота при беременности. Слишком сильные движения плода. Когда после аборта женщина поднимается, встает на ноги, кровотечение возобновляется. Молочные железы набухшие; соски красные. Жжение и зудящие прыщики вокруг сосков. Высыпания на молочных железах, сопровождающиеся возникновением ссадин, экскориаций.

**Дыхательные органы.** Одышка усиливается, когда пациент приподнимается и садится в постели, уменьшается, когда ложится и широко раскидывает руки. Ощущение, что за грудиной — язва. Кашель возобновляется каждую зиму. Сенная лихорадка (поллиноз) регулярно повторяется каждый год. Выделение кровянистой мокроты, в том числе с ощущением жара в груди. Кашель усиливается, когда пациент ложится, когда пьет. Боль из грудной клетки распространяется в плечо, усиливается от холодного питья.

**Сердце.** Бульканье в сердце усиливается, когда пациент ложится. Сердечные шумы, недостаточность митрального клапана. Перикардит. Пульс слабый, аритмичный.

**Спина.** Боль в пояснице усиливается, когда пациент стоит или ходит.

**Конечности.** Кажется, что суставы разболтаны, могут развалиться. Высыпания вокруг ногтей на пальцах рук. Жар и зуд в подошвах. Вонючий пот на стопах. Высыпания в области суставов затрудняют ходьбу.

**Кожа.** Кожа *грязная*; грубая; покрыта чешуйками; сальная; *трескается* в складках. Невыносимый зуд кожи — хуже от тепла постели; пациент расчесывает до крови или пока не сдерет кожу. Крапивница: хуже от напряжения. Разрастания на коже исчезают летом, чтобы вновь появиться только зимой. Постоянно рецидивирующий педикулез (вшивость). Кондиломы на границе кожи и слизистых оболочек. Увеличение желез (лимфатических узлов). Жирная кожа.

**Сон.** Сновидения яркие, продолжаются после пробуждения.

**Лихорадка.** Во время жара пот поднимается в виде пара. *Пациент потеет легко*, пот обильный, сильнее ночью; холодный пот на ладонях.

**Дополнительно.** Sep., SULPH., Tub.

**Диф. диагноз.** Graph., Mang., PHOS., Sulph.

## PTELEA

**Общее.** Это средство показано при заболеваниях печени и желудка.

Желудочные и печеночные симптомы сочетаются с болями, в том числе в конечностях. Горький привкус во рту, отрыжки либо горькие, либо напоминают тухлые яйца. Тупая боль и тяжесть в области печени, ухудшение происходит, когда пациент лежит на левом боку. Лучше, если съест что-нибудь кислое. Дыхание горячее, обжигает ноздри. Отеки стоп и голеней при болезнях печени.

Хуже. От сыра, мяса, пудингов.

## PULEX

Общее. Гомеопатический препарат из блохи обыкновенной показан при наличии выраженных симптомов со стороны мочевыделительных и женских половых органов. Пациент не может удерживать мочу, должен немедленно удовлетворить позыв на мочеиспускание. Пятна, которые оставляют на белье менструальная кровь и бели, очень трудно отстирать. Ощущение, как будто во влагалище находится ватный шарик.

**Хуже.** С левой стороны тела. При движении, когда шевелится.

**Лучше.** Присесть или прилечь.

**Психика.** Очень нетерпеливый, раздражительный.

**Глаза.** Кажется, что глаза увеличены.

**Лицо.** Сморщено, как у старика.

**Горло.** Ощущение, как будто нитка свисает в горле.

**Желудок.** Жажда, особенно при головной боли.

**Мочевыделительная система.** Внезапно мочеиспускание прекращается и возникает боль. Моча скудная, при этом возникают частые императивные позывы и давление в мочевом пузыре, а также тенезмы уретры.

**Женские половые органы.** Слюнотечение во время менструаций. Задержка менструации. Интенсивное жжение во влагалище.

**Лихорадка.** Все тело как будто пылает, словно его держат над паром. Пациент мерзнет, ощущает озноб возле камина, у огня.



## PULSATILLA

**Общее.** За ИЗМЕНЧИВОСТЬ СИМПТОМОВ И ИХ НЕПОСТОЯНСТВО Пульса-тилла называют "флюгером".

Она воздействует НА ПСИХИКУ, ВЕНЫ, СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ, дыхательные органы и преимущественно на одну сторону тела. Симптомы достигают определенного уровня, потом внезапно исчезают.

Это средство для женщин мягких, кротких, покладистых, полнокровных, которые легко плачут, в том числе, когда рассказывают о себе. Симптомы появляются с одной стороны тела или перемещаются в ту сторону, на которой пациентка лежит.

Характерны ОТСУТСТВИЕ ЖАЖДЫ, ЗЯБКОСТЬ И ОДЫШКА в сочетании с нарушениями менструального цикла или расстройствами пищеварения. Зябкость: при болях жгучих; колющих; в сочетании с онемением.

**СЕКРЕТ СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ОБИЛЬНЫЙ, НЕ РАЗДРАЖАЮЩИЙ (МЯГКИЙ), ГУСТОЙ; ЖЕЛТОВАТО-ЗЕЛЕНОВОГО ЦВЕТА.** Совершенно непонятные, изменчивые и противоречивые симптомы. Чередование симптомов. *Метастаз* — перемещение болезненного процесса в другой орган или систему организма. Кровотечения: пассивные; викарные; темной, быстро свертывающейся кровью. Венозный застой, варикозное расширение вен. *Ощущение тяжести.* Царапающие, дергающие, рвущие, язвенные боли; непостоянные, блуждающие боли. *Онемение:* частичное; в том числе кистей; стоп и т.д.; части тела, на которой пациентка лежит; больных частей тела.

Болезненные последствия **ПОДАВЛЕНИЯ** выделений из уха, менструаций, лохий, секреты молока и т.д. Последствия употребления в пищу мороженого; свинины, жирного; пирожных и печенья; смешанной диеты.

Пациентка мерзнет, но стремится на свежий воздух. Бледные зябкие блондинки. Анемия. "Не чувствовала себя здоровой с пубертатного возраста". Хорея из-за аменореи или дисменореи. Чем дольше пациент лежит утром в постели, тем дольше ему хочется лежать. *Не может лежать с низко опущенной головой.* Ребенок хочет, чтобы его медленно носили на руках. Симптомы, возникающие в дистальных отделах тела, вызывают одышку. Ощущение увеличения в размере части тела, словно эта часть или каждый орган стал значительно больше; в том числе при боли. Ощущение повязки. Когда женщина надевает фланелевую или шерстяную одежду, возникают зуд и высыпания на коже. Пульсатилла применяется для профилактики кори. Эпилепсия в случаях, когда менструации отсутствуют или нерегулярные. Исхудание отдельных частей тела. Пульсация во всем теле.

**Хуже.** ОТ ТЕПЛА, ОТ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА; В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ; от теплой одежды; ОТ ТЕПЛА ПОСТЕЛИ. Если промочит ноги. ВЕЧЕРОМ. В ПОКОЕ. В НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ. ЛЕЖА; когда лежит на одном боку (левом). ОТ ЕДЫ; спустя много времени после еды; ОТ СЫГННОЙ, ОБИЛЬНОЙ ЕДЫ, от жирного, от мороженого, от яиц. В ПУБЕРТАТНОМ ВОЗРАСТЕ. ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ. Перед менструациями. От применения препаратов железа. После лечения хинином. Если конечности свисают вниз. От чая. Из-за грозы. От солнца. В сумерках.

**Лучше.** ОТ ХОЛОДА; ОТ СВЕЖЕГО ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА; НА ОТКРЫТОМ ХОЛОДНОМ ВОЗДУХЕ (НА УЛИЦЕ); от холодной пищи, питья. Если раскроется, сбросит одеяло. От спокойного движения. ВЫПРЯМИВШИСЬ. От продолжительного движения. После *piapa*, после того, как наплачется. Перевернуться с боку на бок. От давления. От растирания. Лежа с высоко расположенной головой.

**Психика.** МЯГКАЯ. РОБКАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ И СЛЕЗЛИВАЯ ПАЦИЕНТКА [или пациент — Н.Л.]. Недовольна всем. Обескуражена. Легко обижается. Плаксивая, хнычет. Страстно желает сочувствия, симпатии. Дети поднимают шум, волнуются из-за пустяков, любят, чтобы их ласкали. Патологический страх противоположного пола; замужества; считает, что секс греховен. Впадает в крайности в переживании удовольствия и боли. Легко довести до слез и рассмешить; после еды.

Религиозная меланхолия. Страхи: боится быть одна, темноты, призраков вечером; поэтому хочет спрятаться или убежать. Капризная. Скупая. Подозрительная. Очень раздражительная, обидчивая; пациентке кажется, что ею пренебрегают или боится, что станут относиться пренебрежительно. Отвечает "да" или "нет", кивая или качая головой. Воображает, что определенные пищевые продукты людям вредно есть. Печаль после неприятных известий. Маниакальное состояние при подавлении менструации.

**Голова.** Головная боль: из-за переутомления; из-за подавления сексуального возбуждения; при расстройстве пищеварения; она начинается с боли в темени. Боль в затылке усиливается при кашле. Боль в одной половине головы (гемикрания): пульсирующая, распирающая (как будто голова может взорваться, лопнуть); сопровождается слезотечением на больной стороне, слезы как кипятки.

Головокружение: усиливается сидя; при взгляде вверх; возникает при нарушении деятельности желудка или менструального цикла; перед менструацией, во время нее, после нее или при ее подавлении. Обильный пот на волосистой части головы. Головная боль у школьниц в период полового созревания. Головная боль уменьшается при ходьбе на открытом воздухе. Голова кажется тяжелой, пациентка не может держать ее прямо, не может ее поднять.

**Глаза.** Неясное зрение сопровождается ощущением, как будто что-то застилает глаза: хочется протереть глаза; хуже от ветра. Густые, желтые, обильные, не раздражающие (мягкие) выделения. Воспаление глаз: у новорожденных; в том числе гонорейное; при аменорее. Слезная фистула (свищ): при надавливании выделяется гной. Едкие слезы. Ячмени, в том числе рецидивирующие. Блефарит. Конъюнктивит при простуде. Приступы

пообразная потеря зрения перед менструацией. Слепота (амавроз) при параличе зрительного нерва. Зуд, жжение в глазах, пациент трет глаза. Слезающиеся глаза.

**Уши.** Боль в ушах усиливается ночью. Глухота с ощущением, что уши заложены; лучше слышит в автомобиле; а также в теплом помещении. Выделения из уха гнойные, кровянистые; в виде густой, желтой жидкости, зловонные; появляются после экзантемы.

Наружное ухо красное и опухшее, кажется, как будто что-то выпячивается из уха. Свинка (паротит), особенно при наличии метастаза заболевания в молочные железы или яички. Опухшие мочки ушей.

**Нос.** Обоняние отсутствует при катаре (рините). Зловонные выделения из носа или запах в носу. Насморк: он сопровождается заложенностью носа; хуже, когда пациент ложится или в помещении; лучше выйти на открытый воздух (на улицу). Зеленые, оранжевые, зловонные, с запахом мочи выделения из носа; хронические желтые, не раздражающие (мягкие) выделения из носа. Носовое кровотечение перед менструацией, во время нее или при подавлении менструаций.

**Лицо.** Бледное. Лицевая невралгия сопровождается обильным слезотечением; усиливается при жевании, разговоре или когда во рту что-нибудь горячее или холодное. Губы потрескавшиеся; шелушатся; опухшие. Пациентка *облизывает губы. Трещина посередине нижней губы.* Угревая сыпь у юных девушек.

**Рот.** Дыхание зловонное. *Во рту сухость или скопление слизи; не сопровождающиеся жаждой.* Тянувшая зубная боль — лучше от холода. *Плохой привкус во рту в первой половине суток (до полудня);* не чувствует вкус при насморке; жирный привкус, привкус крови; сладкий; попеременно то один, то другой. Язык: желто-белый; кажется ошпаренным. Обильная сладкая слюна. После еды остается привкус во рту ("послевкусие"). Горький привкус, особенно у хлеба. Понижено восприятие вкуса всей пищи. Слюна вязкая, пенистая, как вата.

**Горло.** *Пища застревает в горле.* Сухость; боли в горле (ангина) с ощущением, что не может глотать. Ощущение, как будто червь извивается в горле и ползет вверх. Когда кашляет, возникает ощущение, что в горло попали пары серы.

**Желудок.** *Отвращение к воде, жирному, свинине, хлебу, молоку, курению, теплой пище или питью.* Страстное желание: кислого или такой еды, от которой будет плохо, например, освежающих продуктов, острых, пикантных блюд, селедки, сыра. Пища кажется слишком соленой. От лука становится плохо. Внезапное отвращение к пище; хуже от еды.

Отрыжки с привкусом пищи в течение продолжительного времени. Тошнота. Изжога. *Жажда отсутствует* почти при всех заболеваниях.

Рвота пищей, съеденной давно. Видимая пульсация под ложечкой. Колющая боль усиливается при ходьбе или когда пациент оступается. *Тяжесть в желудке, как будто там лежит камень. РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА; ОН КАЖЕТСЯ ТЯЖЕЛЫМ.* Икота при курении табака. Испытывает чувство голода; но не знает, чего хочет.

**Живот.** Рези; пульсация в эпигастрии. Болезненный, вздутый живот; громкое урчание. Давление в животе, как от камня. Чувство онемения. Боль распространяется в паховые области. Стул: изменчивый, не бывает одинакового стула; зеленый, желчный стул; ухудшение после полуночи. Ежедневно по два или три раза может выделяться нормальный стул. Плотные, болезненные комки в обеих паховых областях. Внутренний геморрой: хуже в связи с менструацией, когда ложится. Понос при желтухе, сопровождающийся ощущением жара. Выделение крови из прямой кишки, даже не во время стула. Понос после испуга.

**Мочевыделительная система.** *Мочеиспускание:* происходит непроизвольно после того, как пациент ляжет, при смехе, кашле; при чихании; если услышит внезапный шум; после приятной неожиданности, сюрприза; при потрясении (шоке); при отхождении кишечных газов; во время сна (особенно у маленьких девочек). Кровотечение после мочеиспускания. Ощущение сильного давления или судороги в мочевом пузыре после мочеиспускания. Ощущение, как будто в мочевом пузыре перекачивается камень. Моча подтекает, выделяется по капле, когда пациент гневается. Императивный позыв на мочеиспускание, когда пациент лежит на спине. Сужение (стриктура) уретры: моча вытекает по каплям или струя мочи прерывается.

**Мужские половые органы.** Жжение распространяется вниз по ходу левого семенного канатика. Острый простатит; увеличение простаты. Орхит: гонорейный или после того, как посидел на холодных камнях. Эпидидимит. Яички низко свисают. Кровянистая сперма. Густые желтые выделения на последней стадии гонореи.

**Женские половые органы.** *Аменорея:* после того, как промочила ноги; из-за нервного истощения или при анемии. *Пациентка чувствует себя так, как если бы у нее были менструации.* Менструации: сопровождаются выделением *темной, густой крови; они СЛИШКОМ ПОЗДНИЕ; СКУДНЫЕ* после купания; кровь со сгустками, менструации изменчивые, прерывистые, *нерегулярные*, викарные; наступление их в пубертатном возрасте *ЗАПАЗДЫВАЕТ.* Дисменорея. Бели: как молоко, густые, как сливки, сопровождающиеся болью в спине и упадком сил, едкие.

Неправильное положение плода. Слабые родовые схватки. Ощущение давления на низ усиливается в положении лежа. Послеродовые схватки слишком продолжительные и слишком сильные. Послеродовые вторичные кровотечения вследствие задержки плаценты.

Молочные железы: болезненные; в них ощущается тупая боль; образуются уплотнения; в том числе у девочек до наступления полового созревания. *Секреция молока подавлена, скудная.* Женщина плачет каждый раз, когда прикладывает ребенка к груди. Набухание молочных желез после отнятия ребенка от груди. Галакторея. Секреция молока во время менструации.

**Дыхательные органы.** *ОДЫШКА* усиливается, когда пациент лежит на левом боку; ощущение удушья, когда ложится; хуже если разогрется, на открытом воздухе. Кашель: влажный утром, сухой — вечером и ночью; *при кашле должен подняться и сесть в постели*, чтобы стало легче. *Мокрота* густая, гнойная, слизистая; сладкая, солоноватая, горькая на вкус. Кашель сухой, отрывистый (покашливание); возникает из-за ощущения щекотания в эпигастрии. *Стеснение в груди:* как будто груз давит. Болезненность или колотье ниже ключиц. Охриплость появляется и проходит. Астма из-за подавления симптомов. Кашель после кори.

**Сердце.** Сердцебиение: оно усиливается, когда пациент лежит на левом боку, сопровождается тревогой; возникает при аменорее; из-за переживаний, эмоций; после обеда. Боль в сердце, как будто его схватили, защемили, сопровождается одышкой; уменьшается, если придавить руку к груди и при ходьбе.

**Спина.** Ощущение, как будто на спину вылили холодную воду. Боль в спине и пояснице, как будто пациентка долго стояла наклонившись. Искривление в верхней части позвоночника. Стреляющая боль в задней части шеи и спине. Боль в спине усиливается, когда пациентка лежит на спине; уменьшается, когда ложится на бок или изменяет положение тела, особенно во время беременности. Ощущение, что спина перебинтована, как будто наложена повязка. Когда пациент сидит, появляется боль в крестце.

**Конечности.** Быстро меняющие локализацию боли в конечностях. Кажется, что руки сломаны и вывихнуты. Онемение локтей. *Суставы опухшие*, красные. Тыльная поверхность стопы опухшая, отечная. Боли распространяются вниз вдоль ног, возникая попеременно то с одной стороны, то с другой. Тяжесть в голени. Колющие боли в большеберцовой кости усиливаются лежа, уменьшаются от прохладного воздуха и при ходьбе. Холодный пот на голени. Зловонный пот на стопах. *Венозный застой, варикозное расширение вен*, болезненность вен. Послеродовой тромбоз (белый болевой флебит). Периостит. Туберкулезное воспаление коленного сустава. Склонность вытягивать стопы. Когда приходится долго стоять, возникает онемение голени.

**Кожа.** Опухание желез (лимфатических узлов). Язвы: окружены плотным, красным блестящим ободком. Варикозное расширение вен. Зуд кожи, возникающий после того, как пациент согрется, от жары. Крапивница: после обильной сытной еды; сопровождается поносом; возникает из-за задержки менструации, после того, как пациентка разденется. Корь.

**Сон.** Сильная сонливость в дневное время, *при пробуждении* — спутанное сознание; после сна — вялость, сон не освежает. Положение во сне: руки лежат выше головы или скрещены на животе, а ноги поджаты.

Сновидения: страшные, отвратительные, сладострастные, бессвязные; видит кошек во сне и т.д. Бормочет, болтает во сне. Разговаривает, хнычет или кричит во сне.

**Лихорадка.** Пациент *зябкий, мерзнет, но испытывает отвращение к жару, теплу; в том числе когда находится в ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ*; а также *при боли*, когда ложится в постель ночью. Одностороннее похолодание тела в сочетании с онемением. Боли ощущаются во время потоотделения. Одна кисть холодная. Потеет часть тела. Пациентку лихорадит, она ощущает жар, но температура тела нормальная. Непредсказуемое повышение температуры при лихорадке.

**Дополнительно.** ARS., Kali-bi., Sep., Sil., ZINC.

**Диф. диагноз.** Apis, Cimic, Graph., Ham., Kali-bi., Kali-s., Nat-s.

## PYROGEN

**Общее.** Этот нозод готовят из гнилой постной говядины, которая в течение двух недель находилась на солнце, или из разлагающегося (септического) гноя. Следовательно Пирогениум — это средство для лечения любых *септических заболеваний*, когда происходит разложение *КРОВИ, сердце становится слабым, возникает мышечная слабость. Тупые боли, ОЩУЩЕНИЕ РАЗБИТОСТИ, КАК ПОСЛЕ ПОБОВ, БОЛЕЗНЕННОСТИ ТЕЛА и упадка сил* все-таки сопровождаются двигательным беспокойством.

*Ужасно зловонные — выделения*, привкус во рту, запах от тела, запах менструальной крови, пота, рвотных масс и т.д. *Розово-красные полосы* на теле; лимфангит. *Боли в костях. Абсцессы:* рецидивирующие; сопровождающиеся болью и сильным жжением.

Хронические болезни, берущие начало от септического заболевания; распадающиеся раны; отравление метаном (канализационным газом); отравление птомаином; послеродовой сепсис; последствия выкидыша; отдаленные последствия тифа; дифтерия, хроническая малярия — в случаях, когда тщательно подобранное средство не приводит к улучшению состояния или выздоровлению, особенно когда имеется латентно текущий нагноительный процесс.

**Хуже.** От холода, сырости. От движения. Сидя. Когда двигает глазами.

**Лучше.** От жары. *От горячей ванны*, горячего питья. От давления. Вытянуться, потянуться. Переменить положение тела. Когда сильно раскачивают. При ходьбе.

**Психика.** Мозг активен: пациент произносит речи и пишет статьи - *ночью. Болтливый*; думает и говорит быстрее, чем когда-либо прежде. У пациентки появляется ощущение, что ее тело покрывает всю постель. Когда лежит на одном боку, то кажется себе одним человеком, когда переворачивается на другой бок — другим человеком. Пациент *чувствительный*, тревожный; спутанность сознания. У пациента ощущение, что он удвоен, что у него много рук и ног. Галлюцинации: видит себя очень богатым. Полон тревоги и безумных намерений. Постель кажется твердой. Пациентка разговаривает или шепчется сама с собой; в том числе во сне.

**Голова.** Безболезненная пульсация. Жесточая пульсирующая головная боль уменьшается, если повязать голову. Катает голову по подушке из стороны в сторону. Ощущение, как будто на голове шапка. Холодный пот на лбу.

**Глаза.** Болезненность глазных яблок (слева) усиливается, когда пациент смотрит вверх и двигает глазами. Светобоязнь.

**Уши.** Красные; холодные. Звон в ушах, как будто звонит колокол.

**Нос.** Холодный. Веерообразные движения крыльев носа. Пациент испытывает отвращение к запаху собственного тела. Чихает каждый раз, когда высовывает руку из-под одеяла.

**Лицо.** Приливы сильного жара (гектическая лихорадка) возникают днем, с 15 до 16 ч; продолжаются до полуночи; затем лицо покрывается крупными каплями холодного пота.

**Рот.** Огненно-красный; коричневая полоса посредине языка. Язык гладкий, большой, дряблый. Привкус во рту сладковатый; ужасно зловонный. Ужасно зловонное дыхание.

**Горло.** Сухость в горле. Дифтерия, крайне зловонный запах изо рта.

**Желудок.** Рвота: постоянная; коричневатыми массами, кофейной гущей; зловонная, каловая — при каловом завале или обструкции кишечника (при обтурационной, механической непроходимости). После того, как выпитая вода согревается в желудке, ее вырывает. Тошнота уменьшается от очень горячего питья; а также от рвоты. Сильная жажда, пьет холодные напитки маленькими глотками, но самое незначительное количество жидкости немедленно извергается наружу.

**Живот.** Ужасно зловонный, коричнево-черный, безболезненный непроизвольный стул. Запор при полной бездеятельности кишечника. Стул толстый, черный; в виде мелких черных шариков; крайне зловонный.

**Мочевыделительная система.** Липкий, красный, известковый осадок. Мочеиспускание происходит два раза в день; скудная моча. Императивные позывы на мочеиспускание перед лихорадкой. Моча светлая, как вода. Тенезмы мочевого пузыря и прямой кишки.

**Мужские половые органы.** Яички свисают вниз, расслаблены; мошонка кажется тонкой, что подтверждается при осмотре.

**Женские половые органы.** Лихорадка каждый раз во время менструации. Менструальные выделения ужасно зловонные. Параметрит. Выпадение матки; лучше, когда удерживает голову и тужится. После подавления лохий возникает повышение температуры, озноб и обильный вонючий пот. Септические послеродовые заболевания. Боли в области левого соска.

**Дыхательные органы.** Боль в легком (правом) усиливается при кашле, разговоре. Запущенная пневмония. Кашель уменьшается сидя, усиливается, когда пациент ложится.

**Сердце.** Симптом "кошачьего мурлыканья" (дрожание грудной клетки). Кажется, что сердце устало, что оно большое, или *переполнено*. Пациент ощущает свое сердце. Пульсация, которая ощущается в голове и в ушах, мешает спать. **УЧАЩЕНИЕ ПУЛЬСА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ. ИЛИ НАОБОРОТ.** Угроза сердечной недостаточности при септических и инфекционных заболеваниях.

**Шея и спина.** Пульсация сосудов шеи. Чувство слабости в спине.

**Конечности.** Тупые боли (ломота) во всех конечностях и в костях. Кажется, что ногти болтаются, отстают от пальцев; не исключено, что они в самом деле отпадут. Автоматические движения руки и ноги (справа). Боль в плече (справа); хуже при кашле, разговоре.

**Кожа.** Бледная. Холодная. Упорное, трудноизлечимое варикозное расширение вен. Зловонные язвы у стариков. Быстро прогрессирующие пролежни септического происхождения. Маленький порез или рана сильно опухает и воспаляется.

**Сон.** Шепчет во сне. Бессонница из-за повышенной активности мозга.

**Лихорадка.** Пациент зябкий, мерзнет, хочет сидеть у самого огня (у печи, камина) и ощущать раскаленный воздух. Озноб начинается между лопатками; *ощущается в костях*; сопровождается потоотделением; возникает ночью. Медленно прогрессирующая гектическая лихорадка. Потоотделение, не приносящее облегчения. Холодный; горячий пот. **Частые перепады температуры тела.**

**Диф. диагноз.** Anthr., Ars., Bact., Echi.

## RADIUM

**Общее.** Гомеопатическое средство Радий бромид эффективен при кожных болезнях; ревматизме и подагре; при поражении нервов, которые характеризуются *внезапными, меняющими локализацию* или как разряды электричества болями; пациент бывает вынужден лечь.

*Тупые боли, сильная ломота повсюду; в том числе, в глубине суставов;* сильное двигательное беспокойство, пациент вынужден постоянно двигаться, ходить. *Ощущение сухого, жгучего жара*, как будто все тело в огне; страстно хочется прохладного воздуха. Как будто электрический разряд пронзает все тело во время сна. Слабость, апатия, усталость. Симптомы появляются поздно. *Ощущение сжатия* в грудной клетке, в сердце и т.д.; сопровождающееся нехваткой воздуха. Онемение усиливается, когда пациент потягивается, выпрямляется. Некроз ткани.

Последствия рентгенотерапии, ожоги рентгеновскими лучами. Препарат лечит мелкие родинки (невусы), бородавки, язвы. Рак. *Болезни лимфоидной ткани.*

**Хуже.** *От движения. От бритья.* От умывания. От курения. Когда поднимается, встает.

**Лучше.** На открытом воздухе. *От горячей ванны.* От холодного питья. От продолжительного движения. После сна. От давления. От еды.

**Психика.** Боится быть один; страх темноты; пациент хочет, чтобы кто-нибудь был рядом. Своенравный, несговорчивый. Легко раздражается, сердится.

**Голова.** Боль над правым глазом, распространяющаяся назад, в затылок и в темя; лучше от жара, тепла. Головокружение при боли в затылке. Боль в темени и в затылке в сочетании с сильной тупой болью, ломотой в поясничной области.

**Глаза.** Глаза красные, в них ощущается жгучая боль; хуже от чтения.

Ощущение, как будто в глазах — кусочки ваты; лучше потереть глаза.

**Уши.** Звук стремительно несущегося потока воды в ушах; лучше лечь лицом вниз.

**Нос.** Зуд и сухость в полости носа. Жжение в носу.

**Лицо.** Прилив крови к лицу, румяное лицо. Тупая боль в области угла нижней челюсти справа. Жесткая невралгия тройничного нерва. Розовые угри.

**Рот.** Сухость во рту. Дыхание кажется горячим. Металлический привкус во рту. Покалывание в кончике языка.

**Горло.** Боли в горле (ангина), саднение в сочетании с болью в ухе. В горле ощущение, как будто после жгучего перца.

**Желудок.** Страстное желание свинины. Отвращение к сладкому; к мороженому, которое пациентка прежде очень любила. Привычная пища не доставляет удовольствия; нравятся кислые продукты.

**Живот.** Чередование симптомов со стороны живота, грудной клетки и ушей. Тошнота уменьшается от еды. Колики уменьшаются, когда пациент сгибается пополам или после стула. Болезненность и выпадение прямой кишки. Стул бывает в полдень; мягкий, темный или зловонный, синевато-серый.

**Мочевыделительная система.** Дизурия, затем — эрекция. Нефрит при ревматизме.

**Мужские половые органы.** Экзема полового члена и внутренней поверхности бедер. Зуд.

**Женские половые органы.** Тупые боли над лбом во время менструации. Болезненность правой молочной железы; лучше от сильного растирания. *Зуд половых органов.* Менструация продолжается один день; затем появляются кровянистые бели. Маточное кровотечение, когда /р. не помогает. Лохии гнилостные, скудные или подавлены. Бели: белого цвета и скудные; как свернувшееся молоко, творожистые, как сыр.

**Дыхательные органы.** Постоянный кашель из-за щекотания в яремной ямке; хуже лежа, от курения; лучше от еды и на открытом воздухе; лучше, когда поднимается и садится в постели; делает физические упражнения. Напряжение, ощущение сжатия в груди; пациентке кажется, что она не может достаточно глубоко вдохнуть. Боль в груди чередуется с расстройством пищеварения и ощущением заложенности.

**Сердце.** Ощущение сжатия сердца. Пациент просыпается от сердцебиения. Пульс частый, аритмичный, трепещущий. Низкое кровяное давление.

**Шея и спина.** Боль и ощущение слабости в шейных позвонках; хуже, когда роняет голову вперед, на грудь; лучше, если стоит и сидит выпрямившись. Слабость между лопатками. Боль в пояснице, распространяющаяся вверх; лучше от физических упражнений, ходьбы. Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника; *лучше* от горячей ванны, хуже при подъеме по лестнице.

**Конечности.** Боль в глубине суставов; в том числе коленных и голеностопных. Конечности кажутся твердыми и хрупкими, как будто могут сломаться. Ревматическое поражение суставов кистей. Конечности холодные. Не меют.

**Кожа.** *Легко возникает раздражение кожи; кожа толстая; ощущается жжение; зуд кожи;* мокнутие после расчесывания; симптомы сильнее выражены на коже лица и половых органов. Отрубевидные чешуйки. Чешуйки на коже, в том числе на ушах. Экзема. Псориаз. Склеродерма. Мозоли. Рак. Дерматит.

**Сон.** Пациент просыпается с одышкой, тяжело дыша; с сердцебиением. Сновидения яркие: видит огонь; сны кажутся реальностью.

**Лихорадка.** Ощущение внутреннего холода, пациент стучит зубами.

**Диф. диагноз.** PHOS., Puls., RHUS-R.

## **RANUNCULUS BULBOSUS**

**Общее.** Это средство показано *при болях*, возникающих при поражении *НЕРВОВ, мышц, глаз, серозных оболочек, ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, кожи*, пальцев на руках и ногах и в целом — левой стороны тела.

**БОЛИ** колющие, пронзающие (как от ножа), стреляющие; боли доводят до слез, сопровождаются содроганием тела; пациент не может найти удобное положение. Жжение; щиплющая, едкая боль; *болезненность, как от ушиба или как от глубокой язвы. Болезненные участки на теле.* Невралгия. Внезапная слабость и потеря сознания (обморок). Пациент дрожит; в том числе от гнева. Ощущение растягивания, расширения, вздутия. Чувствительность к воздействию воздуха и к прикосновению. Жжение на маленьких участках; из-за сидячего образа жизни. Ощущение ударов, толчков, проходящих через все тело. Хроническая невралгия седалищного нерва — ишиас.

Болезненные последствия употребления алкоголя, травмы; испуга, огорчения. Это слабые и нетвердо стоящие на ногах пациенты, длительно употребляющие виски, коньяк и другие алкогольные стимуляторы. Эпилепсия, в том числе у пьяниц. Ощущение, как будто на теле холодная, мокрая одежда, в особенности на груди; хуже, когда выходит на холодный воздух.

**Хуже.** От **ВОЗДУХА** — сырого; холодного; на открытом воздухе; от сквозняков. *При перемене:* температуры воздуха, положения тела. От алкоголя. *От движения, в том числе от движения рук.* При дыхании. От прикосновения. От еды. От испуга, неприятностей, огорчений, гнева. В дождливую и ветреную погоду (в бурю). Стоя.

**Лучше.** Стоя. Сидя согнувшись, наклонясь вперед.

**Психика.** Сильный страх призраков, привидений вечером, не решится остаться один. Вздорный, ссорится. Упадок духа, депрессия и желание умереть. Белая горячка (алкогольный делирий), сопровождающаяся икотой.

**Голова.** Голова кажется слишком большой и раздутой. Тупая боль во лбу и в темени с ощущением, что голову раздавит на части; боль сопровождается тошнотой и сонливостью. Ощущение ползания мурашек на волосистой части головы. Тик (справа) распространяется в ухо.

**Глаза.** Едкая, жгучая боль, как от дыма. Болезненность в глазных яблоках при движении. Дневная и ночная слепота. Герпетические высыпания на роговице, сопровождающиеся сильной болью, светобоязнью и слезотечением. Гемипопия (половинное зрение), в том числе во время беременности. Жжение в веках.

**Нос.** Ощущение ползания мурашек и пощипывания в ноздрах, в задних отделах носа; пациент пытается откашляться и высморкаться.

**Рот.** Ощущение ползания мурашек на нёбе; хочется его почесать. Судороги, спазмы в губах. Повышенное слюноотделение. Сливочное масло кажется сладким.

**Горло.** Царапает, скребет, жжет вдоль горла сверху вниз.

**Желудок.** Судорожная икота, в том числе у пьяниц.

**Живот.** Ощущение болезненности, как от ушиба, в подреберьях. Чувствительность к давлению. Щемящая боль в животе при колике; она чередуется с болями в груди. Желтуха; зуд тела, особенно ладоней.

**Дыхательные органы.** Тревожное, стесненное дыхание; сопровождается желанием сделать глубокий вдох. Одышка от гнева. Мелкие болезненные участки, как будто на грудной клетке под кожей — язвы. **ОСТРЫЕ, РЕЖУЩИЕ, КОЛЮЩИЕ БОЛИ** в грудной клетке; в том числе с двух сторон. Ощущение холода в груди возникает, когда пациент идет по улице — на открытом воздухе; когда вдыхает холодный воздух. Плевральные боли (плевродиния). Плеврит; спайки после межреберной невралгии.

**Спина.** Мышечная боль вдоль внутреннего края левой лопатки, возникающая из-за того, что пациент сидит согнувшись; из-за шитья; из-за работы на пишущей машинке, из-за игры на фортепьяно; боль распространяется дальше через нижние отделы грудной клетки слева. Лопатка "прирастает", плотно прилежит к грудной клетке. Мышцы шеи спастически сокращены, ригидны — пациент может говорить лишь поднимая и опуская плечи.

**Конечности.** Ощущение ползания мурашек и пощипывания в пальцах рук. Зуд ладоней. Внезапное спастическое подергивание, колющая боль в предплечье (справа) при письме. Боль в пятках, как будто их сдавила обувь.

**Кожа.** **СИНЕВАТЫЕ ПУЗЫРЬКИ (ВЕЗИКУЛЫ).** Жжение и интенсивный зуд усиливаются от прикосновения. Опоясывающий лишай. Пузырчатка (пемфигус). Ороговевшие чешуйки. Разъедающий, гниlostный гной. Плоские язвы, сопровождающиеся жжением и жалящей болью. Мозоли: жгучая боль и жжение усиливаются от прикосновения.

**Лихорадка.** *Зябкость, чувство холода* усиливается на открытом воздухе.

**Диф. диагноз.** Canth., Rhus-t.

## RANUNCULUS SCCELERATUS

**Общее.** Это растение оказывает более разъедающее и раздражающее действие, чем описанный выше *Ran-b.*: оно вызывает *саднение, жжение, смешанное с ощущением жгучей боли, едкие, грызущие или сверлящие боли*. В особенности поражаются **ОРГАНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, кожа**; теменная область и правая сторона тела. Боли вызывают обморочное состояние или одышку. Пациент чувствует болезненность во всем теле. Периодические симптомы. Судорожное подергивание. Ощущение, как от пробки.

Хуже. От движения. Вечером. От глубокого дыхания. От прикосновения. Если конечности свисают вниз. После полуночи.

**Лучше.** После полуночи — боли.

**Психика.** Леность, вялость и отвращение к умственному труду.

**Голова.** Грызущая боль на маленьких участках в темени; либо в височной области — с одной или с другой стороны. Щиплет, чешется кожа волосяной части головы.

**Нос.** Насморк: жидкие, текучие выделения и чихание; это сопровождается жжением при мочеиспускании.

**Лицо.** Как будто лицо покрыто паутиной.

**Рот.** Зубы кажутся тупыми, в том числе при зубной боли. Географический язык. Жжение и саднение на языке; отдельные участки на языке как будто лишены слизистой оболочки, голые. Язык трескается, слизистая его отслаивается.

**Горло.** Жжение, царапанье в горле.

**Желудок.** Тошнота усиливается после полуночи. Боль сопровождается обморочным состоянием.

**Живот.** Ощущение пробки позади пупка. Боль в области печени, как будто будет понос.

**Дыхательные органы.** *Колотье в мышцах грудной клетки*; грудная клетка и грудина чувствительны к прикосновению. Ощущение, как будто пробка вставлена между ребрами; хуже от глубокого дыхания. Болезненное жжение за грудиной.

**Сердце.** Ощущение, как будто пробка в сердце.

**Конечности.** Подагра с поражением пальцев на руках и ногах. Грызущая боль в колене; в левой ладони. Мозоли с ощущением болезненного жжения; хуже, когда пациент свешивает ноги вниз. Внезапное колотье в больших пальцах ног, переходящее в жжение.

**Кожа.** *Желтые пузырьки. Буллы* (крупные волдыри); с едким содержимым. Пузырчатка (пемфигус).

**Сон.** Страшные сновидения; видит мертвецов, змей и драки, сражения.

**Диф. диагноз.** Ars., Arum-t.

## RAPHANUS

**Общее.** Дикая редька вызывает симптомы истерии, другие психические, а также маточные симптомы.

Онемение, меняющее локализацию. Ощущение шара, комка: как будто горячий шар поднимается из матки к горлу. Задержка жидкости: пациент выпивает больше, чем выделяет при мочеиспускании. Кишечные газы не отходят: ни вверх, ни вниз; болезненное вздутие живота после хирургической операции.

Нимфомания с отвращением к представительницам своего пола и к детям, особенно к девочкам. Бессонница на сексуальной почве.

Рвота каловыми массами. Одна стопа холодная. Эпилепсия, возникшая рефлекторно после обрезания приросшей крайней плоти; после операции заживление происходило с трудом из-за жесточайшего приапизма. Моча густая, как молоко.

## RATANHIA

**Общее.** Ярко выражены *симптомы, относящиеся к анусу и прямой кишке*; кроме того, возникает поражение *зубов и сосков*.

Боли в разных местах — то там, то здесь. *Ощущение сжатия. Кровотечения*; пассивные. Острицы. Пациенты темные, худые, костлявые. *Трещины*, в том числе *глубокие*.

Ратания действует как тонизирующее средство на нежных и нервных женщин при необходимости предупредить выкидыш в случаях, когда не удавалось ни разу выносить беременность до конца.

**Хуже.** Ночью. Из-за тревоги, когда беспокойно на душе. От напряжения. От прикосновения. Если тужится во время стула.

**Лучше.** От купания в прохладной воде. От горячей ванны. От ходьбы на открытом воздухе. От физических упражнений.

**Психика.** Раздражительный, сварливый и вздорный пациент.

**Голова.** Боли в середине лба с ощущением, как будто мозг выпадет из головы. Распирающая головная боль возникает, когда пациент тужится во время стула или после стула.

**Глаза.** Кажется, что веки одеревенели, неподвижные. Очень быстрое подергивание век. Птеригий (крыловидная плева на роговой оболочке).

**Рот.** Ощущение, как будто прохладный воздух дует из зубов. Зубная боль усиливается ночью; пациент вынужден прохаживаться. Ощущение паутины с правой стороны рта.

**Желудок.** *Режущие* или стискивающие, сжимающие боли — лучше от отрыжки. Жестокая болезненная икота.

**Живот.** *Сжатие или ощущение, как от острых осколков стекла, в прямой кишке;* приходится сильно тужиться, чтобы изгнать стул; после стула продолжительное время сохраняются *тупые боли (ломота) в сочетании со жжением;* лучше от горячей воды. Трещины заднего прохода, сопровождающиеся сильным сжатием и жжением, как от огня. Сухость и зуд в анусе.

Острицы. Аскариды. Выделение крови из заднего прохода во время стула или вне связи со стулом.

**Женские половые органы.** Метроррагия. При зубной боли беременная женщина вынуждена встать ночью с постели и ходить. Трещины сосков у женщин, кормящих грудью.

**Грудь.** Боль в ребрах возникает, когда пациент ступает на ногу, делает шаг.

**Диф. диагноз.** Nit-ac, Раеон.

## RHEUM

**Общее.** Ревень — это растение, из которого готовят гомеопатическое средство для лечения грудных детей и детей постарше, особенно в период прорезывания зубов; а также для лечения беременных женщин и кормящих матерей.

Реум воздействует на печень, двенадцатиперстную кишку, *желчные протоки* и кишечник. Резко выраженный *кислый* запах: весь ребенок пахнет кислым; после купания запах не исчезает. *Дети, страдающие спастическими болями (коликой),* они всегда плачут и *кричат*. Кислый привкус, кислый запах у рвотных масс, стула, пота и т.д. Трудное прорезывание зубов. Пациент очень мало спит и немного ест. Ощущение потрескивания, хруста.

**Хуже.** *При прорезывании зубов.* От еды; в том числе от слив. Летом. У кормящих матерей. От движения. Перед стулом, после и во время него.

**Лучше.** От тепла. Закутавшись. Лежа согнувшись. В странной, причудливой позе.

**Психика.** *Нетерпеливый человек;* ребенок яростно требует разных вещей, плачет при этом, отказывается от своих самых любимых вещей. Страстно желает получить определенный предмет. Двигательное беспокойство; в том числе сопровождающееся плачем.

**Голова.** Потоотделение на волосистой части головы; волосы *влажные, совершенно мокрые (насквозь).*

**Глаза.** Слабеют, когда пациент пристально смотрит на какой-нибудь предмет. Судорожное подергивание век.

**Лицо.** Холодный пот на лице: особенно вокруг рта и носа; над верхней губой. Лоб наморщен. Подергивание мышц лица.

**Рот.** Отвратительная слизь во рту, в том числе после сна. Дыхание с кислым запахом. Слюнотечение; при колике или при поносе. Пища кажется горькой, даже сладкие продукты. Зубы кажутся холодными.

**Желудок.** Хочется разных продуктов, но пациент не может их есть. Отвращение к еде после первого кусочка. От слив и чернослива становится хуже. Пациенту требуется немного пищи.

**Живот.** Колика: ребенок кричит; ему становится лучше, когда он сгибается пополам; хуже, если раскрывается какая-нибудь часть тела. После такой колики возникает кашицеобразный, *кислый, коричневый, зеленый, с признаками брожения, слизистый* или едкий стул; хуже от употребления в пищу незрелых фруктов; хуже вечером. Тело содрогается, пробегает озноб во время стула. Понос возникает только при ходьбе. Желтуха после употребления незрелых фруктов; понос с белым стулом.

**Мочевыделительная система.** Жжение в мочевом пузыре и почке перед мочеиспусканием и во время него. Безрезультатный позыв на мочеиспускание перед стулом.

**Женские половые органы.** Симптомы со стороны мочевыделительной системы после аборта. Понос после родов. Молоко у кормящей грудью женщины желтое и горькое; ребенок отказывается от груди.

**Спина.** Скованность в крестце и в боках (в области крыльев таза), пациент не может ходить выпрямившись. Рези в поясничной области, хуже после стула.

**Конечности.** Та конечность, на которой лежит пациент, немеет, становится нечувствительной. Подергивание мышц рук, кистей и пальцев на руках. Ощущение бульканья в локтевом-суставе [вероятно, это ошибка оригинала и подразумевается "в коленном" -Н.Л.], начиная с подколенной ямки и — до пятки. Слабость, повышенная утомляемость в области запястья и коленного сустава после растяжения связок или вывихов.

**Сон.** Беспокойный сон; ребенок хнычет и плачет. Подергивание мышц лица и пальцев рук. Потребность в сне очень маленькая, пищи требуется также немного.

**Лихорадка.** Потоотделение на коже волосистой части головы, возле рта, носа; над верхней губой.

**Дополнительно.** Mag-c.

**Диф. диагноз.** Cham.



## RHODODENDRON

**Общее.** Это растение со светло-желтыми цветами из семейства вересковых применяется в гомеопатии для лечения подагры.

Оно воздействует на *ФИБРОЗНЫЕ ТКАНИ*; предплечье; нижнюю часть голени; на мелкие суставы; на кости; половые органы; нервы; на отдельные части тела.

Пациент *ЧУВСТВИТЕЛЕН К ВЕТРЕННОЙ ИЛИ СЫРОЙ ШТОРМОВОЙ ПОГОДЕ*, даже если он находится в помещении. Рододендрон показан нервным людям, которые боятся грома.

**Боли:** *рвущие, как удар молнии*, сверлящие, быстро меняющиеся, направленные сверху вниз боли; *паралитические*. Выраженная слабость после незначительного напряжения. Ощущение ползания мурашек; при потоотделении. Хорея перед бурей. Чередование симптомов. Ощущение волнообразного движения.

**Хуже.** *ПЕРЕД БУРЕЙ. В суровую, ветреную; холодную, сырую; переменчивую, пасмурную погоду. Ночью. В середине лета. От вина. В покое. От фруктов. От промокания. При простуде.*

**Лучше.** После начала бури. От жары: от солнечного тепла, когда светит солнце. От движения — сразу же. Закутать голову.

**Психика.** Спутанное сознание и отупение. Пациент забывает, о чем он говорит; пропускает целые слова, когда пишет. Страх грома у нервных людей. Отвращение к работе, своему бизнесу. Быстро пьянеет от вина.

**Голова.** Головная боль усиливается рано утром и уменьшается от еды. Пульсация в правой половине головы. Тянущее, рвущее ощущение под кожей волосистой части головы. Головокружение возникает, когда пациент лежит в постели, уменьшается при движении, при ходьбе. Волосы встают на голове дыбом, как будто наэлектризованные.

**Глаза.** Цилиарная невралгия — боль ощущается в орбите, глазном яблоке и голове; ухудшение наступает перед бурей. Ощущение жара в глазах при зрительной нагрузке. Ощущение, как будто раскаленные докрасна иголки пронзают глаза в направлении изнутри наружу.

**Уши.** Ощущение, как будто червяк в ухе. Глухота: снижение слуха возникает спустя продолжительное время после вставания с постели, то есть слух лучше утром. Шум в ушах появляется через несколько часов после того, как пациент встанет с постели. Шум в ушах при головокружении.

**Нос.** Ноздри закладывает по очереди; при этом наблюдаются жидкие выделения из носа; лучше на открытом воздухе.

**Лицо.** Лицевая невралгия: жестокие рвущие, дергающие боли, они уменьшаются от еды и тепла.

**Рот.** Зубная боль уменьшается от еды и тепла. Зубная боль прекращается внезапно; возобновляется через два или три часа.

**Желудок.** Ощущение сильного давления в желудке из-за холодных напитков. Желудок кажется полным от небольшого количества пищи. Рвота зеленой, горькой массой после питья холодной воды.

**Живот.** Колика: боли возле пупка. Боли распространяются из прямой кишки в половые органы. Кишечные газы ощущаются в спине. Понос возникает от фруктов; но он не вызывает слабости. Колющая боль, покалывание в селезенке при быстрой ходьбе. В животе ощущается волнообразное движение.

**Мочевыделительная система.** Частые позывы на мочеиспускание сопровождаются тянущей болью в области мочевого пузыря. Боль в уретре, как будто под кожей образовались язвы. Моча: обильная; зловонная, зеленоватая.

**Мужские половые органы.** *Тянущее ощущение из семенного канатика распространяется в направлении живота и бедер.* Яички опухшие, болезненные, подтянуты, кажется, что они раздавлены. Кажется, что головка полового члена раздавлена. Яички уплотнены; болят по очереди. Орхит. Зуд мошонки, она сморщена, потеет. Водянка яичка: встречается у мальчиков; в том числе с рождения.

**Женские половые органы.** Подавление менструаций. Лихорадка: сопровождается головной болью; появляется во время каждой менструации.

Серозные кисты влагалища. Жжение в области матки после родов чередуется с болью в конечностях, при этом пальцы на руках спастически согнуты.

**Дыхательные органы.** Ощущение в грудной клетке как при ушибе, растяжении связок. Пациент не может дышать и говорить из-за жестоких плевральных болей, спускающихся вниз по передней поверхности грудной клетки.

**Сердце.** Ощущение теплого волнообразного движения в сердце. Сильные удары сердца.

**Шея и спина.** Скованность в шее, в том числе в задней ее части. Боли в крестце усиливаются, когда пациент сидит.

**Конечности.** Ощущение, как будто запястье ушиблено, растянуты связки. В холодную погоду в руках ощущается тепло. Нижняя часть голени холодная, кожа сморщена, кажется, что голени онемели. Ощущение, что к стопам подвешен груз. Рвущая ревматическая боль во всех конечностях. Тянувшая, рвущая боль в надкостнице длинных костей. Ревматизм с ухудшением в жаркую погоду. Стопы холодные даже в теплом помещении, даже в постели. Боль в ахилловом сухожилии возникает, когда пациент ступает на ногу, делает шаг.

**Сон.** Не может уснуть, пока не положит ногу на ногу. Просыпается, словно его позвали по имени, окликнули.

**Лихорадка.** Ощущение ползания мурашек и зуд кожи при потоотделении.

**Диф. диагноз.** Rhus-t.

## **RHUS TOXICODENDRON**

**Общее.** Растение сумах ядовитый оказывает раздражающее действие *НА КОЖУ*, особенно лица, волосистой части головы, *половых органов*; оно поражает *фиброзную ткань*, связки и суставы, в результате чего появляются **ПРИЗНАКИ РЕВМАТИЗМА**. Оно также может вызвать появление признаков **ТИФОПОДОБНОЙ ЛИХОРАДКИ**.

Поражение **НЕРВОВ И СПИННОГО МОЗГА** приводит к возникновению **ПАРЕЗОВ**. **ЖЕЛЕЗЫ** опухшие, горячие, болезненные; они уплотнены; нагнаиваются. Симптомы возникают на левой стороне или перемещаются слева направо.

**БОЛИ РВУЩИЕ, СТРЕЛЯЮЩИЕ; КОЛЮЩИЕ; УСИЛИВАЮТСЯ НОЧЬЮ; ПАЦИЕНТ НЕ НАХОДИТ СЕБЕ ПОКОЯ** ни при каком положении тела. В органе или части тела ощущается болезненность, разбитость, как от ушиба, **СКОВАННОСТЬ**. Боли такие, будто мышцы, мясо отрывается от костей. Ощущение, как при вывихе. Подергивание мышц. Ощущение ползания мурашек. Онемение; в парализованных частях тела. Дрожание. Жжение, опухание и мертвенная бледность. Секрет слизистых оболочек *едкий; ржаво-красного цвета, как мясные помои; с затхлым запахом*; способствует возникновению высыпаний.

Инфекционные болезни; септицемия, карбункулы на ранней стадии. Воспаление подкожной клетчатки. Воспаление и распухание длинных костей; ощущение, что по надкостнице скребут, царапают ее, в ней чувствуется грызущая боль, ощущение, что надкостницу отрывают от кости. Ревматизм обостряется в холодное время года.

Осложнения после хирургических операций. Правосторонняя гемиплегия; ощущение, как будто возникло онемение. Детский паралич после пребывания на сыром холоде. Грипп. Оспа. Стриктуры после воспаления. Болезненность костных выступов. Паралич: после необычно сильного напряжения; после родов. Фурункулы, абсцессы.

**Хуже.** *ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЫРОСТИ, ХОЛОДА, а также сырого холодного воздуха, сквозняка, от охлаждения разгоряченного или вспотевшего тела. Когда раскрывается:* обнажает часть тела, голову и т.д. *В НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ. В ПОКОЕ. ПЕРЕД БУРЕЙ. ОТ РАСТЯЖЕНИЯ (СВЯЗОК). От перенапряжения. После полуночи.* От удара; сотрясения тела. От езды. От напитков со льдом, очень холодного питья. С той стороны, на которой лежит пациент.

**Лучше.** *От продолжительного двиѣбная. ОТ ЖАРА. От горячей ванны; когда разогреется. От теплого укутывания. От растирания.* От носового кровотечения. Если придерживает больное место, живот, голову и т.д. Когда вытягивает конечности. Изменить положение тела. В сухую теплую погоду.

**Психика.** Тревога, печаль; беспомощность и глубокая депрессия, уныние. Бред (делирий) в мягкой форме при септической лихорадке: бессвязная речь, пациент отвечает правильно, но медленно, или торопливо, или неохотно. Склонен плакать, больше вечером; плачет, не зная почему; при этом хочет уединиться. Боится, что его отравят. Пресыщенность жизнью: мысли о самоубийстве, хочет утопиться. Забывчивый, не помнит самые свежие события. Страх усиливается ночью, пациент не может лежать в постели. *Спутанность сознания.* Пациент тревожится за своих детей.

**Голова.** Головокружение: у стариков; оно сопровождается ощущением вращения; после него возникает головная боль. Ощущение, что мозг разбит вдребезги, раздроблен или болтается; хуже от сотрясения тела. Ощущение, как будто доска прикреплена поперек лба. Отупляющая головная боль; должен лечь в постель; хуже от незначительного огорчения. Болезненно напряженная, ригидная кожа волосистой части головы; лучше, когда ложится на это место. Тяжелая голова.

**Глаза.** Боль за глазами; хуже от движения. Веки напряжены, как будто одеревенели; склеиваются; сухие; плотно сомкнуты. Когда пациент открывает глаза, сплошным потоком текут горячие слезы. Воспаление с образованием пустул. Конъюнктивит в виде валиков, мешочков (в виде "булыжной мостовой"). Светобоязнь. Ирит. Птоз. Паралич любых мышц глазного яблока. Вертикальная диплопия (двоение в глазах). Воспаление клетчатки глазницы. Поражение внутренней поверхности век.

**Уши.** Паротит (слева); в сопровождении лихорадки. Мочки ушей опухшие. Боль в ухе с ощущением, что внутри него что-то есть. Выделение кровянистого гноя из уха.

**Нос.** Кончик носа красный, чувствительный; течет из носа. Чихание, жидкие выделения из носа при насморке. Носовое кровотечение: сильнее ночью, при наклоне, во время стула, при лихорадке; оно приносит облегчение. Жесткая тупая боль (ломота) в костях носа. Дыхание горячее, обжигает ноздри.

**Лицо.** Треск в челюстных суставах при жевании. Суставы болезненные. Лицевая невралгия сопровождается зябкостью. Часто возникает вывих нижней челюсти. Скуловые кости болезненные. Красные пятна на левой щеке. Опухание лица, сопровождающееся ощущением скованности, напряжения. Губы сухие, коричневатые, в углах рта трещины; губы покрыты корочками. Герпес на губах. Молочный струп. Розовые угри.

**Рот.** Грязно-серый налет на зубах. Кажется, что зубы длинные и шатаются. Кровянистая слюна течет изо рта во время сна. *Язык:* сухой, красный посредине; потрескавшийся, напряженный (как будто одеревенел), болезненный, у него на кончике покраснение треугольной формы; налет на языке расположен по диагонали или только с одной стороны. Ощущение, как будто язык покрыт кожей. Медный или травянистый, или горький привкус во рту. Хлеб кажется горьким.

**Горло.** Краснота, отечность, зуд в зеве. Миндалины покрыты желтой пленкой. Ангина, сопровождающаяся опуханием желез. Затруднено глотание: твердой пищи, как будто горло сужено, сжато; трудно глотать слюну. Воспаление пищевода после приема едкого вещества.

**Желудок.** Страстное желание холодного питья, хотя из-за него усиливается кашель, озноб и т.д. Желание: холодного молока; сладкого; устриц. Рвота возникает: из-за кашля; когда лежит на спине; каловая рвота. Тошнота: хуже от мороженого; после еды. Сильная жажда; сильнее ночью. Сонливость, дремота после еды. Сильная жажда, но нет аппетита — не хочется никакой пищи. Боль в желудке после питья воды со льдом.

**Живот.** Болезненный живот. Ощущение, как будто вода плещется в нем или как будто в животе комок. Из-за колики вынужден ходить согнувшись; боль уменьшается, когда лежит на животе. *Симптомы, связанные с илеоцекальной областью;* аппендицит.

Стул: водянистый; пенистый; или кровянистый; зловонный; как мясные помои; слизистый, желеобразный; непроизвольный; возникает ночью во время сна; либо сопровождается тенезмами; хуже от питья. Дизентерийный понос. Геморрой с ухудшением от поднятия тяжести. Болезненные тенезмы без выделения стула. Живот втянут, как часовое стекло. Слизистый колит.

**Мочевыделительная система.** Недержание мочи: хуже лежа, ночью или сидя; в том числе у мальчиков. Нефрит. Моча: темная, мутная, яркого цвета, скудная. Учащенное, обильное мочеиспускание днем и ночью.

**Мужские половые органы.** Мошонка утолщена, опухшая, отечная. Отек крайней плоти. Сильный зуд половых органов. Водянка яичка, в том числе из-за поднятия чрезмерной тяжести. Метастаз заболевания в яички при свинке (паротите).

**Женские половые органы.** Опухание; и интенсивный зуд наружных половых органов. Менструации слишком ранние, обильные и продолжительные. Аменорея: возникает после промокания; сопровождается появлением молока в груди. Метрит; в том числе при сепсисе. Лохии: жидкие, затяжные, зловонные, в недостаточном количестве, сопровождаются стреляющей вверх болью во влагалище. Выпадение матки из-за поднятия тяжести или вследствие чрезмерного напряжения, от натуги. Послеродовые схватки частые. Жесточая боль в области наружных половых органов во время менструации. Болезненность влагалища.

**Дыхательные органы.** Боли в грудной клетке усиливаются от работы руками. Щекотание за грудиной в верхней ее части; от этого возникает кашель — сухой, сиплый, сопровождающийся ощущением, что в груди что-то рвется, мучительный; при этом во рту ощущается привкус крови. Этот кашель усиливается при ознобе или когда пациент высовывает руки (кисти) из-под одеяла, кашель может начаться после полуночи и продолжаться до утра.

Охриплость из-за перенапряжения голоса. Внезапный застой крови в легких или отек легких. Плевродиния: боли из грудной клетки стреляют в плечи. Кровохарканье: из-за перенапряжения; из-за игры на духовых инструментах; кровь при этом яркая. Ржавого цвета мокрота. Ощущение холода в гортани при дыхании. Из трахеи выдыхается горячий воздух.

**Сердце.** Неосложненная гипертрофия сердца вследствие сильного напряжения. Сердце кажется уставшим; боли распространяются вниз вдоль левой руки. Сердцебиение усиливается, когда пациент сидит неподвижно; уменьшается при ходьбе. Дрожание в сердце, лучше при ходьбе. Пульс частый, слабый, аритмичный, перемежающийся; при этом левая рука немеет. Ноющая боль в левой руке при болезни сердца.

**Шея и спина.** Скованность в шее сопровождается напряжением и болью, в том числе при движении. Боль между лопатками усиливается при глотании. Боль в спине стягивающая или с ощущением, как будто спина разбита. Боль уменьшается от сильного давления; когда человек лежит на чем-нибудь твердом; когда ходит или прогибается назад. Прострел в пояснице (люмбаго). Ноющая боль из копчика распространяется в бедра.

**Конечности.** Онемение и покалывание в конечностях. Руки нервные и дрожат, трясутся (левая). Паралитические боли в локтях. Трещины на тыльной поверхности кистей. Ладони сухие, горячие, потрескавшиеся и болезненные; от мытья возникает жжение. Боли, распространяющиеся по задней поверхности бедер, усиливаются от стула; ишиас. Кажется, что голени омертвели, деревянные. Судороги в икроножных мышцах. Пациент непроизвольно прихрамывает. Болезненность мышечков костей. Скованность, паралич конечностей. Горячая, болезненная припухлость в области суставов.

Почка, как иголки, в кончиках пальцев рук и в ладонях, когда пациент что-нибудь берет в руку, хватается за что-нибудь. Боль по ходу локтевого нерва. Язвы: на голени; гангренозные язвы; из язв сочится кровянистая жидкость; язвы на отечных голени. Зуд голени и стоп. Лодыжки опухают после слишком продолжительного сидения; стопы опухают вечером. Паралепсия: после родов, после сексуальных излишеств; при лихорадке. Ощущение, как будто идет по иголкам. Абсцесс в подмышечной области после родов.

**Кожа.** Напряжена, неподвижна, толстая, сухая, горячая, в ней ощущается жжение; зуд кожи сильнее на покрытых волосами участках. Кожа чувствительна к холодному воздуху. **ВЫСЫПАНИЯ:** мелкие, **В ВИДЕ ПУЗЫРЬКОВ (ВЕЗИКУЛЕЗНЫЕ);** с образованием корочек, экзематозные; мокнущие, **РОЖИСТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ;** хуже в области половых органов; высыпания чередуются с дизентерией. Гной разъедает волосы. Пузырьки (везикулы) над абсцессом. Молочный струп. Экзема булочников. Крапивница: возникает после промокания; сопровождается поражением суставов (ревматизм) или появляется во время озноба и лихорадки. Опоясывающий лишай.

**Сон.** Пациент просыпается усталым или нервничает. *Во сне видит* как совершает *значительное усилие*, переживает *большое напряжение*; видит во сне кровь; или огонь. Зевота частая, жестокая, спастическая; пациент при этом не склонен спать; потягивается при зевоте. Двигательное беспокойство; человек беспокойно мечется.

**Лихорадка.** *Зябкий, мерзнет, если хоть чуть-чуть раскроется; в том числе при болях в конечностях.* Озноб с ощущением, как будто его облили холодной водой или холодная вода течет по венам; ознобу предшествует кашель; озноб чередуется с жаром. Ощущение озноба в отдельных частях тела. Жар при профессиональном бреде (бреде занятия). Брюшной тиф. Потоотделение: усиливается при боли; сопровождается сонливостью. Крапивница во время лихорадки. Желание зевать и потягиваться во время озноба.

**Дополнительно.** Bry., Calc, MAG-C, Med., Phyt.

**Диф. диагноз.** Arn., Bry., Dulc.

## ROBINIA

**Общее.** Характерные признаки, указывающие на Робинию — *едкость и повышенная кислотность.* Следовательно это средство бывает показано при гиперхлоргидрии, когда наблюдаются кислые отрыжки и кислый привкус во рту, а *рвотные массы настолько кислые, что возникает ощущение оскомины на зубах* или зубы тупятся.

"Кислые" младенцы: кислый запах тела; кислый запах от стула, рвотных масс (в них — кислое молоко). Кислая диспепсия. Постоянная тупая боль в лобной области; усиливается от движения и чтения. Мигрень сопровождается рвотой кислыми массами. Кислая отрыжка. Жжение в желудке и между лопатками. Метеоризм. Сдавливающая боль в желудке. Изжога и повышенная кислотность желудочного сока; хуже лежа, особенно ночью.

**Хуже.** *От еды. Ночью.* От жирного. От капусты. От репы. От сырых фруктов. От мороженого.

**Диф. диагноз.** Iris, Mag-c.

## RUMEX CRISPUS

**Общее.** Ревень поражает *нервы*, способствуя возникновению многочисленных и разнообразных болей: они нигде не сосредотачиваются и непостоянны; *боли резкие*; невралгического характера. Поражаются также *слизистые оболочки гортани*, трахеи, кишечника и область **ЯРЕМНОЙ ЯМКИ**: возникает *сухость и повышенная чувствительность.*

Румекс воздействует на суставы, особенно *голеностопные*; на кожу, на левую сторону тела; на органы грудной клетки. Уменьшается секреция слизистых оболочек и возникает *ощущение клейкости, вязкости, сопровождающееся жжением.* Ожирение. Увеличение лимфатических узлов, извращенная секреция. Каждый раз при простуде страдают суставы.

**Хуже.** **ОТ ПРОХЛАДНОГО ВОЗДУХА, ОТ ЕГО ВДЫХАНИЯ;** на открытом воздухе; при перемене температуры воздуха — от тепла к холоду; от холода — к теплу. Когда раскрывается. Ночью. От давления, в том числе на трахею. От разговора. Когда дышит глубоко или неритмично. От движения. От еды; после приема пищи.

**Лучше.** *Прикрыть рот (рукой, платком и т.д.).* Закутаться.

**Психика.** Подавлен, унылый; при этом серьезное выражение лица. Безразличен к окружающему.

**Голова.** Пронзающая резкая боль в левой половине головы.

**Глаза.** Жжение в глазах, в том числе в помещении; опухание в первой половине дня (до полудня).

**Нос.** Ощущение сухости в задних отделах носа. Приступы чихания; насморк с жидкими выделениями. Зуд, распространяющийся из кончика носа в глотку.

**Лицо.** Одутловатое, тупое. Бледное, когда пациент стоит.

**Рот.** Зубная боль полностью проходит после обеда; от полоскания рта холодной водой.

**Горло.** Откашливает большое количество вязкой слизи. Горло кажется пустым, полым. Комок в горле: ощущение не уменьшается при покашливании; комок опускается при глотании и снова подкатывается к горлу после глотания.

**Желудок.** Волчий аппетит. Ощущение, как будто под ложечкой — что-то твердое. Боль в левой молочной железе после приема пищи. От разговора усиливаются желудочные симптомы. Гастралгия: тупая боль распространяется из желудка в спину, пациент вынужден дышать глубоко. Сильная тупая боль в эпигастрии, сопровождающаяся ощущением сжатия, сдавливания и затруднением дыхания и распространяющаяся в спину;

одежда кажется тесной. После употребления в пищу мяса возникают отрыжка и зуд. Тошнота уменьшается от отрыжек.

**Живот.** Ощущение ползания мурашек возле пупка; лучше после выделения зловонных кишечных газов. Стул возникает внезапно; он обильный; зловонный; безболезненный; коричнево-черный или жидкий, водянистый, заставляющий встать с постели утром (в промежутке между 5 и 9 ч); подобный стул бывает при туберкулезе легких, после катара. Зуд заднего прохода сопровождается ощущением, что в прямой кишке — заноза, щепка. Досаждающее урчание при метеоризме, в том числе у женщин.

**Мочевыделительная система.** Внезапный императивный позыв на мочеиспускание; непроизвольное мочеиспускание при кашле.

**Женские половые органы.** Боль из правого яичника распространяется в спину.

**Дыхательные органы.** ПРИ КАЖДОМ ВДОХЕ ПОПАДАЮЩИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ВЫЗЫВАЕТ ЩЕКОТАНИЕ В ЯРЕМНОЙ ЯМКЕ, как будто от перышка или от пыли, а также ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ; становится лучше, если закрыть рот или накрыть чем-нибудь рот или голову; хуже — от прикосновения к яремной ямке; когда ложится на левый бок.

Сухой надоедливый кашель мешает спать. Обильная, жидкая, пенистая мокрота. Мокрота отхаркивается полным ртом. Одышка возникает, когда пациент ложится отдохнуть. Удушье, пациент давится от кашля, задыхается. Дыхание затруднено на ветру. Кашель провоцирует переход из одного помещения в другое: из холодного — в теплое, из теплого — в холодное.

Боль, саднение или жжение под ключицей, как будто туда проник воздух; хуже при покашливании. Боль за грудиной; ниже правого соска. Жгучая, колющая боль в левой половине грудной клетки, в области сердца; хуже — при глубоком дыхании.

Лающий кашель. Кашель появляется регулярно в 23 ч, в 2 ч и в 5 ч; в том числе у детей. Кашель возникает только в дневное время. Кашель усиливается в ранние сроки беременности, может вызвать выкидыш. Боль в ключице усиливается при покашливании.

**Сердце.** Сначала пациенту кажется, что сердце внезапно остановилось, потом возникает сильная пульсация, ощущаемая в грудной клетке.

**Спина.** Боль под лопаткой; справа.

**Конечности.** Боль в левом плече при кашле, при поднимании рук. Кисти холодные при кашле. Спастическое сокращение мышц, судороги в области лодыжек и стоп.

**Кожа.** Выраженный зуд кожи, сильнее на нижних конечностях; хуже от пребывания на холоде, от холодного воздуха или от раздевания. Обыкновенные угри на спине.

**Сон.** Внезапная сонливость.

**Лихорадка.** Пациент потеет при пробуждении от глубокого сна.

**Диф. диагноз.** Caust., Seneg.

## RUTA GRAVEOLENS

**Общее.** Рута имеет особое сродство с фиброзной тканью; сухожилиями мышц, сгибателей; суставами, в том числе голеностопными суставами, запястьем; с хрящевой тканью; надкостницей, а также маткой и кожей. Это основное средство для лечения повреждений, в том числе ушибов костей; а это значит, что характерны БОЛИ С ОЩУЩЕНИЕМ РАЗБИТОСТИ, КАК ПРИ УШИБЕ; БОЛЕЗНЕННОСТЬ И ДВИГАТЕЛЬНОЕ БЕСПОКОЙСТВО.

**Ощущение сильной усталости и болезненности.** Тяжесть: как будто гиря лежит во лбу или подвешена к ногам; или тяжесть в нижних конечностях. Ощущение, как будто шершавая тупая пробка вставлена в больное место — в голову, в нос и т.д. Паралитическая ригидность. Деформации, искривления. Грызущие и, одновременно, жгучие боли, невралгия. Ревматизм. Образование наростов, узлов в надкостнице, сухожилиях и возле суставов, особенно в области запястий.

Последствия ушибов, переломов; перетаскивания тяжелых грузов. Хромота после растяжения связок. Хрупкие кости. Болезненность частей тела: на которых пациент лежит; даже если пациент лежит в постели. Чувство выраженной усталости, слабости и отчаяния.

**Хуже.** От перенапряжения, травмы; от растяжения связок. ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ТЛАЗ. ОТ ХОЛОДА: от холодного воздуха, от влажного холодного ветра; от сырого холода. ЛЕЖА. СИДЯ. От давления о край стола и т.д. При наклоне. Во время менструации. Из-за сырой пищи, не подвергавшейся кулинарной обработке, или от несъедобных вещей. От напряжения; когда поднимается или спускается по лестнице.

**Лучше.** Лежа на спине. От тепла. От движения. От растирания. Ехли почесать, расцарапать.

**Психика.** Недоволен собой и другими, склонен плакать. Подозрительный человек, ему кажется, что его всегда обманывают. Волнуется, беспокоится, ссорится и противоречит.

**Голова.** Голова болит так, словно в нее вбит гвоздь. Резкая колющая боль — хуже от чтения.

**Глаза.** Красные, горячие и болезненные из-за чтения мелкого шрифта, из-за шитья. *Неясное зрение.* Слезотечение. Зуд во внутреннем углу глаза. Астенопия. Спазм нижних век; когда он проходит, начинается слезотечение.

**Уши.** Боль, как от тупого куска дерева, пробки.

**Нос.** Пот на носу. Давящая боль в корне носа; в том числе при кровотечении из носа.

**Рот.** Судорога в языке, затрудняющая речь. Деревянный привкус во рту.

**Желудок.** Внезапная тошнота во время еды; сопровождается рвотой пищей. Грызущая и одновременно жгущая боль. Расстройство желудка из-за поднятия большой тяжести. Сильная жажда холодной, со льдом воды. Тошнота ощущается в прямой кишке. Чувство напряжения в желудке уменьшается от питья молока.

**Живот.** Когда возникает позыв на стул, происходит лишь *выпадение прямой кишки*. Выпадение прямой кишки при наклоне; после родов, во время стула — независимо, твердый он или мягкий. Часто при наклоне — недержание кала. Болезненное набухание селезенки. Рак нижнего отдела кишечника. Сужение (стриктура) прямой кишки.

**Мочевыделительная система.** Постоянное ощущение давления в мочевом пузыре, как будто он полный или двигается вверх и вниз. Пациентка постоянно ощущает позыв на мочеиспускание, с трудом удерживает мочу, а если делает усилие и все-таки удерживает мочу, то впоследствии испытывает сильную боль и не может помочиться.

**Женские половые органы.** Едкие бели, возникающие после нерегулярных менструаций или при их подавлении.

**Дыхательные органы.** Одышка с ощущением сжатия, стеснения в груди. Чувство слабости в груди после отхаркивания густой, желтой мокроты. Болезненный участок на груди. Последствия механической травмы грудной клетки.

**Шея и спина.** Слабость, ощущение разбитости, как после ушиба, в пояснице, в области крыльев таза и в нижних конечностях в первой половине суток (до полудня). Ощущение холода в позвоночнике, распространяющееся вниз. Боль в спине уменьшается, когда пациент лежит на спине и от давления.

**Конечности.** Когда вытягивает ноги, возникает ощущение, что *бедра сломаны*. Болезненность сухожилий. Пошатывается при ходьбе; часто запинается. Боли ощущаются где-то в глубине длинных костей; вынужден ходить. Узлы в ладонях. Киста сухожильного влагалища в области запястья (ганглион). *Бурсит*. Боль в костях стоп, не может ступить на ноги.

Контрактуры: пальцев на руках; в стопах, контрактуры пальцев на стопах. Подколенные сухожилия кажутся укороченными. Хруст в суставах усиливается при ходьбе на улице (на открытом воздухе). Ишиас: хуже когда ложится, ночью; лучше в дневное время. Ноги подкашиваются, когда пациент пытается встать со стула; приходится сделать несколько попыток, прежде чем это получится. Паралитическая слабость в голени после растяжения спины. Голени кажутся слабыми, колени подгибаются при подъеме и спуске по лестнице. Лодыжки опухшие.

**Кожа.** Легко возникает раздражение кожи, *потертость*: от ходьбы, от езды верхом; в том числе, у детей. Едкий зуд. Плоские, гладкие, болезненные бородавки, в том числе на ладонях. Зуд кожи после употребления в пищу мяса.

**Сон.** Пациент часто просыпается; видит яркие, запутанные сновидения. Зевает, потягивается и выпрямляет руки.

**Лихорадка.** Частые, в виде приступов, приливы быстро распространяющегося жара. Ощущение пылающего жара в лице, на коже и т.д.

**Дополнительно.** CALC-P.

**Диф. диагноз.** Arn., Phyt., Ran-s., Symph.

## SABADILLA

**Общее.** Сабадилла воздействует НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ НОСА, слезные железы, ЗАДНИЙ ПРОХОД и пищеварительный тракт. Поражение *НЕРВОВ* приводит к слабости, нервозности; пациент легко пугается, вздрагивает.

При наличии глистов рефлексорно возникают симптомы со стороны нервной системы: подергивание мышц, судорожное дрожание или каталепсия. *Ощущение ползания мурашек*. Чередование нервных и телесных симптомов. Истерия после испуга.

Последствия испуга; нервного напряжения, мыслительной деятельности. Глисты вызывают судороги, нимфоманию и т.д. Воображаемые болезни. Режущие боли в костях.

**Хуже.** ОТ ХОЛОДА, от холодного воздуха; холодного питья. *Периодически*: каждую неделю, каждые две недели. Каждые четыре недели; в один и тот же час; перед полуднем; в новолуние и полнолуние. От запахов; если так и не появились высыпания (экзантема). От нервного напряжения.

**Лучше.** На открытом воздухе. От жара (в жару). От еды. При глотании. Если быстро двигать больной частью тела.

**Психика.** Пациент чувствует себя несчастным. Робкий. Легко пугается, вздрагивает. Ошибочные представления (навязчивые идеи), касающиеся самого пациента: воображает, что он очень болен; что части его тела ослабели, атрофировались; что его конечности изогнуты, подбородок удлинён; одна половина тела больше, чем другая; пациентка считает, что больна раком или беременна.

Пациент не отвечает на вопросы, сознание отсутствует, затем он вскакивает и несётся опрометью через комнату. Ярость. Мания: лучше облить голову холодной водой.

**Голова.** Головокружение с ощущением, что все предметы вращаются один вокруг другого; оно возникает внезапно, когда пациент просыпается ночью или когда поднимается после наклона; при этом у него темнеет в глазах, он чувствует слабость; лучше положить голову на стол. Односторонние головные боли; или поочередно — то с одной, то с другой стороны; хуже, когда думает; лучше — от еды. Жжение, зуд, ползание мурашек на коже волосистой части головы; лучше почесать, поцарапать. Головная боль у девочек-школьниц.

**Глаза.** Веки красные, горят. *Слезотечение:* усиливается при боли; при чихании, кашле, зевоте; когда идет по улице (на открытом воздухе); при ознобе.

**Уши.** Снижение слуха, как будто на ушах повязка.

**Нос.** *Постоянное ЖЕСТОКОЕ либо НЕУДАВШЕЕСЯ ЧИХАНИЕ. ЗУД;* щекотание в носу; пациент трет нос или ковыряет в носу. Сухость в носу. Щекотание возникает в носу, распространяется на все тело, затем возникает одышка. Сенная лихорадка (поллиноз). Грипп. *Обостренное обоняние.* Одна или обе ноздри заложены. Насморк с жидкими выделениями; ухудшение возникает от запаха цветов: даже при мысли о цветах выделения усиливаются.

Не переносит запаха чеснока. Упорный, затяжной насморк. Пациент отхаркивает ярко-красную кровь из носоглотки.

**Лицо.** Ощущение, что лицо горячее, огненно-красное. Жар и жжение в губах, как будто они ошпарены. Когда широко открывает рот, возникает хруст в височно-нижнечелюстном суставе.

**Рот.** Полость рта и язык как будто обожжены. Зуд мягкого нёба. Сладковатый привкус во рту. Не переносит, когда во рту что-то горячее или холодное.

**Горло.** При боли в горле (при ангине) не может высунуть язык. Ощущение, как будто в горле *комоч*, кусочек пищи, нитка или кожица свисает; пациент постоянно делает глотательные движения, хочет проглотить. Ангина; боли переходят слева направо; хуже, когда делает "пустое" глотательное движение; лучше от горячего питья. Тонзиллит после насморка.

**Желудок.** Страстное желание: горячей еды, сладостей, молока. Пища неприятна до тех пор, пока женщина не съест первый кусочек, потом ест с удовольствием; при беременности. С жадностью ест сладкое и мучное. Жажда отсутствует. Ощущение холода или пустоты в желудке. Отвращение к любой пище, к мясу, кислым продуктам, кофе, чесноку.

**Живот.** Кажется, что кишечник завязан узлом. Ощущение, как будто комоч или нить быстро перемещается в кишечнике. Жгучий, пенистый, жидкий, коричневатый, всплывающий на поверхность стул. *Ползание мурашек, зуд в анусе;* чередуется с зудом в носу или в ушах. Острицы.

**Женские половые органы.** Нимфомания из-за глистов. Менструации слишком поздние, протекают "урывками", в виде пароксизмов; прерывистые; то сильнее, то слабее.

**Дыхательные органы.** Жестокие приступы кашля; приглушенный кашель — усиливается от гнева; кашель сопровождается слезотечением. Астматическое дыхание сочетается с зудом кожи, носа и зудом в заднем проходе. Красные пятна на груди. Плеврит, сопровождающийся выраженной паралитической слабостью.

**Сердце.** Сердцебиение сопровождается пульсацией во всем теле.

**Конечности.** Руки дергаются кверху. Трещины между пальцами ног и под ними. Режущие боли в костях. Толстые, деформированные, грубые ногти. Красные пятна на руках. Желтые пятна на пальцах рук. Стопы опухшие, подошвы болят.

**Кожа.** Зуд кожи в сочетании с астматическим дыханием. Кожа сухая, как пергамент.

**Сон.** Наступает, когда пациент задумывается, размышляет (медитирует), читает.

**Лихорадка.** Дрожь, содрогание тела — сопутствующий симптом. Жажда возникает только после озноба. Ощущение холода, озноб распространяется снизу вверх. Слезотечение при ознобе.

**Дополнительно.** Sep.

**Диф. диагноз.** Ars., Puls., Urt-u.

## **SABAL SERRULATA**

**Общее.** Сабаль действует преимущественно на мочеполовые органы, в особенности на *предстательную железу, яичники, на молочные железы, мочевого пузыря, уретру.*

Это средство оказывает смягчающее действие на слизистые оболочки, тонизирует, усиливает активность, улучшает снабжение утомленного мозга питательными веществами (применяется в потенции D1).

Резкие, жгущие блуждающие боли. Сабаль — это гомеопатический катетер при задержке мочи вследствие увеличения простаты. Нервные женщины и *старые мужчины. Бессилие*. Нервозность и раздражительность сопровождаются отсутствием сексуального желания и у мужчин, и у женщин. Пациенты страдают сексуальным неврозом.

**Хуже.** В холодную, сырую, пасмурную погоду. От сочувствия, выражения симпатии. Перед менструацией.

**Лучше.** После сна.

**Психика.** Раздражительность и депрессия; сочувствие сердит пациентку. Женщина погружена в мрачные размышления по поводу своих страданий или симптомов своего заболевания. Апатия. Равнодушие. Боится уснуть из-за страха, что может что-то случиться. Когда дремлет, внезапно просыпается в страхе.

**Голова.** Резкая, пронзающая боль в разных местах, возникающая и исчезающая внезапно. Боль поднимается вверх вдоль носа и сосредоточивается во лбу. Головная боль у слабых людей.

**Глаза.** Ирит у пациентов, страдающих заболеванием предстательной железы.

**Уши.** Слух снижен; кажется, что голоса доносятся издалека.

**Желудок.** Постоянное желание молока; хотя прежде пациент молоко не любил. Повышенная кислотность. Отрыжки.

**Живот.** Боль из живота распространяется в бедра; расходится в разных направлениях, сосредоточивается в яичниках.

**Мочевыделительная система.** Постоянное желание помочиться; в том числе ночью. Недержание мочи при любом напряжении, при поднимании тяжести, при смехе и т.д. Мочеиспускание затруднено: жгучая боль, жжение в уретре. В мочевом осадке содержатся кальциевые соли. Сильная тупая боль и ощущение холода в мочевом пузыре, распространяющееся в наружные половые органы. Цистит при гипертрофии простаты.

**Мужские половые органы.** Втянутость яичек, в том числе сопровождающаяся болью. *Холодные половые органы. Увеличенная или застойная предстательная железа; в том числе в старости.* Атрофия яичек и импотенция. Болезненные эрекция или семяизвержение во время коитуса. Сексуальный невроз. Эпидидимит. Импотенция. Сперма густая, вызывает ощущение жара по ходу семенного канатика.

**Женские половые органы..** *Половые органы холодные.* Наружные половые органы (вульва) как будто раскрыты. Яичники чувствительные и увеличенные; боль из яичников распространяется вниз вдоль бедер.

Неистовое сексуальное желание, страстность. Женские сексуальные неврозы; подавленное или извращенное сексуальное желание. Молочные железы болезненные и чувствительные, полные — хуже от холодной ванны; либо молочные железы маленькие, *неразвитые*. Одна молочная железа меньше, чем другая.

**Дыхательные органы.** Отхаркивание обильной мокроты сопровождается выделениями из носа. Хронический бронхит. Свистящий кашель — хуже, когда пациент ложится, кашель продолжается до 6 ч утра.

**Спина.** Тупая боль в спине, в том числе после коитуса. Боль в крестцовой области перед началом менструации.

**Сон.** Пациент боится заснуть, так как опасается, что может что-нибудь случиться; внезапно просыпается, вскакивает с ощущением этого страха, когда дремлет.

**Диф. диагноз.** Sep., Sil.

## SABINA

**Общее.** Наиболее сильное влияние Сабина оказывает *НА ЖЕНСКИЕ ТАЗОВЫЕ ОРГАНЫ; на матку*. Кроме того, она воздействует *на фиброзную ткань, в частности, мелких суставов*; на серозные оболочки; а также на пятки.

Это средство подходит женщинам вспыльчивым, имеющим склонность к подагре и ревматизму (подагрически-ревматический диатез), женщинам *со склонностью к кровотечениям*, в том числе из носа, а также к гематурии и т.д.

Склонность к выкидышу, особенно на третьем месяце беременности. Ощущается сильная пульсация: хочется открыть окна. Тяжесть в теле и вялость, хочется лечь. Красный, блестящий отек (опухание) в области больного органа. Острое воспаление в области деформированных суставов (в области артритических узлов). Ощущение полноты. Выросты, похожие на бородавки. Боль появляется внезапно и проходит постепенно, медленно.

**Хуже.** *Ночью. ОТ ЖАРА:* от тепла постели; в жарком помещении; при напряжении, когда становится жарко. Во время беременности. Во время климакса. В туман. При наклоне. Когда свешивает конечности вниз. Когда делает глубокий вдох. От музыки.

**Лучше.** От холода. От прохлады. На открытом воздухе. Когда делает выдох.

**Психика.** Музыка невыносима: она вызывает нервозность. Меланхолия. Печаль.

**Голова.** *Распирающая головная боль*, как будто голова лопнет, взорвется. Эта боль появляется внезапно, медленно стихает и часто возобновляется. Головокружение при подавлении менструаций.



**Рот.** Зубная боль усиливается только при жевании. Тянущая боль в жевательных мышцах. Горький привкус во рту; а также у пищи, в особенности, у молока и кофе.

**Желудок.** Желание лимонада. Изжога. Боль распространяется из эпигастрия в спину.

**Живот.** Полнокровие. Дрожание в животе, как будто в нем что-то живое, напоминающее движения плода. Геморрой сопровождается выделением ярко-красной крови, вызывает боль, идущую от крестца к лобку. Геморрой чередуется с болью в конечностях.

**Мочевыделительная система.** Раздражение мочевого пузыря; в том числе при уратурии. Выделение кровянистой мочи сопровождается сильными императивными позывами на мочеиспускание. Пульсация, жжение в области почек.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание повышено, сопровождается жестокими продолжительными эрекциями. Сикотические разрастания; жжение и болезненность в них. Плотный отек в области спинки полового члена.

**Женские половые органы.** *Зуд половых органов*; практически ненасытное сексуальное желание. Менструации слишком обильные, слишком ранние; *сплошным потоком вытекает горячая, яркая, водянистая кровь*; кровь смешана с темными сгустками; кровотечение усиливается от малейшего движения, но часто уменьшается от ходьбы; менструация сопровождается болью в суставах; а также **БОЛЬЮ, НАПРАВЛЕННОЙ ИЗ КРЕСТЦА В ЛОБОК или наоборот; либо сопровождается стреляющими болями во влагалище, направленными снизу вверх.**

Кровотечение между менструациями; сопровождается сексуальным возбуждением. Бели зловонные, едкие, густые, желтые, из-за подавления менструаций или при обильных менструациях; сопровождаются зудом промежности; возникают при беременности. Зуд во время беременности. Задержка отделения плаценты. Сильные послеродовые схватки. Сабина способствует изгнанию пропитанного кровью погибшего плодного яйца, заноса. Ощущение ползания мурашек в сосках. Кровотечения после аборта. Оофорит и метрит после аборта. Преждевременные роды. Дис-менорея: лучше лежать на спине на ровной поверхности, вытянув конечности. Сладострастный зуд сосков.

**Сердце.** Сильная, неистовая, пульсация в кровеносных сосудах всего тела.

**Спина.** Боль распространяется из поясничной области в лобковую или наоборот.

**Конечности.** Опухание, покраснение и колотье в большом пальце правой стопы. Стреляющая боль в пятках. Сабина способствует уменьшению варикозных узлов. Перемежающаяся тупая боль в пятках со стороны подошвы.

**Кожа.** Зловонные, сопровождающиеся зудом, жжением мокнущие кондиломы. Черные поры на коже, особенно на лице.

**Лихорадка.** Невыносимый жгучий жар во всем теле, сопровождающийся сильным двигательным беспокойством.

**Дополнительно.** Thuja.

**Диф.** диагност. Ars., Caul., Puls.

## **SALICYLICUM ACIDUM**

**Общее.** В обычной лечебной практике салициловая кислота применяется в качестве острого противоревматического средства. Из нее готовят гомеопатический препарат для лечения болезни Меньера.

Рев и звон в ушах. Глухота, сопровождающаяся головокружением. Последствия подавления потоотделения на стопах.

**Хуже.** От движения. Ночью. От холодного воздуха.

## **SALIX NIGRA**

**Общее.** Это средство уменьшает раздражение половых органов у мужчин и женщин.

Сатириаз и эротомания. Поллюции в присутствии женщин или когда пациент разговаривает с женщиной. Похотливые мысли и сновидения. Применяется в материальных дозах в виде настойки — по 30 капель.

## **SAMBUCUS NIGRA**

**Общее.** Самбукус действует на дыхательные органы, почки и кожу.

*Обильный пот или одышка* сопровождают многие симптомы. Отечность разных частей тела, в особенности голеней, области плюсны и стопы. Насморк у младенцев — они сопят носом; дыхание и кормление затруднено. Общее дрожание сопровождается тревогой.

Болезненные последствия испуга, горя, тревоги, сексуальных излишеств. Самбукус подходит людям прежде здоровым и полнотелым, а теперь внезапно сильно похудевшим.

**Хуже.** От сухого холодного воздуха. Если выпьет что-нибудь холодное, когда разгорячен, разогрет. Когда голова низко опущена. От употребления фруктов. Лежа. В покое.

**Лучше.** Если прижаться к острому краю (например, стола). От движения. Закутаться. Подняться, сесть в постели.

**Психика.** Постоянно беспокоится, волнуется. Легко пугается. После испуга возникают приступы удушья. Когда закрывает глаза, видит образы.

**Глаза.** Глаза полуоткрыты во время сна. Светобоязнь.

**Нос.** Насморк, ринит у младенцев: выделений из носа нет, ребенок сопит носом.

**Рот.** Полуоткрыт во время сна.

**Лицо.** Бледное, синеватое, одутловатое лицо — хуже при кашле. Горячее лицо; в сочетании с холодными, как лед, стопами.

**Мочевыделительная система.** Острый нефрит. Признаки водянки (отеки) сопровождаются рвотой желчью и дискомфортом в желудке после еды. Обильное мочеиспускание сопровождается ощущением жара в теле. Мочеиспускание учащенное и скудное.

**Мужские половые органы.** Водянка яичка после травмы.

**Женские половые органы.** Изнуряющие поты после родов.

**Дыхательные органы.** *ВНЕЗАПНОЕ УДУШЬЕ* или *удушающий кашель* при засыпании; либо *удушье будит пациента в полночь, и он при этом очень сильно потеет*; хуже от испуга. Свистящее дыхание, спазмы голосовой щели. Визгливый, хриплый голос. Круп. Приступы кашля, в том числе перед лихорадкой.

**Конечности.** Стопы холодные, как лед. Кисти становятся синими. Отеки на голенях и стопах.

**Лихорадка.** *Сухой, жгучий жар во время сна и обильное потоотделение при пробуждении. Пациент потеет при кашле.* Изнуряющие поты; хуже ночью.

**Диф. диагноз.** Bell., Brom.

## SANGUINARIA CANADENSIS

**Общее.** Это растение широко известно как кровавый корень.

Сангвинария — *ПРАВОСТОРОННЕЕ* средство, оно воздействует на *голову, ПЕЧЕНЬ*, органы грудной клетки и на дельтовидную мышцу.

Сангвинария показана при *СОСУДОДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ*, когда имеется ограниченное покраснение щек, живота, языка и т.д.; *конгестия* — *прилив крови* к голове, груди, животу и т.д.; приливы жара "ощущение пульсации во всем теле".

**ОЩУЩЕНИЕ ЖГУЧЕГО ЖАРА И КИПЕНИЯ КРОВИ.** Слизистые оболочки становятся сухими. Возникает *жжение* в горле, за грудиной; на ограниченных участках или в виде жгучего колотья в груди; *жжение в ладонях и подошвах*. Ощущение, как будто язык обожжен.

*Симптомы усиливаются, пока не наступит рвота желчью, или прекращаются вместе с ней.* Ощущение саднения внутри. Едкие, с прожилками крови или зловонные выделения. Пациент лежит на спине с приподнятой головой. Климактерические расстройства. Заболевания желчевыводящих путей. Боли усиливаются и уменьшаются в соответствии с движением солнца над горизонтом. Внезапное прекращение катара дыхательных путей с последующим возникновением поноса. Полипы носа, матки. Грибовидные разрастания. Дурнота и обморок из-за запаха цветов. Боли в местах, где кости менее всего покрыты мягкими тканями.

**Хуже.** *Периодически* — в соответствии с движением солнца; каждую неделю; каждую ночь. *Во время климакса. От запахов. От сотрясения.* От света. От сладкого. От движения. Когда смотрит вверх. От прикосновения. Когда поднимает руки.

**Лучше.** *От сна.* Лежа на спине. От рвоты. От прохладного воздуха. Когда отходят кишечные газы. От кислых продуктов. Лежа на левом боку.

**Психика.** Раздражительный, мрачный. Ворчит. Создает себе проблемы, все усложняет. Усталость, не хочется двигаться или совершать какое-либо умственное усилие.

**Голова.** Боль над правым глазом; или *БОЛЬ, ПОДНИМАЮЩАЯСЯ ИЗ ЗАТЫЛКА В ОБЛАСТЬ НАД ПРАВЫМ ГЛАЗОМ*. Гемикрания (мигрень): боль усиливается и уменьшается в соответствии с движением солнца над горизонтом. Вздутие вен на висках. Боль в затылке, как вспышка молнии. Головокружение усиливается при взгляде вверх и при быстром движении головой. Головная боль возникает, если человек не поест вовремя — ходит голодным. Головная боль уменьшается от сна, от рвоты и обильного мочеиспускания.

**Глаза.** Жжение в глазах. Боль в глазных яблоках при движении глазами. Плотная на ощупь припухлость над бровями. Слезотечение при насморке, слезы горячие.

**Уши.** Жжение в ушах. Боль в ухе при головной боли. Гудение и рев в ухе; болезненная чувствительность к звукам во время климакса.

**Нос.** *Боль в корне носа.* Насморк: закладывает нос, потом начинается понос. Полипы носа. "Простуда от роз" (поллиноз) с последующим возникновением астмы. Чувствительность к запахам. Потеря обоняния или извращенное обоняние; в носу ощущается запах, напоминающий жареный лук.

**Лицо.** *Покраснение щек и жжение в них.* Лихорадочный румянец, красные щеки. Невралгия в области верхней челюсти, боли иррадиирующие; лучше — встать на колени и с силой придавить лоб к полу. Ощущение полноты и чувствительности позади угла нижней челюсти.

**Рот.** Ощущение, как будто язык обожжен. Передняя часть языка выглядит красной, как сырое мясо. Сладкая пища кажется горькой. Небо как будто ошпарено. Зубная боль возникает из-за ковыряния в зубах.

**Горло.** Ангина: горло болит, опухшее (справа); боли распространяются в ухо и в грудную клетку. Жжение в горле усиливается от сладкого. Сухость в горле у певцов.

**Желудок.** Страстное желание пряностей, специй; пациент не знает, чего хочет. Отвращение к сливочному маслу. Тошнота: сопровождается слюнотечением; хуже, когда чихает или сморкается; лучше от еды; после тошноты появляется крапивница. Выплевывает желчь при гастродуодените. Желудочные боли распространяются в правое плечо.

**Живот.** Напряжение в эпигастрии. Ощущение, как будто горячая вода выливается из груди в живот; после этого возникает понос. Жидкий, желчный, извергающийся сплошным потоком стул. Вздутие живота при метеоризме; при этом газы выделяются из влагалища. Желтуха. Рак прямой кишки.

**Мочевыделительная система.** Моча темно-желтая при желтухе. Обильное и учащенное мочеиспускание бесцветной мочой; сильнее выражено ночью.

**Женские половые органы.** Менструальные выделения зловонные, обильные. Полипы матки. Климактерические расстройства, в особенности, приливы жара и вонючие, едкие бели. Болезненность ниже соска (справа). Молочные железы болезненные; а также увеличенные; во время климакса.

**Дыхательные органы.** Ощущение полноты и сухость в гортани; в том числе у певцов. При кашле ощущается зловонное дыхание; кашель сухой; возникает из-за щекотания за грудиной; пациент должен подняться и сесть в постели; при кашле отходят кишечные газы; кашель уменьшается при выделении кишечных газов, при отрыжке.

Мокрота: плотная, цвета ржавчины, гнойная; от ее выделения становится хуже. Жжение в груди при кашле; ощущение, как будто горячий пар распространяется в живот. Кашель после гриппа или коклюша; возобновляется после каждой новой простуды. Боль в правой половине груди (в молочной железе), распространяющаяся в плечо. Пневмония. Туберкулез легких. Астма: из-за нарушения пищеварения, сопровождающаяся едкими отрыжками.

**Сердце.** Чувство слабости, нерегулярные (аритмичные) сокращения.

**Конечности.** Зуд в подмышечной области, усиливающийся перед менструацией. Режущая боль или скованность в правой дельтовидной мышце, усиливающаяся при поднимании руки или при ее повороте. Ревматизм правого плеча и левого тазобедренного сустава. Боль в плече усиливается ночью.

Боль в кости, близко к ее поверхности. Неврит: лучше от прикосновения к больному месту. Жжение в ладонях и подошвах: хуже от укрывания, одежды; во время климакса. Ладони морщинистые. Тупые боли и опухание возвышения большого пальца руки (справа). Боль в руке уменьшается, если пациент раскачивает руку туда-сюда.

**Кожа.** Сухая кожа, в том числе при желтухе. Угри: при скудных менструациях. Жар, сопровождающийся покалыванием, распространяется по всему телу.

**Лихорадка.** Приливы жара: жар поднимается вверх — к лицу и голове; сочетается с головной болью. Пот: жгучий, скудный.

**Дополнительно.** Ant-t., Phos.

**Диф. диагноз.** Bell., Phos.

## SANICULA

**Общее.** Эта минеральная вода из источника действует на усвоение пищи, обмен веществ; на женские половые органы, прямую кишку, шею и кожу.

Пациенты худые и выглядят старыми, в особенности дети. Истощение (маразм). Тело пахнет, как старый сыр. Ночью ребенок сбрасывает с себя ноги одеяло; хочется лежать на чем-нибудь твердом, несмотря на худобу. Одежда кажется холодной, мокрой. Ощущение увеличения; оно возникает в горле, влагалище и т.д. Густой, едкий желтый гной. Пациент не переносит, когда части тела соприкасаются друг с другом; либо не может лежать возле другого человека. Ощущение, как будто распирает, как будто может лопнуть: промежность, кишечник, мочевой пузырь, темя, грудная клетка. Укачивает в автомобиле, на море — морская болезнь. Боли, меняющие свою локализацию.

Хуже. От напряжения. От движения; когда поднимает руки; когда отводит руки назад. При спуске, когда спускается по лестнице. Когда холодный ветер дует в затылок или шею. От сотрясения.

**Лучше.** На открытом воздухе. От тепла. От рвоты.

**Психика.** Своевольные, упрямые, обидчивые люди, в том числе дети. Постоянное желание оглянуться назад. Раздражительность — одно малозначительное слово или поступок выводит пациентку из равновесия. Пациент все истолковывает неправильно. Упрямство и несговорчивость быстро сменяются веселостью и игривостью; в том числе у детей. Боязнь движения вниз. Страх темноты. Не хочет, чтобы к нему прикасались. Двигательное беспокойство с желанием переходить с места на место. Недостаток целеустремленности, воли, слабый.

**Голова.** Не переносит, когда холодный воздух попадает на затылок и шею. Обильно потеют затылок и шея; сильнее во время сна. Когда пациент причесывается, возникает потрескивание электричества в волосах. В

большом количестве на голове образуются чешуйки перхоти; волосы выпадают. Распирающее ощущение в теменной области. Как будто мозг обернут холодной тканью. Не созревающие мелкие нарывы (фурункулы) на голове.

**Глаза.** Веки прилипают к глазным яблокам. Слезотечение от холодного воздуха на улице или от прикладывания холода. Перхоть в области бровей.

**Нос.** Насморк с жидкими выделениями усиливается от еды. Кажется, что у воды затхлый запах, как у старой дождевой воды.

**Рот.** Язык: большой, дряблый; жжение на языке, пациент вынужден высунуть его, чтобы охладить; лишай на языке. Полость рта, в том числе нёбо, покрыта язвами; белые афты во рту. Края языка заворачиваются вверх. Язык прилипает к нёбу.

**Горло.** Ощущение холода, как ото льда; ощущение, как от мяты; горло кажется слишком большим. Твердую пищу глотать легче, чем жидкую.

**Желудок.** Ребенок просит грудь все время, но все-таки худеет. Страстное желание соли, бекона или холодного, как лед, молока. Жажда: пьет понемногу и часто; воду вырывает, как только она достигает желудка. Рвота свернувшимся молоком. Пациент засыпает после рвоты. От еды возникает императивный позыв на стул — вынужден выйти из-за стола.

**Живот.** Громкое бульканье; дети с большим животом, пузатые. *Стул: в виде одного большого, тяжелого комка; зловонный, как гнилой сыр, сухой, в виде мелких шариков, его приходится вытаскивать или он крошится у края ануса.* Распирающая боль в промежности во время стула. Стул уродливой формы, переменчивый, произвольный.

**Мочевыделительная система.** Ребенок плачет перед мочеиспусканием; тужится, чтобы помочиться во время стула. Моча, как рыбный рассол. Ощущение распирания в мочевом пузыре, сопровождающееся императивным позывом на мочеиспускание. Учащенное, обильное, внезапное мочеиспускание; позыв проходит, если пациент терпит, подавляет желание. Моча оставляет на пеленках красные пятна.

**Мужские половые органы.** От половых органов пахнет рыбным рассолом; запах возникает спустя несколько часов после коитуса.

**Женские половые органы.** Бели: с сильным запахом рыбного рассола; хуже от стула. Давление на низ, как будто содержимое таза выпадет наружу; сильнее от сотрясения, ходьбы. Женщина поддерживает расслабленные органы, придавливая рукой вульву; лучше в покое. Влагалище кажется большим, менструация не может прекратиться. Шейка матки как будто раскрыта и расширена.

**Шея и спина.** Шея слабая и худая; ребенок не может удерживать голову; *скованность и боль в спине*; хуже от малейшего поворота головы, от поднимания рук или *при отведении рук назад, за спину*. При этом, чтобы оглядеться вокруг, пациент вынужден поворачиваться всем телом; сидит, наклонив голову вперед, чтобы облегчить боль.

Ощущение холода в поясничном отделе позвоночника. Прострел в пояснице (люмбаго); лучше лежать на правом боку. Ощущение, как будто поясничные позвонки вывихнуты, смещены или соскальзывают друг с друга. Как будто спина сломана на две части. Ощущение влажной ткани на крестце.

**Конечности.** Боль в плечах — хуже при поднимании рук или при отведении их за спину. Холодные липкие кисти и стопы. Жжение в ладонях и подошвах. Судороги в стопах. Зловонный пот на стопах: он вызывает раздражение на пальцах стоп, разъедает обувь или делает жесткими носки. Стопы как будто погружены в холодную воду. Когда пациент соединяет руки, кисти становятся влажными, потеют.

**Кожа.** Сухая, коричневатая, дряблая кожа, особенно в области шеи. Трещины на кистях и пальцах рук. Кожа на шее сморщена и висит складками. Склонность к появлению мелких нарывов (фурункулов), которые никак не созревают.

**Сон.** При пробуждении ребенок трет глаза и нос кулачком. Сновидения о грабителях.

**Лихорадка.** Пот липкий.

**Диф. диагноз.** Lys, Psor., Sulph.

## SANTONINUM

**Общее.** Это излюбленное противоглистное средство вызывает цветовую слепоту и видение в желтом цвете.

## SARSAPARILLA

**Общее.** Это средство применяли как укрепляющее и очищающее кровь после изнуряющего курса лечения ртутью.

Сарсапарилла соответствует сифилитическим, сикотическим и псорическим конституциям. Действие Сарсапариллы, в основном, направлено на мочеполовые органы, кожу, кости, правую ногу.

Сарсапарилла подходит худым, болезненным, сморщенным пациентам, которые выглядят старыми, в особенности детям с увеличенным животом. Дистрофия (маразм); исхудание. Части тела как будто притянуты

друг к другу, сдавлены. Боли в костях по ночам. Боли стреляют в разных направлениях и сопровождаются подавленностью и тревогой. Ощущение, как будто соль насыпали на рану. Склонность к образованию камней; *зудящие высыпания*; они появляются после установления жаркой погоды и после вакцинации. *Очень болезненные подагрические узлы*. Ревматизм. Сарсапарилла улучшает цвет лица, очищает кожу на лице.

**Хуже.** В конце мочеиспускания. Весной. От холода, сырости. От ртути. Ночью. После подавления гонореи. При зевании. От движения. При подъеме и спуске по лестнице.

**Лучше.** Обнажить шею и грудь. Стоя.

**Психика.** Депрессия и тревога из-за боли. При мысли о пище, которую пациент съел, возникает тошнота. Легко обижается. Молчаливый. Унылый, мрачный без всякой причины.

**Голова.** Боли распространяются из затылка в глаза или в корень носа. Ощущение, как будто мяч стучит в голову, когда пациент разговаривает. Ощущение болезненно тугой повязки вокруг головы, пациент непроизвольно снимает шляпу, но это не приносит облегчения.

**Глаза.** Видит, как в тумане, хуже от семяизвержения. Высыпания на веках, напоминающие чесотку.

**Уши.** Слова отдаются эхом в ушах.

**Нос.** Нос заложен годами. Опухание в области .корня носа.

**Лицо.** Высыпания на лице и над верхней губой; сильнее во время менструации. Лицо желтое, морщинистое, выглядит старым.

**Рот.** Афты; слюнотечение. Зловонное дыхание. Боль в челюсти усиливается при запрокидывании головы.

**Желудок.** После приема пищи возникает ощущение пустоты, как при голодании, а кроме того, тошнота или отвращение к еде возникает, когда думает о пище, которую съел. Питье воды вызывает рвоту.

**Живот.** Колика и боль в спине в одно и то же время, при поносе. Урчание в животе с ощущением пустоты. Песок в стуле. Мокнувшие высыпания и болезненность в паховых областях перед менструациями. Детская холера. Стойкий запор, сопровождающийся учащенными позывами на мочеиспускание.

**Мочевыделительная система.** *Болезненное мочеиспускание, заставляющее кричать*; хуже в конце мочеиспускания. Пациент может помочиться только стоя; это бывает в дневное время, а ночью, в постели, моча вытекает свободно. Моча сочится, вытекает по капле, когда пациент сидит. Императивные позывы на мочеиспускание перед менструацией. В конце мочеиспускания выделяется несколько капель крови или белое едкое вещество. Песок на пеленке. Во время мочеиспускания из мочевого пузыря выходит воздух. *В моче осадок в виде корки, плотного налета*. Боль в уретре, распространяющаяся назад, в живот. Дергающая боль по ходу уретры. Почечная колика (справа). Гной в моче.

**Мужские половые органы.** Половые органы влажные, неприятно пахнут. Сперма кровянистая. После поллюции ощущается боль в семенном канатике; он набухший, если сексуальное желание не удовлетворено. Герпес на крайней плоти. Дергающее ощущение вдоль уретры. Зуд мошонки и промежности.

**Женские половые органы.** Соски втянуты или покрыты трещинами, маленькие и сморщенные. Менструации поздние и скудные. При дисмении отмечается втянутость сосков или болезненность молочных желез.

**Шея и спина.** Исхудание шеи. Боль распространяется из поясницы вниз, по ходу семенного канатика, в том числе после поллюции. Боль в спине при колике.

**Конечности.** Режущие боли под ногтями. *Глубокие трещины* на пальцах рук и ног, особенно по бокам. Изъязвление кончиков пальцев рук. В целом, это любые болезни, локализующиеся на правой ноге.

**Кожа.** Вялая, сморщенная, собирается в складки; *пятнистая*, плотная. Зудящие, покрытые чешуйками участки кожи. Гной, вызывающий раздражение кожи. Высыпания медного цвета. Экхимозы (кровоподтеки, внутрикожные кровоизлияния) у стариков. Отек. Новая кожа трескается и горит.

**Сон.** Зевота; она сопровождается другими симптомами.

**Лихорадка.** Озноб возникает в области мочевого пузыря и распространяется в спину.

**Дополнительно.** Merc, Sep.

**Диф. диагноз.** Calc, Petr.

## SCILLA (SQUILLA) MARITIMA

**Общее.** Лук Красного моря, или морской лук, воздействует на *серозные и слизистые оболочки* дыхательных путей и пищеварительного тракта, а также на *почки, сердце* и селезенку.

Сцилла (или Сквилла)— это медленно действующее средство, и оно полезно в тех случаях, когда процесс достигает своего наибольшего развития в течение нескольких дней. Характерно наличие экссудации и обильной секреции. Отеки; они сопровождаются *обильным мочеиспусканием*. Бульканье. Сочетание симптомов со стороны сердца и мочевы-делительной системы. Действие Сциллы напоминает действие *Dig.*: Сцилла хорошо следует за *Dig.*, когда ему не удастся уменьшить отеки.

**Хуже.** Рано утром. От движения. Когда раскрывается. Во время вдоха. У стариков. При кашле.

**Лучше.** В покое. Подняться, сесть в постели. От выделения даже небольшого количества мокроты.

**Психика.** Пациент сердится по пустякам. Испытывает отвращение к умственному и физическому труду.

**Глаза.** Левый глаз выглядит значительно меньшим, чем правый. Ребенок сильно трет глаза и лицо, как будто у него сильный зуд; наблюдается при заболевании головного мозга; при кори. Ощущение, как будто глаза залиты холодными слезами. Слезы выступают при кашле. Застывший взгляд, глаза широко раскрыты.

**Нос.** Жестокое чихание, сопровождающееся жидкими едкими выделениями из носа. Чихание во время кашля. Сильно течет из носа утром.

**Лицо.** Ребенок трет лицо кулачком при кашле. Губы подергиваются, покрыты желтыми корками; черные, потрескавшиеся.

**Рот.** Черные пятна на зубах. *Сладкий: привкус во рту;* привкус у пищи, особенно у супа и мяса; горький привкус у хлеба. Жажда: хочется холодных напитков. При одышке пьет маленькими глотками.

**Желудок.** Давление, как от камня. Боли уменьшаются, когда пациент лежит на левом боку.

**Живот.** Приступообразное урчание и бульканье над лобком — лучше от еды. Тупые боли в подреберьях. Боли в селезенке при ее заболевании. Стул темный, коричневый, пенистый, крайне зловонный. Асцит со скудным выделением мочи.

**Мочевыделительная система.** Учащенные или внезапные позывы на мочеиспускание: выделяется много мочи. Непроизвольное мочеиспускание при кашле. Кровянистая моча. Когда мочится, происходит отхождение кала.

**Мужские половые органы.** Поллюции при эротических переживаниях.

**Дыхательные органы.** *КАШЕЛЬ:* упорный, сухой, хриплый, *клокочущий;* он мешает спать, будит; сопровождается чиханием; насморком; слезо течением; недержанием мочи; или сопровождается отхождением стула; или жаром; заканчивается ощущением, что пациент давится, задыхается; хуже от холодного питья, когда делает вдох.

Ребенок трет лицо и глаза при кашле. Кашель усиливается утром и вечером. Кашель сухой, после него всегда возникает потребность высморкаться. Мокрота отхаркивается легко, плотная; отходит с трудом; в виде мелких круглых шариков; сладковатая на вкус; белая или красноватая; зловонная.

Одышка: сопровождается колющей болью в груди и судорогами в мышцах живота. При астме пациент пьет маленькими глотками; ощущает *колющую боль в груди* (слева). Кашель при увеличении селезенки или при боли в области селезенки. Влажный утренний кашель переносится тяжелее, чем сухой вечерний кашель. Плеврит. Бронхопневмония.

**Сердце.** Сцилла стимулирует работу сердца. Пульс малый и медленный; скорее твердый.

**Шея и спина.** Ощущение кипения ниже лопатки.

**Конечности.** Ногти становятся хрупкими и расщепляются. В стопах появляется болезненность после того, как человек постоит. Чувствительные стопы у продавщиц в магазинах. Кисти и стопы холодные, тело горячее.

**Кожа.** Мелкие красные пятна разбросаны по всему телу, в них ощущается боль в виде покалывания.

**Лихорадка.** Жар сопровождается нежеланием раскрыться, раздеться. Пототделение отсутствует.

**Дополнительно.** Ant-t.

**Диф. диагноз.** Ars., Bar-c, Nux-v., Rhus-t, Sil.

## SCOPARIUS

**Общее.** Это средство *обладает тонизирующим действием на сердце;* оно влияет также на почки; спинной мозг; мышцы и левую сторону тела. Скопариус увеличивает силу сердечных сокращений, снижает кровяное давление. Нерегулярная (аритмичная) деятельность сердца, связанная с гриппом или другим инфекционным заболеванием. Скопариус уменьшает *полнокровие почек* (конгестию), способствуя улучшению их выделительной функции и уменьшению нагрузки на сердце. Сильные тупые боли (ломота).

Хуже. Когда поворачивается на левый бок.

Лучше. От прохладного воздуха. От быстрого движения. От отхождения кишечных газов.

**Живот.** Кажется, что желудок и кишечник заполнены камнями или твердой массой. *Метеоризм;* при этом отмечается тяжелая депрессия, подавленность. Колика в животе, затем отходит яркий, едкий, пенистый стул, после которого в заднем проходе ощущается жжение.

Мочевыделительная система. *Очень обильная* яркая, пенистая моча, после ее отхождения — жжение в промежности.

Сердце. Ощущение тревожного стеснения в области сердца, распространяющегося в левое плечо и шею. Сердцебиение с приливом крови к голове — с конгестией. Стенокардия. Сердце курильщика.

**Конечности.** Ощущение омертвения — потери чувствительности, онемения — правой руки и пальцев на руке.

**Кожа.** Сикоз, лишай области бороды и усов.

**Диф. диагноз.** Phos.

## SECALE CORNUTUM

**Общее.** Секале — это нозод растительного происхождения, который готовится из спорыньи. Известно, что спорынья сокращает *мышцы КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ И МАТКИ*, разрушает *КРОВЬ*, приводя к *кровотечениям*. Непрерывно сочится жидкая, водянистая, черная, зловонная кровь.

*Подергивание мышц*; спазмы, во время которых пальцы растопырены. Грызущее ощущение и *судороги*, сопровождающиеся скованностью, возникают в отдельных частях тела или после болей.

*Онемение.* Невыносимое *ощущение пощипывания, ползания чего-то живого*: оно начинается в лица; или в спине; ощущается в конечностях; в кончиках пальцев рук; уменьшается от растирания.

*Ощущение жжения* во всем теле, или как будто искры сыплются на тело, или жжение на отдельных участках; жжение, как от огня. *Выделения темные, жидкие, зловонные и истощающие.*

Тонические судороги (тетанус), пациент в полном сознании. Быстрое исхудание: худеет парализованная часть тела; либо пациент худеет, несмотря на хороший аппетит и сильную жажду. Потеря способности к произвольным движениям. Пациенту кажется, что он ступает по бархату.

Тело холодное; но пациент не хочет, чтобы его укрывали. Судорожное сокращение и вздрагивание парализованных конечностей.

Невралгия, возникающая из-за давления расширенных вен. Варикозное расширение вен. Тромбоз вен. Лимфоидные опухоли. Ощущение омертвения — онемения, утраты чувствительности; в любой части тела. Гангрена: после травмы; из-за прикладывания пиявок или горчичников; лучше от холода.

Секале подходит раздражительным полнокровным пациентам; или худым, костлявым, слабым женщинам с признаками истощения, хакексии; или очень старым, дряхлым людям. Петехии. Мелкие ранки сильно кровоточат. Кажется, что все раскрыто, расслаблено и болтается. Спазм, сужение артериол. Хронические резкие, жалящие невралгические боли, сопровождающиеся жжением, как от огня; лучше от прикладывания горячего.

Паралич сопровождается деформацией конечностей; поражает нижние конечности; паралич возникает с одной стороны; паралич одной руки или одной ноги; паралич сопровождается пощипыванием, онемением и покалыванием. Паралич после спазмов. Двигательное беспокойство, крайняя слабость; изнеможение. Коллапс.

**Хуже.** *ОТ ТЕПЛА.* Перед самым началом или во время менструации. При беременности. От потери жизненных соков — жидкостей организма. *ОТ УКРЫВАНИЯ.* От прикосновения. От еды. От сексуальных излишеств. После аборта. У курильщиков.

**Лучше.** *От холода, от купания в холодной воде*; когда раскрывается, раздевается; когда обмахивают веером, от вентилятора. От раскачивания, качания. *Если с силой выпрямить, потянуться.* Когда лежит в постели, согнувшись вдвое. После рвоты.

**Психика.** Нервная слабость: после спазмов; после вызывающего изнеможение полового акта. Безумие: склонен кусаться, может утопиться. *Маниакальный страх*; или депрессия из-за страха. Послеродовой психоз: обнажает тело, с силой тянет себя за половые органы, вводит палец во влагалище и расцарапывает его до крови; потому, что убеждена, что утратила скромность, благопристойность. Пациентка смеется, хлопает в ладоши над головой, кажется, что она не в себе.

**Голова.** Голова кажется легкой либо тяжелой, в то время как в голенях ощущается пощипывание. Пациент вертит головой в разные стороны. Выпадение волос.

**Глаза.** Искры перед глазами. Старческая, начинающаяся катаракта, особенно у женщин. Глаза ввалившиеся; с синими кругами. Паралич верхнего века, в том числе из-за отравления угарным газом. Подавление слезоотделения. Двоится или троится в глазах. Слепота. Диабетический ретинит.

**Уши.** Тугоухость после холеры.

**Нос.** Постоянные кровотечения из носа; кровь темная; кровотечение сопровождается выраженным упадком сил; возникает у стариков, пьяниц или у молодых женщин.

**Лицо.** Черты лица искажены или лицо осунувшееся, бледное, с заострившимися чертами. Дикий взгляд. *Ощущение* пощипывания в лице или подергивание мышц лица; оно распространяется на все тело. Спастическое сжатие челюстей (тризм).

Рот. Язык сухой, потрескавшийся, из него сочится черная, как чернила, кровь; язык неподвижный, одеревенелый; в кончике ощущается пощипывание; язык кажется парализованным; пациент заикается, речь невнятная.

**Горло.** Болезненное пощипывание; жжение. Паралич после дифтерии.

**Желудок.** Неутолимая *жажда*. Неестественно повышенный аппетит (волчий голод); страстное желание кислой пищи и лимонада. Рвотные массы темно-коричневые, как кофейная гуща. Позывы на рвоту (отрыжка воздухом). Жжение. Тошнота, легко возникает рвота. Кровавая рвота.

**Живот.** Крайне вздутый и напряженный; пациенту *хочется раскрыться, обнажить живот*. Ощущение пустоты внизу живота (в гипогастрии); либо давление на низ; приходится лечь в постель и согнуться пополам. Стул извергается сплошным потоком, зловонный; безболезненный, водянистый, оливково-зеленый или кровавистый; стул сопровождается падением кровяного давления (коллапсом); тело становится холодным, как

лед, но пациент не выносит, когда его укрывают. Кажется, что задний проход расслаблен и широко раскрыт, зияет; кал выделяется произвольно. Подергивание мышц живота. Образование больших комков, шишек и участков вздутия, распухания в животе.

**Мочевыделительная система.** Недержание мочи (энурез) у стариков. Кровянистая моча, белый творожистый осадок. Подавление выделения мочи, моча бледная, водянистая. Задержка мочи с безрезультатными позывами на мочеиспускание.

**Женские половые органы.** Менструации нерегулярные, обильные, менструальные выделения темные; постоянно сочится водянистая вонючая кровь, в том числе — до следующей менструации. Вялая матка или ощущение давления на низ, при этом тело холодное. Сокращение матки; матка в виде песочных часов. Коричневатые, отвратительные, непрекращающиеся бели.

Угроза выкидыша: на третьем месяце беременности. Сильные послеродовые схватки. Темные, отвратительные, зеленого цвета лохии. Инфицированная плацента. Метрит. Гангрена женских половых органов. Подавление секреции молока, сопровождающееся жалящими болями в молочных железах. "После аборта никогда больше не чувствовала себя здоровой". Влагалище горячее либо прохладное. Послеродовой сепсис. Выпадение матки после наложения акушерских щипцов в родах.

**Дыхательные органы.** При надавливании на позвоночник возникают боли, проходящие сквозь грудную клетку. Ощущение жжения в легких.

**Сердце.** Сердцебиение после сексуальных излишеств; у мужчин. Пульс перемежающийся.

**Шея и спина.** Пощипывание, покалывание из спины распространяется в пальцы рук и ног. Давление на больное место вызывает локальную боль, а также способствует распространению боли сквозь грудную клетку. Миелит.

**Конечности.** Конечности холодные. Синеватые пальцы на руках и на ногах. Судороги в кистях; в голених и стопах. Пальцы на руках растопырены, изогнуты назад или стиснуты, выглядят пропитанными водой, набухшими, раскисшими от воды. Ощущение, как будто пальцы на руках покрыты пушком, в том числе у курильщиков. Судороги в икроножных мышцах. Дрожащая, шатающаяся или шаркающая походка, как будто стопы волочатся. Пальцы на ногах подтянуты вверх. Локомоторная атаксия. Паралегия. Кисти и стопы холодные и сухие, у курильщиков.

**Кожа.** Нарывы (фурункулы), содержащие зеленый гной; они созревают медленно. Кровяные волдыри. Кожа холодная, сухая, морщинистая или синеватая; изменения более выражены на больной части тела. Болезнь Рейно. Отеки новорожденных. Язвы зловонные, вялотекущие, безболезненные; варикозные язвы. Подергивание или дрожание кожи. Ощущение ползания мурашек под кожей.

**Сон.** Бессонница у наркоманов и алкоголиков. Глубокий, летаргический сон.

**Лихорадка.** ОЩУЩЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ЖЖЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЮСЯ ХОЛОДОМ СНАРУЖИ ТЕЛА И НЕЖЕЛАНИЕМ УКРЫТЬСЯ; сильнее на животе. Жар, как будто от искр. Рожистое воспаление. Холодный или зловонный пот портит обувь.

**Дополнительно.** Ars., Thuj.

**Диф. диагноз.** Chin., Merc, Nux-m., Puls., Ust.

## SELENIUM

**Общее.** Считается, что этот химический элемент обладает сходством с серой (*Sulph.*) и теллуром (*Tell.*) Он постоянный компонент костей и зубов.

Селен оказывает выраженное влияние на *нервы МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ* и надглазничную область (слева); кроме того, он воздействует на *ГОРТАНЬ* и печень. Пациент под влиянием селена начинает *быстро уставать* от жары или в жаркую погоду; от малейшего умственного или физического напряжения он становится сонным.

Слабость после истощающих заболеваний; после лихорадки. Старческий возраст; раннее старение. *Исхудание* отдельных частей тела, лица, кистей, бедер и т.д. Пульсация во всем теле, особенно в животе; усиливается от еды. Судороги: после них возникает скованность. Щиплет, пощипывает в разных местах.

Болезненные последствия распутной жизни, чрезмерного употребления чая, сахара, соли, лимонада, потери жизненных соков организма, мастурбации, сексуальных излишеств, чрезмерной учебной нагрузки. Любые симптомы, сопровождающие поллюции или семяизвержение, в особенности, сперматорея, возникающая во время стула, когда пациент тужится.

**Хуже.** В жаркие дни. От бессонницы; работы по ночам. От прикосновения. После сна. От пения. От сквозняка, даже теплого потока воздуха. После стула. От коитуса. От вина.

**Лучше.** После захода солнца. При вдыхании холодного воздуха. От питья холодной воды.

**Психика.** Совершенно неспособен ни к какой деятельности. Забывчивость на работе, в делах; все, что забыл, вспоминает во сне. При волнении разговорчивый; заикается, некоторые слова произносит неправильно. Грустный. С трудом соображает. Забывчивый, когда просыпается, видит в полусне то, что забыл. Сладострастные мысли при импотенции. Воображает, что дует сквозняк. Не может понять услышанное или прочитанное.



Испытывает отвращение к сквозному ветру, теплему, холодному или сырому. Страх общества — боится выйти в свет.

**Голова.** Боль над левым глазом; хуже, когда прогуливается под солнцем; от сильных запахов, как например, мускус, роза или чай; сопровождается повышенным мочевыделением. Нервного происхождения головные боли. Кожа волосистой части головы кажется собранной в складки. Выпадение волос; в том числе из бровей, усов и в области половых органов. Не хочет, чтобы прикасались к его волосам. Боль в коже головы, как будто выдергивали волосы.

Уши. Глухота из-за уплотнения ушной серы.

**Нос.** Насморк, завершающийся поносом. Склонность ковырять пальцами в носу. Заложенность носа, в том числе хроническая. Нос заполнен густой, похожей на яичный белок слизью.

**Лицо.** Худое лицо. Комедоны. Кожа жирная, лицо блестит.

**Рот.** Зубная боль из-за питья чая; сопровождается ощущением холода; уменьшается, когда держит во рту холодную воду или при попадании в рот холодного воздуха. Сладковатый привкус во рту.

**Желудок.** Жажда отсутствует. Страстное желание стимулирующих веществ, коньяка (бренди), чая и т.д. Отвращение к соленой пище. Пульсация во всем теле, особенно в животе после еды — это мешает спать. Непреодолимое желание напиться (пьяным).

**Живот.** Хронические заболевания печени. Печень увеличена, в ней ощущается колющая боль, усиливающаяся во время вдоха, кроме того, обнаруживается мелкая сыпь в области печени. Стул очень объемный, плотный, такой твердый, что требуется механическая помощь, чтобы его удалить. В кале обнаруживаются нити, напоминающие волосы.

**Мочевыделительная система.** Моча выделяется произвольно, сочится — вытекает по капле: при ходьбе; после мочеиспускания; а также после стула. Крупный песок в моче. Щиплет, как будто едкая капля выталкивается наружу.

**Мужские половые органы.** *Сладострастие* в сочетании с импотенцией. Характерно повышение сексуального желания, снижение способности. Сперма сочится во время сна. *Легко возникает семяизвержение:* во время коитуса в сочетании со слабой эрекцией и с продолжительным сексуальным возбуждением; эякуляция во время стула. Сперма водянистая, без запаха.

Хронический уретрит (гонорейный). Сок простаты выделяется по каплям во время сна, когда пациент сидит, при ходьбе, во время стула. Водянка яичка (гидроцеле).

**Женские половые органы.** Обильные менструации с выделением темной крови. Пульсация в животе во время беременности — сильнее от еды.

**Дыхательные органы.** *Голос хриплый:* охриплость возникает, как только человек начинает петь, говорить или читать; возникает при каждой простуде. Голос хриплый, грубый. Узелки на голосовых связках. Пациент отхаркивает прозрачную слизь, в том числе утром. Часто возникает необходимость прочистить горло, в том числе у певцов. Делает глубокий вдох. Туберкулезный ларингит. Сухой отрывистый кашель — сильнее утром. Пациент отхаркивает комочки кровянистой слизи. Чувство слабости в груди.

**Шея и спина.** После кратковременной болезни спина становится почти как парализованная. Шейные лимфоузлы увеличенные и твердые. Паралитическая боль в пояснице уменьшается, когда пациент лежит на животе.

**Конечности.** Исхудание кистей; голеней. Внезапная боль в седалищном нерве (слева), после нее остается ощущение болезненности.

**Кожа.** Зуд в области лодыжек и в складках кожи. Кожа жирная, маслянистая. Мокнет после расчесывания. Участки жжения на коже. На ладонях высыпания, сопровождающиеся образованием корок. Псориаз ладоней. Угри.

**Сон.** Спать мешает пульсация во всем теле, особенно в животе. Пациент просыпается рано, в один и тот же час.

**Лихорадка.** *Пот* обильный; желтого цвета, *оставляет налет соли на одежде;* делает жестким белье или волосы — они напоминают проволоку; потоотделение более выражено в области половых органов.

**Диф. диагноз.** Calc, Merc, Nat-m., Nux-v., Sep., Sulph.

## SENECIO

**Общее.** В эклектической медицинской практике крестовник считается растением, регулирующим менструации. Это значит, что он оказывает выраженное влияние на **ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ И НА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ**, особенно на мочевой пузырь. Он воздействует на *слизистые железы*, вызывая катар слизистых оболочек влагалища, мочевого пузыря и дыхательных путей.

Характерна недостаточная, вялая реакция слизистых оболочек мочеполовых органов. *Измуряющие* викарные выделения и кровотечения. Ощущение напряжения, сжатия в носу, горле и т.д. Мышцы сокращены, стянуты в узел. Ощущение комка в горле.

Болезненные последствия подавления или задержки менструации; последствия ран. *Нервные, бледные, слабые и потерявшие сон истеричные женщины.* Склонность к кровотечениям; возникают кровотечения из разных органов, особенно при подавлении или задержке менструации. Отеки после кровотечения.

**Хуже.** В период полового созревания (в пубертатном возрасте). От сексуального возбуждения. От сырости. На холодном открытом воздухе — на улице. Сидя (психические симптомы) — вынужден ходить, прохаживаться.

**Лучше.** От менструации.

**Психика.** Пациентка очень раздражительна, хнычет. Не способна сосредоточиться ни на одном предмете. Эгоизм. Поочередно — в приподнятом настроении и грустная.

**Голова.** Головокружение с ощущением качания на волнах, начинающееся в затылке и распространяющееся выше, в свод черепа. Резкая боль над левым глазом и проходящая сквозь левый висок. Головная боль возникает перед появлением белей и раздражением мочевого пузыря.

**Глаза.** От слез возникает зуд.

**Уши.** Зуд в евстахиевой трубе.

**Нос.** Жжение в ноздрях. Чихание, сопровождающееся жжением в носу. Ощущение напряжения, сжатия в носовых ходах. Носовое кровотечение или катар возникают в случае подавления менструации, независимо от причины. Насморк сопровождается носовым кровотечением.

**Лицо.** Подергивание мышц вокруг рта.

**Горло.** Ощущение сухости и сжатия, хочется сделать глотательное движение; хотя это причиняет боль.

**Желудок.** Отвращение ко всей пище, в особенности, к сладостям и кофе, которые прежде пациентка очень любила. Тошнота и рвота почечного происхождения. Ощущение шара, поднимающегося из желудка и подкапывающегося к горлу.

**Живот.** Боль в пупочной области, распространяющаяся во всех направлениях; она уменьшается от стула; если согнуться пополам. Асцит из-за подавления менструаций. Стул: жидкий, водянистый, перемешанный с твердыми комками кала; или жидкий, темный, кровянистый, сопровождающийся тенезмами.

**Мочевыделительная система.** Ощущение жара в области шейки мочевого пузыря; а также постоянные императивные позывы на мочеиспускание в сочетании с болью в почке. Моча кровянистая; очень горячая или с большим количеством слизи в осадке. Почечная колика (справа). Нефрит. Дизурия у женщин при дисменорее или при смещении матки, а также у детей, в сочетании с головной болью.

**Мужские половые органы.** Сладострастные сны; в том числе сопровождающиеся поллюциями. Увеличение предстательной железы; она кажется твердой на ощупь и набухшей.

**Женские половые органы.** *Функциональная аменорея* у юных девушек, сопровождающаяся болью в спине. Менструации задерживаются; а также подавлены, при этом наблюдаются сопутствующие симптомы: отеки, кашель, боли в спине и т.д.

Обильное выделение слизи из влагалища вследствие сексуального возбуждения. Повышенная сексуальная возбудимость, сопровождающаяся зудом, жжением в половых губах и их набуханием.

Боли из яичников распространяются в молочные железы. Бели: густые, желтые, обильные, *стекают по бедрам.* Ощущение, как будто должна начаться менструация. Меноррагия: обильное кровотечение продолжается до тех пор, пока у женщины не появятся признаки анемии. Дисменорея, в том числе после аборта. Жжение в левом соске.

**Дыхательные органы.** Щекочущий кашель с отхаркиванием мокроты, содержащей прожилки крови; в том числе при подавлении менструации. Кровохарканье при подавлении менструаций. Влажный кашель с отхаркиванием обильной слизистой мокроты, при этом пациент(ка) дышит с трудом.

**Спина.** Боль в пояснице, как будто она может сломаться; при аменорее. Заболевание почек.

**Конечности.** Блуждающие суставные боли, в том числе периодические. В постели стопы холодные. Хрупкие ногти.

**Кожа.** Сухая кожа.

**Сон.** Много сновидений, в том числе эротических. Бессонница у женщин при болезнях матки и аменорее. Сонливость, дремота в течение дня.

**Лихорадка.** Гектическая лихорадка с отсутствием аппетита (с анорексией).

**Диф. диагноз.** Puls., Sep.

## SENEGA

**Общее.** Известна как змеиный корень, или истод змеиный. Сенегга поражает *СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ*, вызывает симптомы катара, особенно в дыхательных путях и мочевом пузыре. Страдают также *глаза*, серозные оболочки *ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ*; мышцы и левая сторона тела.

Сенегга подходит полнокровным людям, а также людям, склонным к полноте; высоким, стройным, оживленным женщинам; старикам или *упитанным, с толстыми щеками детям.*

Парез, в особенности мышц глаза, и отчетливые глазные симптомы. После воспаления в груди остаются ограниченные болезненные участки. Кажется, что слабость возникает в груди. Обморочная слабость при ходьбе на открытом воздухе, на улице. Ощущение жжения *в дыхательных путях*. Вялость тканей. Обильные выделения, напоминающие яичный белок.

Последствия ядовитых укусов. Растяжение связок. Ощущение дрожания без видимой на глаз дрожи.

Хуже. *От воздуха* — когда вдыхает его; на улице (на открытом воздухе); от холодного воздуха; от ветра. *От прикосновения*. От давления. *В покое*. Если смотрит пристально. При ходьбе на улице — на открытом воздухе (одышка, кашель). От растирания.

**Лучше.** Запрокинуть голову назад (зрение). От потоотделения. При ходьбе на открытом воздухе (боли).

**Психика.** Тревога; в сочетании с учащенным дыханием. Легко обижается.

**Голова.** Распирающая боль во лбу, как будто голова лопнет; боль распространяется в глаза; уменьшается от прохладного воздуха на улице — на открытом воздухе.

**Глаза.** Кажется, что глазные яблоки расширены или как будто глаза — это ледяные шары. Возникает ощущение дрожания, глаза слезятся, когда пациент пристально смотрит или читает. Предметы видит как сквозь туман, завесу. Слезотечение, птоз и диплопия; лучше, если запрокинет голову. Блефарит, веки сухие, покрыты корками. Паралич глазодвигательного нерва. Сенега способствует рассасыванию фрагментов хрусталика после хирургических операций. Мерцание перед глазами, пациент вынужден часто вытирать глаза. Помутнение стекловидного тела. Ирит. Пятнышки на роговице. Колотье в глазу (справа), хуже при кашле.

**Уши.** При жевании в ухе возникает тупая боль, ломота.

**Нос.** Пациент чихает так часто и так сильно, что появляется головокружение, тяжесть в голове. В ноздрях как будто перец.

**Лицо.** Паралич левой половины лица. Папулы в углах рта, жжение в них.

**Рот.** Сухость, царапает во рту; хуже, когда разговаривает. Привкус во рту: металлический; напоминающий мочу.

**Горло.** Сухость, царапает в горле — хуже при разговоре. Отхаркивает из горла вязкую слизь в виде отдельных мелких сгустков.

**Желудок.** Отвращение к еде и тошнота; склонность к рвоте.

**Мочевыделительная система.** Моча: пенная, едкая; ее количество увеличено или уменьшено; в моче видны крупные хлопья, похожие на обрывки слизистой оболочки. Ощущение, как от кипятка, перед мочеиспусканием и после него.

**Дыхательные органы.** Сухость, царапает в груди; сильнее при разговоре. Хриплый, неровный голос; хуже от разговора и потери спермы; голос пропадает внезапно, при чтении вслух.

Непрекращающийся кашель, удушающий, жестокий, от которого сотрясается тело пациента, он задыхается; кашель заканчивается чиханием; хуже становится, когда пациент лежит на правом боку или вечером.

Много хрипов, *клокотание в груди*; но прозрачная, обильная мокрота слишком вязкая, соскальзывает обратно. Мокрота напоминает яичный белок или содержит прожилки крови.

**Грудная клетка болезненна** из-за кашля, при надавливании, при чихании или движении рук, на отдельных участках; она как будто ушиблена; при наклоне ощущаются боли, меняющие локализацию. Ощущение, как будто грудную клетку раздавливает груз; или ощущается слабость, начинающаяся в груди; грудная клетка кажется слишком узкой. Выпот в плевральной полости. Гидроторакс. Жжение в груди перед кашлем или после него. Астматический бронхит у стариков в сочетании с хроническим нефритом или эмфиземой. Частичный паралич голосовых связок. Плевропневмония.

**Диф. диагноз.** Calc, Caust., Нер., Lyc, Phos., Sulph.

## SEPIA

**Общее.** Чернила каракатицы, известные как "индийские чернила", считаются преимущественно женским лекарством, хотя первые симптомы Га-неман случайно заметил у мужчины-художника.

Сепия поражает *венозное кровообращение*, особенно в области **ЖЕНСКИХ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ**, в системе воротной вены и пищеварительном тракте. Венозный застой и, как следствие, птоз внутренних органов — важные характеристики этого средства.

Сепия подходит молодым людям того и другого пола, нервным и нежным, у которых легко возникает сексуальное возбуждение или они истощены в результате сексуальных излишеств. Это дети, часто простывающие при перемене погоды. Вялые, полнокровные женщины. Слабые, с отвислым животом, с желтым лицом рожавшие женщины. Заболевания у беременных. Женщины, изнуренные тяжелым трудом, потерей жизненных соков, сексуальными излишествами, у которых часто наблюдается *выпадение внутренних органов, болезни матки*.

**Симптомы часто сосредоточиваются** в области спины, в илеоцекальной области, яичниках и т.д.; они могут распространяться вверх, в голову; сопровождаются ощущением давления на низ в области таза. Пациентка

содрогается от боли. *Внезапный упадок сил, изнеможение. Ощущение слабости, пустоты* в эпигастрии, грудной клетке, мышцах, пояснице, в верхней части бедер (в боковых отделах таза), в коленях и т.д.; либо ощущение полноты, переполнения.

*Ощущение комка или перекатывающегося внутри тела предмета.* Ощущение неистового кипения крови, сопровождающегося пульсацией во всем теле.

Приступы нервозности и истерические спазмы. Судороги — тонические, клонические, катаlepsия (оцепенение). Сильное утомление от короткой прогулки. Подергивание, резкие мышечные сокращения. Жгучие боли в разных частях тела. Кровотечения. Выделения, напоминающие молоко. Обмороки. Суетливость. Склонность к выкидышу; начиная с 5—7 месяцев беременности.

Пациенты, страдающие туберкулезом, хроническим заболеванием печени и болезнями, рефлекторно связанными с заболеванием матки. Пациент мерзнет даже в теплом помещении.

Болезненные последствия переживания гнева и неприятностей, разочарования; ударов; травмы; поднятия чрезмерной тяжести; падения; сотрясения; промокания; работы в прачечной; употребления в пищу кипяченого молока; жирных продуктов; свинины; употребления табака.

Женщина падает в обморок, когда стоит на коленях в церкви. Заболевания, которые принимают затяжной характер. Бородавчатые наросты. Дистрофия у детей: лицо, как у старика, большой живот, сухая дряблая кожа. Ревматизм: хронические случаи или упорно сохраняющиеся последствия острого заболевания. Хуже. *От холода, от холодного воздуха*; от северного ветра; когда идет снег; в снегопад; от сырого холода. *От сексуальных излишеств.* Перед менструацией. *При беременности.* От аборта. Утром и вечером.

После первого сна (в первой половине ночи). При засыпании. Сидя, стоя. Когда стоит на коленях. От сотрясения. При наклоне. От коитуса. Перед грозой. От прикосновения. Когда поднимается по лестнице. От растирания. От поднятия тяжести. От расчесывания, царапанья. От стирки белья.

**Лучше.** *От сильного, энергичного движения. От тепла*, в том числе от тепла постели. От давления. От прикладывания горячего, горячих компрессов, аппликаций. Если положить ногу на ногу или подтянуть конечности. После сна. От холодного питья; холодной ванны; от холода — на открытом воздухе.

**Психика.** Пациентка сердитая, гневливая; чувствительная; раздражительная; легко обижается, чувствует себя несчастной. Хочет покончить жизнь самоубийством. Нервничает так сильно, что возникает желание за что-нибудь схватиться, чтобы не закричать. Женщина говорит и делает странные вещи. Никто не знает, что она сделает в следующий раз. Тревога и страх; в том числе *по пустякам*.

Отвращение к своей семье, к самым любимым людям; к выражению сочувствия, проявлению симпатии; к обществу; однако, боится остаться одна. Нерасположена к привычным делам; отвращение к жизни. Подавление чувств, любви. *Плохая память.* Делает ошибки при письме или при чтении.

*Печаль.* Раздражительность *чередуются с безразличием* или угрюмостью, дурным настроением. Грустит по поводу своего здоровья или домашних проблем. Постоянно беспокоится, мучается и плачет по поводу действительных или мнимых болезней. Сексуально озабочена. Плачет, когда рассказывает о своих симптомах. Скупость. *Тупость*, хочет уйти прочь. *Безразличие.* Получает удовольствие, дразня других. Чувствует себя несчастной без причины. Сидит тихо и отвечает либо "да", либо "нет". Женщины ненавидят мужчин, мужчины — женщин. Теряет самообладание и возникают приступы плача.

**Голова.** Приступы головокружения усиливаются при ходьбе на открытом воздухе, от малейшего движения рук; либо головокружение сопровождается ощущением, как будто что-то вращается вокруг головы.

*Головная боль:* стреляющая, жгучая; в направлении изнутри наружу или вверх; над левым глазом; сопровождается ощущением тяжести в темени; боль возникает поочередно то с одной, то с другой стороны — в области затылка; хуже, когда пациент лежит на больной стороне, в помещении; головная боль сопровождается тошнотой и рвотой.

Головная боль в виде ужасных толчков, ударов во время менструации; сопровождается скудным менструальным кровотечением; сексуальным возбуждением — желанием физической близости.

Голова дергается назад и вперед; в том числе произвольно, при незаращении родничков у детей; при истерии или от боли. Выпадение волос: после приступа хронической головной боли, во время климакса. Корни волос чувствительны к причесыванию. Прыщики на лбу по краю роста волос. Холод и тяжесть в темени. Гемикрания (мигрень). Желтуха, сопровождающаяся головной болью. Пациент кричит при боли. Головная боль усиливается, когда женщина ходит в магазин за покупками, от умственного труда, уменьшается от приема пищи.

**Глаза.** *Веки свисают.* Видит перед глазами черные пятна, точки, искры, вспышки, молнии и полосы света; вуаль, пелена перед глазами; после этого возникает коллапс. Края век красные, чешутся; возникает рак. Зрение пропадает во время менструации; лучше лежать. Опухоли хрящей век. Неясное зрение: из-за сексуальных излишеств, мастурбации и болезней матки. Не переносит отраженного света. Сепия прекращает развитие катаракты у женщин. Ощущение, что глаза выпадают. Эпителиома век. При ячменях глаза красные.

**Уши.** Герпес: за ушами; на мочке уха; на задней поверхности шеи. Повышенная чувствительность к шуму; особенно к музыке. Внезапная глухота; как будто вставили пробки в уши. Выделения из ушей: густой желтый гной; зловонные выделения. Опухание и высыпания в области наружного уха.

**Нос.** Повышенная чувствительность к запахам, в том числе к неприятным; а также к запаху готовящейся еды. Давящая боль в корне носа. **КОРИЧНЕВАЯ, ЖЕЛТОВАТАЯ ПОЛОСА ПОПЕРЕК НОСА.** Густые зеленоватые выделения; толстые, зловонные пробки и корки в носу. Выделения из задних отделов носа густые, со сгустками, приходится их отхаркивать и выплевывать.

Носовое кровотечение: в том числе во время менструации; во время беременности; при наличии геморроя; возникает даже от незначительного удара по носу. Озена. Простуда из горла распространяется вверх, в нос. При простуде боль в затылке сопровождается тянущим ощущением в руках и голенях.

**Лицо.** Цвет лица изменчивый. Темные круги под глазами. Хлоазмы. Угри усиливаются перед менструацией. Онемение скуловых костей. Припухшая, с трещиной нижняя губа. Рак губ, эпителиома. Лицо старое, в морщинах, с пятнами. При разговоре мышцы лица дергаются. Бородавки на лице.

**Рот.** Рот и язык как будто обожжены. Привкус во рту: сыра, рыбы, горечи, кислый, гнилостный, отвратительный. Отхаркивает вонючие или творожистые комочки по утрам. Все кажется слишком соленым. Боли в зубах во время беременности, менструации и при простуде; хуже лежат. Язык грязный; очищается во время менструации.

**Горло.** Ощущение пробки в горле. Боль в горле, как будто от ссадины. Простуда из горла поднимается выше. Давление в горле, кажется, что одежда на шее тесная. Пациент отхаркивает зловонную слизь или комочки утром.

**Желудок.** *Тошнота* возникает при мысли о пище или *от запаха еды*; возникает в первой половине дня (до полудня); при мысли о коитусе. *Рвота* только твердой пищей или в виде жидкости, похожей на молоко; возникает во время беременности; утром; при полоскании рта.

Страстное желание уксуса, кислых и маринованных продуктов, сладкого. **ЧУВСТВО СЛАБОСТИ, ПУСТОТЫ В ЭПИГАСТРИИ, КАК БУДТО ВСЕ ПРОВАЛИЛОСЬ ВНИЗ;** это ощущение *не проходит* от еды; либо возникает ощущение комка в этой области. Жжение под ложечкой. От кипяченого молока становится хуже. Повышенная кислотность. Расстройство пищеварения после поднятия чрезмерной тяжести; из-за табака.

Волчий аппетит или отсутствие аппетита; внезапное желание что-нибудь съесть, внезапное ощущение сытости. Ощущение, как будто что-то извивается в желудке и поднимается вверх, в горло. Неприятное ощущение или боль в желудке усиливаются от рвоты. Отрыжки: как молоко, кислые, горькие, прогорклые; пациент срыгивает плотную, пенистую слизь.

**Живот.** Боль в области печени или желчного пузыря усиливается при наклоне. Печень болезненная, и боль в печени уменьшается, когда пациент лежит на правом боку. Ощущение, что внутренние органы выпадут или *сильное давление на низ в гипогастрии*, то есть внизу живота; лучше когда пациентка поддерживает живот или кладет ногу на ногу.

Отвислый живот у рожавших женщин. Стойкий, тяжелый запор, позыв отсутствует несколько дней. Толстые твердые каловые массы; *ощущение шара* в прямой кишке. Прямая кишка сужена и слабая; из ануса почти постоянно что-то сочится.

**Понос:** зеленоватый стул у маленьких детей; понос из-за кипяченого молока, сопровождающийся быстрым истощением. Геморрой: сопровождается выпадением узлов; хуже при ходьбе — возникает кровотечение, появляется колющая боль; геморрой при беременности.

После стула выделяется желеобразная слизь. Боли стреляют в прямой кишке снизу вверх. Коричневые пятна на животе. Стул отходит после продолжительных усилий — пациент долго тужится; после стула выделяется желеобразная, желто-белая, крайне зловонная слизь в объеме полной чашки. Выпадение прямой кишки после курения. Ощущение тяжести или шара в заднем проходе, которое не проходит после стула.

**Мочевыделительная система.** Непроизвольное мочеиспускание, в том числе во время первого сна; хуже при кашле, чихании; при смехе; от внезапно возникшего шума, от испуга или из-за невнимательности, особенно у женщин и т.д. Мочеиспускание происходит медленно, сопровождается ощущением давления на низ — над лобком.

**МОЧА ГУСТАЯ, ЗЛОВОННАЯ;** содержит белый песок или **НАЛИПАЮЩИЙ НА СТЕНКИ КРАСНЫЙ ПЕСОК.** Струя мочи вялая, моча вытекает медленно. Режущая боль в мочевом пузыре перед мочеиспусканием. Моча кровавистая, напоминает молоко. Возникает дрожь, содрогание, если позыв на мочеиспускание подавляется.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание повышено. Недомогание после коитуса. Отвратительный, врючий пот на мошонке. Половые органы холодные. Кондиломы окружают головку полового члена. Импотенция.

**Женские половые органы.** **ОЩУЩЕНИЕ СЛАБОСТИ, ТЯНУЩЕЕ ОЩУЩЕНИЕ ИЛИ ДАВЛЕНИЕ НА НИЗ,** как будто все органы выпадут через промежность; пациентка вынуждена положить ногу на ногу или поддерживать органы снаружи, чтобы они не выпали. Опухание; абсцесс половых губ. Сжимающая, жгучая или покалывающая боль в матке. Половой акт болезненный, в том числе из-за сухости слизистой оболочки влагалища; после него возникает

кровотечение. Сухость влагалища и наружных половых органов, в том числе, после менструации; из-за этого возникает неприятное ощущение при ходьбе. Отвращение к половому акту или недомогание после него. Изнеможение после полового акта. Тошнота и раздражительность при мысли о коитусе.

Менструации: отсутствуют; в том числе в пубертатном возрасте; а также после отнятия ребенка от груди. Менструации: слишком поздние и скудные; нерегулярные; ранние и обильные. Аменорея. Боль в поясничной области и учащенное мочеиспускание при метрите. Метроррагия во время климакса. Внезапные приливы жара, сопровождающиеся слабостью и потоотделением, во время климакса. Маниакальное состояние из-за обильных менструаций.

Бели желтые, зеленоватые, похожи на молоко, в виде больших сгустков; в том числе, возникают у маленьких девочек; бели появляются вместо менструаций, они зловонные; в том числе гонорейные; сопровождаются резкими колющими болями во влагалище, направленными вверх, далее распространяющимися от матки к пупку; бели выделяются в дневное время.

Соски трескаются поперек ареолы. Склонность к выкидышу: на 5—7 месяцах беременности. Сильный зуд наружных половых органов, способствующий выкидышу. Бесплодие. Движения плода невыносимы. Задержка отделения плаценты, в том числе после выкидыша. Субинволюция матки.

**Дыхательные органы.** Сухой, утомительный кашель, возникающий как будто в желудке; хуже при быстрой смене температуры воздуха; сопровождается выделением зловонной мокроты. Коклюш с затяжным течением. Одышка усиливается после сна; уменьшается от быстрого движения. Ощущение пустоты в груди. Застойного происхождения (гипостатический) плеврит. Коричневые пятна на коже груди. При кашле во рту возникает привкус тухлых яиц. Астма. Симптомы, относящиеся к органам грудной клетки, облегчаются от давления рукой. Запущенная пневмония.

**Сердце.** *Нарушение кровообращения;* кажется, что кровь застаивается. Сердцебиение заметно со стороны, кажется, что оно распространяется в затылок. Иногда ощущаются тяжелые, глухие удары сердца. Пульсация во всем теле. Ощущение кипения крови ночью. Переполнение кровеносных сосудов. Пациент просыпается из-за того, что сердце неистово бьется. Ощущение дрожания в сочетании с приливами. Нервное сердцебиение, уменьшающееся при быстрой ходьбе; хуже, когда лежит на левом боку.

**Шея и спина.** Воротник кажется тесным. *Тупая боль, ломота между лопатками и В ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ;* паралитическая боль; хочется придавить больное место. Внезапная боль в спине, как будто ударили молотком; хуже при наклоне, стоя на коленях. Боль в спине уменьшается от отрыжки, а также если прижаться спиной к чему-нибудь твердому. Слабость в пояснице при ходьбе; в том числе из-за болезни матки. Всё сказывается на спине. *Ледяной холод между лопатками.* Возникают судороги в ягодичных мышцах, когда вытягивает ноги.

**Конечности.** Кисти багрового цвета. Кисти холодные в теплом помещении. Напряжение в конечностях, как будто они слишком короткие. Беспокойство в конечностях, подергивание мышц и резкие мышечные сокращения днем и ночью. Колени и пятки холодные. Ишиас: лучше во время беременности; хроническое воспаление седалищного нерва, боль сосредоточивается в пятках. Ощущение, как будто мышшь бежит по ноге. Горячие кисти и холодные стопы или наоборот. Короткая прогулка сильно утомляет. Уродливые ногти. Потливость кистей. Кожа на ладонях шелушится.

**Кожа.** *Пятнистая;* в ссадинах, грубая, шершавая, плотная или потрескавшаяся кожа; хуже в сгибах. Нарывы (фурункулы) под мышками. Толстые корки на локтях. Язвы в области мелких суставов. Эпителиома: век, губ. Кожа винного цвета. Пятна на коже.

Стригущий лишай рецидивирует каждую весну. Пузырьки, сопровождающиеся зудом. Крапивница с ухудшением на открытом воздухе, улучшением в теплом помещении. В области суставов на коже образуются толстые корки. Уплотнение кожи из-за постоянного давления, кожа имеет в этом месте багровую окраску.

**Сон.** Громко разговаривает во сне. Сновидений больше, когда пациент лежит на левом боку. Часто просыпается; с ощущением, как будто его позвали, окликнули.

**Лихорадка.** Мерзнет, зябкий. Холодно, знобит и не хватает воздуха. *Холодное тело: на отдельных участках; в области темени; между лопатками; холодные стопы в постели.*

Сопровождающиеся тревогой приливы жара, которым предшествует внезапная слабость. *Потливость;* пот неприятный, появляется во время прилива крови; потоотделение — на половых органах, *под мышками;* или в области спины; между менструациями. Неправильного типа лихорадки. Ощущение поднимающегося вверх жара или как будто пациента окатили горячей водой.

**Дополнительно.** Nat-m., Nux-v., Phos., Psor., Puls., Sabad., Sulph.

**Диф. диагноз.** Calc, Caust., Con., Gels., Lil-t., Lyc, Murx., Nat-c, Nat-m., Puls.

## SILICEA

**Общее.** Растирания (тритурации) Силицеи готовят из чистого песчаника. Кремний вызывает нарушение **ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ПИТАНИЯ**, в особенности у детей, вследствие несовершенного усвоения питательных ве-

ществ. Кремний также воздействует на *НЕРВЫ*, *повышая их чувствительность, восприимчивость*, способствуя возникновению неврастения и повышению рефлексов.

Болезни *костной* и хрящевой ткани; кариес (остеомиелит) и некроз; размягчение костей. Экзостозы. Увеличение *ЖЕЛЕЗ*. Это дети, страдающие рахитом и золотухой (скрофулезные); с большой головой, открытыми родничками; *вздутым горячим и твердым животом*; они поздно начинают ходить; у них худое тело, особенно ноги (*голену*). Маленькие дети нервно ползают; или виснут на руках матери; когда побегают, становятся бледными.

*Нагноительные процессы, в том числе упорные, хронические*; свищевые ходы; абсцессы. Медленно развивающееся, незавершенное воспаление желез, клетчатки и кожи; после него возникает уплотнение, затвердение тканей. Обостренная чувствительность к шуму, боли, к холоду; пациент стремится быть поближе к огню, хочет очень тепло одеться; ненавидит сквозняки. Истощенные (в состоянии кахексии) и старые, дряхлые пациенты; а также люди светловолосые, со светлой кожей.

*Боли очень сильные, колющего характера*; могут возникать в ушах, горле, язвах и т.д. Характерно быстрое истощение, ненормальное пото отделение. Недостаток жизненного тепла, зябкость, даже если занимается физическими упражнениями.

Спазмы, эпилепсия; чувство холода перед поистуиом. Истерия, паралич и упорная невралгия, которые являются следствием беспутной жизни, тяжелой работы, ограничения свободы движения (?родов — confinement). Плохое усвоение питательных веществ, пониженное питание. Задержка развития. Исхудание. *Не хватает твердости* — моральной и физической.

Избыточные грануляции в ране (дикое мясо). Рубцы плотные, твердые, узловатые, блестящие, гладкие, прозрачные, чувствительные к прикосновению, в них ощущается стреляющая боль. Келоидные рубцы.

Отеки в первой половине суток, до полудня. Рак. Сжатие сфинктеров. *Ощущения и симптомы распространяются снизу вверх*. Упадок сил нервных и физических. Размягчение головного мозга. Двигательное беспокойство, волнение и суетливость, пациент вздрагивает от малейшего шума. Части тела, на которых пациент лежит, немеют. Силица способствует изгнанию инородных тел. Прогрессирующая локомоторная атаксия. Ощущение, как будто пациентку разделили на две части, и левая половина ей не принадлежит. Ощущение волоса на языке; а также в трахее.

Болезненные последствия вакцинации; работы в каменоломнях — у каменотесов, резчиков по камню и т.д.; последствия потери жизненных соков; травмы; растяжения связок; попадания занозы. Непереносимость алкогольных напитков. Нервные болезни после травмы позвоночника, особенно если при давлении на него возникает боль в отдаленных частях тела. Конвульсии: начинаются в области солнечного сплетения; возникают после вакцинации. Эпилепсия: аура возникает в области солнечного сплетения, перемещается ("переползает") в грудь и в желудок. Нездоровая кожа: *любая ранка нагнаивается*. Выделения зловонные — гной, пот, стул и т.д.

**Хуже.** *ОТ ХОЛОДА; ОТ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХА; ОТ ХОЛОДНОГО СКВОЗНЯКА; от сырого холода*; если раскроется, разденется; от купания в холодной воде. Из-за подавления потоотделения, особенно *на стопах*. От нервного возбуждения. От света. От шума. От сотрясения тела; после ушиба позвоночника. При смене лунных фаз. Ночью. От нервного напряжения. От алкоголя. От прикосновения. *От давления*. При перемене погоды. От причесывания волос.

**Лучше.** *ОТ ТЕПЛА, ТЕПЛО УКУТАТЬСЯ*, в том числе, укутать голову. Летом. В мокрую, влажную погоду. От обильного мочеиспускания. От воздействия магнетизма, гипноза и электричества.

**Психика.** Мягкий, покладистый; малодушный, трусливый человек. Чувствительный, плаксивый. Упрямый, настойчивый, своевольный, в том числе ребенок. Плачет, когда с ним мягко разговаривают.

Навязчивые идеи: думает только о булавках, боится их, разыскивает их и пересчитывает. Острый ум в сочетании с физической слабостью и вялостью. Угрюмый, замкнутый. Испытывает угрызения совести по пустякам. Отсутствие уверенности в себе; страх неудачи, но лишенный основания.

Вздрагивает от незначительного шума. Страшно кричит, стонет; при эпилепсии. . Равнодушие к религии. Чувство безнадежности. Печаль. Отвращение к жизни; хочет утопиться. Нервное истощение. Не может правильно объясниться, рассказать о себе. Суетливость, беспокойство. Недомогание из-за ожидания, от предчувствий.

**Голова.** Головокружение: как будто оно поднимается вверх из области спины; усиливается при взгляде вверх, при закрывании глаз, когда лежит на левом боку. *Боли из затылка поднимаются выше*; уменьшаются от давления. Периодические головные боли. Сначала головная боль, потом — слепота.

Пульсация, биение в области темени. Роднички не закрыты, живот у ребенка вздутый, большой. Шишки, уплотнения в коже головы. Голова обильно потеет. Опухание глабеллы (над переносицей). Кефалогематома.

От обильного мочеиспускания уменьшается головная боль. Правая сторона как будто парализована, хуже от коитуса. Головная боль усиливается от напряжения, учебы, от шума, от движения, от сотрясения, от света, от холодного воздуха, от разговора, если пациент тужится во время стула; боль уменьшается от теплого укутывания головы и от давления.

Мокнувшие, с образованием корок высыпания на коже волосистой части головы. Припухлость на голове: между кожей и костями обнаруживается скопление свернувшейся, с комками жидкости.

Головная боль возникает, когда пациент голодает (постится) или если он вовремя не поел. Мигрень. Хроническая головная боль после какого-либо серьезного заболевания. Выпадение волос, раннее облысение.

**Глаза.** Поражаются углы глаз; область слезных протоков; припухлость в области слезной фистулы; сужение (стриктура) слезного протока. Видит пятнами, скотомы в поле зрения. Предметы кажутся бледными. Отвращение к дневному свету: он слепит глаза. Кератит: пустулезный; перфо-ративный. Воспаление глаз. Гипопион (скопление гноя в передней камере глаза). Помутнение роговицы, в том числе после оспы (применять в потенции D30 на протяжении нескольких месяцев). Катаракта у конторских служащих после подавления потоотделения на стопах. Ячмени: для предотвращения их рецидивов. Кистозные опухоли век. При чтении буквы сливаются.

**Уши.** Рев в ушах. Шипение, свист в ушах. Перфорация барабанной перепонки. Зуд в ушах. Кариес сосцевидного отростка. Глухота: слух восстанавливается с громким, как выстрел хлопком, либо в момент, когда пациент сморкается или кашляет; хуже в полнолуние. Вонючие выделения из уха. Чувствительность к шуму. Ощущение заложенности в ухе; оно уменьшается, когда пациент зеваает или делает глотательное движение. Образование корок в ушах. Ребенок ковыряет в ушах во время сна.

**Нос.** Пенистые выделения из носа. Насморк сопровождается кровотечением из носа. Прободевание (перфорация) носовой перегородки. Сухие, плотные корки в носу; при их отделении возникает кровотечение. Чихание утром. Зуд кончика носа. Кости носа болезненные. Нос заложен, сухость в носу, обоняние утрачено. Носовое кровотечение у младенцев. Трещины в ноздрах. Упорный насморк; в том числе с поражением уха. Нос холодный.

**Лицо.** Бледное, истощенное; как будто восковое. Увеличение околоушных желез. Трещины: на губах; на коже лица. Высыпания на подбородке. Опухание подчелюстных желез. Трещины в углах рта с уплотнением. Рак нижней губы.

**Рот.** Ощущение волоса на языке. Абсцесс в области корня зуба. Нарывы на деснах. Пиорея. У воды скверный привкус; после того как пациент ее выпьет, возникает рвота. Зубы: крошатся, стирается эмаль, они становятся неровными, разрушаются — возникает кариес. Язык коричневый. Зубы как будто слишком большие и длинные, чтобы поместиться во рту. Одностороннее опухание языка.

**Горло.** Горький привкус в горле. Миндалины набухшие, нагнаиваются. Пища вываливается через нос при глотании. Покалывающая боль в миндалинах, как от булавы. Пациент отхаркивает зловонные комочки. Глотание болезненное, затрудненное; в том числе при истерии.

**Желудок.** Отвращение: к пище и к мясу, если их подвергли кулинарной обработке или они теплые; к молоку матери, возникает рвота. Любит мороженое, воду со льдом: от них возникает приятное ощущение в желудке. У воды скверный привкус: после того, как выпьет, возникает рвота.

Уплотнение стенок привратника. Кислая отрыжка, изжога сопровождается ощущением холода. Волчий аппетит, который пропадает, когда пациент пытается поесть; либо отмечается отвращение к еде. Кислые отрыжки после еды. Рвота кислым. Грызущая, скручивающая боль в эпигастрии усиливается от давления. Ощущение, как будто в желудке лежит холодный камень.

**Живот.** Пульсирующая, язвенная боль в области печени; абсцесс печени. Колики, режущая боль в животе; при этом кисти рук желтые, ногти синие. *Живот раздутый, твердый и горячий, голени худые*, особенно у детей.

Режущая, судорожная боль в *прямой кишке*, распространяющаяся в яички; хуже от коитуса. Запор усиливается перед менструацией и во время нее. Пациент тужится, хотя стул мягкий, до изнеможения. Мок-нутие ануса; зловонные кишечные газы. *Стул выделяется с трудом: в момент, когда частично уже вышел наружу, он ускользает обратно в прямую кишку*; задержка стула из-за страха, что возникнет боль.

Трещины на брюшной стенке. Трещины, свищи в области ануса, в сочетании с симптомами со стороны органов грудной клетки. Болезненные спазмы сфинктера. Во время стула выпадают крайне болезненные геморроидальные узлы. Понос с выделением зловонного стула. Безрезультатные позывы на стул. Хронический понос. Стул отвратительный, безболезненный, содержит неперевавленную пищу. Ленточные глисты. Понос после молока. Чувствительное к прикосновению грыжевое выпячивание. Асцит: образуется значительный выпот; он сопровождается частыми приступами поноса.

**Мочевыделительная система.** Обильное мочеиспускание способствует уменьшению головной боли. Учащенное мочеиспускание сопровождается тенезмами. Ночное недержание мочи (энурез); в том числе, у детей, из-за глистов. Хронический уретрит: зловонные выделения из уретры, густые, творожистые, гнойные, кровянистые. Гной в моче. Ночное недержание мочи после удара по голове. Камни почки и мочевого пузыря.

**Мужские половые органы.** Сексуальное желание либо повышено, либо снижено. После коитуса в правой половине головы возникает ощущение, как будто она парализована. Крайнее изнеможение после коитуса: чтобы вернуться в нормальное состояние, требуется от 8 до 10 дней. Ночные поллюции. Простаторея: хуже, когда пациент тужится во время стула. Хронический уретрит сопровождается скручивающей болью. Зловонные



гонорейные выделения из уретры. Зудящие мокнущие участки на мошонке. Водянка яичка. Слоновость мошонки. Болезненные высыпания на лобке.

**Женские половые органы.** Тошнота во время коитуса. Кровянистые выделения между менструациями. Бесплодие. Нимфомания.

Менструации ранние, скудные. Аменорея в течение нескольких месяцев. Менструации обильные, сопровождаются приступами, когда все тело становится холодным, как лед. Водянистые выделения вместо менструации. Режущие боли во влагалище, направленные снизу вверх; сильнее при мочеиспускании. Бели как молоко, едкие, выделяются сплошным потоком; сильнее при мочеиспускании. Сальпингит сопровождается скоплением гноя или сыворотки, которые время от времени выделяются из матки. При белях возникает режущая боль в области пупка. Зуд наружных половых органов и влагалища — оно очень чувствительное. Зуд промежности.

Серозная киста влагалища; отверстие свищевого хода или абсцесс в области вульвы. Абсцессы со свищами или свищевые отверстия во влагалище и возле него; густые, створожившиеся выделения. Кровянистые выделения усиливаются при кормлении ребенка грудью; возникают между менструациями.

Сосок втянутый, как воронка, болезненный. Твердые, плотные комки, свищи (фистулы) в молочных железах. Угрожающий абсцесс молочной железы. Скирр, сопровождающийся зудом. Резкие боли в молочной железе и в матке.

Слишком сильные движения плода. Выкидыш возникает вследствие слабости или по этой же причине не наступает беременность.

**Дыхательные органы.** При кашле пациент давится, сотрясается всем телом, у него возникают позывы на рвоту; ухудшение наступает от холодного питья; когда пациент разговаривает, лежит или после того, как проснется.

Одышка: из-за воздействия сквозного ветра, сквозняка на шею; возникает при хронической простуде, которая сосредоточивается в груди и приводит к возникновению приступов астмы; одышка появляется после того как пациент перегреется или от напряжения. Сикотическая астма.

Обильная, зловонная мокрота, желтая, в виде комочков; зернистая; зловонная, если ее растереть.

Простуда никак не поддается лечению. Пациент медленно поправляется после пневмонии. Клокотанье, хрипы в груди. Колотье в груди, распространяющееся в спину. Одышка из-за ручного труда; из-за быстрой ходьбы. Болезни дыхательных органов у каменотесов. Эмфизема после плеврита. Запущенная пневмония. Безболезненная пульсация в грудине.

**Сердце.** Пульсация во всем теле возникает, когда пациент сидит или двигается. Сердцебиение: в положении сидя, в сочетании с дрожанием рук. Болезни сердца из-за нервного истощения.

**Шея и спина.** Позвоночник слабый, очень чувствителен к сквознякам, дующим в спину. Spina bifida. Кариез (остеомиелит) позвонков. Псоас-абсцесс. Боль в копчике. Боль в спине, как после продолжительной езды в экипаже. Жжение в спине, после того как тело разогреется от прогулки на открытом воздухе (на улице). Скованность в шее; в том числе при головной боли. Болезненный кифоз. Слабость в области крестца ("спина отказывает").

**Конечности.** Опухание, увеличение подмышечных лимфатических узлов. Кончики пальцев на руках болезненные, сухие, как будто сделаны из бумаги; это ощущение возникает ночью. Стопы холодные, как лед, и потливые. *ЗЛОВОННЫЙ ПОТ НА СТОПАХ*; сопровождается зудом, он *едкий*, разрушает, портит обувь; *подавление потоотделения на стопах*. Болезненность, ломота в своде стопы.

Деформированные, вросшие, желтые ногти. Слабые лодыжки и стопы. Икроножные мышцы напряжены и стянуты. Панариций: боль ощущается глубоко в пальце. Атрофия и онемение пальцев на руках. Части тела, на которых пациент лежит, немеют. Бурсит большого пальца стопы. Воспаление костей. Руки дрожат, когда пациент пытается что-нибудь сделать. Слабость предплечья, оно не слушается. Голени как будто парализованы, дрожат при ходьбе. Сладострастное покалывание, пощипывание в стопах. Чувство разбитости во всем теле после коитуса или поллюции, как будто побили. Судороги в коленях.

Мягкие роговые наросты (мозоли) между пальцами на ногах. Ногти неровные, желтые, уродливые, хрупкие, с белыми пятнами, синие — при лихорадке. Язвы в области суставов с отделяемым жидким, зловонным, гнойным или в виде творожистой массы.

Небрежная походка. Ревматизм, особенно в области подошв, пациент не может ходить. Судороги в икроножных мышцах и в стопах. Увеличение синовиальной сумки в области коленной чашечки. Конечности выгнуты во время судорог. Руки (левая) трясутся перед приступом эпилепсии.

**Кожа.** Влажная, как будто пропитана водой, вялая. Остроконечные высыпания. Рубцы внезапно становятся болезненными. Келоид. Любая мелкая ранка нагнаивается. Лепроматозные узлы (лепромы). Пятна медного цвета. Карбункулы. Язвы: болезненно-чувствительные, зловонные; рыхлые; локализуются на стопах, на пальцах стоп, в области ногтей; лучше от жара, от горячего. Абсцессы в области суставов.

Зуд в области высыпаний только в дневное время или вечером. Нарывы и пустулы повсюду. Ощущение холода в язвах. Бородавки. Пятна розового цвета. Слоновость.

**Сон.** Снохождение (сомнамбулизм). Пациент просыпается из-за страшных сновидений. Беспокойный сон. Сновидения: сладострастные, о прошедших событиях. Просыпается испуганный, дрожит всем телом. Громко разговаривает во сне, хнычет или смеется. Сильная зевота. Сонливость, но спать не может. Неосвежающий сон.

**Лихорадка.** Пациент *ЗЯБКИЙ*, *МЕРЗНЕТ*: особенно когда лежит в постели; от напряжения. *Холодное тело, в том числе, больное место. Ознобы с ощущением ледяного холода. ПОТООТДЕЛЕНИЕ обильное, в том числе на верхней части тела; потеет голова или больное место; потоотделение возникает ночью*; пациент потливый; он потеет как только заснет; пот зловонный; едкий. Гектическая лихорадка.

**Дополнительно.** FL-AC, Phos., Thuj.

**Диф. диагноз.** Calc, Hep., Kali-p.

## SOLIDAGO VIRGA

**Общее.** Солидаго часто бывает эффективен при заболеваниях, возникающих вследствие *НАРУШЕНИЯ РАБОТЫ ПОЧЕК* или осложняющихся патологией почек. Солидаго воздействует на пищеварительный тракт, нижние конечности и кровь.

Чувство слабости; зябкость, чередующаяся с ощущением жара. Кровотечения. Пациент легко простывает. Хронический нефрит. Уремическая астма.

**Хуже.** От давления.

**Лучше.** От обильного мочеиспускания.

**Глаза.** Красные глаза при увеличении предстательной железы.

**Нос.** Приступы чихания, сопровождающиеся выделением большого количества слизи.

**Рот.** Постоянно горький привкус во рту. Язык с толстым налетом; он очищается, когда моча становится нормальной.

**Живот.** Обильный, непроизвольный слизистый стул.

**Мочевыделительная система.** Моча *темная и скудная* или прозрачная, *вонючая*, выделяется с трудом; содержит белок; содержит слизь, фосфаты. Если заболевание любого органа или части тела сопровождается перечисленными симптомами, то, вероятно, будет полезно назначить Солидаго.

*Почки болезненные, область почек чувствительна к прикосновению; тупая боль, ломота*; ощущение, что почка растянута. Боль из области почек распространяется вперед — в живот, в мочевой пузырь, вниз, вдоль бедер. Хронический нефрит. Цистит. Увеличение предстательной железы: она создает препятствие оттоку мочи или воспаляется.

**Женские половые органы.** Увеличение матки, она давит на мочевой пузырь. Фиброма матки.

**Дыхательные органы.** Бронхит, кашель с отхаркиванием большого количества гнойной мокроты с прожилками крови; сопровождается стеснением дыхания. Постоянная одышка. При астме каждую ночь возникают дизурические явления.

**Спина.** Боль в пояснице: кажется, что все тело болит.

**Кожа.** *Петехии, в том числе, на нижних конечностях*; они сопровождаются отеком; а также зудом. Гангрена; в том числе при диабете. Экзема усиливается при подавлении мочевого выделения.

## SPIGELIA

**Общее.** Спигелия известна как розовый корень. Она оказывает влияние на *НЕРВЫ*, в том числе, *НА ТРОЙНИЧНЫЙ НЕРВ; А ТАКЖЕ НА СЕРДЦЕ; ГЛАЗА, зубы*, фиброзную ткань и в целом *НА ЛЕВУЮ СТОРОНУ ТЕЛА*.

Спигелия показана, когда *сочетаются сердечные и глазные симптомы* или в случаях, когда глазные симптомы являются сопутствующими.

**БОЛИ жестокие**, жгучие, как от раскаленных иголок или проволоки, дергающие, рвущие, колющие; *распространяются* (иррадиируют) в другие части тела. Невралгия. Боли в соответствии с движением солнца над горизонтом.

Спигелия подходит анемичным, ослабленным, страдающим ревматизмом или золотухой пациентам. Пациенты очень чувствительны к прикосновению; в том месте, к которому прикоснулись, или в ушибленном месте возникает ощущение холода или пощипывания, или по телу пробегает *дрожь*, пациент *содрогается*. Дети, страдающие от глистов: они указывают на пупок как на самое болезненное место. При ходьбе тело кажется легким; когда пациент встает со стула, в теле ощущается тяжесть и болезненность. **Хуже.** *ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ. ОТ ДВИЖЕНИЯ. От сотрясения тела.* Периодически; в соответствии с движением солнца над горизонтом. От табака. От коитуса. При поднимании рук. После еды. При мысли о симптоме. При наклоне. Когда сморкается. Когда делает выдох.

**Лучше.** Лежа на правом боку с высоко поднятой головой. Когда делает вдох. От равномерного давления. Во время еды.

**Психика.** Боится острых предметов, в том числе булавок, иголок. Двигательное беспокойство и тревога. Сидит, как будто погружен в размышления; смотрит в одну точку. Мрачное настроение, мысли о самоубийстве. Легко обижается.

**Голова.** Боль из затылочной области слева распространяется в область над левым глазом; хуже при наклоне, когда отступает, когда открывает рот. *Головокружение:* ощущение, как будто стопы поднялись выше головы; хуже, когда пациент смотрит вниз, вынужден смотреть только прямо; хуже стоя, при ходьбе. Надглазничная (супраорбитальная) невралгия. Голова кажется слишком большой.

**Глаза.** Глаза кажутся слишком большими. Сильная боль в глазах и вокруг них, распространяющаяся внутрь глазницы; хуже, когда подумает о глазах. Косоглазие при наличии глистов. Глаза красные; *болезненные*, тянущая боль в глазах; желтые круги вокруг глаз.

Ощущение, как будто в глаза вонзились иголки. Слезотечение: обильное, из больного глаза; слезы едкие. Трудно поднять веки из-за болезненного ощущения скованности, напряжения в них. Пациент часто моргает. Трудно подобрать очки: нет устойчивого фокусного расстояния, нет стабильного зрения; скрытые погрешности зрения. Эзофория (паралич наружных мышц глаза) и экзофория (паралич внутренних мышц глаза). Покалывание в веках. Выворот век.

**Уши.** Периодическая глухота; уши как будто заложены.

**Нос.** Хронический катар — секрет стекает через задние отделы носа (ри-нофарингит). Щекотание в носу и зуд носа. Сухость передних отделов носа. Жидкие выделения при лицевой невралгии. Отвращение к табачному дыму, к нюхательному табаку.

**Лицо.** Лицевая невралгия с вовлечением глаза, области скулы, щеки, зубов; височной области. Эта боль усиливается от прикосновения, при наклоне, начинается с утра и сохраняется до захода солнца; ухудшение наступает от питья чая; боль внезапно проходит и появляется.

**Рот.** *Дыхание зловонное.* Зубная боль усиливается после еды и от холода; когда пациент думает о ней; уменьшается от курения табака. Язык покрыт желтым или белым налетом; жжение или колющая боль в нем; он покрыт трещинами.

**Желудок.** Волчий аппетит. Тошнота с ощущением, что червяк ползет по направлению к горлу.

**Живот.** Колика сопровождается щемящей болью в области пупка. Стул состоит только из больших сгустков слизи. Зуд, щекотание в заднем проходе и в прямой кишке. Глисты. Крайне зловонные кишечные газы. Обморок, теряет сознание во время стула.

**Мочевыделительная система.** Моча обильная, учащенные позывы, преимущественно ночью.

**Дыхательные органы.** Одышка усиливается, когда пациент шевелится в постели; когда поднимает руки; вынужден лечь на правый бок, голову положить повыше. Гидроторакс. Болезнь сердца. Колотье в груди усиливается от малейшего движения или при дыхании. Ощущение дрожания в груди.

**Сердце.** *СЕРДЦЕБИЕНИЕ; яростное, его слышно со стороны;* оно сопутствует другим симптомам. *Жесткое колотье* или сжимающие боли, распространяющиеся в горло; руки, лопатку; боли усиливаются от малейшего движения, если пациент сгибается пополам.

Сердцебиение в сочетании со скверным запахом изо рта. Болезненность, симптом "кошачьего мурлыканья"; хруст в области сердца. Перикардит. Стенокардия сопровождается сильным желанием горячей воды, от которой становится лучше. Ревмокардит. Пульс перемежающийся, сопровождается нервным сердцебиением; пульс слабый, дрожащий, аритмичный. Пульсация сонных и подключичных артерий.

**Шея и спина.** Скованность в шее; боли распространяются в правый висок или боль из левого плеча распространяется в шею. Режущая боль в области левой лопатки.

**Конечности.** Онемение левой руки. Пульсация в коленной чашечке (в надколеннике).

**Лихорадка.** Жар; приливы жара ночью; ощущение жара в спине. Пот вонючий: на верхней части тела; а также холодный на кистях.

**Дополнительно.** Calc.

**Диф. диагноз.** Sact.

## SPONGIA

**Общее.** Жареная губка содержит небольшой процент йода (*Iod.*). Спонгия воздействует на *СЕРДЦЕ*, особенно на его клапаны; на гортань; трахею и на железы, в особенности на железы, не имеющие выводных протоков (эндокринные).

Это средство подходит светловолосым женщинам и детям, имеющим *РЫХЛОЕ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ*, дряблым и склонным к проявлениям золотухи (скрофулезная конституция).

*Изнеможение и ощущение тяжести в теле* при незначительном напряжении; пациент вынужден лечь; это сопровождается приливом крови к груди, лицу и т.д. Ощущение заложенности. Железы набухшие, плотные; в том числе эндокринные железы.

Онемение нижней части тела. Сухость: слизистых оболочек; языка; гортани; трахеи, горла. Одежда кажется неудобной. Тревога возникает при боли в области сердца или при одышке. Скованность, пациент лишен способности двигаться. Внезапно слабеет, падает в обморок, когда возникает одышка, если поднимает руки выше головы.

**Хуже.** *ОТ СУХОГО ХОЛОДА; от сухого холодного ветра. Если разбудят.* После сна. *От напряжения.* При поднимании рук. Перед полуночью — до 24 ч. В полнолуние. От сладостей.

**Лучше.** Когда лежит с низко опущенной головой. От еды или питья, в том числе, от небольшого количества. От теплой еды. Когда спускается, идет вниз.

**Психика.** Непреодолимое желание петь: сочетается с необычайной веселостью; после этого пациент становится печальным. Страх будущего; пациент устал от жизни. Тревога, страх смерти; в том числе во время удушья. Робость, страх, ужас. Плачет, в том числе, от сновидений; когда болен коклюшем, во время жара, при потоотделении. Уныние, депрессия из-за снижения потенции. Пациент упрямый и ведет себя неправильно.

**Голова.** Ощущение, как будто волосы на темени встали дыбом.

**Глаза.** Глаза выступают вперед, нависают; пациент смотрит пристально.

Диплопия — лучше, когда ложится. Глаза красные, при этом отмечается слезотечение и жжение в глазах.

**Нос.** Насморк без выделений из носа; нос как будто заложен. Нос заострен; холодный. Ноздри широко раздвигаются; веерообразные движения крыльев носа.

**Лицо.** *Испуганное; тревожное выражение лица.* Синие губы. После физических упражнений лицо бледное вместо того, чтобы покрываться здоровым румянцем. Холодный пот на подбородке. Подбородок немеет.

Рот. Язык сухой, коричневый. Сладковатый привкус во рту.

**Горло.** Горький привкус. Опухание щитовидной железы: оно захватывает даже область подбородка. Болезненность горла, усиливающаяся от сладостей. Пациент постоянно прочищает горло. Симптомы со стороны горла уменьшаются, когда пациент лежит на спине. Зоб: сопровождается приступами удушья; ухудшение наступает от прикосновения к шее или от давления; или боль в области шеи возникает одновременно с болью в сердце. Глотает воду понемногу и с трудом. Онемение горла снаружи (шеи).

**Желудок.** Голод сопровождается жаждой. Пациент не выносит тугую одежду в области желудка. Желудок кажется вялым, как будто он раскрыт. Желание деликатесов. Ощущение сильного голода; в том числе перед менструацией.

**Живот.** Во время вдоха сильно напрягаются мышцы живота. Внутренности подтянуты к диафрагме. Боль в животе вместо менструации.

**Мужские половые органы.** Болезненное опухание семенного канатика и яичек. Ощущение стягивания, как будто закручивают, сжатия или резкая колющая боль, направленная вверх, в семенные канатики и яички. Яички плотные и набухшие, увеличенные. Половые органы горячие. Свищевой ход в области мошонки со скудными, густыми, белыми выделениями.

**Женские половые органы.** Во время менструации женщина просыпается из-за приступа удушья. Астма возникает, когда отсутствуют менструации. Голод и сердцебиение перед менструацией. Боль в крестце перед менструацией или вместо нее.

**Дыхательные органы.** **ОХРИПЛОСТЬ:** сопровождает многие заболевания, сочетается с кашлем, насморком и т.д. Гортань болезненная, в ней ощущается сухость, сжатие; хуже от прикосновения, от пения, разговора или глотания; пациент хватается за горло.

**УДУШЬЕ,** как будто мешает пробка, клапан или листок в гортани; *из-за этого пациент просыпается: у него яростное сердцебиение, сопровождающееся болями, синие губы; сильное потоотделение.* Шумный свистящий вдох при засыпании. Пациент дышит беспокойно, *ловит ртом воздух.*

**КАШЕЛЬ:** **ГУЛКИЙ, ЛАЮЩИЙ, КУКАРЕКАЮЩИЙ, ПОХОЖИЙ НА ЗВУК ПИЛЫ (ПИЛЯЩИЙ) ИЛИ НАПРЯЖЕННЫЙ, СДАВЛЕННЫЙ; КРУПОЗНЫЙ.** Этот кашель будит пациента; после кашля в груди и в горле ощущается жжение; оно усиливается от холодного питья или от волнения; от сладостей, холодного молока; уменьшается от питья или еды, особенно от теплых продуктов.

Голос срывается во время пения или разговора. У пациента возникает ощущение, как будто приходится дышать через сухую губку. Слабость в груди: пациент едва может говорить; задыхается при засыпании. Астма. Дифтерия. Круп. Обильная слизистая мокрота: ее трудно откашлять, пациент проглатывает ее; она пахнет молоком. Туберкулез, начинающийся с верхушки легкого.

**Ощущение полноты, переполнения в груди.** Стеснение дыхания уменьшается, если немного поест. При астме пациент должен запрокинуть голову назад; хуже в полнолуние. Ощущение, что воздух при дыхании попадает в железы шеи. Зоб.

**Сердце.** **Жестокое сердцебиение** при одышке; пациент просыпается внезапно ночью из-за боли и удушья, испытывает страх, ужас. *Прилив крови к шее, голове и лицу;* при этом глаза закрываются, текут слезы.

Недостаточность клапанов сердца. Аневризма аорты. Ревматизм с эндокардитом. Гипертрофия сердца при наличии симптомов астмы. Пульс частый, твердый, хорошего наполнения или слабый. Стенокардия.

**Шея и спина.** Ощущение, как будто вокруг шеи намотана веревка. Боль в крестце вместо менструации.

**Конечности.** Онемение кончиков пальцев на руках. Онемение нижней части тела. Бедра онемевшие и холодные. Возникает боль в коленных суставах, когда пациент встает с коленей. Утолщение суставов после приступа суставного ревматизма.

**Кожа.** Опухание и затверждение желез. Едкий, щиплющий зуд по всему телу.

**Сон.** Пациент просыпается в испуге, ему кажется, что он задыхается; при этом он испытывает ужас и страх.

**Лихорадка.** Жар в виде приливов; сопровождается тревогой; болью в сердце (пациенту кажется, что он может умереть); при жаре бедра холодные и влажные; становится хуже, когда пациент думает об этих симптомах. Жар и внезапная слабость после прогулки — после ходьбы на открытом воздухе; должен лечь.

**Дополнительно.** Нер.

**Диф. диагноз.** Iod., Led.

## STANNUM

**Общее.** Действие олова, в основном, сосредоточено *НА НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ*: оно вызывает *КРАЙНЮЮ СЛАБОСТЬ*, особенно ощутимую *В ГРУДИ*; а также слабость *в горле*; желудке; верхней части рук и бедер. При этом пациент не способен даже говорить; он падает на стул вместо того, чтобы присесть; дрожит, когда двигается.

Слабость гораздо сильнее ощущается когда спускается вниз по лестнице, чем при подъеме. *Паралитическая слабость или тяжесть*. Спазмы: истерические; сопровождающиеся болью в животе и диафрагме; эпилептические судороги; при судорогах отмечается метание, разбрасывание конечностей, большие пальцы зажаты в кулаки, возникает опистотонус, потеря сознания и, как осложнение, сексуальные расстройства.

Поражение *СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК* вызывает появление желтых, *сли-зисто-гнойных выделений*. *БОЛИ УСИЛИВАЮТСЯ И ОСЛАБЕВАЮТ ПОСТЕПЕННО*. *Давящие, тянущие боли*. Невралгия диафрагмы; в том числе подавленная. Судороги. Истерия. Исхудание. Повторные кратковременные приступы.

Болезненные последствия переживаний, эмоций, испуга; мастурбации; прорезывания зубов; нагрузки на голос. Ощущение, как будто затягивается пояс, при зевоте. Ребенок хочет, чтобы его носили так, чтобы он свешивался через плечо человека, его несущего. Дрожание усиливается при медленном движении или от физических упражнений. Паралич: из-за глистов, после судорог, после переживаний, из-за мастурбации. Гемиплегия; пораженная сторона тела постоянно влажная, мокнет.

**Хуже.** От нагрузки на голосовые связки, когда пользуется голосом. От холода. В 10 ч утра. Лежа на правом боку. После спокойного движения. *ОТ ДВИЖЕНИЯ*. От теплого питья. Во время стула. Когда спускается вниз по лестнице. Когда поднимается по лестнице, идет в гору. От прикосновения.

**Лучше.** Если сильно прижаться к твердому краю (к столу и т.д.). От кашля, отхаркивания мокроты. От быстрого движения. Когда лежит поперек твердого предмета. Согнувшись вдвое.

**Психика.** Пациентка очень чувствительна к тому, что говорят о ней другие. *ТРЕВОЖНЫЙ, нервный, грустный*; хуже перед менструацией. *Чувствует себя несчастным, неуверен, обескуражен*. Женщина не может избавиться от навязчивой идеи, однажды возникшей у нее. Пациент молчаливый и не любит общество. Внезапные приступы ярости. Забывчивый и рассеянный. Чувствует неловкость, не находит себе места, не знает, куда себя деть. Чувство безнадежности, депрессия; все время хочется плакать, но от слез становится хуже.

**Голова.** Сильное болезненное сжатие в лобной области и висках. Отупляющая, давящего характера головная боль. Сотрясение тела при ходьбе отдается болью в голове. Мигрень, связанная с патологией головного мозга; лучше от рвоты. Боли жестокие, как будто голова расколена докрасна, боли пульсирующие, с ощущением распирания, как будто голова лопнет, боли сопровождаются ударами, направленными внутрь. Головокружение: кажется, что все предметы слишком далеко.

**Глаза.** Ввалившиеся, тусклые. Птоз; он повторяется каждую неделю.

**Уши.** Треск, визг в ушах возникает, когда пациент сморкается. Изъязвление отверстия для серы.

**Нос.** Повышенная чувствительность к запахам.

**Лицо.** Бледное лицо. Лицевая невралгия. Невралгия в области скуловой кости, в том числе во время менструации.

**Рот.** Щекотание в корне языка. Привкус кислый, сладкий, горький — у всей пищи, кроме воды.

**Горло.** При попытке откашлять вязкую, липкую слизь возникает тошнота. Режущая боль в горле при глотании. Тошнота ощущается в горле. Сухость в горле. Жгучая боль.

**Желудок.** Запах готовящейся еды вызывает тошноту и рвоту. Рвота: жестокая; кровью; желчью; возникает рано утром; рвотные массы имеют запах съеденной пищи. Ощущение пустоты в желудке. Ощущение неловкости, дискомфорта в желудке.

**Живот.** Жжение в области печени. Невралгия диафрагмы, в том числе истерического происхождения. Колики: режущая, щемящая боль; она сопровождается ощущением голода и истощающим поносом; лучше от сильного

давления. Глисты в кале. Спастическая боль в животе; в том числе истерическая. Колики у детей; лучше, когда ребенка носят на плече (он свешивается через плечо). Запор: стул сухой, твердый, узловатый, недостаточный, а также зеленого цвета. "Запор понедельника", то есть возникающий после выходных дней.

**Мочевыделительная система.** Нечувствительность мочевого пузыря; только ощущение переполнения напоминает о необходимости помочиться. Атония мочевого пузыря.

**Мужские половые органы.** Сексуальное возбуждение. Сладострастное ощущение в половых органах, вызывающее поллюции; приводит к истощению.

**Женские половые органы.** Повышенное сексуальное желание; легко возникает оргазм. Если почесать, поцарапать отдаленные места (руки), возникает нестерпимое ощущение сексуального наслаждения и оргазм.

Эротическая мания перед менструацией. Менструации ранние и обильные. Сильный запах от тела женщины во время менструации.

Бели выделяются сплошным потоком и сопровождаются выраженной слабостью; бели представляют собой желто-белую или прозрачную слизь. Ощущение давления на низ в области матки. Выпадение матки и влагалища — хуже во время стула. Маточные симптомы сопровождаются ощущением слабости, стягивания в груди. Боль во влагалище распространяется вверх и назад, в позвоночник.

Ребенок отказывается от материнского молока.

**Дыхательные органы.** Голос: глубокий, грудной, хриплый; лучше при отхаркивании слизи. Обилие слизи в трахее. *Кашель усиливается от смеха, пения, разговора; когда лежит на правом боку. Мокрота отхаркивается легко; выделяется большое количество сладкой, солоноватой, кислой, гнилой или ярко-желтой гнилой мокроты, или отхаркивается сгусток слизи.*

*Одышка при каждом усилии; пациент вынужден ослабить, расстегнуть одежду. Делает глубокий вдох. Ощущение саднения в грудной клетке или пустоты, полости в ней. Кровохарканье; оно сопровождается отхаркиванием большого количества мокроты.*

Колотье в левой половине груди, возникающее при дыхании или когда пациент лежит на левом боку; кинжальная боль ниже левой подмышечной впадины. Катаральный туберкулез. Бронхоэктазы. Позывы на рвоту при кашле. Пациент шаг ступить не может или сделать что-нибудь, чтобы не кашлять.

**Конечности.** Опухание кистей и лодыжек. Паралитическая слабость; роняет вещи. Конечности внезапно подкашиваются, когда пациент пытается сесть на стул. Дрожащие колени. Пальцы на руке дергаются, когда пациент держит ручку. Неврит. Паралич у машинисток, работающих на печатной машинке. Контрактуры пальцев на руках; втягивание большого пальца внутрь кулака. Судороги в кистях, не может выпустить из рук метлу. Когда говорит или поет, возникает слабость в руке выше локтя; слабость распространяется по всему телу. Ломота, тупая боль в дельтовидной мышце возникает из-за чтения.

**Сон.** Стонет, плачет и горестно жалуется во время сна. Спит, согнув одну ногу и вытянув другую.

**Лихорадка.** Озноб в 10 ч утра; он сопровождается онемением кончиков пальцев. *Жжение в ладонях и подошвах.* Гектическая лихорадка. Изнуряющий, с затхлым запахом пот в 4 ч утра.

**Дополнительно.** Puls.

**Диф. диагноз.** Calc, Kali-c, Lach., Nat-m., Phos., Sulph.

## STANNUM IODIDE

**Общее.** Это ценное средство для лечения хронических заболеваний органов грудной клетки, характеризующихся образованием спаек и постоянным кашлем, возникающим из-за щекотания, или ощущения сухости на небольшом участке в горле (очевидно, в области корня языка). Сначала появляется слабый, почти беззвучный кашель, сопровождающийся одышкой, затем кашель набирает силу и звучность и приводит к отхаркиванию обильной, жидкой, бледно-желтой мокроты. Причем сначала возникает чувство облегчения, которое вскоре сменяется ощущением сухости, слабости в груди и в горле, а кроме того, усиливается чувство стеснения в груди.

Станнум йодид показан в случаях, когда предыдущее средство "дало осечку" и требуется подобрать другое. Применяйте в низких потенциях — D2-D3.

## STAPHYSAGRIA

**Общее.** Нервные болезни, *сопровождающиеся дрожанием* — характерная черта этого средства. Дельфиниум, или стефаново семя, способствует возникновению как физических, так и нравственных, *сексуальных расстройств*, он провоцирует склонность к сексуальным излишествам и беспорядочным сексуальным связям, а также склонность к мастурбации, приводит к связанным с этой привычкой физическим недомоганиям.

Стафизагрия воздействует *НА ЗУБЫ; НА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ; на фиброзную ткань* — веки, края век, кожу, железы и правую дельтовидную мышцу.

Пациентка *болезненно чувствительна*: одно единственное слово, которое показалось обидным, причиняет ей сильное страдание; органы чувств невыносимо чувствительны — прикосновение, запах, шум, вкус — все воспринимается крайне остро.

Сжимающие или *жалящие, жгучие боли*; как будто пациент порезался. Боли, которые перемещаются в зубы. *Сфинктеры* растянуты и разорваны. *РАЗРЫВ ТКАНЕЙ*, в том числе, промежности и т.д. Колющие боли, возникающие после хирургических операций.

Болезненные последствия гнева и оскорблений; в том числе, те, о которых умалчивают, которые скрывают. Последствия открытого проявления гнева. А также травмы; падения; чистые резаные раны; хирургические операции; случаи сексуального насилия и сексуальные излишества; прорезывание зубов; употребление табака; применение ртути.

Болезненное опухание желез. Деформация и образование узлов в области суставов. Набухание и нагноение в области костей и надкостницы. Экзостозы. Бородавки. Кондиломы. Гемиплегия после гнева. Скованность и ощущение усталости во всех суставах. Во всем теле боли в сочетании с чувством слабости.

**Хуже.** *От переживаний, эмоций: разочарования; досады, неприятностей; негодования; из-за ссор. После сексуального эксцесса. Из-за мастурбации. От прикосновения. От холодного питья. От разрыва тканей, при рваных ранах.* Когда вытягивает, выпрямляет тело. От коитуса. После мочеиспускания; когда не мочится. Ночью. В новолуние; перед полнолунием.

**Лучше.** От тепла. В покое. От завтрака. От коитуса.

**Психика.** Жестокие приступы ярости. *Всегда сердитый, гневается.* Мрачный и обидчивый; швыряет вещи. Ребенок требует многие вещи, но отказывается от них, когда ему предлагают. Плохая память. Постоянно думает о сексе. Неудовлетворенное сексуальное желание, в том числе, у вдов. *Раздражительность, придирчивость;* повышенная чувствительность психическая и физическая. Ипохондрия. Воображаемые оскорбления.

Раздражительный, нервный, возбудимый и неистовый человек. Сильное негодование по поводу того, как поступают другие люди или сам пациент; он сожалеет о последствиях совершенного им. Пациент полагает, что он может упустить свое счастье, что жена уйдет от него. Болезни после подавленного, скрытого недовольства, досады. Женщина очень чувствительна к тому, что другие люди говорят о ней. Печаль без всякой причины; в сочетании с раздражительностью. Болезненные последствия нагоняя или наказания у детей. Недостаток самообладания. Страх: пугается собственной тени.

**Голова.** Сжимающая, оупляющая головная боль; лучше, когда много зевает; лучше — упереться головой во что-нибудь. Кажется, что головной мозг стиснут или разорван. Ощущение тяжелого груза или круглого предмета, шара во лбу. Мокнувшие, зловонные, разъедающие кожу молочные корки; хуже — на затылке. Перхоть. Вши. Выпадение волос.

Головокружение уменьшается, когда пациент ходит по кругу или быстро вращается на пятках. Ощущение, что головной мозг онемел, а в области затылка — полость, пустота. Выпадение волос на затылке и возле ушей.

**Глаза.** При слезотечении кажутся сухими. Узелки на веках. Ячмени, в том числе рецидивирующие. Блефарит. Распирающая, жгучая боль в глазных яблоках при сифилитическом ирите. *Ввалившиеся* глаза, вокруг них синие круги. Горячие слезы текут из глаз (из левого), когда пациент смотрит на солнце.

**Уши.** Тугоухость из-за увеличения миндалин; у детей — из-за аденоидов.

**Нос.** Насморк: сопровождается изъязвлением; выделения то густые, то жидкие. Частое чихание без насморка.

**Лицо.** *Болезненное, осунувшееся,* с заострившимся носом. Невралгия из-за кариеса зубов; боли распространяются в глаза. Подчелюстные железы болезненные, набухшие или неизменные; абсцесс подчелюстной железы. Лицевая невралгия: боль начинается с губ и распространяется на лицо; хуже при жевании.

**Рот.** *Зубы шатаются: чернеют: крошатся;* с темными полосами; хуже от еды и во время менструации; лучше от сильного давления и от жара, от горячего. Бледные кровоточащие десны. Пиорея. Затхлый, как от плесени, привкус во рту. Чрезвычайно чувствительные кариозные зубы; крайне болезненные после пломбирования. Зубы разрушаются как только прорезываются. Зубная фистула. Стоматит. Молочница.

**Горло.** Когда говорит, постоянно делает глотательные движения. Миндалины набухшие; колющая боль распространяется в ухо при глотании. Уплотнение и гипертрофия миндалин, гнусавый голос.

**Желудок.** Пациент *голоден*, даже когда желудок полный. Желание хлеба, стимуляторов, табака, молока. Ощущение, как будто желудок расслаблен и свисает. Тошнота, особенно после хирургических операций.

**Живот.** Чувство слабости в животе, как будто он может выпасть; пациенту хочется его поддержать. Сильная боль после операций на органах брюшной полости. Вздутие живота у детей из-за обилия кишечных газов. Колики: в том числе желчная; после гнева. Кишечные газы горячие, с запахом тухлых яиц. Дизентерийный стул: хуже от незначительного количества еды и питья. Понос из-за питья холодной воды. Очень чувствительные геморроидальные узлы — хуже от прикосновения. Дизентерия у слабых, болезненных, с большим животом детей.

**Мочевыделительная система.** Частые императивные позывы на мочеиспускание; при этом моча скудная или выделяется большое количество водянистой мочи; моча вытекает тонкой струйкой или по каплям. Ощущение, как будто капля мочи непрерывно скатывается вдоль уретры; сильнее после ходьбы или езды; уменьшается от мочеиспускания. Жжение в уретре возникает, когда пациент не мочится. Безрезультатный позыв на мочеиспускание у *новобрачных женщин*; а также при беременности. После мочеиспускания снова возникает позыв, как будто мочевого пузыря полон. Грыжа мочевого пузыря (цистоцеле).

**Мужские половые органы.** Постоянно думает о сексе. Сексуальная неврастения. Приапизм. Поллюции, после которых возникает полное изнеможение. Одышка усиливается во время или после коитуса. Сладострастный зуд мошонки. Простатит: Боль распространяется из заднего прохода в уретру. Мягкие мокнущие разрастания позади венчика головки полового члена. Увеличение предстательной железы в сочетании с геморроем. Орхит, в том числе при свинке (паротите). Атрофия яичек.

**Женские половые органы.** Повышенное сексуальное желание; голова слишком занята мыслями о сексе. Болезненная чувствительность половых органов; сильнее, когда садится. Боли в яичниках, распространяющиеся в бедра, усиливаются от давления; а также от полового акта. Сальпингит. Аменорея из-за возмущения, негодования. Зернистые разрастания во влагалище. Зуд или чувствительность наружных половых органов. Менструации: регулярные, сопровождаются тупыми болями в области крыльев таза и слабостью в конечностях. Первый половой акт очень болезнен, причиняет сильные психические и физические страдания.

**Дыхательные органы.** Одышка, сопровождающаяся ощущением сжатия в груди, возникает в конце полового акта или после поллюции. Кашель усиливается при чистке зубов; от курения табака; употребления в пищу мяса или чередуется с ишиасом.

Сердце. Сердцебиение с ощущением дрожания возникает, когда пациент слушает музыку.

**Шея и спина.** Боль в пояснице, как после поднятия чрезмерной тяжести; хуже от коитуса, утром и при вставании со стула.

**Конечности.** Дергает, как будто за нитку, в кончиках пальцев рук, или в них возникает онемение. Кости пальцев рук сформированы неправильно; остеомиелит пальцев на руках. Деформация суставов на пальцах рук, образование узлов в области суставов после артрита. Невралгия бедренного нерва. Конечности как будто ушиблены, разбиты и болят. Слабость в коленях. Шаркающая походка. Ягодицы болят, когда пациент сидит.

**Кожа.** Боль предшествует появлению высыпаний при опоясывающем лишае. Кожные симптомы чередуются с болями в суставах. Щиплет, чешется кожа, как при паразитах; зуд меняет локализацию после расчесывания. Экзема с образованием толстых струпьев, сопровождающаяся жестоким зудом. Сухие кондиломы на ножке. Язвы, новообразования крайне чувствительны: от прикосновения к ним могут возникнуть конвульсии.

**Сон.** Пациент усиленно зевает и потягивается, из-за этого на глазах выступают слезы. Ребенок просыпается, отталкивает от себя все и требует, чтобы все ушли; часто зовет мать. Эротические сновидения, сопровождающиеся поллюциями. Весь день пациент сонный, всю ночь не спит. Ломота во всем теле.

**Лихорадка.** Хочет раскрыться, раздеться. Пот обильный, холодный, пахнет, как тухлые яйца, при этом пациенту хочется раскрыться, сбросить одежду. Неспособен вспотеть.

**Дополнительно.** Caust., Coloc.

**Диф. диагноз.** Cham., Merc.

## СТИСТА

**Общее.** Растение, из которого готовят гомеопатический препарат, широко известно под названием медуница, или легочная трава. Стикта применяется при насморке, катаре бронхов, *нервных* и суставных болезнях.

Чувство отупения и вялости, как при начинающейся простуде. *Ревматические заболевания, сопровождающиеся скованностью.* Пациент *нервный*, у него возникает ощущение, что разные части тела парят, самостоятельно перемещаются в пространстве. Болезненная сухость слизистых оболочек. Боли локализируются по диагонали. Истерия; хорея; возникают после потери крови. Последствия падения, кровопотери.

Хуже. *Ночью.* Когда ложится. От движения. При перемене температуры.

**Лучше.** От выделений. На открытом воздухе.

**Психика.** Пациентке кажется, что она должна говорить обо всем, о чем угодно; она не придает значения тому, слушают ее или нет. Оживлена, танцует, веселится. Ей кажется, что она парит в воздухе.

**Голова.** Головная боль перед появлением катаральных выделений. Тяжесть в голове, в том числе в лобной области.

**Глаза.** Когда опускает веки или поворачивает глаза, возникает жжение в веках и ощущение болезненности в глазных яблоках.

Нос. *Давление или ощущение полноты в корне носа* — нос заложен. Постоянная потребность высморкаться, хотя выделений из носа нет. Болезненная сухость слизистых оболочек. Насморк: секрет быстро подсыхает и образуются корки, которые бывает трудно удалить. Сенная лихорадка (поллиноз), непрекращающееся чихание.

**Горло.** Сухость в горле; из задних отделов носа капает слизь.



**Желудок и живот.** Понос утром, стул пенистый.

**Женские половые органы.** Отсутствие молока после родов.

**Дыхательные органы.** Щекотание в верхних отделах глотки. *Непрекращающийся сухой отрывистый кашель мешает спать; хуже от кашля*, когда делает вдох; к вечеру и когда устал; после приема пищи, от простуды; при гриппе; при коклюше. Онемение дыхательных путей. Пульсация из правой части груди распространяется вниз, в живот. Бронхит. Боль из области грудины распространяется в позвоночник, усиливается при движении.

**Шея и спина.** Болезненность, скованность в шее; боли распространяются в плечо. Беспокойство в кистях и стопах. Ноги как будто парят в небе. *Ревматизм.* Красные пятна в области больных суставов. Бурсит, особенно в области колена. Холодные, влажные конечности. Обильное потоотделение на кистях. Спазмы, напоминающие хорею.

**Сон.** Бессонница из-за нервозности; из-за кашля; после хирургических операций.

**Диф. диагноз.** Elaps, Guaj., Sang., Thuj.

## STRAMONIUM

**Общее.** Вся сила дурмана, или бешеного яблока, проявляется в его **ВОЗДЕЙСТВИИ НА ГОЛОВНОЙ МОЗГ**: он вызывает выраженное и стойкое нарушение умственной деятельности; галлюцинации; навязчивые идеи; бред, сопровождающийся страхами и т.д.

Таким образом, Страмоний — это средство для лечения **СИЛЬНЫХ СТРАХОВ**. При обычных условиях дурман не вызывает боль как таковую.

**Подавление выделений:** не выделяется ни моча, ни стул. Поражаются также горло, кожа и спинномозговые нервы. Дурман повышает возбудимость мимических и скелетных мышц; движения могут быть *грациозными*, ритмичными или *беспорядочными, необузданными*, в том числе, движения головы и рук.

**Дрожание конечностей.** Паркинсонизм. Дрожь, в том числе, нервная. Конвульсии, спазмы усиливаются ночью; в том числе, после мастурбации. Паралич одной половины тела, судороги — в другой половине или односторонний паралич; паралич сопровождается подергиванием мышц. Хорея, эпилепсия, в том числе после испуга. Истерия, плач, смех, сочетающиеся с сексуальным возбуждением. Катаlepsия: конечностями пациента могут двигать другие люди. Тонические и клонические судороги возникают по очереди. Неврит после травмы. Прогрессивный паралич.

Болезненные последствия шока, потрясения, испуга; воздействия солнца; родов; подавления симптомов. Водобоязнь (бешенство). Неправильное восприятие, заблуждения, касающиеся размера предметов и расстояния. Ощущение, как будто конечности отделены от тела.

**Хуже.** От блестящих предметов: в том числе зеркал, поверхности воды. От испуга. После сна. В темноте. В облачные, пасмурные дни. При глотании. От подавления симптомов. От невожатанности. От прикосновения.

**Лучше.** ОТ СВЕТА. В обществе, в компании. От тепла.

**Психика.** Просыпается в испуге, никого не узнает, кричит от страха, прижимается к тому, кто рядом (ребенок). **БОИТСЯ ТЕМНОТЫ**, испытывает ужас перед блестящими предметами. Молится, поет в благоговении; умоляет; упрашивает; *говорит*, не переставая. *Страшные* галлюцинации, пугающие пациента; пациент видит привидения, яркие сверкающие или отвратительные призраки, животных; они выскакивают из-под земли и разбегаются в разные стороны или направляются к нему.

**Дикое возбуждение**, как в ночных кошмарах. Пациент совершает всевозможные безумные действия. *Бред сопровождается разнообразной активностью*; белая горячка (алкогольный делирий). Буйное **ПОМЕШАТЕЛЬСТВО**; сопровождающееся холодным потом. Религиозное безумие. Невыносимо слышать как разговаривают другие. Самообвинение. Потеря рассудка или речи. Станные, нелепые идеи: пациент считает себя высоким; считает, что он удвоен; что лежит поперек постели; что часть тела отрезана и т.д.

Желание общества, компании; застенчивость, прячется или пытается убежать. Разговаривает на иностранном языке. Смеется ночью, плачет в дневное время. Гордый, высокомерный, веселый и восторженный. Похотливые разговоры. Пациенту кажется, что конечности отделены от туловища. Возникают страх и тревога, когда он слышит звук текущей воды. Отвращение ко всем жидкостям.

Буйный, проклинает, рвет зубами свою одежду. Яростная речь. Неприлично обнажает свое тело. Тупость; слабоумие. Сидит молча, смотрит в пол, тербит одежду. Хочет убить каких-то людей или себя. Возникает тревога, когда проходит через туннель. Состояние экзальтации, восторга чередуется с периодами стойкой меланхолии. Пациенту кажется, что все вещи и все люди вокруг новые. Жена считает, что муж не обращает на нее внимания; муж считает, что жена ему неверна.

**Голова.** Головокружение усиливается, когда человек идет в темноте или с закрытыми глазами. Резким движением поднимает голову с подушки, потом снова роняет ее на подушку: в бессознательном состоянии; в бреду (делирий); в родильной горячке (при послеродовом сепсисе) и т.д. При головной боли часто речь становится бессвязной. Голова запрокинута назад; в том числе при головокружении — пациент поддерживает

голову руками, когда сгибается или поднимается; наблюдается, в том числе, после солнечного удара. Менингит; в том числе вследствие подавления выделений из уха. Головная боль из-за солнца.

**Глаза.** Глаза неподвижны, сверкают; у пациента *пристальный взгляд*, глаза широко раскрыты. Косоглазие. Во время сна глаза полуоткрыты. Двоится в глазах (диплопия). Слезотечение: при головной боли, лихорадке, при боли в ухе. Ночная слепота. Видит предметы в зеленом цвете. Галлюцинации, в которых все перемешано, беспорядочно двигается. *Все предметы кажутся черными; изогнутыми; маленькими, большими.* Косоглазие при болезни головного мозга, во время конвульсий; оно усиливается от ужаса, от страха. Зрение ослаблено, угасает. Зрачки расширены.

**Уши.** Ощущение, что воздух вырывается из уха. Глухота. Слуховые галлюцинации.

**Нос.** Крылья носа белые.

**Лицо.** *Красное, одутловатое*, горячее. Выражение лица быстро меняется; то оно румяное, то бледное; сардоническая усмешка; затем — выражение ужаса на лице. Лоб наморщен; брови нахмурены; при заболеваниях головного мозга. Пациент считает, что лицо стало длиннее. Губы сухие, слипшиеся. Жевательные движения. Спастическое сжатие челюстей (тризм).

**Рот.** *Мелкие красные точки на языке. Язык: сухой, как пергамент, распухший; свисает из рта.* Горький вкус во рту, в том числе, у пищи. Заикание. Афазия. Постоянно сплевывает слюну. Из рта течет вязкая слюна. Пациент скрежещет зубами.

**Горло.** Сухость в горле сопровождается сильной жаждой; *и все же пациент боится воды*, из-за нее возникает удушье. Гортань перемещается вверх и вниз, как при глотании. Ощущение, как будто кипящая вода подступает к горлу. Глотание: затрудненное; торопливое.

**Желудок.** У пищи вкус соломы. Рвота зеленоватой массой. Сильное желание кислого; от лимонного сока становится лучше. Упорная икота.

**Живот.** *Понос: стул гнилостный, темный, безболезненный*, непроизвольный; при поносе отмечается косоглазие и бледность. Детская холера. Подавление дефекации — стула нет.

**Мочевыделительная система.** Подавление мочеиспускания; в особенности при тифе, мочевого пузыря пустой. Потеря сократительной способности мочевого пузыря у стариков; моча вытекает медленно, быстро мочиться не может. Озноб, ощущение холода при мочеиспускании.

**Мужские половые органы.** Сильное сексуальное возбуждение; оно сопровождается непристойными разговорами и действиями. Все время держит руки на половых органах.

**Женские половые органы.** Нимфомания; женщина говорит непристойности; поет похабные песни. Усиленные менструации, им предшествует сексуальное возбуждение. Болтливость и пение во время менструаций. Менструальная кровь имеет сильный запах, как у спермы. Чрезмерно сильные менструальные выделения. Всклипывает и стонет после менструации.

Экламптические судороги, послеродовой психоз; при этом психические симптомы сочетаются с обильным потоотделением. Руки всегда держит на половых органах.

**Дыхательные органы.** Вдох медленный, выдох быстрый. Спастический кашель: у пьяниц; при коклюше. Голос хриплый, каркающий; внезапно срывается на высоких нотах. Спазмы, подергивание гортани. Астма нервного происхождения. Кашель усиливается, когда пациент смотрит на свет, на огонь или на яркие, блестящие предметы. Кашель сопровождается резким сокращением нижних конечностей, если пациент сидит.

**Сердце.** Слабое сердце; пульс аритмичный. Болезни сердца, сопровождающиеся ощущением сжатия грудной клетки и психическими симптомами.

**Шея и спина.** Скованность шеи, не может запрокинуть голову назад. Тянущая боль в спине. Позвоночник чувствительный; от малейшего давления на него пациент громко кричит, приходит в неистовство. Опис-тотонус.

**Конечности.** Грациозные и ритмичные движения. Пациент хлопает в ладоши над головой. Делает простые движения руками — сжимает и разжимает пальцы. Заламывает руки. Пошатывается при ходьбе. Когда спускается по лестнице, оступается, пропускает ступеньку. Жесткая боль в боку (**в области** крыла подвздошной кости). Дрожание конечностей. Внутренняя поверхность правого бедра красная и опухшая. Абсцесс **тазобедренного** сустава, сопровождающийся жестокой болью. Ге-миплегия сопровождается судорогами в парализованной части тела. Пятки немеют, иногда болят.

**Кожа.** Ощущение, как будто ползает множество насекомых. Кожная сыпь, экзантема — так и не возникает, хотя должна была появиться. Ярко-красный, блестящий румянец. Хронические абсцессы, свищи (фистулы). Огненно-красные бляшки на коже. Абсцессы и опухоли, сопровождающиеся сильной болью. Ожоги пламенем и жидкостью.

Сон. Коматозный сон. Пациент плачет в сновидениях. *Просыпается в страхе* или с криком. Лежит на спине, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах. Бессонница в темноте. Видит страшные сны. Смеется, вскрикивает, вздрагивает во время сна.

**Лихорадка.** Обильное потоотделение, не приносящее облегчения. Жесткая лихорадка. Холодный пот; в том числе при спазмах.

**Диф. диагноз.** Bell., Hyos., Op.

## **STRONTIUM CARBONICUM**

**Общее.** Стронций воздействует на *кровообращение*, вызывая ощущение напряжения, обусловленное полнокровием (конгестией). Кроме того, он влияет на сердце, почки, костный мозг, *голеностопные суставы* и в целом на правую сторону тела.

**Летучие боли:** пациент вряд ли может сказать, где они локализуются. Боли усиливаются и уменьшаются постепенно либо из-за них пациент ощущает обморочную слабость, общее недомогание. Жжение, *грызущее ощущение*.

Человек непроизвольно сильно вздрагивает всем телом. *Неподвижность* одной стороны тела. Ощущение *паралитической слабости*. Исхудание. Изнеможение или шок после хирургической операции. Онемение. Болезненность. Ощущение ползания мурашек в конечностях. Отек, особенно в области голеностопных суставов (как сопутствующий симптом). Высокое кровяное давление; артериосклероз. Поражение костей, в особенности бедренной. Хронические последствия кровотечений. Суставные боли. Хроническое растяжение связок. Стеноз, в частности пищевода. Неврит с ухудшением от холода. Ощущение холода на отдельных участках; в области икроножных мышц. Боль и зуд чередуются.

**Хуже.** ОТ ХОЛОДА, если раскроется, разденется. От ходьбы. От растяжения. От кровотечения. Вечером. При перемене погоды. При наклоне. От прикосновения. От растирания.

**Лучше.** От жара и света. От солнца. От укутывания. От горячей ванны.

**Психика.** Крайняя забывчивость. Предчувствия, как будто совесть нечиста. Депрессия, уныние. Раздражительный; внезапно начинает гневаться, наносит удары по всему, что попадает под руку.

**Голова.** Тупые боли распространяются в верхнюю челюсть, сопровождаются головокружением и тошнотой. Жестокая боль в затылке, распространяющаяся вверх; лучше, если закутать голову. Распирающее давление ощущается во всей голове. Тупая боль в области бровей.

**Глаза.** Жжение в глазах, краснота. Светобоязнь, сохраняющаяся после операции, в особенности, если предметы кажутся залитыми кровью. В темноте видит зеленые пятна перед глазами. Боль и слезотечение после нагрузки на глаза; при этом предметы, на которые пациент смотрит, прыгают, кружатся, а их цвет меняется.

**Нос.** Зуд, покраснение и жжение носа. Кровяные корки.

**Лицо.** Красное, с ощущением жгучего жара, или очень бледное; в том числе каждый раз во время ходьбы.

**Рот.** Ощущение онемения и сухости в первой половине суток (до полудня); в частности когда просыпается. Зубы как будто сдавлены, стянуты вместе.

**Желудок.** Ощущение давления в желудке в процессе пищеварения. Икота вызывает боли в груди. Пища кажется пресной, безвкусной. Страстное желание хлеба и пива. Отвращение к мясу.

**Живот.** Колика в пупочной области. Твердый, узловатый стул, эвакуируется медленно, требуется большое усилие; после стула возникает жжение в заднем проходе, сохраняющееся продолжительное время. Понос усиливается ночью; сопровождается постоянными позывами на стул; стул в виде желтой жидкости, истощающий; сопровождается сжимающей болью; уменьшается к утру. Периодический понос.

**Мочевыделительная система.** Моча бледная, с сильным запахом аммиака.

**Дыхательные органы.** Ощущение давления, как от груза, лежащего на груди. Боль в груди слева, сопровождающаяся ощущением стеснения, усиливающаяся после приема пищи.

**Сердце.** Кажется, что сердце сдавлено. Блокада сердца.

**Конечности.** Кисти немеют. Судороги в икроножных мышцах и подошвах. *Растяжение связок голеностопного сустава или опухание лодыжек*, как сопутствующий симптом. Хронические спазмы, особенно в области голеностопных суставов. Ишиас, сопровождающийся отеком лодыжки. Неподвижность конечностей только с одной стороны, как при параличе. Грызущее ощущение, как будто в костном мозге. Понос при ревматизме (при болях в суставах).

**Кожа.** Высыпания мокнущие, сопровождающиеся зудом, жжением; лучше на открытом воздухе, особенно от теплых солнечных лучей.

**Лихорадка.** Приливы жара, в том числе к лицу, однако пациент не желает раскрываться. Обильное потоотделение ночью; при климаксе.

**Диф. диагноз.** Calc, Rhus-t.

## **STROPHANTHUS HISPIDUS**

**Общее.** Строфант применялся в качестве яда для стрел. Он вызывает повышение сократительной способности всей поперечно-полосатой мускулатуры, особенно *МИОКАРДА*; усиливает систолу и уменьшает частоту сокращений. Это средство можно с успехом применять для того, чтобы увеличить силу сердечной мышцы и уменьшить отеки.

Строфантус не обладает кумулятивным действием; он безопасен для лечения дородных пожилых людей, страдающих от уплотнения стенок артерий. Функциональные нарушения работы сердца из-за употребления алкоголя, табака, а также чая. Недостаточность митрального клапана. Артериосклероз.

*Подергивание мышц. Колющие боли. Ощущение колыхания или волнообразного движения тела.* Пульсация, биение. *Быстрое чередование симптомов* сочетается с медленным пульсом. Обморочная слабость. Анемия, сопровождающаяся сердцебиением и одышкой. Экзоф-тальмический зоб. Усиленная секреция. Строфантус устраняет пристрастие к алкоголю.

Хуже. От напряжения. От табака. От чая. От алкоголя.

**Психика.** *Боятся суровых испытаний.* У пациента во время сна возникает ощущение, что он поднят над землей. Не по годам разговорчивый ребенок.

**Голова.** Головокружение: предметы плавают перед глазами; головокружение у стариков. Ощущение волнообразного движения в голове.

**Глаза.** Неясное зрение, смутно видит предметы. Зрачки быстро расширяются и сужаются, с интервалом в несколько минут. Глаза блестят.

**Лицо.** Румянец; красные пятна на лице. Алые губы.

**Горло.** Ощущение сжатия горла. Жжение, заставляющее делать глотательные движения.

**Желудок.** Страстное желание кофе. Отсутствие аппетита. Тошнота и отвращение к алкоголю. Отвращение к еде, после еды возникает удушье и рвота.

**Живот.** Урчание и щемящая боль в области пупка. Понос, сопровождающийся жжением и тенезмами заднего прохода.

**Мочевыделительная система.** Повышенное образование мочи; или моча скудная, содержит белок.

**Сердце.** Слабое сердце; *ноющая боль* или мучительное, тоскливое ощущение в области сердца. *Ощущение, что сердце работает быстро, оживленно.* Хроническое, в том числе нервного происхождения сердцебиение, а также остановка дыхания. Колотье и ощущение подергивания в области верхушки сердца. Пульс: частый, чередуется с медленным; слабый, малый, аритмичный. Сердечная астма.

**Конечности.** Тяжесть и боль в предплечьях и в пальцах рук. Зуд и колющая боль в обеих стопах.

**Кожа.** *Крапивница:* хроническая, уменьшающаяся.

**Диф. диагноз.** Арос, GLON., IGN., Spig.

## STRYCHNINUM

**Общее.** Спастическая ригидность — ключевой симптом Стрихнина, алкалоида, получаемого из семян рвотного ореха (*Nux-v.*). Тонические судороги, сопровождающиеся опистотонусом; столбняк; жестокое внезапное сокращение, подергивание и дрожание — характерные симптомы, которые возникают при отравлении стрихнином. Человек не способен сделать глубокий вдох; неподвижность грудной клетки. Атетоз. Ощущение холода в позвоночнике. Проливной пот на голове и на груди.

**Хуже.** От прикосновения. От шума. От движения.

**Лучше.** Лежа на спине.

## SUCCINUM

**Общее.** Окаменевшая смола, или янтарь, вызывает нервные и истерические симптомы. Страх поездов и закрытого пространства.

## SULPHONAL

**Общее.** Это производное угольной смолы вызывает симптомы атаксии — появляется шатающаяся походка; возникает анестезия голеней, пропадает коленный рефлекс.

## SULPHUR

**Общее.** Сера — продукт вулканической деятельности, она встречается в природе в чистом виде и с давних времен применяется для избавления от кожных болезней. Поэтому и гомеопатическая сера, Сульфур, является великим противопсорным средством.

Сера вызывает *неравномерное распределение КРОВИ*, ощущение *ЛОКАЛЬНОГО ЖЖЕНИЯ*, *ПУЛЬСАЦИИ* или *КОНГЕССИИ*; приливы жара; прилив крови к голове, к груди, к сердцу.

*ПОКРАСНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ* или отдельных частей тела — еще один известный признак, связанный с неравномерным распределением крови: у пациентов красные *ГУБЫ*, уши, нос, веки, задний проход, у женщин — вульва.

Нарушен *ОБМЕН ВЕЩЕСТВ*, так как пища недостаточно хорошо усваивается: несмотря на волчий аппетит, пациент *худеет*, в особенности, дети. Ребенок выглядит усохшим, как маленький старичок, у него крупная голова, большой живот, худые конечности.

Сульфур часто бывает очень полезен в начале лечения *ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ*, а также для завершения лечения острых; или в случаях, когда отмечается *НЕДОСТАТОЧНАЯ РЕАКЦИЯ* и точно подобранное средство не действует.

Секрет слизистых оболочек и выделения *едкие, с прожилками крови, зловонные* и вызывают зуд. Выпот в серозных полостях и отложения на серозных оболочках рассасываются медленно. Сульфур избирательно действует *НА КОЖУ*, вызывая ощущение жара и жжение, которые сопровождаются *ЗУДОМ*.

Пациент не способен ходить прямо, у него *ПОКАТЫЕ ПЛЕЧИ, ОН ВЫСОКИЙ И ТОЩИЙ*; выглядит *НЕУМЫТЫМ; НЕОПРЯТНЫМ; ТЕЛО ПАХНЕТ НЕПРИЯТНО НЕЗАВИСИМО ОТ МЫТЬЯ*. Отвращение к мытью: всегда становится хуже после ванны. Грязные, мерзкие люди, склонные к болезням кожи.

*Рецидивирующие болезни.* Опухание, затвердение и нагноение желез. *Приступы обморочной слабости:* частые, возникают в течение дня, в частности, после кормления ребенка грудью; либо после бессонной ночи; сопровождаются выраженной сонливостью. Ощущение *пустоты*, слабости, как будто все внутри опустилось или провалилось. Ощущение переполнения, шершавости, или онемения. Перед приступом эпилепсии возникает ощущение, как будто мышь бежит вверх по рукам к спине. Ребенок подскакивает, вздрагивает и вскрикивает от страха.

*ПОДНИМАЮЩИЕСЯ СНИЗУ ВВЕРХ* — приливы крови, жара, головокружение и т.д. Оборванный, одетый в лохмотья философ; люди, которые всегда выглядят грязными, неопрятными и размышляют на религиозные и философские темы. Всё отражается на эпигастральной области. Жжение *В ТЕМЕНИ И В ПОДОШВАХ*. Ревматизм. Золотуха. Псора. Хронический алкоголизм: отеки и другие симптомы у пьяниц.

Болезненные последствия падения, ударов, растяжений, пребывания на солнце. Пациент стремится, чтобы кишечник всегда был опорожнен, пуст. Незначительное давление вызывает боль, опухание и нагноение. Уплотнение тканей из-за постоянного давления: мозоли; пролежни и т.д. Воспаление синовиальной сумки плюснефалангового сустава большого пальца стопы. "Никак не может выздороветь после заболевания органов грудной клетки". Ощущение, что кровать слишком мала, чтобы удержать пациента. Как будто раскачивается или стоит на колеблющейся поверхности. Болезни шахтеров. Хорея: хроническая; после подавления высыпаний.

**Хуже.** *ОТ ПОДАВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ. ОТ КУПАНИЯ. ОТ МОЛОКА. КОГДА СОГРЕЕТСЯ, НАПРИМЕР, В РЕЗУЛЬТАТЕ СИЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ; В ПОСТЕЛИ;* надев шерстяную одежду и т.д. *Из-за изменения состояния атмосферы. От разговора. Периодически;* в 11 ч. *Во время климакса.* В полнолуние. *Когда стоит,* наклоняется. Если тянется высоко, пытаюсь дотянуться, достать что-то. От сладостей. Когда смотрит вниз. Когда переходит через текущую воду (ручей и т.д.). Вследствие вакцинации. Из-за подавления геморроя.

**Лучше.** На открытом воздухе. От движения. Если поджечь больные конечности. От потоотделения. В сухую теплую погоду. Лежа на правом боку. При ходьбе. От сухого жара.

**Психика.** *Оупение, думает с трудом;* переставляет слова или не может подобрать нужное слово, когда говорит или пишет. *Ленивый, голодный и всегда усталый.* Капризный, как ребенок, взрослый человек. *Мечтатель, полный оптимизма.* Подлый. Любопытный, сует нос не в свое дело. Легко приходит в волнение. Безрассудное, глупое ощущение счастья и чувство гордости: пациент считает, что он обладает прекрасными вещами; все, чем он увлекается, кажется ему прелестным; даже лохмотья кажутся ему красивыми или чрезвычайно дорогими. Человек очень эгоистичен; не уважает других. Слишком ленив, чтобы заставить себя что-то делать, и слишком несчастен, чтобы жить. Выраженная склонность предаваться размышлениям на религиозные и философские темы, сопровождающаяся возникновением навязчивых идей.

Отвращение, вплоть до тошноты, связанное с любыми испарениями, исходящими от тела самого пациента. Упрямство. Не переносит, когда рядом с ним кто-то есть. Усталость от жизни. Сильные импульсы совершить самоубийство: возникает желание утопиться или выпрыгнуть из окна (в случае эпилептического приступа ухудшение наступает во время менструации).

Отвращение к умственному и физическому труду. Бездельничает, теряет время зря. Считает, что он дает людям что-то нехорошее, что вызывает их смерть. Придирается. Испытывает отвращение к делам, работе. Меланхолия. Печаль. Рассеянность. У женщины возникает ощущение, будто она опозорена; после родов.

Желание добиться чего-нибудь сопровождается неспособностью сделать это. Мания философствовать: хочет знать, кто и как сделал ту или иную вещь; пытается что-нибудь доказать, не имея ни малейшей надежды обнаружить истину или найти возможный ответ. Воображает себя великим человеком; будучи невеждой, презирует образованных людей и просвещение. Плачет без причины или по незначительному поводу; от утешения становится хуже. Голова. Головокружение: ощущается во лбу; усиливается, когда переходит через реку; при наклоне; оно сопровождается головной болью. *Темя* горячее, в нем ощущается *пульсация*, тяжесть, болезненность. Боль, озноб, давление и т.д. — *поднимаются из области затылка вверх, к темени.* Мигрени, повторяющиеся периодически, в том числе, каждое воскресенье; им предшествуют фотопсии.

Ощущение, как будто повязка на голове или боль сосредоточена глубоко в мозгу. Голова горячая, а стопы холодные. Волосы сухие, холодные, жесткие; выпадение волос усиливается от мытья. Потливость кожи волосистой части головы. Роднички слишком долго остаются открытыми. Водянка мозга (гидроцефалия)

сопровождается судорогами, при этом лицо красное, зрачки расширены. При ходьбе голова наклонена вперед. Глаза. Жжение в глазах. Рези, как от песка. Распирающая боль в глазных яблоках. Дрожание глаз; трепетание, дрожание век. Предметы кажутся более удаленными, чем на самом деле. *Ореол вокруг источника света*. Неясное зрение, как будто перед глазами черная вуаль, дымка. Ретинит вследствие чрезмерной нагрузки на глаза. Воспаление глаза, боли из-за попадания инородного тела. Светобоязнь. Кератит: роговица как матовое стекло. Веки склеиваются. Маслянистые слезы. Ячмени и опухоли хрящей век. Экзема век. Трахома. Помутнение стекловидного тела.

**Уши.** Наступлению глухоты предшествует повышенная чувствительность к звукам; сильнее после еды, когда сморкается. Звук, напоминающий плеск воды. Зловонные гнойные выделения из уха; воспалительные выделения каждый восьмой день. Уши очень красные, в том числе, у детей. Ощущение, как будто звуки проникают не через уши, а через лоб.

**Нос.** Заложенность поочередно то с одной стороны, то с другой. Жидкие жгучие выделения из носа; сильнее на улице; нос заложен в помещении. Кончик или крылья носа красные; опухают; хуже от холода. Ощущение, что возле носа пахнет, как при застарелом насморке. Носовое кровотечение: ухудшение наступает ночью, когда пациент ложится на правый бок. Повышенная чувствительность к запахам. Воображаемые запахи. Веснушки и черные точки (комедоны) на носу. Пациент часто чихает.

**Лицо.** Бледное, болезненное, *ВЫГЛЯДИТ СТАРЫМ*. Четко очерченная краснота на щеках. Веснушки, пятна на лице. Губы ярко-красные, припухшие (верхняя), сухие, шершавые, потрескавшиеся, ощущается жжение на губах; подергивание или дрожание губ. Набухшие вены на лбу. Угри. Свинка (паротит).

**Рот.** Зубы: чувствительны к прикосновению, болезненные. Дергающие, стреляющие, пульсирующие боли в зубах. Пациент скрежещет зубами. Десны опухшие, кровоточат. Язык: сухой, дрожит; кончик и края языка красные. Привкус во рту: кислый, сладковатый, скверный, горький — утром. Обильная слюна, вкус у нее тошнотворный. Стоматит у грудных младенцев. Кажется, что пища на вкус как солома, или пересолена. Афты; молочница.

**Горло.** Ощущение, как будто комок, волос или заноза (щепка) в горле или как будто *пар* поднимается к горлу. Кажется, что шар подкатывается к горлу и перекрывает глотку. Покраснение горла снаружи. Ощущение, как будто горло опухло. Сухость в горле, из-за которой возникает кашель.

**Желудок.** *Пьет много, ест мало*. Отрыжки с привкусом тухлых яиц; хуже от еды или ночью. Полная потеря аппетита или волчий аппетит. Пациент чувствует голод, но когда садится за стол, возникает отвращение к еде, он отворачивается от пищи. Ест любую пищу, все подряд. Отвращение к мясу. Желание сладкого, сырых продуктов. Пища кажется слишком соленой. От молока возникает кислый вкус во рту и кислые отрыжки.

**ВНЕЗАПНЫЙ ГОЛОД И СЛАБОСТЬ** в 11 ч; *ощущение пустоты и слабости в эпигастрии*. Отрыжка возникает от давления на желудок. Головная боль или усталость, если пациент ест не часто. Рвота непереваренной пищей или кислой массой. Тошнота во время беременности. От сладкого становится хуже. Тяжесть в желудке.

**Живот.** **БОЛЕЗНЕННЫЙ**, очень чувствительный к давлению живот. Колющая боль в области селезенки; сильнее при кашле или при глубоком дыхании. Колотье в области печени. Желчная колика; а также хроническая или рецидивирующая желтуха. Кажется, что кишечник затянута в узлы; хуже, когда пациент сгибается вперед. Тяжесть в животе, как будто в нем лежит глыба. Ощущение, как будто в животе шевелится что-то живое; как будто ребенок бьет кулачком. Колика после еды или питья, заставляющая пациента сгибаться вдвое; хуже от сладкого. Давление на низ в прямой кишке. Боль, позывы на стул и зуд в прямой кишке. *Склонность к геморрою*, в том числе, во время беременности. Геморрой наружный и внутренний; узлы в виде крупных гроздьев — болезненные, чувствительные, в них ощущается саднение и жжение, жгучая боль, они кровоточат. Из-за боли пациент задерживает стул.

**ПОНОС:** *ЗАСТАВЛЯЕТ СПЕШИТЬ, ВОЗНИКАЕТ РАНО УТРОМ*; стул изменчивый, кашицеобразный; *зловонный, безболезненный*; водянистый; сероватый; пенистый; хуже от молока. Понос чередуется с запором. Привычный запор. Запах стула преследует пациента, как будто он испачкался. *Покраснение вокруг ануса*, сопровождающееся зудом. Понос у младенцев: он сопровождается бледностью лица, обильным потоотделением, сонливостью (ребенок лежит с полуоткрытыми глазами), подавлением мочеиспускания, спазмами в конечностях, а также криком при пробуждении. Маленькие дети, страдающие от колик. Непроизвольный стул, возникающий при чихании или смехе, сопровождающийся выделением кишечных газов. Большой живот, худые конечности (у детей). Экзема в области пупка. Стул плоский и тонкий.

**Мочеисделительная система.** Зуд, жжение в уретре при мочеиспускании, сохраняющиеся продолжительное время после него. Внезапный позыв на мочеиспускание, должен спешить. Учащенное мочеиспускание, в особенности ночью. Непроизвольное мочеиспускание ночью (ночной энурез), особенно у золотушных, неопрятных детей. Слизь и гной в моче. Выделение большого количества бесцветной мочи; на ее поверхности плавают жирные частицы. Непроизвольное мочеиспускание при отхождении кишечных газов или при кашле. Болезненные безрезультатные попытки помочиться; задержка мочи; каждый раз при простуде страдает мочевого пузырь. Струя мочи тонкая, прерывистая.

**Мужские половые органы.** Яички низко свисают. Поллюции, сопровождающиеся жжением в уретре. Холодный половой член. Потенция снижена; импотенция. Уплотнение яичек. Зловонный пот на половых органах. Изнеможение утром после поллюции. Боль в спине и слабость в конечностях после коитуса, сопровождающиеся грустью и раздражительностью. Простаторея после мочеиспускания и стула. Когда прикасается к женщине, возникает поллюция. Сперма без запаха, водянистая. Водянка яичка. Крайняя плоть напряженная, плотная, как будто кожаная, при этом в большом количестве образуется зловонная смегма; возникает зуд.

**Женские половые органы.** Жжение в области наружных половых органов и во влагалище, зуд, а также болезненность усиливаются, когда женщина сидит; поэтому она едва ли способна сидеть неподвижно. Ощущение болезненности во влагалище во время коитуса. Ощущение давления на низ в области таза в направлении наружных половых органов; усиливается, когда женщина стоит.

Менструации нерегулярные, слишком поздние, короткие, менструальные выделения скудные, густые, зловонные, черные, едкие, вызывающие болезненность. Режущая боль в матке во время менструации. Подавление менструаций из-за незначительного физического или нервного возбуждения. Аменорея.

Бели в виде желтой слизи, жгучие, разъедающие. Мучительный зуд наружных половых органов, сопровождающийся папулезными высыпаниями вокруг. Чувство слабости в половых органах.

Скверный запах от половых органов, зловонный пот на бедрах. Выпадение матки, возникающее, когда женщина тянется вверх, пытаясь что-то достать. Рак молочной железы или матки. Неправильное развитие молочных желез и матки.

Резкое жжение в молочной железе. Соски: потрескавшиеся у основания, при этом отмечаются жгучая боль, жжение, кровоточивость; трещины появляются после кормления ребенка, при этом боль распространяется в спину.

Послеродовой сепсис, сопровождающийся высокой температурой, обильным потоотделением на всем теле, чувствительностью живота к прикосновению и сонливостью, дремотой.

**Дыхательные органы.** *ЗАТРУДНЕННОЕ ДЫХАНИЕ; ЖЕЛАНИЕ ОТКРЫТЬ ОКНА;* по ночам возникает ощущение удушья, нехватки воздуха. Неправильное, неритмичное дыхание. Низкий грубый голос. *Кашель* жестокий, в виде двух или трех незавершенных приступов; щекочущий, как будто из глубины гортани. Сильное клокотание слизи и ощущение жара в груди; особенно в 11 ч.

*Боль из левого соска распространяется назад.* Ощущение повязки на грудной клетке или груза, лежащего на ней. Красные, коричневые пятна на груди. Экссудативный плеврит. Пневмония. Зеленоватая, сладковатая, гнойная мокрота. Ощущение жжения или *холода* в грудной клетке; оно распространяется в лицо.

Каждый раз приступу астмы предшествует простуда. Чувство слабости в груди, возникающее во время разговора. Жестокий кашель сопровождается головной болью; усиливается, когда пациент лежит на спине. Ощущение, как будто в верхней трети левого легкого вбита заклепка. Стреляющие боли, из груди распространяющиеся в спину; хуже при кашле, когда пациент лежит на спине и от глубокого дыхания. Запущенная пневмония.

**Сердце.** Кажется, что сердце слишком большое. Сердцебиение усиливается в положении лежа; ночью; в постели; когда пациент идет в гору, поднимается по лестнице. Пульс более частый утром, чем вечером. Экссудативный перикардит. Резкие боли проходят сквозь грудную клетку в область между плечами.

**Шея и спина.** Мышцы шеи слабые; ребенок не может держать головку. Нарывы (фурункулы) на шее. Скованность в шее. Ощущение, что позвонки соскальзывают друг с друга или хрустят, когда пациент запрокидывает голову назад. Тупая боль, ломота между лопатками.

*Поясничные боли* распространяются в желудок; пациент *ходит согнувшись*; в том числе, из-за боли в спине; может выпрямиться только после движения. Когда сидит, опирается на руки, перенося на них тяжесть тела. Боли в копчике во время стула. Ломота в пояснице усиливается во время мочеиспускания. Искривление позвоночника.

**Конечности.** Тяжесть в плечах. Пот под мышками пахнет чесноком. Онемение левой руки усиливается лежа. Онемение пальцев на руках. Ладони сухие, горят, трескаются, шелушатся; экзема ладоней; бородавки на ладонях.

Напряжение подколенных сухожилий (слева). Судороги в икроножных мышцах (слева). *ПОДОШВЫ ГОРЯТ; ПАЦИЕНТ РАСКРЫВАЕТ ИХ*, в том числе, ночью; стопы холодные в постели; подошвы сухие. Горячие, потливые кисти. Тяжесть в конечностях, как при парезе. Пациент *держит одной конечностью, когда засыпает*.

Напряжение, ощущение сжатия в подколенной ямке при наклоне. Опухание суставов при водянке суставов (при гидроартрозе). Скованность суставов. Ощущение дрожания в кистях при письме. Туберкулез коленного и тазобедренного суставов. Язвы вокруг ногтей. Панариций, сопровождающийся быстрым распуханием пальца, покраснением, скованностью и сильной колюще-жгучей болью. Непроизвольное сокращение мышц кисти, как будто пациент собирается что-нибудь схватить. Неустойчивая походка.

**Кожа.** Возможны почти любые высыпания. Кожа *сухая, шершавая; морщинистая, покрыта чешуйками. ЗУД:* сладострастный; яростный, он усиливается ночью; в постели; от расчесывания и умывания.

Кожа *нездоровая; ПОКРЫВАЕТСЯ СЫПЬЮ; нагнаивается и не заживает.* Ощущение жжения при расчесывании; болезненная чувствительность к воздуху, к ветру, к мытью и т.д. *Высыпания чередуются с другими симптомами* — с приступами астмы и т.д.

Скопления фурункулов. Чесотка. Трещины. Экзема. Язвы. Ползучее (блуждающее) рожистое воспаление. Экскориации — ссадины — в складках кожи. Нагноение с образованием пузырьков воздуха. Варикозное расширение вен: вены изъязвляются, происходит их разрыв, возникает кровотечение.

**Сон.** Тяжелый, неосвежающий сон. Сонливость, дремота; потом мигрень. Сон поверхностный, "кошачий". Пациент сонливый днем, бодрствует ночью. Во сне он разговаривает; возникают резкие мышечные сокращения и подергивание мышц. Просыпается, внезапно вскакивает или вскрикивает. Поет во сне или просыпается с пением. Яркие сновидения, оставляют глубокий след в памяти.

**Лихорадка.** Озноб, распространяющийся вверх по спине. *Приливы жара. Пациенту слишком жарко.* Жар, сопровождающийся пульсацией во всем теле, в том числе, между лопатками. Потоотделение на отдельных участках тела; под мышками; на кистях и стопах. Обильный пот ночью, имеющий запах серы. Потоотделение не приносит облегчения. Послабляющая (ремиттирующая) лихорадка. Септическая, в том числе, послеродовая лихорадка (сепсис).

**Дополнительно.** Acon., Aloe, Ars., Bell., Calc, Merc, Nux-v., Puls., Pyrog., Rhus-t., Sep., Sul-i.

**Диф. диагноз.** Graph., Psor., Sel., Syph.

## SULPHURICUM ACIDUM

**Общее.** Слабость или бессилие, свойственные всем кислотам, проявляются более всего в действии серной кислоты на *ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ:* возникает ощущение сильного расслабления желудка, сопровождающееся потребностью в стимулирующих веществах. Слабость не соответствует тяжести заболевания; она следует из некой глубоко укоренившейся дискразии, особенности.

Ацидум сульфурикум воздействует на *кровь* и кровеносные сосуды, вызывая *кровотечения*. Это сильные кровотечения из всех отверстий тела — кровь жидкая, черная. Вены расширены (на стопах). Геморрагическая пурпура. Это средство позволяет избавиться от длительно существующих черных и синих пятен, которые возникли после травмы и сопровождаются ощущением болезненности и скованности в больной части тела; Ацидум сульфурикум хорошо следует за Арникой (Arn.).

Ощущение *ВНУТРЕННЕГО ДРОЖАНИЯ;* пациент хочет, чтобы его держали. *Болезненность* тела; желудка. Ацидум сульфурикум подходит *пьяницам;* старикам, особенно пожилым женщинам; в том числе, женщинам во время климакса; а также слабым детям, не имеющим никаких других симптомов.

*Обильные едкие или вязкие выделения.* Ощущение скованности и сжатия в частях тела. *Боли усиливаются постепенно и прекращаются внезапно. Ощущение, как будто тупая пробка вставлена в больном месте.* Характерна *сильная болезненность.* Боли ощущаются во сне, исчезают при пробуждении. Грызущие боли. Отравление свинцом. Гангрена после механического повреждения. Жгучие, пронзающие боли. Удары, как будто от боли. Язвы приобретают красную и синюю окраску, становятся болезненными. Писчий спазм.

Хуже. На *открытом воздухе. От холода. От алкоголя. От травмы;* в том числе, после хирургической операции. После сотрясения мозга. *ОТ ЗАПАХА КОФЕ. Во время климакса.* Ближе к вечеру. От сильной жары или холода. От прикосновения. От давления. От растяжения. При поднимании рук. От питья холодной воды.

**Лучше.** От горячего питья. *Когда руки возле головы.* При умеренной температуре воздуха. От тепла.

**Психика.** *Делает все в большой спешке.* Мрачный, нетерпеливый, сердитый, потому что все происходит слишком медленно. Капризный и *раздражительный* — по незначительному поводу; нервное истощение и склонность пугаться. Нерешительный и замкнутый, угрюмый. Неохотно отвечает на вопросы: делает усилие и говорит "да" или "нет". Постоянно громко или потихоньку плачет. Никто не может ему угодить. Серьезность чередуется с шутовским поведением, буффонадой.

**Голова.** Кажется, что мозг болтается; как будто он болтается из стороны в сторону в лобной области; ощущение усиливается при ходьбе на открытом воздухе (на улице); лучше, когда пациент сидит неподвижно в помещении. Сдавливающая боль в затылке; лучше, когда человек держит руку возле головы. Толчки в висках (справа), как будто туда вгоняют пробку. Ощущение как от разрядов электричества: в лобной области, в висках. Волосы выпадают, седеют.

**Глаза.** Внутриглазное кровоизлияние, возникающее после травмы. Трудно разомкнуть веки. Ощущение комка в наружном углу глаза: когда пациент закрывает глаз, этот комок перемещается к внутреннему углу глаза; когда открывает — он возвращается обратно. Во время чтения в глазах появляется жгучая боль, жжение и слезотечение.

**Уши.** Ощущение, как будто листок лежит перед ухом.

**Нос.** Считается темная, жидкая кровь; становится хуже от запаха кофе; в том числе у стариков.



**Лицо.** Смертельно бледное или морщинистое. Ощущение, как будто оно покрыто подсохшим яичным белком.

**Рот.** Афты; появляются при затяжной болезни, особенно у детей при истощении (маразме). Кровоточивость десен. Зловонное дыхание. Пиорея. Разрушение зубов при сахарном диабете. Кровянистая слюна выделяется изо рта. Быстро распространяющиеся язвы.

**Горло.** Ангина. Тягучая лимонно-желтого цвета слизь свисает из задних отделов носа в глотку; в том числе при дифтерии. Горло кажется выбеленным. Регургитация жидкостей при глотании.

**Желудок.** Изжога. Кислые отрыжки; из-за них возникает оскоми́на на зубах. Страстное желание коньяка (бренди) и фруктов. Икота: у пьяниц; в сочетании с *тошнотой*; она сопровождается содроганием тела. Рвота кислыми массами; в том числе у пьяниц; хуже, когда лежит на левом боку. Ощущение слабости, расслабления в желудке; становится хуже после стула. Напитки вызывают ощущение холода в желудке, они извергаются наружу, если не смешать их с алкоголем. Рвота слизью вместо пищи. Пациент кашляет: перед рвотой, во время беременности. Пациент потеет после еды; особенно от теплой пищи. Отвращение к запаху кофе.

**Живот.** Колика сопровождается ощущением, как будто произойдет выпячивание грыжи. Селезенка увеличена, плотная, болезненная; в том числе при кашле. *Понос*: стул крайне зловонный, зеленый, черный или как будто *рубленый*; оранжево-желтый; возникает из-за незрелых фруктов и устриц; а также из-за малейшего несварения желудка. Мокнутие геморроидальных узлов. Ощущение, как будто в прямой кишке находится большой шар; набухшие геморроидальные узлы мешают опорожнить кишечник. Ощущение пустоты в животе после стула, как будто все опустилось, провалилось вниз.

**Мочевыделительная система.** Боль в мочевом пузыре, если позыв на мочеиспускание был подавлен. Гематурия.

**Женские половые органы.** Мучительные кошмарные сновидения перед менструациями или после них. Эрозия шейки матки; в том числе у старых женщин; легко возникает кровотечение. Приливы жара, затем потоотделение и ощущение дрожания во всем теле; во время климакса. Менструации слишком ранние и слишком обильные. Едкие, жгучие бели. Гангрена влагалища после его выпадения. Выпадение влагалища и матки из-за слабости.

**Дыхательные органы.** Сначала возникает кашель, затем — отрыжки или рвота. Кровянистая мокрота; в том числе во время климакса. Когда возникает одышка, гортань усиленно ходит вверх и вниз, отмечаются быстрые движения крыльев носа; лучше опустить ноги с постели, свесить их вниз.

**Спина.** Позвоночник слабый, пациент не может сидеть или стоять. Большой абсцесс на шее справа.

**Конечности.** Пальцы на руках дергаются, когда пациент пишет. Писчий спазм. Колени болезненно слабые. Слабость голеностопных суставов, пациент не может ходить. Пальцы на руках дергаются во время сна. Подергивание сухожилий.

**Кожа.** Рубцы краснеют и синеют, и становятся болезненными. Экхимозы (кровоподтеки). Карбункулы, фурункулы, гангрена. Зуд всего тела. Узловатая (нодулярная) крапивница. Пролежни; абсцессы.

**Лихорадка.** Приливы ЖАРА; после них возникает дрожание или выступает холодный пот; хуже после употребления теплой пищи; ощущение сильнее в верхней части тела; лучше от движения. Проливные поты. Выраженная слабость, не соответствующая состоянию пациента при лихорадке, например, при тифе.

**Дополнительно.** Puls.

**Диф. диагноз.** Ars., Lach., Sep.

## SULPHUR IODATUM

**Общее.** Трудноизлечимые кожные болезни; безболезненное увеличение желез, а также инфильтрация тканей, их утолщение и уплотнение после воспаления — вот характерные черты препарата Сульфур йод. Слабость, как после гриппа. Упадок сил и повышенная чувствительность к любым воздействиям. Обморочная слабость и дурнота. Ощущение саднящего, жгучего жара внутри и холода снаружи тела. Едкие выделения. Отдельные части тела, пальцы на руках и т.д. белеют и становятся нечувствительными. Нагноение. Это средство способствует рассасыванию уплотнений.

Хуже. От напряжения; даже от незначительного. От жара. Лежа на правом боку. Перед бурей. Ночью. При наклоне.

Лучше. От прохладного воздуха. Стоя. От выделения мокроты. Зимой.

**Психика.** Боится сделать усилие. Сомневается. Торопливый, нетерпеливый, печальный.

**Голова.** Головная боль уменьшается на закате. Кажется, что волосы встали дыбом. Головокружение усиливается при наклоне; когда пациентка завязывает волосы; от голода; перед менструацией и во время нее.

**Глаза.** Видит зигзаги перед глазами.

**Лицо.** Гнойные угри. Гипертрофия околоушной железы; после свинки (паротита).

**Рот.** Зубы кажутся мягкими. Язык: как *глазированный*; утолщен после воспаления. Ощущение саднения, сухость во рту; хочется его смочить. Простуда (герпес) на губах.

**Горло.** Саднение, сухость в горле; боли при глотании. Нёбный язычок и миндалины увеличены и красные.

**Желудок.** Отсутствие аппетита (анорексия). Дрожание в эпигастрии при напряжении. Повышенный аппетит у истощенных детей (при дистрофии, маразме).

**Живот.** Патология брыжейки (мезаденит?). Стойкий запор. Ярко-желтый стул. Зловонные выделения из ануса.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная, гнойная; коричневого цвета песок в моче. Моча пахнет малиной. Стриктура уретры после гонореи; болезненное мочеиспускание, струя мочи изогнутая. Жжение на конце полового члена, тупая боль в предстательной железе.

**Мужские половые органы.** Недостаточная эрекция. Трещины на крайней плоти. Яички мягкие. Водянка яичка у маленьких мальчиков.

**Женские половые органы.** Нерегулярные менструации; а также обильные, густые, жгучие бели; хуже перед менструацией и после нее.

**Дыхательные органы.** Дыхание астматическое, нерегулярное (неритмичное), клопочущее, сопровождается удушьем. Кашель сильнее в первой половине суток (до полудня); спастический. Мокрота зеленоватая, гнойная, обильная, вязкая, а также желтая. Ощущение сжатия в груди, выпот в плевральной полости, а также высыпания на груди.

**Конечности.** Болезненность, ломота ниже коленей. Тупая боль в подошвах, жжение и болезненность, возникающие когда пациент стоит.

**Кожа.** Зуд. Язвы. Мокнущая экзема. Нагнаивающиеся угри. Сикоз области бороды и усов.

**Последующие.** Sulph.

## SUMBUL

**Общее.** Название "мускусный корень" предполагает, что это растение имеет запах, очень похожий на запах мускуса, поэтому, подобно Мошусу (*Mosch.*), Сумбул является средством для лечения истерии и *нервных болезней*. Он воздействует *на сердце*, так как вызывает нервное сердцебиение.

Пациент нервный, раздражительный и страдает бессонницей. Склонность падать в обморок из-за незначительных причин. Хорей: у пациента постоянно дергаются голова и конечности и высовывается язык. Ощущение, как будто горячая вода течет через орган или часть тела. Желтые вязкие выделения. Когда пациент замерзает, возникает онемение с левой стороны. Невралгия. Раннее старение, одряхление. Склероз артерий. Приливы во время климакса.

**Хуже.** От движения. Во время климакса. От музыки. От холода. Когда думает о симптомах. Когда делает вдох.

**Лучше.** От спокойного движения. От тепла.

**Психика.** Эмоциональный и суетливый. Плачет и смеется попеременно. Падает в обморок, когда слушает музыку. Боится сойти с ума.

**Нос.** Из носа выделяется вязкая желтая слизь.

**Лицо.** Ощущение, как будто волос или паутина на лице. Невралгия. Глупое ("идиотское") выражение лица.

**Рот.** Язык шершавый, как будто его поскребли.

**Горло.** Ощущение сжатия горла, сопровождающееся удушьем; пациент постоянно делает глотательное движение; при истерии.

**Желудок.** Жгучая кислая отрыжка.

**Живот.** Переполнен, вздутый и болезненный.

**Женские половые органы.** Повышенная сексуальная возбудимость. Невралгия яичника. В молочной железе (справа) возникает ощущение, как будто дергают за веревочку. Климактерические приливы. Стягивающая, сдавливающая боль в области матки (с левой стороны).

**Мочевыделительная система.** Маслянистая пленка на поверхности мочи.

**Дыхательные органы.** Одышка возникает при любом напряжении. Астма: в том числе сердечная; истерического происхождения. Ощущение стеснения, сжатия в левой половине грудной клетки, как будто она закупорена.

**Сердце.** Сердцебиение нервного происхождения; в том числе, у истеричных людей или во время климакса; усиливается от малейшего напряжения и при мысли о нем. Ощущение, как будто сердце бьется в воде. Невралгическая боль в области левой молочной железы, симулирующая стенокардию. Сердечная астма. Высокое кровяное давление вследствие артериосклероза.

**Спина.** Ощущение, как будто тонкая струйка течет вдоль позвоночника.

**Конечности.** Тупая боль, тяжесть, онемение, усталость в левой руке.

**Кожа.** Бледная; холодная. Ощущение зуда внутри.

**Сон.** В сновидениях видит как падает; видит половой акт, после чего внезапно возникает обильная поллюция.

**Дополнительно.** Lact-v.

**Диф. диагноз.** Asaf., Mosch.

## SYMPHORICARPUS RACEMOSA

**Общее.** Это средство в высшей степени полезно при неукротимой рвоте беременных. Отвращение ко всей пище. Тошнота усиливается во время менструации; от любого движения. Лучше, когда женщина лежит на спине. Запах пищи и мысли о ней отвратительны.

## SYMPHYTUM

**Общее.** Окопник, или костоправ, как следует из его названия, применяется *при травмах ХРЯЩЕЙ; НАДКОСТНИЦЫ*, сопровождающихся очень сильной болью.

Болезненные старые повреждения. Осколочные *ПЕРЕЛОМЫ*. Покалывание, колющие боли, сохраняющиеся после заживления раны; усиливающиеся от прикосновения. Невралгия культи после хирургической операции. Несращение переломов. Проникающие раны промежности. *Неполноценная костная мозоль*. Болезни суставов. Артралгия; в том числе, коленного сустава. Наружное применение уменьшает отек после травмы или способствует рассасыванию прочих наростов. Псоас-абсцесс. Саркомы.

**Хуже.** *ОТ ТРАВМЫ*. От удара тупым предметом. От прикосновения. После сексуальных излишеств.

**Голова.** Боль, меняющая локализацию.

**Глаза.** *Травмы глаз* тупым предметом; удары, ушибы и т.д.; веки спастически сжаты.

**Лицо.** *Повреждения лица*. Злокачественная опухоль гайморовой пазухи справа.

**Желудок.** Язвы желудка. Боль в области пупка; усиливается, когда пациент сидит.

**Спина.** Боли в спине после сексуальных эксцессов или после занятий борьбой (рестлингом); из-за интенсивных движений. Кариез, остеомиелит позвонков.

**Кожа.** Холодная.

**Диф. диагноз.** Arn., Calc-p.

## SYPHILINUM

**Общее.** Этот нозод готовится из секрета сифилитического шанкра.

Сифилинум воздействует на *слизистые оболочки, нервы и кости*. В хронических случаях, когда реакция организма недостаточная и подобранное гомеопатическое средство приносит частичное облегчение и, особенно, если имеется наследственная склонность к алкоголизму или *ОТЯГОЩЕННОСТЬ СИФИЛИСОМ* (упоминание в анамнезе пациента, в семейном анамнезе или латентный сифилис), бывает показан Сифилинум.

Выраженная слабость, сопровождающаяся очень немногочисленными симптомами; либо полное изнеможение и бессилие, в том числе, утром; когда пациент просыпается. *Многофазные симптомы. Изъязвления*, упорные, не поддающиеся лечению.

Низкорослые, сморщенные, похожие на стариков младенцы и дети постарше; с лысой головой, недовольно выпяченными губами и большим животом. Отвратительный запах от тела. Жестокие, или линейные (в виде полосы) боли. *Последовательно, друг за другом возникающие абсцессы. Зловонный или зеленого цвета гной*. Образование узлов, утолщений в мышцах. Боли или другие симптомы усиливаются и проходят постепенно. Эпилепсия с ухудшением после менструации. Вонючие выделения. Постоянные боли в любой части тела. Боли с ощущением холода (?или боли при простуде — cold rains) Плачущие дети: они начинают плакать сразу после рождения. Медленно прогрессирующая гемиплегия. Ощущение, как будто в кровеносных сосудах горячая вода. Кости болезненные, разрушаются (возникает кариез), происходит их искривление. Экзостозы. Увеличение желез. Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз). *Пилящие боли в костях*.

**Хуже.** *НОЧЬЮ. От захода солнца до восхода*. От сырости. В сильную жару или в сильный холод. Каждое второе полнолуние. Во время грозы. В любом положении. От движения. При поднимании рук в стороны. Когда сидит на корточках. Зимой. Летом. На берегу моря. Когда высовывает язык.

**Лучше.** От непрерывного или медленного движения. Когда меняет положение тела. Высоко над уровнем моря, в горах. Приложить горячее. В дневное время.

**Психика.** *Безнадежность, пациент не верит в выздоровление. Необщительный, недружелюбный. Ужасная депрессия*. Несговорчивый, своенравный, раздражительный, капризный. У пациента возникает ощущение, как будто он сходит с ума или у него начинается паралич. Ощущение, как будто он отдалился и "находится где-то далеко": говорит, что он — это не он, не чувствует себя самим собой, находится в состоянии апатии и безразличен к будущему. *Импульс вымыть руки*. Ужасно боится наступления ночи. Потеря памяти: не помнит лица, имена, события, место и т.д., но помнит все, что предшествовало его болезни. Очень нервный, смеется или плачет без причины. Не хочет, чтобы его утешали. Бред возникает каждую ночь. Безумие при сифилисе. *Отвращение к обществу*. Печальный, горько жалуется, сетует.

**Голова.** *Глубокие раздавливающие головные боли* поперек основания черепа или в висках. Линейные головные боли. Пациент бьется головой о стену. Кажется, что голову дергает назад. Размягчение мозга. Обильное выпадение волос. Ощущение, что темя распирает, как будто оно лопнет. Бугорки повсюду на коже головы.

**Глаза.** Хронический рецидивирующий фликтенулезный кератит; лучше от умывания прохладной водой; он сопровождается сильной светобоязнью и слезотечением. Офтальмия (воспаление глаз); в том числе, у новорожденных. Мерцание перед глазами, слабое зрение. Вертикальная *диплопия*. *Птоз*. Ощущение, что холодный воздух дует в глаз. Косоглазие. Амавроз (слепота); атрофия зрительного нерва. Пятна на роговице.

**Уши.** Глухота, возникающая без всякой видимой причины; нервного происхождения глухота при кахексии. Отложение извести на барабанной перепонке. Абсцесс среднего уха.

**Нос.** Озена; отвратительные, густые, желто-зеленые выделения. При вдыхании воздуха возникает боль в носу. Боли в области придаточных пазух. Из задних отделов носа выделяются зеленого цвета комочки. *Гнусавость, насморк*. Кариес костей. Пробождение носовой перегородки. Седловидный нос; если у пациента типа Сифилинум изменена форма спинки носа, то у *Ser.* в этом месте изменен лишь цвет кожи: имеется пятно в форме седла. Приступы насморка с жидкими выделениями. Зуд ноздрей.

**Лицо.** Бледное, морщинистое; выглядит старым. Подергивание мышц. Боль над глазами (справа); хуже, когда высовывает язык. Односторонний паралич (гемиплегия), сопровождающийся затруднением речи, жевания и подергиванием глазных яблок и век.

**Рот.** *Ощущение, как будто зубы липкие, вязнут*; как будто в них — червяк. Зубы у детей имеют углубления. Ощущение, что все зубы выпали, не на своем месте. Зубы разрушаются у края десен. Язык: покрыт налетом, с отпечатками зубов по краям, с глубокими продольными трещинами посередине, с язвами; в нем ощущается жгучая боль и жжение в языке.

Гнилостный привкус во рту, в том числе, перед приступом эпилепсии. *Сильное слюнотечение: слюна вытекает изо рта во время сна*. Афазия. Паралич языка. Зубная боль уменьшается, когда пациент стискивает зубы, усиливается от горячего или от холодного.

**Горло.** Ангина; воспаление начинается справа, перемещается налево; хуже от холодного питья. Хроническая гипертрофия миндалин при наличии сифилитической отягощенности.

**Желудок.** Изменчивый аппетит. *Страстное желание алкогольных напитков*. Отвращение к мясу. На протяжении нескольких месяцев совершенно отсутствует аппетит. Никакая пища не усваивается и не утоляет голод. Рвота в течение нескольких недель и месяцев.

**Живот.** Хронический, тяжелый, запор. Кажется, что прямая кишка имеет перетяжки, стриктуры. Трещины заднего прохода и прямой кишки. Когда пациент делает клизму, при вытекании воды возникает боль. Понос: стул желчный; безболезненный; ухудшение возникает на берегу моря; заставляет пациентку встать с постели около 5 ч утра.

**Мочевыделительная система.** Моча пенистая; скудная, желтого цвета. Ночное недержание мочи (энурез). Мочиться лучше стоя. Мочеиспускание только один раз в сутки, но обильное.

**Мужские половые органы.** Узловатые образования на яичках, семенных канатиках и на мошонке. Шанкры. Тупые боли в половых органах, пациент не может сидеть неподвижно.

**Женские половые органы.** Менструальная кровь имеет запах тухлого мяса. Желтые, отвратительные, *едкие бели, настолько обильные*, что просачиваются через прокладки и стекают по ногам до земли; сопровождаются болью в яичниках; возникают у болезненных нервных женщин; сопровождаются зудом половых органов.

Привычный выкидыш. Молочные железы: чувствительны к прикосновению; болезненные во время менструации и в другое время. Язвы в области наружных половых органов сопровождаются болью в яичниках; язвы чувствительны к прикосновению. Режущая боль в яичнике во время коитуса в момент наступления оргазма.

**Дыхательные органы.** Сухой кашель усиливается, когда пациент лежит на правом боку; ночью. Афония перед менструацией. Хроническая астма; хуже летом, во время грозы, ночью, при влажной погоде. Постоянная боль в гортани усиливается от прикосновения.

**Сердце.** Боль распространяется от основания сердца к его верхушке. Большой мягкий пульс. Ощущение, как будто горячая вода течет по венам.

**Шея и спина.** Кажется, что шея короткая. Боль в спине в области почки усиливается после мочеиспускания. Боль в копчике, сопровождающаяся ощущением, что он распух; хуже, когда пациент сидит.

**Конечности.** Боль в месте прикрепления дельтовидной мышцы; становится хуже, когда пациент поднимает руки в стороны или вперед. Поражение *средних пальцев на руках*. Остеосаркома; в средней части большеберцовой кости. Зудящие высыпания на локтях. Боль с *ощущением холода* в голених (или *боль в голених при простуде?*).

Семяющая походка. *Боли в костях с ощущением, как будто их распиливают*. Экзостозы с двух сторон — болезненные, чувствительные к прикосновению. Боли в большеберцовых костях; лучше, когда на них льют холодную воду. Ишиас обостряется ночью. Узлы, вздутия в мышцах; в том числе при ревматизме. Боли в подошвах сопровождаются ощущением сокращения мышц, стягивания; хуже, когда стоит на ногах. Пациент не может сидеть на низком стуле или на корточках.

**Кожа.** Кожа опухшая и покрыта пятнами. Щиплет, покусывает, как будто кусают насекомые. Блуждающее (ползучее) рожистое воспаление. Конусообразные корки. Большие волдыри (буллы). Рубцы белого цвета или в виде оспин. Искривленные ногти. Пятна медного цвета на коже.

**Сон.** Бессонница.

**Лихорадка.** Зябкий пациент. Ночные поты, доводящие до изнеможения.

**Диф. диагноз.** Aur., Kali-i., Merc, Nit-ac.

## ТАВАСУМ

**Общее.** Повсеместно принято табак нюхать, курить и жевать, но только в гомеопатии он используется как лекарство.

Заметнее всего влияние табака сказывается на блуждающем, на симпатическом, на спинномозговых нервах и на **СЕРДЦЕ**. Табак вызывает полный *упадок сил, протрацию и расслабление* всех мышц; при этом наблюдается *обильная секреция*; рвота; обильное потоотделение; слезотечение, слюнотечение и т.д. Возникает *сокращение мышц полых органов*, горла, мочевого пузыря, прямой кишки, органов грудной клетки и т. д.

Сначала спазмы, затем паралич: кишечника, сердца и т.д. Конвульсии: голова с силой, резко запрокинута назад. Спастические мышечные сокращения, подергивание мышц во всем теле. Дрожание. Обморочная слабость. Опасные для жизни состояния, протекающие бурно, стремительно, сопровождающиеся быстрой сменой симптомов.

Боли усиливаются от жары (от горячего). Чрезвычайное исхудание, особенно в области спины и щек (атрофия мышц). Походка медленная и шаркающая, неустойчивая, пациенту трудно подняться по лестнице.

Стенокардия в сочетании со склерозом коронарных артерий сердца и высоким артериальным давлением. Ощущения, как при морской болезни. Столбняк. Паралич сфинктеров. Пациент сползает, соскальзывает в постели вниз. Последствия солнечного удара. Табакум — это паллиативное средство при укусах пчел и комаров.

**Хуже.** *ОТ ДВИЖЕНИЯ; в лодке, в автомобиле.* Лежа; в том числе, на левом боку. Когда открывает глаза. Вечером. От крайних температур — от жара и от сильного холода.

**Лучше.** *От холода;* от холодных аппликаций. От свежего воздуха. В сумерки. Когда обнажает живот. От слез, плача. От рвоты.

**Психика.** Крайнее уныние. *Безразличие.* Мрачный, угрюмый; чувствует себя ужасно несчастным, недоволен своим существованием. Забывчивый; медленно соображает. Спутанность сознания. Нервное истощение. Идиотия; эпилептическое слабоумие. Говорит глупости. Пациенту кажется, что кто-то придет, чтобы арестовать или убить его.

**Голова.** *Очень сильное головокружение;* оно сопровождается обильным выделением пота (холодного); хуже, когда открывает глаза. Внезапная боль, как будто ударили по голове молотком; хуже во время мочеиспускания. Ощущение сжатия, как от повязки на голове. Периодические мигрени.

**Глаза.** Слепнет, когда пристально смотрит на любой белый предмет. Внезапная потеря зрения без повреждения глаз, после чего возникает атрофия зрительного нерва. Центральная цветовая скотома. Неясное зрение: видит как будто сквозь завесу, вуаль, пелену. Изображение слишком долго сохраняется на сетчатке (послеобразы).

**Уши.** Музыка вызывает боль в ушах. При болезни Меньера возникают ощущения, как при морской болезни.

**Нос.** Повышенная секреция.

**Лицо.** Лицо *смертельно бледное;* синее; *заострившиеся черты;* осунувшееся лицо. Покрыто холодным потом. Одна щека горячая, пылает, а другая бледная. Спазмы в области нижней челюсти. Боль в верхнечелюстном суставе усиливается при смехе. Губы поджаты. Исхудание лица.

**Рот.** Слюнотечение. *Часто и много сплевывает;* при разных заболеваниях. Речь затруднена.

**Горло.** Сильное ощущение сжатия в горле; в том числе при стенокардии.

**Желудок.** *Смертельная тошнота и жестокая рвота; хуже от малейшего движения;* лучше — обнажить живот; пациент часто сплевывает; наблюдается, в том числе, при беременности. Морская болезнь. *Ощущение ужасной слабости и пустоты под ложечкой, как будто все провалилось вниз.* Каловая рвота. Позывы на рвоту. Повышенная кислотность.

**Живот.** Давление в области печени, как от тяжелого предмета. *Желание обнажить, раскрыть живот:* это уменьшает тошноту, рвоту и другие недомогания. Ужасная колика: пациент вскрикивает от боли и ощущает слабость. Стул непроизвольный, водянистый или густой, свернувшийся; как простокваша. Детская холера. Кишечная непроходимость. Ущемленная грыжа. *Ощущение пустоты в эпигастрии, как будто все опустилось, провалилось вниз,* сопровождающееся ужасной дурнотой, обморочной слабостью. Пупок втянут; мышцы живота сокращены. Привычный запор.

**Мочевыделительная система.** Почечная колика сопровождается холодным потом, смертельной тошнотой. Паралич сфинктеров; моча подтекает, сочится. Недержание мочи (энурез).

**Мужские половые органы.** Ночные поллюции. Импотенция. Гиперестезия и невралгия полового члена.

**Женские половые органы.** Утренняя дурнота, Во время климакса и во время менструаций возникает крайне мучительное чувство недовольства своей жизнью. Бели в виде серозной жидкости, сильнее после менструации. Сильный зуд всего тела во время беременности.

**Дыхательные органы.** Ощущение сильного сжатия грудной клетки. Кашель сухой, надоедливый, пациент вынужден сделать глоток холодной воды; после чего возникает икота или она сопровождает кашель.

**Сердце.** Бешеное сердцебиение; сильнее, когда пациент лежит на левом боку. Ощущение скручивания в области сердца. Стенокардия сопровождается тошнотой, холодным потом и падением кровяного давления (коллапсом). Лабильный пульс. Острая аневризма сердца вследствие шока или физического напряжения. Пульс нитевидный, перемежающийся; твердый (напряженный), как веревка; не определяется.

**Шея и спина.** Во время конвульсий голова запрокинута назад. Скованность в шее. Исхудание (атрофия) мышц спины. Боль в пояснице: усиливается лежа; уменьшается при ходьбе. Жар, распространяющийся вниз по позвоночнику.

**Конечности.** Кончики пальцев на руках как будто покрыты пушком. Судороги в отдельных пальцах на руках; хуже от мытья рук. Голени и кисти холодные, как лед. Ощущение ползания мурашек.

**Кожа.** Зуд, как от блошиных укусов.

**Сон.** Бессонница при аневризме сердца. Кошмарные сновидения. Отупляющий сон ночью.

**Кожа.** Кожа холодная, как лед. Жар, распространяющийся вниз вдоль позвоночника; жар в одной щеке; ощущение внутреннего жара. Внезапный *холодный пот*; сопровождающийся ознобом; при стенокардии; при почечной колике и т.д.

**Дополнительно.** Оп.

**Диф. диагноз.** Ars., Gels., Verat.

## TARAXACUM

**Общее.** Тараксакум воздействует *на печень*, это средство для лечения желчевыводящих путей. Чувство *дурноты* и истощение; пациент предпочитает сидеть или лежать. Колющие боли. Желтуха, камни желчного пузыря, увеличенная и уплотненная печень.

Хуже. *В покое.* Сидя. Стоя. Когда ложится.

**Лучше.** При ходьбе. От прикосновения.

**Психика.** Депрессия. Постоянно бормочет что-то себе под нос. Избегает работы, но взявшись за дело, работает хорошо. Любит поговорить, посмеяться и повеселиться.

**Голова.** Головная боль из-за нарушения работы желудка. Ощущение сильного жара в темени.

**Рот.** Язык: обложен, *на нем имеются оголенные участки; географический.* Привкус во рту горький; кислый. Слюнотечение с ощущением, как будто гортань сдавлена, ее просвет перекрыт.

**Горло.** Откашливает из горла кислую слизь.

**Желудок.** Желудочные приступы, связанные с поражением желчевыводящих путей. Отсутствие аппетита. Горькие отрыжки.

**Живот.** Ощущение, как будто в кишечнике лопаются пузыри. Тимпанит, в том числе, при истерии. Печень увеличенная и плотная. Желчный понос. Стул белого цвета. Желтуха. Боль в области печени и селезенки.

**Мочевыделительная система.** Мочеиспускание характеризуется безболезненными позывами; частым выделением большого количества мочи.

**Женские половые органы.** Подавление менструаций.

**Шея и спина.** Рвущие боли из уха распространяются вниз, в шею. Грудино-ключично-сосцевидная мышца очень болезненная при прикосновении.

**Конечности.** Беспокойные конечности. Кончики пальцев на руках холодные (это ключевой симптом). Дергающая боль в икроножной мышце (справа) уменьшается от прикосновения. Рвущие боли в конечностях. Невралгия колена: лучше от давления. Жжение в пальцах ног.

**Лихорадка.** Зябкость после еды; особенно после питья. Обильный ночной пот.

**Диф. диагноз.** Nux-v.

## TARENTULA CUBENSIS

**Общее.** Яд этого паука поражает клетчатку.

Тарентула кубензис — это средство для лечения токсемии, септических состояний, в случаях, когда инкубационный период длинный, но дальнейшее развитие болезни происходит *быстро, сопровождается вызывающим тревогу общим упадком сил, ужасным жжением или резкими жалящими болями*; ощущением, что **БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА СТАЛА ТВЕРДОЙ, как доска**, а также обильным потоотделением. Дифтерия, сопровождающаяся сильной лихорадкой, тупыми болями с онемением. Злокачественные опухоли. Карбункулы. Синеватые абсцессы; болезненные абсцессы. Панариций. Это средство показано при агонии, смертных муках;

Тарентула кубензис *облегчает последние страдания, агонию*. Сначала возникает паралич, затем — конвульсии. Бубонная чума. Гангрена.

**Хуже.** От холодного питья. От напряжения. Ночью.

**Лучше.** От курения табака.

**Психика.** Нервное беспокойство.

**Голова.** Ощущение переполнения головы. Менингит.

**Желудок.** Склонность к рвоте.

**Мочевыделительная система.** Не может удерживать мочу при кашле. Задержка мочи. Моча горячая, густая.

**Женские половые органы.** Зуд наружных половых органов (вульвы).

**Дыхательные органы.** Спастические запруднение дыхания. Кашель, раздирающий грудь в клочья: коклюш.

**Конечности.** Дрожание кистей. *Суетливые, беспокойные стопы*. Неустойчивая походка.

**Кожа.** Кажется, что вся кожа распухла. *Кожа багрового цвета*. Едкое жжение. Старческие язвы

**Сон.** Дремота, сонливость. Спать мешает жесткий кашель.

**Лихорадка.** *Пациент ощущает едкий жар на поверхности тела*.

**Диф. диагноз.** Anthr., Lat-m.

## TARENTULA HISPANICA

Общее. "Тарантизм" — это термин, обозначающий маниакальное состояние, которое характеризуется неконтролируемым стремлением танцевать. Популярное объяснение этого — укусы человека тарантулом, а лекарством в этом случае считаются музыка и танцы. Описанные симптомы являются ключевыми для назначения Тарентулы.

Тарентула воздействует *НА НЕРВЫ*: они словно натянуты; возникают примечательные симптомы — истерия, хорея, которые во многих случаях рефлекторно связанные с половыми органами.

Выраженное влияние Тарентулы оказывает также на *СЕРДЦЕ, позвоночник, ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ* и правую сторону тела. Симптомы появляются внезапно, они проявляются *БУРНО*.

У пациента наблюдается *двигательное беспокойство, суетливость, торопливость*; он находится в постоянном движении, хотя от ходьбы возникает ухудшение самочувствия. *Катается по земле из стороны в сторону* или яростно бьет ногами; или мотает головой из стороны в сторону и трет ее — все для того, чтобы облегчить свои страдания. Мелкая дрожь; *спастические сокращения мышц; дрожание; мышечные подергивания. Синалгии*, или ассоциированные, сочетанные боли: головная боль и боль в матке; боли в горле и в глазу; лицевая боль и боль в желудке; боль в ухе и икота и т.д.; или боли, возникающие из-за сексуального возбуждения. Жестокие боли, невралгии, как от тысячи иголок. Тяжелые септические состояния; абсцессы — Тарентула способствует быстрой эвакуации гноя. Нома. Исхудание, особенно лица.

Болезненные последствия безответной любви; плохих новостей; нагоня, выговора; наказания; падения; сепсиса. Человек бежит лучше, чем ходит. Неправильные движения. Онемение, сопровождающееся покалыванием. Исхудание, ощущение, что мягкие ткани отстают от костей. Рак; фиброзные опухоли.

Тарентула во многом напоминает *Ars*. Поэтому, когда кажется, что показан *Ars*., но он не дает эффекта, лучше назначить Тарентулу.

Хуже. Периодически; ежегодно; в один и тот же час. *ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ. От холода. От шума. От сырости*. Вечером. После менструаций. От коитуса. От мытья головы. Когда видит кого-либо в беде. Если опустить руки в холодную воду. От музыки.

**Лучше.** От расслабления. *От растирания. От потопотделения*. От курения. От музыки. *На открытом воздухе*. От езды в экипаже. На солнце. От ярких красок, от яркого цвета.

**Психика.** Отвращение к черному, красному, желтому, *зеленому* цветам. Танцует без конца — вперед и назад. Приступы нервного смеха, после которого возникает крик. *Внезапно* меняется настроение, возникают фантазии, капризы или прилив сил. *Не хватает самообладания. Сумасбродное* поведение. Импульсивность.

Безнравственный. *Ловкий, хитрый*, коварный человек. Эгоистичный. Деструктивный, разрушает все, что попадает под руку, разрывает свои вещи и т.д. Полон ненависти, злобный. Проворный, ловкий. Швыряет вещи.

Притворяется, симулирует болезнь; когда нет зрителей — нет истерии; когда внимание обращено на пациентку, она начинает подергиваться, изображает обморок, отсутствие чувствительности, но при этом смотрит по сторонам, наблюдая, какое впечатление производит на окружающих. У женщины возникает желание ударить себя или другого человека. Смеется, передразнивает, бежит, танцует, жестикулирует, шутит, плачет, поет до хрипоты или до изнеможения. Клептомания. Гневается в отчаянии. Неблагодарный человек. Меланхолия. Недовольство. Предсмертные муки, агония. Психические симптомы уменьшаются во второй половине дня (после полудня), после еды.

**Голова.** Головокружение: усиливается, когда пациент несет что-нибудь на голове; после него возникают спазмы. Ощущение, как будто иголки вонзаются в мозг. Сильная боль в висках, распространяющаяся в лицо и шею; при этом пациента тошнит, он становится нетерпеливым. В качестве сопутствующего симптома возникает

**сильная головная боль:** голова как будто раздавлена. Хочется причесать волосы, подергать за них или потереть голову. Менингит. Ощущение, как будто на голову и на все тело вылили холодную воду. Головокружение: возникает ночью; когда пациент спускается по лестнице.

**Глаза.** Глаза чешутся, слезы густые. Колющая боль в глазах, как будто в них попал песок или колючка. Светобоязнь. Один зрачок расширен, другой — сужен. Глаза спастически широко раскрыты; взгляд неподвижный. Видит призраки, лица, вспышки.

**Уши.** Щелчки, хлопки, треск в ушах (справа) сопровождаются болью и икотой. Шум в ушах: как колокольный звон; он усиливается при пробуждении, утром.

**Нос.** Носовое кровотечение уменьшает пульсацию в сонных артериях и ощущение полноты в голове.

**Лицо.** Пылает, красное, одутловатое. Выражение ужаса на лице. Лицо морщинистое.

**Рот.** Сухость во рту и на зубах. Язык втянут назад, это мешает говорить.

**Желудок.** Страстное желание песка и сырой, необработанной пищи. Отвращение к мясу, хлебу. Нарушение работы желудка сопровождается симпатическими болями в голове, лице, зубах и т.д. Жажда холодной воды. Горькие отрыжки; в том числе при истерии. Рвота всей съеденной пищей.

**Живот.** Жжение внизу живота, сопровождающееся ощущением сильной тяжести, мешает ходить. Стул: маслянистый, черный, зловонный, его может спровоцировать мытье головы. Тяжелый запор, когда не помогают ни слабительные, ни клизмы. Запор сопровождается непроизвольным выделением мочи при кашле или т.п. усилии.

**Мочевыделительная система.** Моча зловонная, в осадке песок. Недержание мочи при смехе, кашле и т.д. Сахарный диабет. Полиурия.

**Мужские половые органы.** Чрезвычайно сильное сексуальное возбуждение. Похотлив почти до безумия; сильнее после коитуса. Болезни предстательной железы после мастурбации. При поллюции выделяется горячая, кровянистая сперма. *Чувствительность половых органов.* Вялотекущие опухоли яичек.

**Женские половые органы.** Неистовое желание — нимфомания; усиливается от коитуса. Сухость, жар, *САДНЕНИЕ* и зуд в области вульвы и влагалища, хуже от расчесывания. Зуд вульвы после менструаций. Обильные менструации, сопровождающиеся эротическими спазмами. Менструации ранние. Ощущение движения в матке, напоминающее шевеление плода, или жжение в ней. Мучительные ощущения, дискомфорт в области половых органов. Выделение газов из матки. Рак шейки матки. Бели в виде прозрачных, едких, клейких комочков. Яичники чувствительны к давлению.

**Дыхательные органы.** Приступы *УДУШЬЯ*, сопровождающиеся плачем, криками и двигательным беспокойством; потребность в свежем воздухе; хуже от кашля. Кашель: пациент давится, когда отхаркивает мокроту; изнуряющий кашель; хуже после коитуса, от шума; лучше от курения.

**Сердце.** Ощущение, что оно поворачивается кругом, скручивается; внезапно подпрыгивает. Сердце дрожит и глухо бьется, как будто от неприятных известий или испуга. При болезни сердца наступит ухудшение, если пациент намочит руки в холодной воде. Дрожание сердца, сопровождающееся симптомами со стороны рук. Пульс напряженный (твердый), удары нечастые, аритмичные.

**Шея и спина.** *Болезненная чувствительность позвоночника:* прикосновение вызывает боли в грудной клетке, в сердце и т.д. Кокцигодия уменьшается, когда пациент стоит, усиливается от малейшего движения, от прикосновения. Опухоли в области позвоночного столба.

**Конечности.** Двигательное беспокойство в руках; *руки должны быть все время заняты;* пациент ковыряет пальцы на руках. Беспокойные ноги; импульс прохаживаться, ходить. Семенящая походка. Бегаёт лучше, чем ходит. Холодные влажные стопы и кисти. Зуд подошв. Пилящие боли в костях. Необычные, странные или беспорядочные мышечные сокращения и движения. Слабые голени: пациент не может прочно поставить ноги; они не повинуются воле пациента. Трудно встать на колени.

**Кожа.** *Багрового оттенка.* Кровоподтеки (экхимозы). Холодные участки на коже или ощущение, как будто холодная жидкость течет или капает на часть тела. Карбункул. Глубокие абсцессы. Тарентула способствует эвакуации гноя. Сухая экзема: после безуспешного применения *Ars.* и *Sulph.*; характерен зуд; как будто насекомое ползает или бежит.

**Сон.** *Бессонница* перед полночью из-за возбуждения. Грустные сновидения; пациент плачет.

**Лихорадка.** *Чередование озноба и жара.* Все тело горячее, а стопы холодные. Септическая лихорадка. Проливной пот; он вызывает раздражение, образование ссадин на коже.

**Дополнительно.** *Ars.*

**Диф. диагноз.** *Agar., Mygal.*

## TELLURIUM

**Общее.** Этот металл раздражает кожу, действует на *позвоночник*, уши и глаза; вызывает невралгические боли, особенно ишиас.



*Выделения едкие*, вызывают зуд, приводят к образованию пузырей в местах соприкосновения с кожей — где удобно. Запах тела и пота отвратительный, похож на запах чеснока; выделения из уха напоминают рыбный рассол.

*Соленый* — привкус во рту; соленая слизь отхаркивается из горла; соленый вкус у гноя и т.д. Резкие, возникающие с короткими промежутками боли, затем — болезненность. *Онемение*. Ощущение задержки. Периостит. Линейные боли.

Последствия травмы, в том числе позвоночника. Падения в анамнезе.

*Хуже. От прикосновения. Когда лежит на больной части тела. От холода.* Когда делает "пустое" глотательное движение. После травмы позвоночника. Каждую неделю. В холодную погоду. От трения. При наклоне. От смеха. От кашля. Когда тужится во время стула.

**Психика.** Страх, что прикоснутся к чувствительному месту. Небрежный и забывчивый.

**Голова.** Головокружение; усиливается, когда пациент засыпает; лучше, когда лежит совершенно спокойно. Линейные головные боли.

**Глаза.** Веки утолщены, воспалены, чешутся. Птеригий. Глаза слезятся. Катаракта после повреждения глаза. Ощущение, как будто ресницы на нижних веках загнуты внутрь.

**Уши.** *Воспалены; синеватые, опухшие.* Слух нарушен из-за травмы барабанной перепонки. Выделения из уха, в том числе с запахом рыбного рассола. Экзема за ушами, сопровождающаяся образованием толстых корок. Зуд, опухание, пульсация в слуховом проходе. Постоянная боль глубоко в ухе.

**Нос.** Жидкие выделения из носа, сопровождающиеся слезотечением и охриплостью; усиливаются при ходьбе на открытом воздухе (на прогулке); однако, после пребывания на улице в течение некоторого времени становится лучше. Пациент отхаркивает соленую слизь из задних отделов носа.

**Лицо.** Подергивание мышц лица и искажение его черт; хуже, когда пациент говорит. При болях угол рта дергается кверху. Внезапно на лице появляется румянец. Сикоз (лишай) области бороды и усов.

**Рот.** Дыхание с запахом чеснока.

**Горло.** Боли в горле, когда пациент делает "пустое" глотательное движение; лучше после еды или питья.

**Желудок.** Страстное желание яблок. Прогорклые отрыжки. Позывы на рвоту заканчиваются зевотой. Рвота после употребления в пищу риса. Ощущение слабости или пустоты в желудке.

**Живот.** Щемящая боль в животе. Кишечные газы ужасно вонючие. Каждый раз после стула возникает зуд ануса и промежности.

**Дыхательные органы.** Боль в мышцах грудной клетки, как при растяжении; хуже, когда пациент поднимает руки. Кашель вызывает боль в пояснице. Боль в области ключицы. Ощущение бульканья в легких (в правом).

**Сердце.** Тупая боль в области сердца; уменьшается, когда человек лежит на спине.

**Шея и спина.** Онемение задней части шеи и затылка. *Болезненная чувствительность позвоночника* (начиная с последнего шейного позвонка и заканчивая пятым грудным). Боль в крестце, перемещающаяся в правое бедро; хуже от кашля, смеха, когда тужится во время стула.

**Конечности.** При ишиасе боль ощущается глубоко; усиливается при кашле, чихании; когда пациент тужится во время стула; когда лежит; боль сочетается с чувствительностью позвоночника. Контрактура, сокращение сухожилий в сгибе коленного сустава. Зловонный пот на стопах. Пот в подмышечной впадине имеет запах чеснока.

**Кожа.** Круглые высыпания; а также ранки на коже. Стригущий лишай: покрывает все тело; возникает только на нижних конечностях; на отдельных частях тела, в области мошонки, промежности и т.д. Зуд, покалывание, как будто из-за насекомых. Жжение в области старых рубцов. Сикоз области бороды и усов. Зуд усиливается на прохладном воздухе.

**Сон.** Зевота после позывов на рвоту или в сочетании с отрыжкой. Сонливость, дремота после еды.

**Лихорадка.** Зябкость при боли. Озноб, холод пробегает вдоль позвоночника вниз, когда пациент лежит на спине. Потоотделение на отдельных участках, в том числе с зудом.

**Диф. диагноз.** АН-с, Sel.

## TEREBINTHINA

**Общее.** Очищенный скипидар оказывает избирательное действие на *слизистые оболочки ПОЧЕК*, мочевого пузыря; *дыхательных путей*; а также на бронхи; сердце и кровь.

**КРОВОТЕЧЕНИЯ:** пассивные; кровь черная, зловонная, сочится со слизистых оболочек. Поражение почек при ревматизме. *Тупые боли (ломота), болезненность и скованность* в мышцах. *Геморрагическая пурпура*.

Боль *провоцирует мочеиспускание*; она распространяется по ходу крупных нервов, сопровождается ощущением холода в них; или иногда возникает ощущение, как будто горячая вода течет по трубе.

*Жжение* в разных местах: в кончике языка; в эпигастрии; пояснице; почках; *матке* и т.д. Истощенный; *чувствительный* и усталый пациент. Нарушено чувство равновесия.

Болезненные последствия употребления алкоголя, падения, напряжения, удаления зуба. Синяки возникают из-за незначительных причин.

**Хуже.** От сырости. От холода. Ночью. Лежа. От давления.

**Лучше.** От движения. При наклоне.

**Психика.** Трудно сосредоточиться. Сильная раздражительность; дети сердятся, в том числе, при прорезывании зубов. Кома.

**Голова.** Ощущение повязки вокруг головы. Тупая головная боль при колике.

**Глаза.** Слепота из-за употребления алкоголя. Пациент открывает глаза, когда глотает — в коматозном состоянии. Глаза темно-красные; лицо красное с больной стороны.

**Уши.** Кажется, что собственный голос звучит неестественно. Ощущение в ушах, как будто бьют часы. Говорить громко очень больно.

**Нос.** Пассивное кровотечение из носа у детей. Выделение сыворотки из носа, когда нет насморка.

**Лицо.** Бледное; землистое; осунувшееся. После приливов жара возникает потоотделение.

**Рот.** Язык красный, гладкий; глянцевый; болезненный; ощущается жжение в кончике языка. Афты на слизистой оболочке, начиная с полости рта и заканчивая задним проходом. Дыхание холодное, зловонное.

**Желудок.** Тошнота и рвота; сопровождаются сильным жжением. Жжение в области эпигастрия. Тошнота уменьшается от жидкого стула. Отвращение к мясу.

**Живот.** Болезненность, как от ушиба. Метеоризм. Тимпанит. Асцит. Обильный слизистый стул; водянистый, зеленый, вонючий. Кровянистый стул. Глисты. Кровотечение из кишечных язв. Ощущение, что кишечник подтянут к позвоночнику. Понос сопровождается тоническими судорогами.

**Мочевыделительная система.** Жгучая, тянущая боль в области почек. Жжение или боль вдоль мочеточников. Странгурия сопровождается выделением *кровянистой* мочи. Моча *мутная*, с осадком в виде кофейной гущи; или с густым, желтым, слизистым, похожим на грязь осадком; моча с запахом фиалок. Нефрит: возникает после сыпи (экзантемы); сочетается с тяжелым *бронхитом*. Цистит. Кровотечение из мочевого пузыря. Боли поочередно возникают в области пупка и в мочевом пузыре; уменьшаются от ходьбы. Моча скудная; подавление мочеиспускания; в том числе при прорезывании зубов.

**Женские половые органы.** Сильное жжение в области матки; в том числе, при метроррагии. Метрит. Болезни матки после ношения маточного кольца (пессария).

**Дыхательные органы.** Ощущение жжения и сжатия поперек груди. Бронхиальная астма или бронхит, сопровождающиеся отхаркиванием большого количества мокроты. Кровохарканье. Кровянистая мокрота. Бронхит у детей, страдающих задержкой мочи и сонливостью. Одышка.

**Сердце.** Пульс частый, малый, нитевидный; перемежающийся.

**Спина.** Боль в спине и болезненность при болезнях почек.

**Конечности.** Кажется, что кисти опухли. Судороги в коленях. Сильная боль по ходу крупных нервов; хуже при влажной погоде. Пациент стоит, расставив ноги; не хватает сил, чтобы удерживать равновесие. Скованность в мышцах. Ходит согнувшись, как старик. Невралгия плечевого или подлопаточного нерва. Ощущение, как будто при ходьбе пациента бросает вперед, он наклоняется.

**Кожа.** Геморрагическая пурпура; прогрессирующая. Повышенная чувствительность кожи в целом. Обморожение, ознобление без повреждения кожи; сопровождающееся сильным зудом и пульсацией.

Сон. *Сонливость, дремотное состояние:* при задержке мочи и т.д.

**Лихорадка.** Ощущение, как будто под кожей жар. Холодный пот на голенях.

**Диф. диагноз.** Canth., Erig., Phos.

## THALLIUM

**Общее.** Препарат из этого редкого металла полезен при самых ужасных невралгических болях — спастических, стреляющих. Боли напоминают удары электрического тока.

Онемение или ощущение ползающих мурашек начинается в пальцах рук и ног, распространяется вверх по ногам, а из рук — вниз, в стопы; при этом захватывается низ живота и промежность.

Паралич нижних конечностей. Локомоторная атаксия. Тремор. Очень быстро выпадают волосы, в том числе, после острой или изнуряющей болезни. Атрофия мышц.

## THERIDION

**Общее.** Яд этого оранжевого паука вызывает *повышенную чувствительность НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ*, особенно к *ШУМУ*: шум как будто *ПРОНИКАЕТ В ТЕЛО*; поражает зубы; вызывает тошноту; озноб и боли во всем теле; проникает в больные места и т.д. Яд вызывает *повышенную возбудимость спинного мозга*; он поражает *кости*, вызывая кариез (остеомиелит) и некроз. Туберкулезный диатез. Теридион показан, когда наилучшим образом подобранное средство оказывается неэффективным, особенно, в случаях кариеза (остеомиелита) и некроза костей. Рахит. Кости кажутся сломанными. Туберкулез легких.

Вода кажется слишком холодной. Что-то подскакивает внутри, напоминая движения ребенка. Жгучие боли. Морская болезнь. Ощущение удвоения.

Последствия солнечного удара. Истерия: в пубертатном возрасте и во время климакса. Атрофия у младенцев: увеличение желез; истощение (маразм). Узлы в разных частях тела, в особенности в области ягодиц.

**Хуже.** ОТ ШУМА. От прикосновения. КОГДА ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА. От малейшего движения. От напряжения. От сотрясения. От езды. От холода. От стирки. От коитуса. От солнечного удара.

**Лучше.** В покое; в горизонтальном положении. От тепла.

**Психика.** Время идет слишком быстро. Пациент вздрагивает от малейшего звука. Бесплодная деятельность; ни от чего не получает удовольствия. Истерия. Разговорчивость и веселость. Не хватает уверенности в себе.

**Голова.** Головокружение сопровождается тошнотой; усиливается при наклоне; от малейшего движения; когда пациент ЗАКРЫВАЕТ ГЛАЗА; когда *стоит на коленях*. Головная боль ощущается во сне, усиливается от сотрясения тела; сопровождается тошнотой и рвотой; возникает во время климакса.

Кажется, что голова толстая, пациентка считает, что голова принадлежит другому человеку; кажется, что она может снять ее; или ей хотелось бы снять голову. Мигрень. Головная боль усиливается после стула. Пациент радостный во время головной боли. Не может прилечь при головной боли. Пациентка падает в обморок после стирки.

**Глаза.** Мерцание в глазах; в том числе, при наклоне. Светящееся дрожание перед глазами, неясное зрение; после этого возникают симптомы со стороны головы и слабость.

**Уши.** Малейший шум, каждый звук проникает в тело, пронизывает его насквозь, особенно действует на зубы. Слышится шум потока воды в обоих ушах, как шум водопада.

**Нос.** Боль над корнем носа. Хронический катар: желто-зеленые, густые, зловонные выделения. Озена. Катар задних отделов носа.

**Лицо.** Бледное. Челюсти неподвижны; в том числе утром.

**Рот.** Непроизвольно открывается; пациент не может его закрыть. Пена изо рта при потрясающем ознобе. Зубы чувствительны: холодная вода кажется слишком холодной. Полость рта как будто покрыта пухом ворсом, немеет. Спастическое сжатие челюстей (тризм) в первой половине суток, то есть до полудня, при пробуждении. Прикусывает кончик языка; в том числе во время сна.

**Желудок.** Постоянно хочется есть и пить, но пациент не знает, чего он хочет. Страстное желание апельсинов и бананов, табачного дыма, вина; кислых фруктов и напитков. Тошнота усиливается от малейшего движения; когда пациент пристально смотрит на предмет; от шума. Тошнота и позывы на рвоту уменьшаются от питья теплой воды.

**Живот.** Сильнейшее жжение в области печени. Абсцесс печени. Боль в паховых областях: после коитуса; от движения и когда пациент сгибает ноги.

**Мочевыделительная система.** Повышенное мочевыделение ночью, днем — немного мочи.

**Мужские половые органы.** Поллюции во время послеполуденного сна. Гонорея. Простата увеличена, ощущение комка и тяжести в промежности, сильнее беспокоит при каждом шаге.

**Женские половые<sup>4</sup> органы.** Истерия в пубертатном возрасте; во время климакса. Подавление менструаций.

**Дыхательные органы.** Боль у края ложного (нижнего) ребра слева. При кашле тело дергается так, что голова наклоняется вперед, а колени подскакивают вверх, навстречу голове. Кажется, что слишком много воздуха попадает в грудную клетку. Колотье ощущается в самых верхних отделах грудной клетки; колющая боль направляется кзади через верхушку левого легкого. Туберкулез легких. Затруднение дыхания при подъеме и спуске по лестнице; а также при истерии.

**Сердце.** Тревога в области сердца; резкая боль распространяется в руку и левое плечо. Пульс медленный при головокружении.

**Шея и спина.** Позвоночник чувствителен к давлению и сотрясению; пациент сидит на стуле боком, чтобы избежать давления на него.

**Конечности.** Жжение в плечах (выше локтя). Ощущение беспокойства в кистях; заламывает себе руки. Жалящая боль, идущая от локтя к плечу. Лежит или сидит, скрестив стопы, не может их разъединить.

**Кожа.** Ощущаются жалящие толчки в коже. Зуд.

**Лихорадка.** Пена изо рта при потрясающем ознобе. Ощущение внутреннего холода. Холодный пот; появляется легко.

**Диф. диагноз.** Asar., Sil.

## THIOSINAMINUM

**Общее.** Это вещество химическим путем получено из горчичного масла (*Sin-n.*). Оно рассасывает как наружные, так и внутренние рубцы, спайки, сужения (стриктуры); действует на опухоли, увеличенные железы. Его следует применять в дозе по 0,3 г 2—3 раза в день ежедневно. Потенция D2.

## THUJA OCCIDENTALS

**Общее.** Ганеман считал Тую противоядием — антидотом — для сикотического миазма. Туя действует, главным образом, на слизистые оболочки *МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ*; на кишечник; *КОЖУ*; *психику*; *нервы*; *железы*; затылочную область и левую сторону тела. Туя — это средство для лечения *мягких, обильных, грибовидных разрастаний*; полипов, кондилом, бородавок; в том числе имеющих ножку; черного цвета — к которым применялась терапия подавления.

Гидрогеноидная или лимфатическая конституция. Выраженный упадок сил и быстрое исхудание. Пациент *истощенный и мягкий*, тело кажется тонким и хрупким, непрочным. Онемение, потеря чувствительности в большой части тела. Выделения зловонные, едкие, с *запахом плесени, с прогорклым или сладковатым* запахом.

*Ощущение тонкой струйки или капли, стекающей* по уретре. Жгучие, покалывающие, сопровождающиеся онемением, тянущие или *блуждающие боли*; усиливаются в тепле. Маслянистые стул, кожа, пот. Мягкие ткани как будто отделяются от костей. Отеки в области суставов. Подергивание верхней части тела; в том числе, обусловленное патологией спинного мозга; при хорее. При ходьбе возникает ощущение, что тело легкое. Состояния, возникшие после проведения прививок (вакциноз): "после вакцинации больше не чувствовал себя хорошо" — невралгия, болезни кожи и т.д.

Плачущие младенцы, в том числе, получившие от отца сикотическое отягощение; плачущие из-за врожденной паховой грыжи. Боли продолжительные, распространяющиеся из своего источника. Неврастения; в том числе, связанная с болезнью простаты. Ревматизм. Паралич. Подавленная гонорея.

Болезненные последствия употребления табака. Подавленные проявления сикоза; в том числе, кондиломы. Аневризма анастомоза; набухание кровеносных сосудов. Колющие, рвущие боли в железах, как будто их разрывают на кусочки.

**Хуже.** *ОТ ХОЛОДА; СЫРОСТИ*; от жара; от тепла постели. Периодически: в 3 ч ночи и в 15 ч днем. Ежегодно. На растущей луне. От лунного света. Во время менструации. От мочеиспускания. От чая. От кофе. От сладостей. От жирной пищи. От лука. От солнца. От жевания. От яркого света. От препаратов ртути. После сифилиса. Когда потягивается. От коитуса. Когда закрывает глаза.

**Лучше.** От тепла; от теплого укутывания; от теплого воздуха, теплого ветра. *Когда имеются обильные выделения. От чихания.* От движения. Положив ногу на ногу. От прикосновения. Когда сгибает, подтягивает конечности. От растирания. От расчесывания, царапанья.

**Психика.** *Навязчивые идеи*: как будто странный человек рядом с пациентом; как будто душа и тело разделены; как будто тело хрупкое; сделано из стекла; *ощущение, как будто внутри пациента* — что-то живое; как будто им овладели высшие силы. Пациент *спешит*, когда у него плохое настроение; говорит торопливо; глотает слова. Печальный. Испытывает отвращение к жизни. Перевозбужден, гневается или тревожится по пустякам. От музыки — плачет, дрожат стопы. Нервничает; когда приближается кто-то незнакомый, возникают подергивания. Не может сосредоточиться. Сумасшедшие женщины не позволяют приблизиться или прикоснуться к себе.

Страх при виде зеленых полос. Речь медленная, с трудом подыскивает слова. Женщина раздражительная, ревнивая, вздорная по отношению к мужу или матери, но держит себя в руках среди посторонних людей и врачей. Кретинизм. Нервная депрессия после родов. Пациент ходит по кругу в помещении.

**Голова.** Головокружение, похожее на раскачивание; кажется, что все предметы подпрыгивают; в том числе, когда закрывает глаза, смотрит вверх или в сторону. *Боль в голове, как будто ее пронзает гвоздь*. Головная боль усиливается от сексуальных излишеств; от чая; уменьшается, когда пациент запрокидывает голову. Рвущая, дергающая боль. Белые чешуйки на голове, перхоть. Волосы сухие, расщепляются; выпадают. Пот имеет запах меда.

**Глаза.** Кроваво-красные; полные слез; все время открыты. Веки тяжелые, как будто свинцовые. Зазубренная радужка. Ирит. Склерит. Ячмени и опухоли хрящей век. Ощущение, как будто холодный воздух вырывается из головы через глаз; лучше, когда тепло укрыт. Фотопсии (искры, молнии) вне поля зрения. Плавающие полосы (зеленого цвета). Экзофтальм; связан с опухолью, растущей позади глазного яблока.

**Уши.** Выделения из уха: водянистые, гнойные; гниlostные. Когда пациент делает "пустое" глотательное движение, возникает треск в ушах. Шум в ухе, как от кипящей воды.

**Нос.** *Кровяные корки*; либо запах рыбного рассола в носу. Когда сморкается, выделяется густая зеленая слизь. Носовое кровотечение: хуже после перегревания.

**Лицо.** Бледное, как будто восковое, *блестящее*, темные тени под глазами. Венозная сетка на лице, вены в виде паучков. Сверлящая боль в скуловых костях (слева) уменьшается от прикосновения. Кожа жирная. Невралгия: из-за подавления гонореи или экземы уха. Опухоль на щеке.

**Рот.** Зубы разрушаются у края десен, они крошатся; желтеют. Грызущая боль в зубах усиливается от холода, от чая, когда пациент сморкается. Пиорея. Киста подъязычной железы (ранула). Варикозное расширение вен языка и ротовой полости. Афты; язвы во рту. Белые волдыри по краям языка близко к его корню, болезненные. Пациент

часто прикусывает язык, потому что он распухший. Сладковатый привкус во рту, в том числе, при гонорее. Во рту становится сухо, когда пациент жуёт пищу.

**Горло.** В горле много слизи, которая с трудом отхаркивается.

**Желудок.** *Шумно глотает*, громко рыгает. Прогорклые или жирные отрывки. Отвращение к картошке и свежему мясу, от лука становится плохо. Расстройство пищеварения у любителей чая. Человек не способен съесть завтрак. Желание холодного питья и соли.

**Живот.** Большой, раздутый живот; он выпячивается то в одном, то в другом месте, как будто ребенок (плод) бьет кулачком; ощущается движение в животе, как будто внутри него находится что-то живое (у старых дев). Уплотнения, затвердения в животе. Урчание, метеоризм; верхняя часть живота втянута. Болезненность пупка. Режущие, сжимающие боли внизу живота (в гипогастрии). Кишечная непроходимость (илеус).

Слышно бульканье в кишечнике; затем возникает безболезненный, водянистый, зеленый, как трава, стул. Булькает, урчит внизу живота или стул *внезапно с хлопком вырывается наружу* — хуже после завтрака. Стул плотный; маслянистый; черный, в виде комков, вперемешку с льющейся, как из крана, жидкостью; позыв на стул заставляет поспешить, стул выстреливает — отходит много газов — и разбрызгивается.

Режущая, сжимающая боль в паховых областях. Геморроидальные узлы набухшие, болезненные. Трещины заднего прохода, бородавки; мокнутие ануса. Промежность мокнет. Тенезмы сопровождаются ригидностью полового члена. Свищ (фистула) промежности.

**Мочевыделительная система.** Режущие, сжимающие боли *в мочевом пузыре* и уретре. Кажется, что мочевой пузырь парализован, пациент вынужден ждать, пока начнется мочеиспускание. Позывы учащенные, императивные — приходится спешить; сопровождаются болями в других частях тела; обильным мочеиспусканием. Моча жгучая, сочится, вонючая. Ощущение, как будто капля мочи стекает вдоль уретры, в том числе, после мочеиспускания. Рези в переднем отделе уретры после мочеиспускания. Струя мочи расщепленная и слабая. Боли из левой почки распространяются в эпигастрий; хуже от движения. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови. Сахарный диабет. Непроизвольное мочеиспускание ночью, когда пациент кашляет. Пенистая моча.

**Мужские половые органы.** Гонорея: моча обжигает во время мочеиспускания. Ревматизм из-за подавления гонореи. Увеличение предстательной железы. Отвратительный запах от половых органов; пот в области мошонки имеет сладковатый запах. Яички как будто ушиблены; левое подтянуто. Опухание крайней плоти. Разрастания на крайней плоти и на головке полового члена. Искривленные эрекции (*chordee*); сильнее ночью. Сперма зловонная.

**Женские половые органы.** *Влагалище очень чувствительное*, это препятствует коитусу; зуд влагалища. Воспаление левого яичника, сопровождающееся рвущей болью; хуже во время менструации. Бели: обильные, густые, зеленоватые, выделяются в промежутке между менструациями. Эрозия шейки матки. Разрастания в виде цветной капусты, легко возникает кровотечение. Влагалищно-прямокишечный свищ. Потливость наружных половых органов перед менструацией. Втянутые соски. Менструации слишком ранние, слишком короткие.

Шевеление плода настолько сильное, что будит пациентку. Выкидыш на третьем месяце беременности.

**Дыхательные органы.** Одышка, пациент дышит с трудом; хуже от глубокого дыхания и разговора. Кашель возникает только в дневное время или как только пациент съест или выпьет что-нибудь холодное. Мокрота: отхаркивается легко, когда пациент ложится; она зеленая, с привкусом старого сыра. Астма: свойственна детям с сикотической отягощенностью; ухудшение наступает ночью. Боли, возникающие в груди, распространяются в разных направлениях. Кожа в области ключиц синяя. Коричневые пятна на груди. Полипы голосовых связок.

Туя показана при астме, если не помог *Ars.*, хотя казалось, что он соответствует симптомам. В этом случае Туя и *Nat.s*, продолжат начатую работу и завершат лечение пациента.

**Сердце.** Тревожное сердцебиение; возникает при пробуждении, в том числе, утром.

**Шея и спина.** Пульсация в спине. Давящая боль в области почки. Атрофия длинных мышц спины. Искривление позвоночника. Пациент стоит согнувшись вперед. Кровяные нарывы.

**Конечности.** Возникает хруст в суставах, когда пациент вытягивает конечности. Ночью, когда просыпается, чувствует, что пальцы на руках холодные, онемевшие, как будто омертвели. Ощущение ползания мурашек или воспаление кончиков пальцев на руках или на ногах. Тазобедренные суставы "отказывают" при ходьбе. Ощущение, что конечности сделаны из дерева или стекла и поэтому легко могут сломаться. Кажется, что конечности парализованы. Беспокойство в коленях.

Ногти: *болезненные*, хрупкие; ломкие, крошатся; их цвет изменен, они деформированы. Боль в тазобедренном суставе сопровождается *чувствительностью подошв*. Зловонный, едкий пот на стопах. Ногти: рифленые, ребристые, мягкие, как будто продолжение конечности. Вросшие ногти на ногах.

**Кожа.** Коричневая; *пятнистая; грязная*; покрыта волосами. Зуд или сильное жжение в области высыпаний; хуже от мытья холодной водой. Зловонные мокнувшие полипы. Родинки (невусы). Высыпания только на покрытых одеждой частях тела. Язвы плоские, с синеватым дном. Ощущение жалящей боли, как будто что-то выскочит.

*Зловонные пустулы* с западающей верхушкой. Обильный рост волос в местах, обычно не покрытых волосами. Опооясывающий лишай (herpes zoster).

**Сон.** Пациенту не спится, когда он лежит на левом боку. Стойкая бессонница. Сны о смерти; падает с высоты во сне.

**Лихорадка.** Потрясающий озноб; сопровождается зевотой; усиливается от мочеиспускания; не уменьшается от жара, тепла. Жар поднимается в грудную клетку; при этом *кисти холодные, как лед*; при этом возникает носовое кровотечение или кашель. Потоотделение только на открытых частях тела; на покрытых одеждой — кожа сухая, горячая; кисти при этом холодные, лучше от умывания.

*Обильное потоотделение на половых органах*; пот стекает струями; сильнее в обществе, на людях; пот вонючий, маслянистый, с едким, сладковатым, иногда чесночным запахом; оставляет желтые пятна.

**Дополнительно.** Med., Nat-m., Nat-s., Nit-ac, Puls., Sabin., Sil.

**Диф. диагност.** Asaf., Calc, Ign., Kali-c, Lyc, Merc.

## ТНУМОЛ

**Общее.** Это средство считается специфичным для лечения анкилостомоза. Сексуальная неврастения.

## THYROIDINUM

**Общее.** Это саркод, приготовленный из высушенной щитовидной железы овцы или теленка.

Препарат, как и собственно щитовидная железа, оказывает сильное влияние на *СЕРДЦЕ*; кроме того, он регулирует *обмен веществ, рост и развитие*. Он также воздействует на центральную нервную систему, кожу и левую сторону тела.

Отечность тканей, ожирение. Пациент чувствует себя усталым и больным, легко утомляется, хочет лечь. Приступы обморочной слабости, нервная дрожь; дрожание лица и конечностей. Пронзающие, как от ножа, раскалывающие, сжимающие, как в тисках, боли. Удушье. Быстрое исхудание. Зоб. Ощущение покалывания, пощипывания. Микседема (гипотиреоз), сопровождающаяся выпадением волос; а также кретинизм. Задержка развития у детей. Похудание у младенцев. Крипторхизм у мальчиков. Из-за пониженной функции щитовидной железы возникает очень сильная потребность в большом количестве сахара. Акромегалия; медленно срастаются переломы.

**ТЕТАНИЯ**; хуже от холода. Немедленно. Истерические судороги. Ощущение, как будто холодный ветер дует на тело. Ревматоидный артрит. Отеки. Опухоли молочных желез. Низкое кровяное давление.

**Хуже.** От малейшего напряжения или от холода. При наклоне.

**Лучше.** Лежа на животе или откинувшись назад, развалившись.

**Психика.** Оцепенение (ступор) чередуется с двигательным беспокойством и меланхолией. Пациентка плачет, раздевается. Склонность к убийству. Подозрительность. Мания преследования. Плохое настроение; хуже, когда возникает помеха, препятствие; пациент приходит в ярость из-за пустяков. Ворчит, причем, постоянно. Пациентка смеется очень необычно, как никто другой. -

**Голова.** Ощущение легкости в мозгу. Постоянная боль в лобной области; тяжесть над глазами. Выпадение волос.

**Глаза.** Экзофтальмический зоб. Прогрессирующая потеря зрения, сопровождающаяся центральной скотомой.

**Уши.** Склероз слуховых косточек.

**Нос.** Сухо — в помещении; жидкие выделения — на улице.

**Лицо.** Румяное. Губы сухие, красные, горят; сильно шелушатся.

**Рот.** Язык покрыт густым налетом; металлический привкус на кончике языка.

**Горло.** Сухость, жжение. Ощущение, как будто щепка застряла поперек горла.

**Желудок.** Желание сладостей и жажда холодной воды. Рвота беременных.

**Живот.** Режущая боль в области печени; хуже от глубокого дыхания. Кишечные газы, булькая, перекачиваются по кишечнику; потом возникает обильный, с газами стул. Давление на низ и ноющая боль распространяются через малый таз — в переднюю часть бедер.

**Мочевыделительная система.** Повышенное выделение мочи. Сахарный диабет. Моча пахнет фиалками. Недержание мочи (энурез) у болезненных, слабеньких детей.

**Женские половые органы.** Аменорея. Грызущее ощущение в матке. Фибромы матки. Опухоли молочных желез. Рвота при беременности. Экламптические судороги; послеродовой психоз. Отсутствие молока у кормящей матери (агалактия).

**Дыхательные органы.** Сухость в гортани. Сухой болезненный кашель при входе в теплое помещение с прохладного воздуха. Пациент задыхается; лучше откинуться на подушки, лечь.

**Сердце.** *Сердцебиение*; усиливается от малейшего напряжения; сердце стучит, как молоток; пациент слышит удары своего сердца. Тахикардия. Сердечные боли иррадируют под мышку; сердце сжимает, как в тисках, сдавливает; хуже, когда пациент ложится; возникает одышка. Гипертрофия сердца после тяжелого труда.

Ощущение, как будто кровь устремляется вниз, сквозь тело. Сердце как будто прыгает. Широкие вены на руках. Поражение клапанов сердца.

**Конечности.** Дрожание конечностей; тремор. Немеют сначала пальцы на левой руке, потом — правая голень. Левая кисть холодная, как лед. Холодные липкие руки. Ненормальное развитие конечностей вследствие чрезмерного напряжения.

**Кожа.** Очень сухая. Зуд кожи без высыпаний. Псориаз в сочетании с ожирением. Ихтиоз. Зуд кожи при желтухе. Шелушение кожи нижних конечностей. Мясистое опухание кожи. Симметричные ползучие высыпания.

**Лихорадка.** Приливы жара; потом ознобы или проливные поты. Маслянистый, с запахом плесени пот.

**Диф. диагноз.** Calc, Glon.

## TRILA EUROPEA

**Общее.** Это растение вызывает *мышечную слабость* и воздействует на женские половые органы, а также на мочевыделительную систему.

Выраженная *болезненность* живота, *матки* и т.д. Боли с ощущением давления на низ или тянущие книзу, возникающие в мочеполовых органах и в области прямой кишки.

Постель кажется слишком жесткой. Отеки. Невралгия. Ревматизм. Кровотечения бледной жидкой кровью. **ЧЕМ БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТ ПОТЕЕТ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ БОЛЬ.**

**Хуже.** ОТ ПОТООТДЕЛЕНИЯ. От сквозняков. От разговора. После сна.

При ходьбе. От чихания.

**Лучше.** В прохладном помещении. При ходьбе на открытом воздухе, на улице.

**Психика.** Томится от любви. Боится общества.

**Голова.** Невралгия (справа, затем слева); сопровождается ощущением вуали, пелены перед глазами.

**Глаза.** Как будто дымка, вуаль перед глазами. Как будто кусок холодного железа воткнут в правый глаз и вызывает жжение.

**Нос.** Сильное чихание в сочетании с жидкими выделениями из носа. Носовое кровотечение.

**Живот.** Болезненность живота сопровождается выделением теплого пота, который не приносит облегчения. Перитонит.

**Мочевыделительная система.** Сильная тянущая книзу боль в уретре. Скудная моча.

**Женские половые органы.** Крайне выраженная болезненность области матки; ощущение давления на низ, сопровождающееся горячим потом; потоотделение не приносит облегчения. Болезненность и покраснение наружных половых органов. Послеродовой метрит.

**Дыхательные органы.** Кашель из-за щекотания в горле.

**Кожа.** Крапивница. Интенсивный зуд и жжение, как от огня, которое возникает после расчесывания.

**Сон.** Сонливость; усиливается во время боли.

**Лихорадка.** Обильный теплый пот: появляется вскоре после засыпания; не приносит облегчения.

**Диф. диагноз.** Apis, Calc, Lil-t.

## TRIFOLIUM PRATENSE

**Общее.** В легких возникает ощущение, как будто вдыхаемый воздух горячий; как будто он грязный, в нем много примесей. Трифоль предупреждает возникновение свинки. Он сдерживает рост раковых опухолей, если не началось их изъязвление. Применяется материнская настойка (тинктура).

## TRILLIUM

**Общее.** Это растение широко известно под названием трилистник (а в Америке и в англоязычных странах — родильный корень, пурпурный трилистник). Его применяют, как следует из английского названия, *при кровотечениях* всех видов; в том числе, *дородовых*; *послеродовых*; климактерических; возникающих при фибромах матки; причем, кровь течет сплошным потоком, она ярко-красная; кровотечение *сопровождается выраженной обморочной слабостью и головокружением. Расслабление* в области таза.

**Хуже.** От движения. Во время климакса. Когда сидит прямо.

**Лучше.** От какой-либо деятельности, связанной с физическим напряжением, на открытом воздухе. *От тугих повязки.* Согнуться, наклониться вперед.

**Голова.** Тупая боль: усиливается от шума, ходьбы, кашля; уменьшается, когда пациент сгибается, наклоняется вперед.

**Глаза.** Кажется, что глаза слишком большие, как будто они могут вывалиться из глазниц. Кажется, что всё вокруг — голубого цвета.

**Нос.** Обильное носовое кровотечение.

**Рот.** Кровотечение после удаления зубов.

**Живот.** *Ощущение обморочной слабости и пустоты* в области желудка, как будто он провалился вниз. Хронический понос с кровянистыми выделениями. Дизентерия с выделением почти чистой крови.

**Женские половые органы.** Бели: обильные, желтые, клейкие. Маточное кровотечение, сопровождающееся ощущением, как будто *кости боковых отделов таза, спины и бедер отрываются друг от друга или распадаются* на куски; лучше от тугой повязки; это ощущение сопровождается обморочной слабостью и ощущением пустоты в желудке (как будто он опустился или провалился).

Менструации возникают каждые две недели. Варикозное расширение вен во время беременности. Моча подтекает, сочится после родов. Обильные, продолжительные кровянистые лохии.

**Дополнительно.** Calc-p.

**Диф. диагноз.** Sabin.

## TROMBIDIUM

**Общее.** Этому средству отводится особое место в лечении дизентерии. Характерно ухудшение от еды и питья. Коричневый, жидкий, кровянистый стул, сильная боль перед стулом и после него. Стул бывает только после еды. Слизистые выделения из носа во время еды, когда обедает.

## TUBERCULINUM

**Общее.** Этот нозод готовится либо из содержимого туберкулезной каверны, либо из глицеринового экстракта чистой культуры микобактерий туберкулеза. Туберкулинум воздействует на психику; ЛЕГКИЕ; голову, область затылка; железы и гортань.

Это средство имеет очень большую ценность в лечении начинающегося туберкулеза. Симптомы *все время изменяются*: появляются внезапно, внезапно проходят; или симптомы *имеют неясное происхождение*, и хорошо подобранное средство не приводит к улучшению.

Слабость, исхудание при хорошем аппетите. Пациент легко простывает при малейшем охлаждении; это заканчивается поносом. Пациент очень восприимчив к переменам погоды. Рецидивирующие заболевания. Пациент всегда усталый; движение вызывает сильное утомление. Нарастающее истощение и *небольшой запас жизненных сил*. Быстро возникает полный упадок сил.

Туберкулинум соответствует блондинам с узкой грудной клеткой. Золотуха: увеличение желез. Аденоиды. **ОТЯГОЩЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ** [т.е. туберкулез в анамнезе пациента, или в семейном анамнезе, или скрытый туберкулез у пациента, также как и "отягощен-ность сифилисом", "сикотическая отягощенность" и проч. — Н.Л.]. Дрожание, мелкая дрожь. Умственно неполноценные дети. Эпилепсия. Неврастения. Крайне повышенная чувствительность психическая и физическая. Нервная слабость. Дрожание. *Одежда кажется влажной, сырой*.

Если Туберкулинум оказывается неэффективен, после него часто хорошо следует Syph. и приводит к желаемому результату.

Туберкулинум не следует применять, если у пациента слабое сердце. Боль, как от ушиба, во всем теле. Кости болят. Ощущение ползания мурашек. Обмороки.

**Хуже.** В ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ. От движения. От напряжения. При перемене погоды. В СЫРУЮ погоду; в холодную погоду. От сквозняка. Когда просыпается. От шума. При мысли о симптоме. От нервного возбуждения. От музыки. От давления пояса на талии. Стоя. Периодически.

**Лучше.** От прохладного ветра. На открытом воздухе. От движения.

**Психика.** Пациент ЧУВСТВИТЕЛЕН, в том числе к музыке; каждая мелочь его раздражает; хуже, когда просыпается. Приступы ярости; хочет драться; швыряет все подряд в кого угодно; даже не имея на то причины. Недоволен, неудовлетворен; всегда хочется перемен, хочет путешествовать; не желает долго оставаться на одном месте; хочет заняться чем-нибудь другим или, может быть, даже подыскать нового врача; устал от жизни.

Отвращение к умственному труду. Безрассудный, дерзкий. Страх животных; в том числе, собак. Хнычет и жалуется из-за совсем небольшого недомогания. Желание грязно ругаться, проклинать и клясться. Переменчивое настроение. Спутанность сознания; все в комнате кажется странным. Ночные видения (галлюцинации), пациент просыпается в испуге. Дети просыпаются с криком, при этом беспокойно двигаются. Тревожность. Безднадежность. Болтливость; в том числе, при лихорадке. Противоречивость: мания и меланхолия; бессонница и оцепенение.

**Голова.** Глубоко локализующиеся жестокие головные боли; пациент рвет на себе волосы или стучит по голове кулаком, или бьется об стену или об пол; хуже от движения. Стреляющая боль из области над глазами (справа) проходит сквозь голову в заднюю часть уха (слева) или из правого лобного бугра в затылочную область справа. Кажется, что мозг болтается, не прикреплен. Менингит. Кожа волосистой части головы чувствительная. Колтун (plica polonica). Периодические головные боли.



**Глаза.** Экзема краев век. Болезненность глазных яблок и ощущение, что они ушиблены; хуже при движении глаз. Менингит сопровождается косоглазием.

**Уши.** Постоянные отвратительные выделения из уха. Перфорация барабанной перепонки, края отверстия рваные.

**Нос.** Скопления мелких нарывов (фурункулов), очень болезненных, которые появляются в носу друг за другом, последовательно; выделяется зеленый вонючий гной. Потоотделение на носу. Насморк (простуда) заканчивается поносом.

**Лицо.** Старое, отечное, бледное. Тупые боли, ломота в скуловых костях.

**Рот.** Ощущение, как будто все зубы прижаты друг к другу и во рту их слишком много — не помещаются в голове пациента. Зубы чувствительны к воздуху. *Позднее прорезывание зубов.* Сухо, вязко, липко во рту. Черные волдыри на губах.

**Горло.** Отхаркивает слизь после еды. Аденоиды. Сухость в задних отделах носа. Увеличенные миндалины.

**Желудок-.** *Страстное желание холодного молока или сладостей.* Отвращение к мясу, к любой пище. Ощущение пустоты и голода, отчего пациенту приходится поесть.

**Живот.** Внезапный понос рано утром. Стул: коричневый; *зловонный*; водянистый; он извергается со значительной силой. Туберкулезный меза-денит. Понос у детей на протяжении нескольких недель; он сопровождается исхуданием; возникает истощение, лицо становится синевато-бледным.

Рвущая боль в прямой кишке при кашле. Паховые лимфатические узлы уплотнены и хорошо видны. Живот вздут, как барабан (тимпанит). Хронический понос, сопровождающийся сильной потливостью. Запор: стул толстый и твердый, после него возникает понос. Выпячивание живота в области селезенки; колющие боли в боках после бега.

**Мочевыделительная система.** Должен тужиться, как во время стула, чтобы потекла моча. Ночное недержание мочи. Липкий осадок в моче.

**Женские половые органы.** Менструации: наступают вскоре после родов; они слишком ранние, слишком обильные, продолжительные. Аменорея. Дисменорея: боль нарастает по мере усиления кровотечения. Опухоли молочных желез; в том числе доброкачественные. Соски втянутые. Сильная боль в молочных железах в начале менструации.

**Дыхательные органы.** *ОЩУЩЕНИЕ УДУШЬЯ*; даже если достаточно свежего воздуха; пациент стремится дышать холодным воздухом. Охриплость уменьшается от разговора. Кашель: сухой; жесткий, сильнее во время сна; от него усиливается одышка; он сопровождается ощущением холода, ознобом и покраснением лица; сильнее по вечерам; усиливается при поднимании рук. Слизь клокочет в груди; не отхаркивается. Болезненный участок в груди. Астма. Пневмония; в том числе, после гриппа. Обильная мокрота. Густая желтая или желто-зеленая мокрота.

**Сердце.** Тяжесть и давление в области сердца. Сердцебиение: когда делает глубокий вдох; после вечернего приема пищи.

**Шея и спина.** Напряжение в задней части шеи. Боль в спине в сочетании с сердцебиением. Ощущение холода, зябкости между плечами или холода, распространяющегося вверх по спине.

**Конечности.** Слабость в кистях и руках, они не слушаются; пациент не может писать или поднимать чашку, стакан. Кончики пальцев на руках бурые. Ощущение усталости в конечностях. Стопы холодные; в том числе, в постели. Кажется, что конечности слабые или парализованы; сильнее после обеда. Острый суставной ревматизм. Боли в локтевом нерве.

**Кожа.** Сухая, *грубая, шершавая*; чувствительная, быстро покрывается загаром; зуд кожи на прохладном воздухе. Отрубевидные чешуйки. Псориаз. Хроническая экзема. Зуд меняет локализацию после растирания, расчесывания кожи.

**Сон.** Сновидения яркие; видит во сне неприятности, позор; страшные сны. Просыпается в ужасе. При засыпании вздрагивает, содрогается всем телом. Двигательное беспокойство ночью, пациент кричит во сне.

**Лихорадка.** Мерзнет, когда засыпает, в начале сна, но все-таки хочет, чтобы воздух был свежий. Ощущение жара в щеке: на больной стороне; на отдельных участках. Приливы жара усиливаются от еды. Жжение в половых органах. *Потоотделение* возникает легко; пот холодный; липкий; возникает на верхней части тела; на кистях; усиливается от кашля; оставляет желтые пятна. Во всех периодах лихорадки пациент предпочитает быть укрытым.

**Дополнительно.** Bell., Calc, Kali-s., Psor., Sep., Sulph.

**Диф. диагноз.** Bar-c, Calc-p., Phos., Puls., Sil.

## URANIUM NITRICUM

**Общее.** Это средство для лечения глюкозурии и повышенной секреции мочи.

Очень сильная жажда, тошнота, рвота, чрезмерный аппетит; диабет сахарный и несахарный. Сильное исхудание. Слабость; склонность к возникновению асцита и общего отека (анасарки). Нефрит. Высокое кровяное

давление. Жжение в желудке; язва желудка. Недержание мочи. Жжение в уретре во время мочеиспускания. Импотенция с ночными поллюциями. Подавление менструаций при диабете.

**Хуже.** Ночью.

**Лучше.** Когда дышит глубоко.

## URTICA URENS

**Общее.** Как следует из названия, "крапива жгучая", это растение вызывает жалящие или *жаляще-жгучие боли*.

Уртика действует на *МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ*; *мочеполовые органы*; печень и селезенку. Запах мочи от тела. Мочекислый диатез. *Крапивница*, сочетающаяся или чередующаяся с поражением суставов. Кровотечения.

Болезненные последствия *ожогов*, ужаления пчелы, употребления в пищу моллюсков или ракообразных; подавления секреции молока; подавления крапивницы. Ангионевротический отек (Квинке).

Хуже. Когда идет снег; от прохладного влажного воздуха. От купания в прохладной воде. Ежегодно. От прикосновения. Когда лежит на руке.

**Голова.** Головная боль, сопровождающаяся колотьем в селезенке.

**Живот.** Стул: маленького объема, болезненный, в виде слизи, смешанной с белого цвета массой, напоминающей вареный яичный белок. Сильный зуд в заднем проходе; в том числе, из-за остриц. Рвота из-за подавления крапивницы.

**Мочевыделительная система.** Едкая моча, вызывающая зуд. Песок в моче. *Повышенное содержание мочевой кислоты в крови*. Подавление мочевого выделения.

**Мужские половые органы.** Зуд, жжение половых органов; мошонки; это мешает пациенту спать.

**Женские половые органы.** Зуд наружных половых органов: зуд, жалящая боль; отек вульвы. *Пониженная секреция молока* после родов. Набухание молочные желез; оно сопровождается жалящими, жгучими болями. Уртика прекращает секрецию молока после отлучения ребенка от груди.

**Дыхательные органы.** Кровохарканье; в том числе после физического перенапряжения.

**Конечности.** Непрекращающаяся боль в дельтовидной мышце (справа); хуже, когда поворачивает руку внутрь (при пронации); пациент не может надеть пальто. Острый приступ подагры.

**Кожа.** Зуд, приподнятые над уровнем кожи красные пятна. Крапивница: ухудшение наступает каждый год, в одно и то же время года. Ощущение покалывающего жара. *Крапивница*: высыпания приподняты над уровнем кожи; сочетаются с поражением суставов (ревматизмом); возникают после употребления моллюсков или раков; возникают при гельминтозе (острицы).

Образование пузырей на коже. Ожоги пламенем и жидкостью первой степени; сопровождающиеся сильным жжением, зудом; в этих случаях применяется наружно.

**Лихорадка.** Потливость: ночью; при головокружении, в сочетании с пульсацией, которая ощущается во всем теле.

**Диф. диагноз.** Form., Nat-m., Oci.

## USTILAGO MAYDIS

**Общее.** Пузырчатая головня кукурузы воздействует на *женские половые органы*; на кожу, волосы и ногти.

Застойного происхождения, пассивное или *вялое кровотечение*, или выделение крови в виде сгустков; кровь темная, но жидкая, водянистая. *Кровотечения темной кровью*. Ощущение, как будто имеется *узел*: в матке, в кишечнике, в горле и т.д. *Выпадение волос и ногтей*. Прострация из-за сексуального насилия.

Устилаго подходит высоким худым женщинам; в том числе во время климакса.

**Хуже.** Во время климакса. От прикосновения. От движения.

**Психика.** Сильный упадок духа, депрессия. Пациентка часто плачет.

**Голова.** Клейкий секрет, из-за которого волосы слипаются. Молочный струп. Головокружение: оно сопровождается появлением белых пятен перед глазами; возникает во время климакса; сопровождается обильными менструациями. Нервные головные боли из-за нарушения менструального цикла.

**Живот.** Боль с ощущением, как будто кишечник завязан в узел; спастическая боль (колика) уменьшается от твердого стула или при запоре.

**Мужские половые органы.** Непреодолимое желание заниматься мастурбацией. Эротические фантазии. Поллюции возникают каждую ночь и даже во время разговора с женщиной.

**Женские половые органы.** Викарные менструации: кровотечения из легких и кишечника. Менструации: кровь наполовину жидкая, наполовину свернувшаяся, в виде сгустков; ярко-красная; кровотечение усиливается от малейшей провокации. Менаррагия: во время климакса; после аборта. Сочится темная кровь: свернувшаяся, образуются длинные черные нити.

Шейка матки рыхлая, легко возникает кровотечение. Острая боль в яичнике (слева). Неприятное жгучее ощущение в яичниках (справа). Болезненность матки и яичника (слева). Стреляющая боль, направленная вниз, вдоль бедер.

Зловонные желтые или коричневые бели. Боль под левой молочной железой; боль по краю ребер, возникающая между менструациями; в том числе, постоянная. Гипертрофия матки; субинволюция матки. Кажется, что матка затянута в узел. Во время кормления ребенка грудью возникают боли с ощущением давления на низ.

Фибромы матки. Отмечено исчезновение опухолей после применения Устилаго. Подавление менструаций без причины, но сопровождается сопутствующими симптомами.

**Спина.** Ощущение кипящей воды, текущей вдоль спины.

**Конечности.** Конtrakтуры мышц, в том числе, нижних конечностей.

**Кожа.** Сухая, горячая.

**Диф. диагноз.** Asaf., Bov., Sec.

## VACCININUM

**Общее.** Нозод готовится из содержимого вакцинальной оспенной пустулы. Это полезное средство для хронических болезненных состояний, известных как вакциноз.

Невралгия; застарелые кожные высыпания; новообразования; сикотические состояния.

**Диф. диагноз.** Maland., Thuja.

## VALERIANA

**Общее.** Валериана вызывает повышенную чувствительность *НЕРВОВ*; в том числе *спинномозговых*, мочеполовых. Это растение воздействует *на психику*; на мышцы (в том числе, икроножные), на пятки; на ахиллово сухожилие.

*Психическое и физическое состояние внезапно изменяется*; и достигает крайностей. Боли пронзающие, рвущие; *перемещаются наружу*; они ощущаются в разных местах — то там, то здесь — или появляются и исчезают; перескакивают с одного места на другое.

*Иллюзии, заблуждения*: обманы зрения; слуха; обонятельные галлюцинации; или вкусовые. Ощущение парения, удвоения, ощущение шара или пробки.

*Недостаточная, слабая реакция.* Чередование симптомов. Возбуждены все нервы: возникают внезапные мышечные сокращения, подергивание мышц; дрожание. Двигательное беспокойство; *импульс двигаться* — пациент не может быть неподвижен.

*Слабость*, в том числе, в *отдельных частях тела*: слабые глаза; руки; запястья; слабость в подколенной области и т.д. Ощущение комка в горле. Ощущение нитки, свисающей из пищевода вниз.

*НЕРВНЫЕ, раздражительные и слабые*, истеричные женщины с преобладанием интеллекта, страдающие от невралгии. Обычно красные части тела становятся белыми. Незначительное повреждение вызывает спазмы, судороги. Раннее возникновение пролежней. Эпилептические припадки. Паралич и контрактура конечностей; в том числе истерического происхождения. Постоянное ощущение жара и неловкости, дискомфорта.

**Хуже.** В *ПОКОЕ. СТОЯ. От волнения.* Вечером. На открытом воздухе; от сквозняка. Когда голодает, постится. В темноте. При наклоне.

**Лучше.** Когда *меняет положение тела*. При ходьбе. От растирания. После сна. От приема пищи. От завтрака.

**Психика.** Психические расстройства характеризуются перепадами настроения — из одной крайности в другую: переход от наивысшего веселья к глубочайшему горю; от мягкости к ворчливости. Нетерпеливость: берется то за одно, то за другое. Заблуждения, ошибочные представления: пациентка считает себя кем-то другим; как будто все вокруг странное и неприятное. Извивается и корчится. *Гневается*. Склонность падать в обморок. Истерия; боится остаться одна, особенно в темноте. Безумие: буйствует и ругается, богохульствует. Видит образы, животных, людей.

**Голова.** Головная боль в виде толчков, "дергает в голове"; боль уменьшается, когда пациент ходит; усиливается от солнечного света. Ощущение холода в верхней части головы. Головокружение: при наклоне; голова кажется легкой, как будто она парит, плывет в воздухе.

**Глаза.** Блеск и свет перед глазами в темном помещении; острое зрение. Кажется, что предметы расположены слишком близко к глазам. Дикий взгляд.

**Уши.** Иллюзии: считает, что слышал звон колокольчика. Боль в ухе (оталгия); хуже от сквозняка и от холода.

**Лицо.** Внезапно появляется боль и сокращение мышц. Подергивание мышц. Щеки красные и горячие на открытом воздухе.

**Рот.** Прогорклый жирный привкус во рту. Тошнота, которая ощущается в горле. Язык покрыт толстым налетом.

**Горло.** Ощущение, как будто нитка в горле: при слюнотечении и рвоте.

**Желудок.** Отрыжки с запахом тухлых яиц. Голод сопровождается тошнотой; кажется, что тошнота возникает в области пупка. После кормления у грудного ребенка возникает рвота большими сгустками свернувшегося молока; если мать перед кормлением ребенка сердилась. Ощущение, как будто что-то теплое поднимается вверх из желудка и вызывает удушье. Спазмы в желудке.

**Живот.** Вздутый живот. Спазмы. *Метеоризм*; в том числе, истерического происхождения. Жидкий, водянистый стул при поносе; содержит сгустки свернувшегося молока и сопровождается сильным криком, у грудных детей. Спазмы в животе после еды, ночью в постели. Пациент непроизвольно втягивает живот.

**Мочевыделительная система.** *Количество мочи увеличено, и мочеиспускание учащено*; в том числе, у нервных женщин.

**Дыхательные органы.** Ощущение удушья в горле при засыпании. Просыпается с ощущением, что задыхается. Спастическая астма.

**Сердце.** Колющая боль в сердце сопровождается частым, малым и слабым пульсом.

**Конечности.** Судорожная боль, удары, как будто электрическим током, в плечевой кости (слева) заставляют пациента проснуться. Боль в пятках постоянная или возникает, когда пациент сидит. Ишиалгия: усиливается, когда пациент стоит, сидит или отдыхает (в покое); боль уменьшается при ходьбе и от растирания.

Постоянное судорожное сокращение, подергивание мышц. Болезненное напряжение в икроножных мышцах; хуже, когда сидит, положив ногу на ногу. Судороги в двуглавой мышце плеча, в бицепсе (справа) возникают, когда пациент пишет. Судороги в кистях и стопах не дают спать. Боль из икроножной мышцы распространяется в пятку. Ишиас: хуже, когда вытягивает конечности, когда стоит. Голени кажутся легкими после ходьбы.

**Сон.** Бессонница по ночам сопровождается зудом и мышечными спазмами; возникает из-за нервного возбуждения.

**Лихорадка.** Озноб начинается в затылке и распространяется вниз по спине. Лихорадка представляет собой только период неприятного жара. Внезапное, сплошным потоком потоотделение; возникает, главным образом, на лбу. Тело холодное, как лед; при тошноте и рвоте.

**Диф. диагноз.** Asaf., Ign., Puls.

## VANADIUM

**Общее.** Ванадий — это средство для лечения дегенеративных изменений в печени и в сосудах. Жировое перерождение сердца и печени. Артериосклероз. Темного цвета пигментные пятна на лбу при болезнях печени. Выраженная слабость.

## VARIOLINUM

**Общее.** Нозод Вариолинум готовят из серозной жидкости, содержащейся в оспенной пустуле. Вариолинум оказался эффективным средством профилактики оспы и вакцинальной инфекции. Он смягчает течение и способствует излечению от оспы.

*Генерализованные тупые боли, ломота во всех мышцах; сильнее в области спины, затылка и голени.* Отложение извести (кальцинаты) в стенках кровеносных сосудов, спинном мозге и т.д.

**Хуже.** От движения. *От прививки (вакцинации).*

**Психика.** Болезненный страх оспы.

**Голова.** Безумное ощущение в головном мозге. При головной боли стопы и кисти холодные, как лед.

**Глаза.** Все видит в зеленом цвете, когда встает (со стула и т.д.).

**Рот.** Язык высовывается изо рта во время сна. Скверный, металлический привкус во рту. Отвратительное ощущение во рту.

**Желудок.** Тошнит от всех запахов. Возникает желание отрыгнуть пищу. Рвота молоком возникает сразу после того, как пациент его выпьет.

**Живот.** Тимпанит; живот выпячивается кверху; женщина становится похожа на беременную.

**Спина.** *Разламывающая боль в спине.* Боли из спины перемещаются в живот.

**Кожа.** Ощущение, как будто насекомые ползают под кожей. Экзема ладоней. *Пустулезные высыпания;* зловонные. Опоясывающий лишай, а также боль, возникающая после появления высыпаний. Язвы как будто выкопаны совком, ложечкой.

**Лихорадка.** Ощущение, как будто струйка холодной воды бежит вниз по спине. Сильнейший озноб. Интенсивный, жгучий жар при лихорадке. Зловонный пот.

**Диф. диагноз.** Ant-t., Cimic, Maland.

## VERATRUM ALBUM

**Общее.** Чемерица белая оказывает глубокое влияние на *психику*; *НЕРВЫ*, в том числе, *нервы брюшной полости*; *на сердце*; кровь и кровеносные сосуды; дыхательные органы; *на область темени*; а также на пищеварительную систему.

**ОБИЛЬНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ** — обильная рвота, обильный стул в случае поноса, обильное слюноотделение, потоотделение, мочевыделение — сопровождаются **ПОЛНЫМ ИЗНЕМОЖЕНИЕМ**; при этом отмечается **ПОХОЛОДЕНИЕ ТЕЛА**, цианоз и **КОЛЛАПС**. Перечисленные симптомы — это характерные признаки Вератрум альбум.

**ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ СВОЙСТВЕННА БОЛЬШАЯ СИЛА И ВНЕЗАПНОСТЬ.** Вератрум альбум — это великое средство для лечения **ОБМОРОКОВ**, возникающих вследствие переживаний, эмоций; от незначительного напряжения; от малейшей травмы, сопровождающихся кровотечением; возникающих также после стула, рвоты.

**Холодный пот на лбу** наблюдается при всех заболеваниях. **Холодные**, как лед: дыхание; язык. Тонические спазмы или **судороги**: в груди; в кишечнике; в кистях; в пальцах рук; в пальцах ног; в подошвах; спазмы возникают при поносе. Нарастающая слабость и исхудание в случае острой болезни: при коклюше, малярии и т.д. Внезапный упадок сил. Паралич после истощающих потерь жизненных соков. Конвульсии, вызванные религиозным экстазом; а также у детей. Шок после хирургической операции. Чрезвычайная сухость всех слизистых оболочек. Ощущение жжения. Дети успокаиваются, когда их быстро носят на руках. Ощущение, что кровь в сосудах остывает, становится все холоднее; сепсис — септицемия и септикопиемия. Непроизвольные движения пальцами в бессознательном состоянии — карфология, "обирается".

Болезненные последствия испуга, разочарования в любви, уязвленного самолюбия или бесчестия; последствия подавления высыпаний, употребления опия, табака, алкоголя.

**Хуже.** **ОТ НАПРЯЖЕНИЯ. ОТ ПИТЬЯ;** в том числе холодных напитков. От испуга. **При боли.** В сырую, холодную погоду; при перемене погоды. Перед менструацией и во время нее. Перед стулом, во время него, после него. От прикосновения; от давления. Если нанесен удар по самолюбию и чести. От употребления опия. От жевания табака.

**Лучше.** От тепла; если тепло укрыться. При ходьбе. От горячего питья. Лежа. От употребления мяса. От молока.

**Психика.** Мрачное безразличие. Эротизм, повышенная сексуальность. Высокомерие. **Бред, делирий: ранний;** сопровождается неистовством, болтливостью или непристойным поведением; возникает при боли. Меланхолия: сидит молча мрачный, с поникшей головой; хочет остаться один. Молится, проклиная, пронзительно кричит — попеременно. Хочется рвать и резать вещи. Мания, чередующаяся с молчаливостью. Безумие. Раскаяние. Иллюзии: полагает, что должно случиться несчастье.

Двигательное беспокойство со стремлением заняться чем-нибудь. Уходит из дома и бродит без цели. Лживый, никогда не говорит правду. Целует всех; в том числе перед менструацией. Отчаяние из-за своего социального положения; чувствует себя очень несчастным. Поет, насвистывает, смеется. Бегаёт с места на место.

Женщина симулирует болезни, считает, что беременна. Послеродовой психоз. Нимфомания; обнимает всё, даже предметы. Религиозная мания. Говорит о недостатках, ошибках других людей или бранится. Тоска, мука, страх смерти. Не верит в спасение своей души ["религиозное отчаяние" — *Н.Л.*]. Считает, что мир пожирает огонь. Поедает собственные экскременты (копрофагия). Сумасбродные, нелепые, высокомерные мысли и поступки. Воображаемые болезни.

**Голова.** Холодный пот на лбу наблюдается при всех заболеваниях. Жестокая боль, доводящая пациента до отчаяния; лучше от холода. Ощущение, как будто на темени лежит кусок льда. Головные боли: сопровождаются тошнотой, рвотой, бледностью, поносом, мочевыделением. Пациент трет лоб. Волосы топорщатся, корни болезненные. Ощущение, как будто холодный ветер дует сквозь голову. Зуд темени при головной боли.

**Глаза.** Вокруг глаз темные круги. Глаза повернуты вверх. Слезотечение и покраснение глаз. Веки сухие, тяжелые.

**Нос.** Ощущается запах в носу. Кончик носа холодный, как лед. Нос заострен. Носовое кровотечение, из правой ноздри, возникает только ночью во время сна.

**Лицо.** Лицо становится смертельно бледным после вставания; оно *синеватое*; с заострившимися чертами или перекошенное. У пациента хмурый; холодный; испуганный вид. Щека красная (левая), как будто обожжена. Челюсти сводит судорогой при жевании. Спастическое сжатие челюстей (тризм). Губы синие; отвисают.

**Рот.** Зубная боль: зубы кажутся тяжелыми, как будто налиты свинцом. Пациент скрежещет зубами. Язык: холодный; бледный, в нем ощущение холода, как от мяты. Привкус мяты во рту. Пациент шепелявит, заикается или у него возникает ощущение, что язык очень тяжелый. Сухость во рту, соленая слюна. Вода кажется горькой.

**Горло.** Сухость; в горле царапает или кажется, что оно шершавое. Когда пациент пьет воду, кажется, что она течет снаружи, а не вниз по пищеводу.

**Желудок.** Жгучая жажда. *Страстное желание воды со льдом*; но как только пациент ее проглотит, возникает рвота; хочется только холодного; или кислых напитков, сочных фруктов и соли.

Пенистые рвотные массы или отрыжки. **ЧРЕЗВЫЧАЙНО СИЛЬНАЯ РВОТА В СОЧЕТАНИИ С ПОНОСОМ;** *сильные позывы на рвоту*. Икота после горячего питья. Тошнота во время еды; пациент не может отправить пищу в желудок, чтобы не возникло позыва на рвоту. Рвота усиливается от питья и от малейшего движения.

Холодная кислая отрыжка. От всех фруктов становится хуже: они вызывают болезненное вздутие желудка. Грызущее чувство голода, несмотря на тошноту и рвоту. Волчий голод. Ухудшение от картофеля и зеленых овощей. Лучше от мяса и молока.

**Живот.** Болезненное втягивание живота во время рвоты. Болезненное жжение под ложечкой. Ощущение пустоты, замирания, как будто в животе все опустилось вниз. Ощущение жжения или холода.

Стул водянистый, зеленый, без запаха или без цвета (как рисовый отвар), или в большом количестве; пациент тужится до изнеможения, появляется холодный пот. Понос, возникающий из-за питья холодной воды в жаркие дни.

Перитонит. Инвагинация кишечника (кишечная непроходимость). Обратная перистальтика. *Колика сопровождается режущими болями*; возникает ощущение, что кишечник закручен в узлы, при этом в конечностях наблюдаются судороги, быстро наступает изнеможение. Холера. Детская холера. Болезненность эпигастрия. Ощущение горячих углей в животе. Запор у грудных младенцев или от питья холодной воды. Стул узкий, как лента, плоский.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная, красно-коричневая. Густая, зеленоватая, подавление мочеиспускания (задержка мочи); непроизвольное мочеиспускание во время кашля.

**Женские половые органы.** Нимфомания: перед менструацией; из-за разочарования в любимом; из-за неразделенной страсти; у рожениц, во время родов. Дисменорея при выпадении матки; сопровождается похолоданием тела; поносом; холодным потом и обмороком, возникающим от малейшего движения. Эклампсия. Послеродовой психоз (мания). Менструации слишком ранние; слишком обильные; подавлены. Меноррагия: сопровождается тошнотой, рвотой, поносом.

**Дыхательные органы.** Воздух кажется слишком горячим. Астма усиливается в сырую холодную погоду; лучше, когда пациент запрокидывает голову. Щекотание распространяется вдоль горла вниз, в легкие. Постоянный сильный кашель: он сопровождается позывами на рвоту; усиливается от холодного питья. Клокотание, влажные хрипы в груди. Запущенный коклюш; в том числе с осложнениями. Лающий кашель в сочетании с отрыжками; сильнее в теплом помещении. Непроизвольное мочеиспускание при кашле. *Потеря голоса* (афония). Кашель, возникающий при входе в теплое помещение с холодного воздуха.

Сердце. Сердце слабое; режущие боли в сердце. Видимое биение сердца; в том числе при хорее. Пульс перемежающийся, слабый, медленный; нитевидный. Ощущение, что по венам течет холодная вода.

**Шея и спина.** Шея настолько слабая, что ребенок едва может держать голову прямо; сильнее при коклюше. Судорожная боль между лопатками уменьшается от движения. Чувство разбитости, как от ушиба, в области крестца.

**Конечности.** Плечевая невралгия, паралитическая боль и боль, как после ушиба, в руках. Жжение в руках, как будто от горячих иголок, перемещается справа налево. Ощущение, что руки переполнены и опухшие. Пощипывание в кистях и в пальцах рук. *Судороги в икроножных мышцах*, в том числе во время стула. В голених ощущаются толчки, как будто разряды электричества; пациент вынужден подняться, сесть в постели и свесить ноги вниз.

Пациент ходит с трудом, как будто парализован; вследствие слабости, утомления. Боли в стопах или коленях, как будто к ним привязаны гири; вынужден ходить. Стопы холодные, как лед.

**Кожа.** Покрыта морщинами. Кожа кажется опаленной, обожженной. Синяя, холодная кожа.

**Сон.** Дрожит, когда просыпается ночью. Вздрагивает, вскакивает, как от испуга.

**Лихорадка.** *ВСЕ ТЕЛО ХОЛОДНОЕ*; как лед; ощущение холода на темени; холодные нос, язык, рот, конечности, холодный пот.

Когда пациент пьет, возникает ощущение внутреннего жара, притом что поверхность тела холодная. При лихорадке ощущается только холода поверхности тела. Озноб при конгестии, застое крови; сопровождается жаждой.

**Дополнительно.** Carb-v.

**Диф. диагност.** Ars., Camph., Cupr., TUB., Цианиды.

## VERATRUM VIRIDE

**Общее.** Американская зеленая чемерица вызывает *ОЧЕНЬ СИЛЬНУЮ КОНГЕСГИЮ*: в сосудах основания мозга; *ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА*; легких; она сопровождается тошнотой и рвотой, а также слабостью. Поражаются также желудок, сердце и капилляры.

Выраженное чувство неловкости, дискомфорта во всем теле. Подергивание мышц и конвульсии; они возникают в разных местах; во время сна; характеризуются внезапным сокращением мышц и дрожанием, грозящими превратиться в судороги.

**Мышечная слабость:** псевдогипертрофический паралич (Дюшенна). Ощущение пульсации во всем теле. Неточные, беспорядочные движения; пациент пошатывается при ходьбе. Спазмы, судороги сопровождаются сильным пронзительным криком; возможен опистотонус; спазмы возникают перед менструацией и после нее.

**Жжение** в разных местах: на языке; в глотке; в пищеводе; на коже (хотя она и холодная на ощупь); жжение сопровождается покалыванием. Уремия. Эклампсия. **ВНЕЗАПНОЕ** возникновение симптомов. **Обмороки**, изнеможение, тошнота. Онемение. Ощущение, как будто на руках и на ногах мокрая одежда; или как будто на нем одежда с чужого плеча, не подходит ему, кажется, что она где-то натирает кожу.

Вератрум вириде подходит полнокровным, с излишним весом людям. Последствия солнечного удара. Это средство понижает артериальное давление. Дети дрожат, как будто в испуге, на грани возникновения судорог. Хорея, подергивание мышц, пациент корчится, извивается; сон не оказывает влияния на спазмы; пена возле губ. Постоянно дергается голова; сексуальное возбуждение. Пациент лежит с низко опущенной головой.

**Хуже.** ПРИ ПОДНИМАНИИ (головы и т.д.). От движения. От холода. Лежа на спине. После соблюдения постельного режима, родов. От солнечного удара.

**Лучше.** От растирания. Когда лежит низко опустив голову. От еды.

**Психика.** Болтливость и наплыв мыслей, идей. Вздорный, ссорится. Бред (делирий): буйный, пациент кричит, воем, дерется, непрерывно бормочет. Мания; послеродовой психоз. Карфология — произвольное движение пальцами в бессознательном состоянии ("обирание"). Страх: пациентка боится увидеть своего врача; боится, что ее отравят. Подозрительность.

**Голова.** Головокружение сопровождается тошнотой и внезапным упадком сил; лучше закрыть глаза и положить голову на что-нибудь. Голова втянута в плечи. Голова постоянно дергается или совершает кивательные движения (хорея); когда пациент поднимает голову, ощущается пульсация. Тупая боль в темени и между глазами. Боль в верхней части затылка, сопровождающаяся неясным зрением и расширением зрачков. Менингит с поражением основания мозга (базальный). Кровоизлияние в мозг (апopleксия, инсульт).

**Глаза.** Видит красные пятна; видит в багровом цвете; в том числе когда закрывает глаза; зрение нестабильное. Зрачки расширены. Дикий, пристальный, неподвижный, взгляд во время бреда. Глаза налиты кровью.

**Уши.** Глухота, возникающая из-за быстрого движения, в обморочном состоянии. Уши холодные и бледные.

**Нос.** Заостренный и синюшный. Частое и продолжительное чихание, сопровождающееся теплым пощипыванием во рту.

**Лицо.** Красное, **СИНЕВАТОЕ, РАСПУХШЕЕ**; но когда пациент поднимает голову и садится в постели, **ЛИЦО СТАНОВИТСЯ БЛЕДНЫМ**. Напряжение ощущается поперек скуловых костей. Судорожное подергивание мышц лица. Жевательные движения нижней челюсти

**Рот.** Перекошен в одну сторону. Язык белый, как будто побелен известкой; сухой; *посредине языка* — продольная красная полоса. Привкус во рту напоминает запах спермы. Из рта пахнет как будто хлороформом или эфиром. *Зловонный* запах изо рта. Ощущение, что рот ошпарен кипятком.

**Горло.** Жжение в пищеводе; эзофагит. Ощущение, что шар подкатывает к горлу.

**Желудок.** Очень сильная жажда; пациент выпивает немного жидкости, от которой ненадолго становится лучше. Икота: болезненная, жестокая; постоянная, сопровождающаяся спазмами пищевода. Тошнота сопровождается рвотой и поносом; от малейшего количества пищи или питья немедленно возникает рвота. *Рвота* жестокая, без тошноты. Кажется, что желудок прижат к позвоночнику. Гастрит.

**Живот.** Боль и болезненность ощущаются поперек живота, выше гребней подвздошных костей. Рези из пупка распространяются в паховую области. Боль из кишечника распространяется в мошонку. Тенезмы прямой кишки жжение в ней; лучше во время и после стула. Энтерит с высокой лихорадкой.

**Мочевыделительная система.** Моча скудная, с мутным осадком. Цистит, сопровождающийся лихорадкой.

**Женские половые органы.** Дисменорея с болезненным, затрудненным мочеиспусканием, странгурией. Подавление менструаций при конгестии сосудов головы. Ригидность шейки матки в родах. Послеродовой сепсис; экламптические судороги; маниакальное состояние только во время конвульсий или сохраняется после их прекращения.

**Дыхательные органы.** Конгестия легких. Пациент *медленно, тяжело дышит*; ощущение, как будто на груди лежит что-то тяжелое. Одышка. Кашель очень сильный с самого начала. Пневмония. Жжение в груди.

**Сердце.** Тупая боль; жжение в сердце. *Пульс хорошего наполнения, большой, мягкий или медленный*; сопровождается сильными или бешеными ударами сердца. Пульсация во всем теле, но более выражена в правом бедре.

**Шея и спина.** Тупая боль, ломота в шее и плечах. Пациент не может удерживать голову в вертикальном положении. Опиостотонус.

**Конечности.** Судороги в голених; стопах, подошвах, пальцах рук и ног. Пузыри на кистях. Жестокие толчки в конечностях, похожие на разряды электрического тока. Судорожное подергивание. Боль в области мышечков. Пульсация, ощутимая в бедрах. Двигательное беспокойство в кистях во время бреда.

**Кожа.** Пощипывание и покалывание в коже. Зуд в разных местах; уменьшается от растирания. Кожа холодная, липкая, синеватая. Рожистое воспаление, сопровождающееся симптомами поражения головного мозга.

**Сон.** Кома. Бессонница. Во сне видит, как будто тонет; видит себя на воде.

**Лихорадка.** *Гиперпирексия* или частые перепады температуры, сопровождающиеся потоотделением. Холодный *липкий* или горячий *пот*. *Цереброспинальный* менингит; нагноительная лихорадка; острый суставной ревматизм. Температура тела высокая вечером; пониженная, ниже нормы — утром.

**Диф. диагноз.** Acon., Gels.

## VERBASCUM

**Общее.** Из цветов коровяка готовят масло, которое считается полезным при наружном употреблении в случае глухоты или боли в ухе.

Вербаскум обладает выраженным влиянием *на нервы*, особенно на 3 (нижнечелюстную) ветвь тройничного нерва; на уши; дыхательные пути и мочевого пузырь, а также на левую сторону тела. Вербаскум уменьшает возбудимость нервов, раздражение бронхов и мочевыводящих путей. Он показан при катаре и простуде; при спазмах и невралгии. Рвущая, колющая, *судорожная, сжимающая, раздавливающая, парализующая* боль.

**Хуже.** От сквозняка. При перемене температуры воздуха. При каждой простуде. В 9 ч утром и в 16 ч днем. Дважды в день, в один и тот же час. От разговора. От чихания. От прикосновения.

**Лучше.** Когда делает глубокий вдох.

**Глаза.** Боль в глазах, как будто глазницы сжались.

**Уши.** Глухота. Боль в ухе. Глухота из-за попадания в ухо воды, как при плавании, или как будто клапан закрывает ухо. Онемение уха (слева).

**Нос.** Насморк в сочетании со слезотечением — слезы горячие.

**Лицо.** Лицевая невралгия: хуже при стискивании зубов, от малейшего движения; боль ощущается в скуловых костях.

**Рот.** Во рту большое количество соленой слюны.

**Живот.** Ощущение комка или скручивания в области пупка. Геморроидальные узлы; создают препятствие для опорожнения кишечника; возникает зуд, воспаление узлов.

**Мочевыделительная система.** Недержание мочи (энурез), в том числе ночью; хуже от кашля.

**Дыхательные органы.** *Охриплость*; голос звучит, как труба. Частые приступы глубокого, гулко-го кашля — звук кашля напоминает звук трубы, горна; лучше от глубокого дыхания. Кашель нервный; при кашле пациент не просыпается.

**Диф. диагноз.** Acon., Plat., Sep.

## VESPA CRABRO

**Общее.** Живая оса причиняет жалящие, жгучие боли, *как будто вонзаются раскаленные докрасна иглы*.

Судороги, потеря сознания, пациент не отвечает на вопрос, смотрит в пространство, впоследствии не помнит приступа.

**Хуже.** От жара печи или в закрытом помещении.

**Лучше.** От мытья рук холодной водой.

## VIBURNUM OPULUS

**Общее.** Калина (в английском варианте — "судорожная кора") в гомеопатии применяется при генерализованных *судорогах*.

Жесткие спазмы, симптомы со стороны нервной системы, особенно у *женщин*, обусловленные состоянием яичников или матки. Из-за боли женщина становится такой нервной, что она не может оставаться неподвижной, не двигаться. Кровотечения.

Это средство подходит высоким, стройным, светловолосым или смуглым истеричным людям. Левосторонние симптомы. При заболеваниях тазовых органов чувствует общее недомогание. Параличи, в том числе после судорог.

**Хуже.** От испуга. *Перед менструацией*. От холода, когда идет снег. Когда лежит на левом боку. От внезапного сотрясения тела. В закрытом помещении.

**Лучше.** В покое. От давления. На открытом воздухе.

**Психика.** Очень нервный и раздражительный пациент.

**Голова.** Головокружение усиливается, когда пациент спускается по лестнице. Чувствует внезапную слабость, когда поднимается и садится в постели. Ужасная раздавливающая боль; сильнее в левой височной области, сопровождающаяся ощущением, что голова открывается и закрывается.

**Глаза.** Ощущение болезненности в глазных яблоках.

**Лицо.** Румяное и горячее.

**Желудок.** Постоянная тошнота, уменьшающаяся от еды. Аппетита нет.

**Живот.** *Мучительная, судорожная, спастическая* боль (колика) или сильная ломота внизу живота (в гипогастрии); уменьшается во время менструации.



**Мочевыделительная система.** *Учащенное, обильное мочеиспускание:* при головной боли; во время менструации; при кровотечениях и т.д. Пациент не может держать мочу при кашле или при ходьбе. Дизурия, спастическая.

**Женские половые органы.** Менструации: приходят позже, скудные, продолжаются несколько часов, зловонные. Дисменорея: сопровождается метеоризмом; громкими отрыжками и нервозностью; дисменорея спастического характера; мембранозная. Сильные тупые боли, ломота или *мучительные спазмы*, в том числе в области таза; уменьшаются во время менструации.

Бели: густые, белые, с прожилками крови; усиливаются во время стула. Женщина ощущает, чувствует свои внутренние половые органы.

Боль из матки распространяется по всему тазу и часто спускается вниз, вдоль бедер. Ощущение, что тазовые органы переворачиваются, изменяя свое положение внутри тела на противоположное.

Частые и очень ранние *выкидыши*, создающие впечатление бесплодия. Ложные родовые схватки. Очень сильные, непрекращающиеся послеродовые схватки. *Маточное кровотечение.* Вибурнум предотвращает выкидыш, если его применяют до разрыва оболочек.

**Дыхательные органы.** *Приступы удушья* ночью: хуже от холода, сырости. Астма у маленьких детей.

**Шея и спина.** Боль в спине с ощущением усталости; лучше от давления. Прострел, или люмбаго: лучше, когда ходит, прижимая трость поперек спины. Боли в спине заканчиваются *спазмом в матке или перемещаются вниз вдоль бедер.*

**Конечности.** Судороги в икроножных мышцах перед менструациями.

**Кожа.** Лишайные пятна на щеках, руках и т.д.

**Диф. диагноз.** Caul., Puls., Sep.

## VINCA MINOR

Общее. Винка оказывает влияние на кожу и волосы и является эффективным средством для лечения маточных кровотечений. Слабость и изнеможение наблюдаются при многих заболеваниях. При подобной обморочной слабости у пациента возникает чувство, что он сейчас умрет. Из-за нервного напряжения возникает ощущение дрожания, пациент часто вздрагивает.

**Хуже.** После глотания. От гнева. Когда наклоняется. При ходьбе.

**Голова.** На волосистой части головы имеются участки мокнутия кожи, из которых сочится зловонная жидкость; она вызывает склеивание, спутывание волос. Едкий зуд на коже головы. Колтун (plica polonica). Участки облысения: кожа на них покрыта короткими волосами, похожими на шерсть. Волосы выпадают, и на их месте вырастают седые.

**Нос.** Нос краснеет, когда человек хоть немного рассердится. Болячки в носу. Частые носовые кровотечения.

**Горло.** Рези в нижней части пищевода; они провоцируют глотательное движение.

**Женские половые органы.** Менструации обильные, кровотечение в виде сплошного потока; кровь выделяется непрерывно; менструация сопровождается выраженной слабостью; в том числе во время климакса. Пассивное маточное кровотечение, спустя много времени после климакса. Кровоточащие фибромы матки.

**Кожа.** Очень чувствительная; краснеет и становится болезненной от незначительного трения. Участки мокнувшей экземы вперемешку со зловонными толстыми корками. Едкий зуд.

**Диф. диагноз.** Ust.

## VIOLA ODORATA

**Общее.** Фиалка душистая вызывает *выраженную нервную слабость*. Она воздействует на уши, глаза, запястья (правое) и кожу. *Симптомы сочетанного поражения глаза, уха и почки.* Наличие глистов у детей. *Ощущение напряжения.*

Виола одората подходит высоким, худым, нервным девушкам. Повышенная нервная активность, а затем — внезапное истощение.

**Хуже.** В облачную, пасмурную погоду. От холодного воздуха. От музыки. В пубертатном возрасте. От подавления выделений.

**Психика.** Часто плачет, не зная почему. Отвращение к музыке, особенно скрипичной. Ребяческое, инфантильное поведение; уныние; отказ от еды; пациентка говорит тихим нежным голосом.

**Голова.** Напряжение из кожи волосистой части головы распространяется на верхнюю часть лица. Головная боль поперек лба, над бровями; приходится нахмуриться. Жжение во лбу.

**Глаза.** Боль из глаз (из левого) распространяется в темя; хуже от кашля; хориоидит. Иллюзии, обман зрения: видит огненные, извивающиеся кольца. Спазм в глазах. Веки часто закрываются, хотя спать не хочется.

**Уши.** Заболевание ушей сопровождается болью в глазных яблоках. Выделения из уха; в том числе рецидивирующие; наблюдаются с самого рождения. Глухота.

**Нос.** Кончик носа немеет, как от удара.

**Желудок.** Страстное желание мяса.

**Живот.** Зуд в анусе. Глисты.

**Мочевыделительная система.** Моча похожа на молоко, имеет крепкий запах. Недержание мочи (энурез); в том числе у нервных детей.

**Женские половые органы.** Одышка во время беременности.

**Дыхательные органы.** Стеснение в груди; как будто на груди лежит что-то тяжелое. Затруднение дыхания, тревога и сердцебиение. Продолжительные приступы кашля возникают только в дневное время; сопровождаются одышкой.

**Конечности.** Плечи холодные. Ревматизм дельтовидных мышц и запястий (правого), в особенности у женщин. Дрожание конечностей. Давящая боль в костях пальцев рук.

**Кожа.** Сухая кожа, но ладони влажные.

**Сон.** Зевота и потягивание без сонливости.

**Диф. диагноз.** Puls., Spig.

## VIOLA TRICOLOR

**Общее.** Кожа, в том числе кожа волосистой части головы, и мочевыделительные органы — вот основные точки приложения действия фиалки трехцветной. Сочетание симптомов со стороны мочевыделительной системы и кожи. Нервные припадки после подавления молочного струпа; экземы.

**Хуже.** От давления со стороны, противоположной больному месту. Зимой. От холодного воздуха.

**Голова.** Клейкие, покрытые трещинами корки на коже волосистой части головы, из-под которых в большом количестве выделяется вязкая желтая жидкость, склеивающая, сгустывающая волосы; отмечается увеличение желез на шее. Молочный струп.

**Мочевыделительная система.** Моча зловонная, с запахом кошачьей мочи. Недержание мочи (энурез).

**Мужские половые органы.** Поллюции сопровождаются яркими сновидениями; сперматорея во время стула. Опухание и зуд крайней плоти.

**Конечности.** Суставной ревматизм, зуд в области суставов, как при сыпи.

**Кожа.** Экзема, в том числе у детей. Импетиго. Большие нарывы (фурункулы) на всем теле; в том числе у золотушных детей.

**Диф. диагноз.** Rhus-t.

## VIPERA

**Общее.** Яд обыкновенной немецкой гадюки действует на кровь и кровеносные сосуды, особенно *ВЕНЫ*: он вызывает воспаление вен и *СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ*.

Паралич: восходящий; параплегия; в том числе паралич стопы. Полиневрит. Полиомиелит. *Ощущение распираания, как будто лопнет* (нога и т.д.). Жалобы, возникающие во время климакса. Зоб.

**Хуже.** КОГДА СВЕШИВАЕТ КОНЕЧНОСТИ ВНИЗ. Каждый год. От холода. От прикосновения. При перемене погоды.

**Нос.** Носовое кровотечение: сопровождается головокружением; возникает во время кормления ребенка грудью.

**Рот.** Язык опухший, коричневатый-черный, высовывается изо рта. Губы синие; опухшие. Речь затруднена. Лицо опухшее.

**Горло.** Опухание горла, напоминающее увеличение щитовидной железы, зоб. Отек голосовой щели.

**Живот.** Мучительная боль в эпигастрии; хуже от давления. Печень увеличена, жестокая боль из увеличенной печени распространяется в плечо и в верхнюю часть бедра (область крыла подвздошной кости); желтуха с лихорадкой.

**Мочевыделительная система.** Гематурия.

**Женские половые органы.** Кровотечение в климактерическом периоде; кровь красная, содержит темные сгустки; кровотечение не обильное, но продолжительное; сопровождается изнеможением и обморочной слабостью; а также кровотечение из-за кормления ребенка грудью.

**Конечности.** Ощущение переполнения и невыносимая боль, как будто конечность лопнет; пациент вынужден приподнимать больную конечность; сидит, высоко подняв стопы. Судороги в нижних конечностях; или они синего цвета. Шаркающая походка вследствие паралича; стопы. Варикозное расширение вен и острый флебит.

**Кожа.** Язвы. Гангрена. Нарывы (фурункулы). Карбункулы, сопровождающиеся ощущением распираания в больном месте. Крупнопластинчатое шелушение кожи. Лимфангиома.

**Диф. диагноз.** Elaps.

## VISCUM ALBUM

**Общее.** Омела поражает нервы и женские половые органы.

Общее дрожание (тремор), как будто во всех мышцах происходит сокращение волокон. Невралгия. Хорея после испуга. Боли в позвоночнике, связанные с патологией матки. Эпилепсия: пациент ощущает сильный жар, поднимающийся из стоп в голову. Подагра и ревматизм. Кровь не свертывается, а рана не заживает. Ишиас в сочетании с выделениями из уха.

**Хуже.** Зимой; в холодную штормовую погоду, в бурю. От движения. Когда лежит на левом боку. Если замерзнет после того, как разогрелся, был разгорячен. От подавления менструаций.

**Психика.** Страх телефона.

**Голова.** Головокружение: стойкое, постоянное; в том числе после приступа эпилепсии. Внезапная пульсация в темени.

**Живот.** Кажется, что кто-то тянет пациентку вниз, держась за ее талию. Болезненность в области талии.

**Мочевыделительная система.** Моча, как молоко; после того, как постоит.

**Женские половые органы.** Метроррагия: частично кровь яркая, частично — свернувшаяся, в виде темных сгустков.

**Дыхательные органы.** Чувствует, что задыхается, когда лежит на левом боку. Бронхиальная астма, связанная с подагрой или ревматизмом.

**Сердце.** Сердцебиение во время коитуса, у мужчин. Гипертрофия сердца. Низкое артериальное давление.

**Конечности.** Рвущие, стреляющие боли в обоих бедрах и в верхней конечности. Ишиас; в том числе в сочетании с выделениями из уха.

Ощущение, как будто паук ползет по тыльной поверхности кисти и стопы. Ощущение, как будто к пятке приложили раскаленные докрасна угли. Ощущение, как будто тело пылает, раскалено, начиная со стоп и заканчивая головой. Прострел (люмбаго) из-за охлаждения, хочется, чтобы кто-нибудь надавил на спину.

**Диф. диагноз.** *Bufo*.

## **ХАНТНОХУЛУМ**

**Общее.** Желтодревник оказывает влияние на нервы; женские половые органы; дыхательную систему и на левую сторону тела.

Паралич отдельных частей тела; гемиплегия. Размалывающая, как будто жерновами, стреляющая, расходящаяся в стороны (иррадиирующая), внезапная боль; невралгия.

Пациенты — неврастеники: худые; истощенные, страдающие от плохого усвоения пищи, а также от бессонницы. Ощущение покалывания; толчки, напоминающие электрические разряды. Онемение левой стороны тела. Жгучая боль, жжение, как от перца, на слизистых оболочках. При ходьбе возникает ощущение, что пол мягкий, как будто из шерсти. Травма, повреждение нервов.

**Хуже.** Когда спит. От сырости. Если промочит ноги. От подавления менструаций.

**Лучше.** От рвоты. Когда ложится, лежа. Если выпьет воды со льдом.

**Психика.** Нервничает, испугана. Пациентке все равно, жива она или умерла.

**Голова.** Пульсирующая головная боль; боль сопровождается ощущением, что макушка отлетит, оторвется от головы. Ощущение, как будто голова разделена на две части. Как будто вокруг головы тугая повязка.

**Горло.** Привкус перца во рту и в горле. Ощущение пустоты в горле.

**Желудок.** Расстройство пищеварения из-за переедания и чрезмерно обильного питья.

**Женские половые органы.** Невралгия яичников, сопровождающаяся болью в верхней части бедер (в области крыла подвздошной кости) и внизу живота. Жесткая, мучительная, размалывающая боль *при дисменорее*; она не уменьшается ни при каком положении тела; боли спускаются в бедра или распространяются по всему телу, вплоть до сердца.

Послеродовые схватки и лохии сопровождаются характерными болями. Менструации слишком ранние и обильные; кровь густая, почти черная. Бели вместо менструаций. Аменорея.

**Дыхательные органы.** Постоянное желание сделать глубокий вдох. Ощущение стеснения в груди. Постоянный сухой кашель — днем и ночью.

**Конечности.** Болезненность бедер перед менструацией. Стреляющие невралгические боли в конечностях. Гемиплегия (слева). Ишиас: ухудшение наступает летом. Копчик очень чувствительный; кажется, что он удлиннен.

**Сон.** Летает во сне.

**Диф. диагноз.** *Ars.*, *Lach.*

## **ZINCUM METALLICUM**

**Общее.** Это средство соответствует отравлению, интоксикации *НЕРВОВ И ГОЛОВНОГО МОЗГА*.

*МОЗГ И НЕРВЫ ИСТОЩЕНЫ*; ткани изнашиваются раньше, чем успеют восстановиться. Это *приводит к депрессии и снижению запасов нервной энергии*. Пациент не может избавиться от продуктов жизнедеятельности;

у него не появляются высыпания или выделения. *В заболевании имеется фаза подавления.* Выраженная анемия; нарастающая *слабость*; она усиливается от еды; *сопровождается двигательным беспокойством.*

Интоксикация вследствие подавления выделений и высыпаний. *И золи-рованные проявления; ощущение ползания мурашек.* Одна часть тела немеет, в другой чувствительность сохранена, одна часть тела горячая, другая — холодная. Боль на ограниченном участке; она локализуется между кожей и нижележащими мягкими тканями.

*Дрожание;* ощущение внутреннего дрожания. Судорожное *подергивание* или *спастическое сокращение мышцы*, усиливается ночью, во время сна; *спазмы* возникают, в том числе из-за травмы позвоночника. *Беспокойство в стопах*, а также другие автоматические движения — рта, рук и кистей.

После того, как пациент лег, возникает ощущение, что все тело онемело. Невралгия после опоясывающего лишая: лучше от прикосновения. Боли, имеющие поперечное направление; стреляющие боли. Нисходящий паралич. Боли в костях, лишаящие трудоспособности. Ознобление, обморожение; поверхность кожи синяя. Кровянистые выделения.

Болезненные последствия горя; гнева; испуга; бессонных ночей; хирургических операций; усиленной учебы, научной деятельности. Хорея после испуга или из-за подавления высыпаний; хуже во время сна; особенно поражаются стопы. Последствия сотрясения головного мозга.

**Хуже.** *ОТ ИСТОЩЕНИЯ* — нервного или физического. *От шума. От прикосновения.* От вина. После согревания, когда разгорячен. От подавления высыпаний; менструаций; выделений. От сладкого. От молока. После еды.

**Лучше.** *От движения.* От сильного давления. На открытом воздухе в теплую погоду. *ОТ ОБИЛЬНЫХ БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ;* в том числе менструации и т.д. От растирания, расчесывания. От еды.

**Психика.** Прежде чем ответить на вопрос, повторяет его. Пациент боится, что его арестуют по подозрению в совершении преступления. Раздражительный, капризный, сварливый; *плачет*, если раздрадован или растроган; плачет во сне (ребенок). Легко пугается, вздрагивает; легко приходит в волнение, возбуждение и легко пьянеет.

*Забывчивый.* *Кричит* от боли. Испытывает отвращение к беседе, разговору; к работе. *Чувствителен* к разговорам других людей и к шуму. Пациент, когда просыпается, смотрит широко раскрыв глаза, присталь но, как будто напуган; и при этом катает голову по подушке из стороны в сторону. Спутанность сознания. Нервное истощение. Плачет, когда сердится. Летаргический сон. Спокойно думает о смерти.

**Голова.** Сильное головокружение в сочетании с оцепенением (ступором). *Головная боль* разной интенсивности. *Давящая боль в темени; в корне носа;* она распространяется в глаза; сопровождается снижением зрения; усиливается от тепла; уменьшается от сильного давления; на открытом воздухе. Сильная тупая боль в висках; хуже, когда кусает что-нибудь, сжимает зубы.

Тянущее ощущение из затылка вниз, вдоль спины, как от удара по затылку; после этого появляется слабость в голених. Пациент слышит грохот, треск в голове, когда засыпает. Катает голову по подушке; зарывается головой в подушку и скрежещет зубами. Затылок горячий, а лоб холодный.

Волосы выпадают на темени. Волосы торчат кверху, ломкие, чувствительные. Паралич мозга. Облысение темени, при этом кожа головы болезненная. Головные боли: у школьников, страдающих от перенапряжения; после употребления небольшого количества вина. Головная боль сопровождается неясным зрением и усиливается от жары. Менингит. Гидроцефалия после детской холеры или поноса.

**Глаза.** Зуд и болезненность век и внутренних углов глаз. Конъюнктивит более выражен у внутреннего угла глаза. Кажется, что глаза притянуты друг к другу. Слезотечение во время еды. Птеригий. Вращает глазами. Косоглазие. После хирургической операции видит светящиеся предметы или ощущает сильное жжение в глазах.

**Уши.** Часто ощущается резкая колющая боль (колотье) в ухе; в том числе у детей (у мальчиков). Выделение вонючего гноя из уха. Зуд в ухе уменьшается, если поковырять в нем.

**Нос.** Опухший. Давление в корне носа. Сухость в носу, болезненность носа.

**Лицо.** Бледное лицо; бледность чередуется с покраснением. Синеватое лицо; несчастное. Губы склеиваются, сухие, потрескавшиеся.

**Рот.** Пациент скрежещет зубами. Кровоточащие десны. Эхолалия. Герпетические высыпания во рту из-за купания в море. Горький привкус или привкус крови.

**Горло.** Боль в наружных шейных мышцах во время глотания. Боль в зеве во время зевания. Горький привкус в горле.

**Желудок.** Волчий голод около 11 ч. Изжога усиливается от сахара. Человек ест или пьет в большой спешке. Не может есть достаточно быстро. Аппетита нет, при этом язык чистый. Ощущение, как будто червяк ползет к горлу из подложечной области; поэтому возникает кашель. Сладковатая жидкость подкатывает к горлу. Ощущение комка, подкатывающего к горлу из подложечной области (globus hystericus). Отвращение к мясу, особенно к телятине; к сладостям; к вареной или теплой пище. От вина становится хуже. Жидкости вырывает сразу после питья.

**Живот.** Ощущение, как будто комок в области печени или возле пупка. Вздутие внизу живота — в гипогастрии. Печень увеличена, плотная и болезненная. Симптомы, рефлекторно связанные с блуждающей почкой. Ощущение, что геморроидальные узлы тянет вниз; лучше от тепла, от горячего; хуже от ходьбы.

Стул: большого объема, сухой, выделяется с трудом, после него возникает непроизвольное мочеиспускание. Зуд в заднем проходе во время стула. Язвы в области геморроидальных узлов. Холероподобный понос у младенцев. Нервный понос. Мозговые симптомы из-за внезапного прекращения поноса; запор у новорожденных. Горячие, с гнилостным запахом кишечные газы. Невралгия: селезенки; межреберная. Толчки, подергивание, распространяющиеся из паховой области в половой член.

**Мочевыделительная система.** Жестокие императивные позывы (тенезмы), но мочеиспускание происходит только в причудливых позах: откинувшись назад, положив ногу на ногу и т.д. Истерическая задержка мочи. Кровотечение после мочеиспускания. Давящие, режущие боли в области в области почек. Не способен удерживать мочу, если не двигает постоянно стопами. Блуждающая почка. Непроизвольное мочеиспускание при ходьбе, кашле или чихании. Викарные кровотечения при подавлении менструаций.

**Мужские половые органы.** Легко возникает сексуальное возбуждение; во время коитуса семяизвержение наступает слишком рано или с трудом. Простаторея возникает без всякой причины. Пациент хватается за половые органы; в том числе при кашле и т.д. Выпадение волос на лобке. Пациент становится грустным после семяизвержения. Опухание яичек сопровождается их втягиванием. Невралгия яичек; хуже при ходьбе.

**Женские половые органы.** Повышенное сексуальное желание. Возникает желание заняться мастурбацией; в том числе во время менструации. Нимфомания у рожениц; а также из-за подавления лохий.

Обильные менструации с выделением крови в виде сгустков, комков. Менструальное кровотечение сильнее ночью. Зуд наружных половых органов во время менструации; он вызывает желание заняться мастурбацией. Боли в молочных железах и половых органах при подавлении менструаций. Все недомогания уменьшаются, когда начинается менструация. Варикозное расширение вен во время беременности. Боли в молочных железах, соски болезненные. Боль в яичнике (слева). Двигательное

беспокойство, грусть, чувство холода во всем теле, чувствительность позвоночника и беспокойные стопы — все эти симптомы присутствуют в жалобах женщин.

**Дыхательные органы.** Одышка усиливается при метеоризме и уменьшается при отхаркивании мокроты. Изнуряющий спастический кашель, усиливающийся от сладких продуктов. Ощущение сжатия в груди. Сухой кашель перед менструацией и во время нее. Мнет, теребит свои половые органы во время кашля, особенно ребенок.

**Сердце.** Ощущение, что сердце покрыто шапочкой. Сердце бьется тяжело. Аритмичная, спастическая работа сердца; время от времени возникает одно сильное сокращение. Неистовая пульсация при жаре (во время лихорадки).

**Шея и спина.** В задней части шеи появляется чувство усталости и бессилия из-за письма или нервного напряжения любого рода. Шея слабеет, кажется, что она больше не способна держать голову, затем возникает оцепенение (ступор).

*Жжение вдоль всего позвоночника; сильнее, когда пациент сидит. Ноющая боль, ломота в позвоночнике; а также в пояснице; сильнее, когда пациент поворачивается в постели; когда сидит или когда садится, опускается на стул, а также при наклоне. Позвоночник чувствительный, пациент не выносит прикосновения к нему. Режущая боль между лопатками уменьшается после отрыжки. Тупая, ноющая боль в области последнего грудного или первого поясничного позвонка. Слабость в поясничной области: хуже, когда пациент стоит.*

**Конечности.** Когда пациент бывает разгорячен, согревается, возникают боли в конечностях. Слабость и дрожание кистей: когда пишет; а также во время менструаций. Экзема на кистях. Боли в поперечном направлении, особенно в верхних конечностях.

**СТОПЫ И ГОЛЕНИ НЕ МОГУТ СТОЯТЬ НЕПОДВИЖНО, НЕ ДВИГАТЬСЯ.** Судороги в стопах и голенях, когда холодно. Кажется, что пальцы на ногах опухли; болезненные; в кончиках пальцев ощущается тупая боль. Подошвы чувствительные. Кости стопы как будто сломаны.

Спастическая походка, пациент спотыкается; он пошатывается при ходьбе, особенно в темноте и с закрытыми глазами.

Варикозное расширение вен, вены болезненные; хроническое расширение вен. Боли при локомоторной атаксии, как удары молнии; отмечается потливость стоп и болезненность пальцев на них. Ощущение, что по коже стоп и голеней ползают насекомые, мешает спать; лучше от растирания и давления.

Истерические контрактуры, пальцы на руках стянуты, кисти деформированы. Жжение в большеберцовой кости. Стопы парализованы. Язвенная боль в пятке усиливается при ходьбе. Боль в дельтовидной мышце; хуже, когда пациент поднимает руку.

**Кожа.** Зуд кожи на бедрах и в подколенной ямке. Экзема: у анемичных людей и невротиков; в том числе на кистях. Варикозное расширение вен на голенях и на половых органах. Ощущение ползания мурашек на стопах и голенях; как будто по коже ползет насекомое; это мешает пациенту спать.

**Сон.** Прерывистый, неосвежающий сон. Пациент громко кричит во сне, не сознавая этого. Дергается и вздрагивает, когда засыпает. Снохождение (сомнамбулизм) после подавления эмоций.

**Лихорадка.** Ощущение зябкости, холода в спине; как будто должна начаться лихорадка. Кисти и стопы становятся холодными, мерзнут.

Обильное потоотделение ночью. Потливость стоп.

**Дополнительно.** Puls., Sep., Sulph.

**Диф. диагноз.** Нер., Ign., Kali-p., Lach., Pic-ac.

## ZINCUM ARSENICOSUM

**Общее.** Это средство предполагает заболевание *поясничной области* и нижних конечностей. Хорея. Полное изнеможение от незначительного напряжения. Боль в затылке. Пациент видит все в синем цвете. Жжение в *мочевом пузыре*. Онемение сначала правой руки, затем левой; лучше, когда пишет. Боль в пояснице усиливается *от напряжения*; в положении сидя; от сотрясения тела или стоя. В подошвах ощущается тупая боль, ломота, возникающая от усталости и уменьшающаяся от давления.

**Хуже.** В 10 ч и в 15 ч. От незначительного напряжения.

## ZINCUM CHROMICUM

**Общее.** Это вещество действует на *уши, нос, горло*, а также на левую сторону тела. Боль тупая, ноющая, грызущая, размалывающая или блуждающего характера; в виде толчков, ударов. Колотье, вынуждающее остановиться, не позволяющее двигаться.

**Хуже. ОТ ДВИЖЕНИЯ.** Лежа на спине. От мытья головы.

**Психика.** Отвращение к работе; пациентка не может заставить себя заняться делом.

**Голова.** Ощущение давления внутри; на ограниченном участке в области темени, там, где соединяются венечный и стреловидный швы на черепе. Пульсация в висках.

**Глаза.** Острота зрения колеблется.

**Уши.** Пульсация за ушами.

**Нос.** В носу ощущается неприятный запах. Когда сморкается, отходит гной с кровью, а также корки.

**Рот.** Металлический привкус во рту.

**Желудок.** Определенных пищевых пристрастий нет; пациент не знает, что он хотел бы съесть. Противна даже мысль о еде.

**Живот.** Пациентка не выносит прикосновения своих рук к животу — когда они лежат на животе.

**Женские половые органы.** Сухость влагалища с ощущением, что начинается заболевание; возникает с 10 ч до 12 ч.

**Дыхательные органы.** Кашель возникает из-за щекотания в яремной ямке. Мокрота: сладкая, жидкая; но ее приходится проглотить; либо мокрота плотная, вязкая; ее отхаркивание всегда сопровождается периодами, когда пациент отплевывается. Стреляющая боль из гортани (слева) распространяется через миндалины в ухо.

**Сердце.** Режущая боль в области верхушки сердца; возникает ночью.

**Спина.** Грызущая и размалывающая боль ниже и выше левой лопатки.

**Конечности.** Стопы болезненные. Грызущая, размалывающая, как жерновыми, боль сводит пальцы на стопах, в том числе ночью.

**Диф. диагноз.** Puls.

## ZINCUM IODATUM

**Общее.** Иодид цинка действует на *сердце*, его клапаны и нервы.

Спастическое сокращение мышц; вздрагивание; боли, как от занозы, щепки. Ощущение парения. Боль имеет волнообразный характер.

**Хуже.** Лежа на левом боку. От жара. Психика. С трудом запоминает прочитанное.

**Голова.** Головокружение усиливается, когда пациент лежит на левом боку.

**Нос.** Заложен; в том числе ночью. Когда сморкается, выделяются плотные, в том числе желтого цвета, комки. Жар и сухость в носу.

**Горло.** Зоб: его давление направлено внутрь. Боли в горле, как от щепки, занозы.

**Желудок.** Ощущение холода в желудке и кишечнике сопровождается потоотделением.

**Дыхательные органы.** Щекотание в горле. Чем больше человек кашляет, тем сильнее ощущается щекотание. Волнообразная боль у края последних (плавающих) ребер справа.

**Сердце.** Сердцебиение, когда пациент лежит на левом боку. Истощение миокарда. Конечности. Ощущение, что нижние конечности парят в воздухе; сильнее, когда лежит на левом боку. Судороги в икроножных мышцах, в области лодыжек, уменьшаются, когда пациент прижимает ноги к полу.

**Диф. диагноз.** Stict.

## ZINCUM PHOSPHORICUM

**Общее.** Это средство для лечения нервной депрессии, утомления; нервного истощения у бизнесменов.

Сексуальное возбуждение и бессонница. Нервозность. Паралич. Эпилепсия. Злоупотребление бромидами. Забывчивость, лень, дурные предчувствия; ухудшение наступает после полудня и ночью. Ощущение ползания мурашек по всему телу. Головокружение нервного происхождения уменьшается, когда пациент ложится.

## ZINCUM SULPHATE

**Общее.** Это средство позволяет избавиться от помутнения роговицы. Дрожание и конвульсии.

## ZINCUM VALERIANICUM

**Общее.** Валериановокислый цинк оказывает влияние *на нервы*, яичники и позвоночник.

Симптомы со стороны нервной системы, сопровождающиеся болями. Невралгия. Повышенная чувствительность; пациент нервничает и страдает от бессонницы. Истерия. Упорная икота. Эпилепсия без ауры.

**Лучше.** *От растирания.*

**Психика.** Возбудимый человек. Испытывает душевный дискомфорт, мучается. Испытывает беспочвенный страх.

**Голова.** Жестокая невралгическая боль перемежающегося характера.

**Уши.** Щекотание над левым ухом.

**Лицо.** Лицевая невралгия.

**Рот.** Кислый привкус во рту в первой половине суток (до полудня). Пациент задыхается, когда пытается поесть.

**Живот.** Судорожные боли из-за метеоризма; в том числе внизу живота. Слизистый колит.

**Женские половые органы.** Невралгия яичника: стреляющие боли распространяются из живота в бедра, в стопы; возникают во время менструации и после нее. Дисменорея: боли распространяются вдоль бедер.

**Спина.** Тупая боль, ломота распространяется вверх по спине.

**Лихорадка.** Озноб, ощущение холода после нервного возбуждения или напряжения. В тех частях тела, что были холодными, по мере их согревания появляется жжение.

## ZINGIBER

**Общее.** Имбирь воздействует на пищеварительный тракт.

Недомогания возникают после употребления в пищу дыни и от питья плохой воды. Астма желудочного происхождения; приступ не сопровождается тревогой; ухудшение наступает под утро. Подавление моче выделения после тифа. Сухой кашель, сопровождающийся отхаркиванием большого количества мокроты утром. Кажется, что все суставы слабые. Тупая боль в пятках появляется, если человек долго стоял на ногах.

## ZIZIA

**Общее.** Спастические сокращения мышц лица и конечностей. Хореоформные подергивание во время сна. Ипохондрия, желание покончить с собой.